【校勘影印本】

中國醫學大成續集

【十二】

上海科學技術出版社

(校勘影印本)

中國醫學大成續集

(十[illegible])

上海科學技術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国医学大成续集. 12 / 曹炳章编. —影印本. —上海: 上海科学技术出版社, 2000.12

ISBN 7-5323-5215-3

Ⅰ.中… Ⅱ.曹… Ⅲ.中国医药学-总集
Ⅳ.R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41291 号

上海科学技术出版社出版发行
(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)
上海江扬印刷厂印刷 新华书店上海发行所经销
2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷
开本 787×1092 1/32 印张 46.125 插页 4
印数 1—2 000 定价: 100.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

千金翼方

〔唐〕孫思邈　撰

原編　曹炳章

出版說明

近代中醫學家，江南名醫曹炳章（一八七七—一九五六），字赤電，浙江四明人。醫名鼎盛，謙遜好學，診餘廣集醫書，名聞海內。自語「常蓄醫藥革命之決心」，爲振興中醫，奔走呼號，不遺餘力。平生著述甚豐，僅撰述和評校之書，即達三十餘種（不包括《中國醫學大成》），實踐了一條「從臨床中來，而歸宿于著作」的醫學家之路。

正因爲曹氏具有豐富的臨證經驗，又有廣博的學識，三十年代，上海大東書局（爲上海科學技術出版社前身之一）特聘其主纂當時被譽爲醫學淵府之《中國醫學大成》，實爲國內中醫界一大盛事。

《中國醫學大成》分十三類，凡三百六十五種：醫經十五種，藥物十九種，診斷十六種，方劑十九種，通治六十種，外感病四十三種，內科二十七種，外科五十二種，婦科二十四種，兒科三十三種，鍼灸十六種，醫案十六種，醫論、醫話、醫史二十五種。因其搜羅至廣、版本選擇至精而稱譽醫壇。《中國醫學大辭典》主編謝利恆氏贊此書「吾道精華，咸集于此」；醫史學家宋大仁稱：「茲書一旦問世，人人皆有獲讀秘籍之機會，必不似從前爲少數人私有物矣。不僅有沾溉學人之益，且維我國數千年醫學文獻于不墜也」。浙江中醫學院徐榮齋教授在紀念曹炳章先生誕生一百周年的專文中，歸納此書對中醫之發展具備八大價值：一、保存和流通古醫籍；二、有系統可循；三、打破保守；四、公開禁方；五、統一中醫學術；六、奠定習醫之參考書；七、造就中醫高深人才；八、便利圖書館之採貯。

中醫藥學歷數千年變化而長盛不衰，雖受西洋醫學之衝擊，又生存于現代科學技術突飛猛進之今日，但至今猶屹立于世界醫學之林，並日益受到各國人士歡迎，此不可不謂人類文明史上的一大奇跡。中醫藥學之發展，除因其獨特的理論體系和卓越之臨床療效外，亦賴于中醫文獻之流傳、保存、搜集、整理及刊行，才使其理論著述、臨床經驗、臨床資料、珍貴典籍得以存世，並不斷擴充完善。《中國醫學大成》之結集刊行，無疑大有益于振興中醫、發展中醫。

《中國醫學大成》雖因戰火蔓延，僅刊印一百三十六種而中止，且已刊行者，至今已散佚不全，但我社于前幾年重刊《中國醫學大成》之一百三十六種，結集成五十冊發行，震動了海內外，可見關心、支持、熱愛中醫藥事業者遍及亞洲，乃至世界。曹炳章先生未及刊行完成之《中國醫學大成》後續部分，被列入國家八五、九五重點出書項目，此亦可告慰于九泉之下的曹先生。

此次刊行之《中國醫學大成》續集，計一百一十八種，結集成四十九冊；大部分爲原刻本，部分爲木刻本。爲保持原書之風貌，一概未于原書上改字校注，遇錯訛、脫漏、缺字者，均于書後校注中另勘，以便爲讀者留出研究和斟酌之餘地。每種書後修有後記，介紹該書作者生平、簡歷、學術觀點，及是書版本概況、成書年代等，簡明扼要。

是書之校勘者和編輯，爲覓一原刻本，南下北上，不辭辛勞；爲一字之勘定，常殫精竭慮，如履薄冰。如此歷數載以成，奉獻于讀者，期能集有志者完成先輩未竟之事業，光大我中醫于世界。

全国古籍整理出版规划
领导小组资助出版

千金翼方提要

千金翼方。乃影刊元大德本。仁宗皇帝詔儒臣林億等校定千金翼方。謂物之繁。必先得其要。故首之以藥録纂要。凡治病者。宜別藥之性味。故次之以本草。人之生育。由母無疾。故次之以婦人。疾病之急。無急於傷寒。故次之以傷寒。然後養其少小。故次之以小兒。人身既立。必知所以自養。故次之以養性。養性者莫善於養氣。故次之以辟穀。氣之盈乃可安間。故次之以退居。退居者當事補養。故次之以補益。若補養失宜。則風疾乃作。故次之以中風。風者百病之長。邪氣緣而畢至。故次之以雜病。又次之以萬病。愈諸疾者必資乎大藥。故次之以飛煉。乳石性堅。久服生熱。故次之以瘡癰。衆多之疾。源乎脈證。故次之以色脈。色脈既明。乃通腧穴。故次之以鍼灸。而以

禁經終焉。書凡三十卷。目録一卷。林億以爲晉有人欲刊正周易及諸藥方。與祖訥論。祖云辨釋經典。縱有異同。不足以傷風教。至於湯藥小小不達。則流弊滋多。是醫方不可以輕議也。更不宜妄加塗竄。必取自神農以下各書。行於世者而精討之。有所未盡。仍俟來者。可見當時是書校勘之慎重矣。

景元大德本千金翼方三十卷

光緒戊寅上海紀行

獨山莫繩孫補署檢

校正千金翼方表

臣聞醫方之學。其來遠矣。上古神農播穀嘗藥。以養其生。黃帝歧伯君臣問對。垂於不刊。爲萬世法。中古有長桑扁鵲。漢有陽慶倉公張機華佗。晉宋如王叔和葛稚川皇甫謐范汪胡洽深師陶景之流。凡數十家。皆師祖農黃著爲經方。迨及唐世孫思邈出。誠一代之良醫也。其行事見諸史傳。撰千金方三十卷。辨論精博。囊括衆家。高出於前輩。猶慮或有所遺。又撰千金翼方以輔之。一家之書。可謂大備矣。其書之傳於今。訛舛尤甚。雖洪儒碩學不能辨之。

仁宗皇帝詔儒臣校正醫書。臣等今校定千金
翼方。謂乎物之繁。必先得其要。故首之以藥錄
纂要。凡治病者宜別藥之性味。故次之以本草。
人之生育由母無疾。故次之以婦人疾病之急。
無急於傷寒。故次之以傷寒。然後養其少小。故
次之以小兒。人身既立。必知所以自養。故次之
以養性。養性者莫善於養氣。故次之以辟穀。氣
之盈乃可安閒。故次之以退居。退居者當事補
養。故次之以補益。若補養失宜則風疾乃作。故
次之以中風。風者百病之長。邪氣緣而畢至。故
次之以雜病。又次之以萬病。愈諸疾者必資乎大

藥。故次之以飛鍊。乳石性堅。久服生熱。故次之
以瘡癰。衆多之疾。源乎脉證。故次之以色脉。色
脉既明。乃通腧穴。故次之以針灸。而禁經終焉。
總三十卷。目錄一卷。臣以爲晉有人欲刋正周
易及諸藥方。與祖訥論。祖云。辨釋經典。縱有異
同。不足以傷風教。至於湯藥。小小不達。則後人
受弊不少。是醫方不可以輕議也。臣等不敢肆
臆見。妄加塗竄。取自神農以來書行於世者。而
質之。有所未至。以俟來者。書成繕寫。將預
聖覽。恭惟
皇帝陛下天縱深仁。孝述前烈。刋行方論。拯治

生類。俾天下家藏其書。人知其學。皆得爲忠孝。亦　皇風之高致焉。太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫竒大常少卿充秘閣校理臣林億等謹上

千金翼方序

唐　逸士　孫思邈　撰

原夫神醫祕術。至賾參於道樞。寶餌凝靈。宏功浹於眞畛。知關籥玄牡。駐歷之効已深。轡策天機。全生之德爲大。稽炎農於紀籙。資太一而反營魂。鏡軒后於遺編。事岐伯而宣藥力。故能嘗味之績。鬱騰天壤。診體之教。播在神寰。醫道由是濫觴。時義肇基于此。亦有志其大者。高密問紫文之術。先其遠者。伯陽流玉冊之經。擬斯壽於乾坤。豈伊難老。儔厥齡於龜鶴。詎可蠲痾。茲迺大道之眞。以持身抑斯之謂也。若其業濟含

靈。命懸茲乎。則有越人徹視於腑藏。秦和洞達於膏肓。仲景候色而驗眉。元化刳腸而湔胃。斯皆方軌疊跡。思韞入神之妙。極變探幽。精超絕代。之巧。晉宋方技既其無繼。齊梁醫術曽何足云。若夫醫道之為言寔惟意也。固以神存心手之際。意析毫芒之裏。當其情之所得。口不能言。數之所在。言不能諭。然則三部九候。廼經絡之樞機。氣少神餘。亦鍼刺之鈞軸。況乎良醫則貴察聲色。神工則深究萌芽。心考錙銖。安假懸衡之驗。敏同機駭。曽無挂髮之淹。非天下之至精。其孰能與於此。是故先王鏤之于玉板。往聖藏

之以金匱。豈不以營疊至道。括囊真賾者歟。余幼智蔑聞。老成無已。才非公幹。夙嬰沈疾。德異士安。早纒厄瘵。所以志學之歲。馳百金而徇經方。耄及之年。竟三餘而勤藥餌。酌華公之録帙。異術同窺。採葛生之玉函。奇方畢綜。每以爲生者兩儀之大德。人者五行之秀氣。氣化則人育。伊人稟氣而存。德合則生成。是生曰德而立。既知生不再於我。人處物爲靈。可幸蘊靈心。闕頤我性源者。由檢押神秘。幽求今古。撰方一部。號曰千金。可以濟物攝生。可以窮微盡性。猶恐岱山臨目。必昧秋毫之端。雷霆在耳。或遺玉石之

響。所以更撰方翼三十卷。共成一家之學。譬輗軏之相濟。運轉無涯。等羽翼之交飛。摶搖不測。矧夫易道深矣。孔宣繫十翼之辭。玄文奧矣。陸績增玄翼之說。或沿斯義。述此方名矣。貽厥子孫。永爲家訓。雖未能譬言中庶。比潤上池。亦足以慕遠測深。稽門叩鍵者哉。儻經目於君子。庶知余之所志焉。

〔一〕
黃帝內經素問（唐）王　冰撰
〔二〕
黃帝內經太素（清）楊上善撰
〔三〕
素問識（日本）丹波元簡輯注
〔四〕
黃帝靈樞經（唐）王　冰校
內經知要（明）李念莪原輯
圖註脈訣辨真（西晉）王叔和撰
〔五〕
增訂本草滙纂（清）屠道和撰
本草蒙筌（明）陳嘉謨撰
〔六〕分裝甲乙兩册
神農本草經疏（明）繆希雍撰
〔七〕
本草綱目拾遺（清）趙學敏撰
〔八〕
本草從新（清）吳遵程撰
得配本草（清）施雯嚴潔洪煒輯
〔九〕
脈訣滙辨（清）李延昰輯著
診病奇侅（日本）丹波元堅撰
〔十〕
脈影指歸圖說（西晉）王叔和著
四診抉微（清）林慎庵輯著
王文選原本
舌鑑辨正（清）梁玉瑜傳
陶保廉録
元敖氏傷寒金鏡録（元）杜清碧編
〔十一〕分裝甲乙兩册
備急千金要方（唐）孫思邈撰
〔十二〕
千金翼方（唐）孫思邈撰
〔十三〕
重訂內經拾遺方論（宋）駱龍吉著
歌方集論（明）劉裕德
朱練重訂
附　人身譜（清）祝春渠著
〔十四〕
急救仙方　作者不詳
絳雪園古方選注（清）王子接撰
得宜本草（清）王子接撰
〔十五〕
醫方選要（明）周文采編
〔十六〕
成方切用（清）吳儀洛撰
〔十七〕
素問玄機原病式（金）劉完素撰
黃帝素問宣明論方（金）劉完素撰
素問病機氣宜保命集（金）張元素撰
傷寒醫鑒（金）馬宗素撰
傷寒直格（金）劉完素撰
傷寒標本心法類萃（金）劉完素撰
傷寒心要（金）鏴　洪編
傷寒心鏡（金）常　德編
〔十八〕
醫壘元戎（元）王好古著
〔十九〕
衛生寶鑒（元）羅天益著
附　衛生寶鑒補遺（元）羅天益著
〔二十〕
此事難知（元）王好古撰
局方發揮（元）朱震亨撰
格致余論（元）朱震亨撰
崔真人脈訣（宋）崔嘉彥撰
脈訣指掌病式圖說（元）朱震亨撰
醫學發明（金）李東垣著
活法機要　不著撰人
養生四要（明）萬　全著
〔二十一〕
保命歌括（明）萬密齋著
〔二十二〕分裝甲乙丙丁四册
醫學綱目（明）樓　英著
〔二十三〕
醫門法律（清）喻　昌著
〔二十四〕
傷寒發微論（明）許叔微撰
傷寒百證歌註（明）許叔微撰
温熱類編（清）凌嘉六著
痎瘧論疏（明）盧之頤撰
〔二十五〕
傷寒論條辨（明）方有執著

治疫全書 （清）熊立品撰
〔二十六〕
痢證滙參 （清）吳本立撰
痢證大全 （清）孔毓禮著
急救痧證全集 （清）費友棠撰
〔二十七〕
先醒齋醫學廣筆記 （明）繆希雍撰
醫悟 （清）馬冠群著
〔二十八〕
雲林神彀 （明）龔廷賢撰
醫旨緒餘 （明）孫一奎撰
醫方簡義 （清）王馥原撰
〔二十九〕
醫醇賸義 （清）費伯雄撰
醫方論 （清）費伯雄撰
〔三十〕
醫宗必讀 （明）李士材著
〔三十一〕
瘍科選粹 （明）陳文治輯 繆希雍參訂
附 洄溪秘方 （清）徐靈胎撰
〔三十二〕
解圍元藪 （明）沈之問撰
徽瘡新書 （日本）片倉元周著
傷科補要 （清）錢秀昌撰
救傷秘旨 （清）趙蘭亭撰
跌損妙方 （明）異遠真人著
傷科秘書 著者闕名
〔三十三〕
重樓玉鑰 （清）鄭梅澗撰
重樓玉鑰續編 （清）鄭承瀚方成培撰
目經大成 （清）黄燕臺撰
〔三十四〕
審視瑤函 （明）傅仁宇纂輯
焦氏喉科枕秘 （清）金德鑒編校
白喉忌表抉微 （清）耐修子撰
白喉捷要 （清）張紹修著
白喉全身集 （清）李紀方著
白喉證治通考 （清）張采田撰
白喉條辨 （清）陳虬撰
疫痧草 （清）陳耕道撰
〔三十五〕
產育寶慶集方 不著撰人
產寶諸方 不著撰人
產寶百問 （明）朱震亨纂輯
女科仙方 （清）傅青主撰
萬氏家傳女科 （明）萬密齋著
〔三十六〕
濟陰綱目 （明）武之望撰
〔三十七〕
胎產心法 （清）閻純璽撰
廣嗣紀要 （明）萬全著
〔三十八〕
顱顖經 著者闕名
類證錢氏小兒方訣 （北宋）錢乙撰 （明）熊宗立註
萬氏醫貫 （明）萬寧撰
幼科釋謎 （清）沈金鰲撰
〔三十九〕
保嬰易知録 （清）吳寧瀾撰
活幼珠璣 （清）許佐廷輯撰
幼科鐵鏡 （清）夏鼎著
幼科要略 （清）葉桂著 （清）周學海註
幼科箕訣直解 （清）魏鑒撰
〔四十〕
西方子明堂灸經 不著撰人
徐氏鍼灸大全 （清）徐鳳編
神灸經綸 （清）吳硯丞編輯
小兒推拿活嬰秘旨 （明）龔雲林撰述
〔四十一〕
鍼灸大成 楊繼洲撰
〔四十二〕
補註銅人腧穴鍼灸圖經 （宋）王惟一編撰
推拿廣意 （清）熊應雄輯撰
釐正按摩要術 （清）張筱衫纂輯
〔四十三〕
寓意草註釋 （清）喻昌原著 （清）謝甘澍註釋
仿寓意草 （清）李文榮著
願體醫話 （清）史典撰
〔四十四〕
評點葉案存真類編 （清）葉桂著 （清）周學海評
愛廬方案 （清）張仲華輯
存存醫話 （清）趙晴初著
吳醫彙講 （清）唐大烈輯

千金翼方目録

唐 逸士 孫 思邈 撰

◎卷之一

採藥時節 藥名 藥出州土
用藥處方 治風藥品 濕痺腰脊藥品
攣急嚲曳藥品 身瘙痒藥品 驚癇藥品
鬼魅藥品 蠱毒藥品 痰實藥品
固冷積聚腹痛腸堅藥品 腹痛脹滿嘔吐藥品
胷脅滿藥品 補五臟藥品 益氣藥品
長陰陽益精氣藥品 補骨髓藥品
長肌肉藥品 堅筋骨藥品 陰下濕痒藥品
消渴藥品 消食藥品 淋閉藥品
利小便藥品 止小便利藥品 明目藥品

止淚藥品　目赤痛藥品　霍亂轉筋藥品
腸痔藥品　鼠瘺并痔藥品　三蟲藥品
益肝膽藥品　補養心氣藥品　補養腎氣藥品
補脾藥品　欬逆上氣藥品　下氣藥品
下部䘌藥品　崩中下血藥品　女人血閉藥品
女人寒熱疝瘕漏下藥品　產難胞衣不出藥品
女人陰冷腫痛藥品　陰蝕瘡藥品
傷寒溫疫藥品　健忘藥品　通九竅藥品
下部痢藥品　虛損泄精藥品
唾粘如膠并唾血藥品　吐血藥品
下血藥品　衄血藥品　尿血藥品
耳聾藥品　止汗藥品　出汗藥品
堅齒藥品　癰腫藥品　惡瘡藥品

熱極喘口舌焦乾藥品　利血脉藥品
失魂魄藥品　悦人面藥品　口瘡藥品
脚弱疼冷藥品

○卷之二

玉石部上品二十二味

玉泉　玉屑　丹砂　空青　緑青
曾青　白青　扁青　石膽　雲母
石鍾乳　朴消　消石　芒消　礬石
滑石　紫石英　白石英　五石脂　太一餘粮
石中黄子　禹餘糧

玉石部中品二十九味

金屑　銀屑　水銀　雄黄　雌黄
殷孽　孔公孽　石腦　石硫黄　陽起石

凝水石 石膏 磁石 玄石 理石
長石 膚青 鐵落 鐵 生鐵
剛鐵 鐵精 光明鹽 緑鹽 密陀僧
桃花石 珊瑚 石花 石牀

玉石部下品三十一味

青琅玕 礜石 特生礜石 握雪礜石
方解石 蒼石 土陰孼 代赭 鹵鹹
大鹽 戎鹽 白堊 鉛丹 粉錫
錫銅鏡鼻 銅弩牙 金牙 石灰
冬灰 鍜竈灰 伏龍肝 東壁土 紫鉚騏驎竭
硇砂 薑石 赤銅屑 銅鑛石 白瓷瓦屑
烏古瓦 石鷰 梁上塵

草部上品之上四十味

青芝　赤芝　黄芝　白芝　黒芝
紫芝　赤箭　天門冬　麥門冬　朮
女萎萎蕤　黄精　乾地黄生者附　菖蒲　遠志葉附
澤瀉葉實附　署預　菊花　甘草　人參
石斛　牛膝　卷柏　細辛　獨活
升麻　茈胡葉附　防葵　蓍實　菴䕡子
意苡人　車前子葉根附　菥蓂子　茺蔚子莖附　木香
龍膽　菟絲子　巴戟天　白英　白蒿

草部上品之下二十八味

肉蓯蓉　地膚子　忍冬　蒺藜子葉附　防風葉附
石龍芻　絡石　千歳虆　黄連　沙參
丹參　王不留行　藍實葉附　景天花附　天名精
蒲黄　香蒲　蘭草　決明子　芎藭

蘼蕪　續断　雲實花附　黃蓍莖葉附　徐長卿
杜若　蛇床子　茵蔯蒿　漏蘆　茜根
飛廉　營實根附　薇銜　五味子　旋花根附
白兎藿　鬼督郵　白花藤

草部中品之上三十七味

當歸　秦膠　黃芩子附　芍藥　乾薑生薑附
藁本實附　麻黃　葛根汁葉花附　前胡　知母
大青　貝母　栝樓根實莖葉附　玄參
苦參　石龍芮　石韋　狗脊　萆薢
菝葜　通草　瞿麥　敗醬　白芷葉附
杜蘅　紫草　紫菀　白鮮　白薇
葈耳葉附　茅根苗附　百合　酸漿　紫參
女萎　淫羊藿仙靈脾是也　蠡實馬藺子是也花葉等附

草部中品之下二十九味

欵冬　牡丹　防巳　女菀　澤蘭

地榆　王孫　爵牀　白前　百部

王瓜　薺苨　高良薑　馬先蒿　蜀羊泉

積雪草　惡實根莖附　莎草根名香附子　大小薊根

垣衣　艾葉　水萍　海藻　昆布

葒草　陟釐　井中苔萍藍附　蔛草

鳧葵　莵葵　鱧腸連子草　蒟醬　百脉根

蘿摩子　白藥　蘹香子　欝金　薑黄

阿魏

○卷之三

草部下品之上二十五味

大黄　桔梗　甘遂　葶藶　芫花根附

澤漆 大戟 蕘花 旋復花根附 鈎吻
藜蘆 赭魁 及已 烏頭射罔烏喙附 天雄
附子 側子 羊躑躅 茵芋 射干
鳶尾 貫衆花附 半夏 由跋 虎掌
莨菪子 蜀漆 恒山 青葙子莖葉附 牙子
白斂 白及 蛇含 草蒿 雚菌
草部下品之下六十八味
連翹 白頭翁 藺茹 苦芙 羊桃
羊蹄 鹿藿 牛扁 陸英 蒴藋
藎草 夏枯草 烏韭 蚤休 虎杖
石長生 鼠尾草 馬鞭草 胡桐淚 馬勃
雞腸 蛇莓 苧根 菰根 狼跋子
弓弩弦 春杵頭細糠 敗天公 半天河

地漿　敗蒲席　敗船茹　敗鼓皮　屋遊
赤地利　赤車使者　劉寄奴　三白草
牽牛子　豬膏莓　紫葛　蓖麻子葉附
葎草　格注草　獨行根　狗舌　烏斂
豨薟　狼毒　鬼臼　蘆根　甘焦根
萹蓄　酢漿草　苘實　蒲公草　商陸
女青　水蓼　角蒿　昨葉何草
白附子　鶴蝨　甑帶灰　屐屧鼻繩
故麻鞋底　雀麥　筆頭灰

木部上品二十七味

茯苓附茯神　琥珀　松脂實葉節根等附　柏實葉皮等附
箘桂　牡桂　桂　杜仲　楓香脂皮附
乾漆附生漆　蔓荊實　牡荊　女貞實　桑上寄生

薡核　五加皮　沉香（薰陸香 雞舌香 詹糖香 楓香等附）　藿香

蘗木根附　辛夷　木蘭　榆皮花附　酸棗

槐實（枝皮等附）　楮實（葉及莖等附）　枸杞　蘇合香

橘柚

木部中品二十九味

龍眼　厚朴　豬苓　箽竹葉根實附

淡竹葉（瀝皮等附）茹筍　枳實　山茱萸　吳茱萸根附

秦皮　梔子　檳榔　合歡　秦椒

衛矛　紫葳（莖葉等附）　蕪荑　食茱萸　椋子木

毋始王木　折傷木　茗苦搽

桑根白皮（五木耳等附）　松蘿　白棘　棘刺花實附

安息香　龍腦香　菴摩勒　毗梨勒

木部下品四十五味

黃環　石南實附　巴豆　蜀椒　莽草
郁李人根附　鼠李根附　欒華　杉材　楠材
榧實　蔓椒　釣樟根皮　雷丸
溲疏　櫸樹皮　白楊　水楊葉　欒荊
小蘗　莢蒾　鈎藤　藥實根　皂莢
楝實根附　柳華子附　桐葉花附　梓白皮葉附　蘇方木
接骨木　枳椇　木天蓼　烏臼木　赤瓜木實附
訶梨勒　楓柳皮　賣子木　大空　紫真檀
椿木葉樗木附　胡椒　橡實　無食子
楊櫨木　槲若皮附

人獸部五十六味

髮髲　亂髮　人乳汁　頭垢　尿溺
龍骨白龍骨齒角等附　牛黃　麝香　馬乳

牛乳　羊乳　酥　熊脂　白膠

阿膠　醍醐　底野迦　酪　犀角

羚羊角　羖羊角髓肺肉骨等附　牛角䚡髓膽腎齒肉蹄等附

白馬莖眼蹄齒心肺肉骨髓等附　狗陰莖膽心腦齒血肉等附　鹿茸骨角髓肉等附

麞骨肉髓等附　虎骨膏肉等附　豹肉　狸骨肉陰莖等附

兔頭骨腦肝肉等附　六畜毛蹄甲　鼺鼠

麋脂角附　豚卵蹄足心腎膽齒膏肉等附　鼹鼠　獺肝肉附

狐陰莖五藏腸屎等附　猯膏肉胞等附　野猪黃　驢尿屎乳軸[illegible]等附

豺皮　丹雄雞肉膽血肪腸肝羽骨等附　白鵝膏毛肉等附

鶩肪白鴨屎附　鴈肪　鷓鴣　雉肉　鷹屎白

雀卵腦頭血屎等附　鸛骨　雄鵲　雊鵒

鷰屎　孔雀　鸕鷀屎頭附　鴟頭

○卷之四

蟲魚部七十一味 論一首

石蜜 蜜蠟白蠟附 蜂子黃蜂土蜂附 牡蠣

桑螵蛸 海蛤 文蛤 魁蛤 石決明

秦龜 龜甲 鯉魚膽肉骨齒附 蠡魚

鮑魚 鮧魚 鱓魚 鯽魚 伏翼

天鼠屎 蝟皮 石龍子 露蜂房 樗雞

蚱蟬 白殭蠶 木䖟 蜚䖟 蜚蠊

䗪蟲 蠐螬 蛞蝓 蝸牛 水蛭

鼈甲肉附 鮀魚甲肉附 烏賊魚骨肉附 蟹爪附

原蠶蛾屎附 鰻鱺魚 鮫魚皮 紫貝 蝦蟇

鼉 牡鼠肉糞附 蚺蛇膽膏附 蝮蛇膽肉附

鯪鯉甲 蜘蛛 蜻蛉 石蠶 蛇蛻

蛇黃 蜈蚣 馬陸 蠮螉 雀甕

鼠婦 螢火 衣魚 白頸蚯蚓 螻蛄
蟯蜋 斑猫 芫青 葛上亭長 地膽
馬刀 貝子 田中螺汁 甲香 珂

果部二十五味

豆蔻 葡萄 蓬蘽 覆盆子 大棗（生棗及葉附）
藕實莖 雞頭實 芰實 栗 櫻桃
梅實 枇杷葉 柿 木瓜 甘蔗
石蜜（乳糖也） 沙糖 芋 烏芋 杏核人（花實附）
桃核人（花梟蠹膠實毛附） 李核人（根實附） 梨
柰 安石榴（殼根附）

菜部二十七味

白瓜子 白冬瓜 瓜蔕（花附） 冬葵子（根葉附）
莧實 苦菜 薺（實附） 蕪菁（子附） 萊菔根

龍葵子附　菘　芥　苜蓿　荏子葉附
蓼實葉附　葱實根莖汁等附　薤　韭根附
白蘘荷　蒜菜　紫蘇子附　水蘇　假蘇
香薷　薄荷　秦荻梨　苦瓠　水芹
馬芹子　蓴　落葵　蘩蔞　蕺
葫大蒜也　蒜小蒜也　菫　芸薹

米穀部二十八味

胡麻　青蘘　麻蕡子附　飴糖　大豆黃卷生大豆附
赤小豆　豉　大麥　穬麥蘖附　小麥麴附
青粱米　黃粱米　白粱米　粟米　丹黍米
蘗米　秫米　陳廩米　酒　腐婢
扁豆葉附　黍米　粳米　稻米　稷米
醋　醬　食鹽

有名未用一百九十六味

青玉　白玉髓　玉英　璧玉　合玉石
紫石華　白石華　黑石華　黃石華　厲石華
石肺　石肝　石脾　石腎　封石
陵石　碧石青　遂石　白肌石　龍石膏
五羽石　石流青　石流赤　石耆　紫加石
終石　玉伯　文石　曼諸石　山慈石
石濡　石芸　石劇　路石　曠石
敗石　越砥石　金莖　夏臺　柒紫
鬼目　鬼蓋　馬顛　馬唐　馬逢
牛舌　羊乳　羊實　犀洛　鹿良
菟棗　雀梅　雀翹　雞涅　相烏
鼠耳　蛇舌　龍常草　離樓草　神護草

黄護草　呉唐草　天雄草　雀醫草　木甘草
益決草　九熟草　兌草　酸草　異草
灌草　茈草　莘草　勸草　英草華
呉葵華　封華　北荇華　隩華　棑華
節華　徐李　新雉木　合新木　俳蒲木
遂陽木　學木核　木核　栒核　荻皮
桑莖實　滿陰實　可聚實　讓實　蕙實
青雌附根莖　白背　白女腸　白扇根　白給
白并　白辛　白昌　赤舉　赤涅
黄秫　徐黄　黄白支　紫藍　紫給
天蓼　地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭　巴棘
巴朱　蜀格　纍根　苗根　參果根

黄辯 良達 對廬 糞藍 委蛇
麻伯 王明 類鼻 師系 逐折
并苦 領灰 父陛根 索干 荊莖
鬼麗 竹付 秘惡 唐夷 知杖
坐松 河煎 區余 三葉 五母麻
疥拍腹 常吏之生 救赦人者
丁公寄 城裏赤柱 城東腐木
芥 載 慶 腂 雄黃蟲
天社蟲 桑蠹蟲 石蠹蟲 行夜 蝸籬
麋魚 丹戩 扁前 蚖類 蜚厲
梗雞 益符 地防 黃蟲
唐本退二十味
薰草 姑活 別羈 牡蒿 石下長卿

齎舌　練石草　弋共　蕈草　五色符
蘘草　翹根　鼠姑　舩虹　屈草
赤赫　淮木　占斯　嬰桃　鴆鳥毛

卷之五

婦人求子第一 論一首 方七首
婦人積聚第二 方六首
婦人乳疾第三 方一十三首
婦人雜病第四 方一十三首
婦人面藥第五 論一首 方三十九首
熏衣浥衣香第六 方六首
令身香第七 方一十三首
生髮黑髮第八 方一十九首

卷之六

産後心悶第一方四首
産後虚煩第二方一十三首
陰脱第三方八首
惡露第四方一十八首
心痛第五方四首
腹痛第六方一十六首
虚損第七方一十七首

○卷之七

虚乏第一方一十二首
盜汗第二方四首
下乳第三方一十六首
中風第四方一十一首
心悸第五方四首

下痢第六方一十七首
淋渴第七方一十一首

卷之八

崩中第一方三十六首
月水不利第二方三十四首
損傷第三方七首

卷之九傷寒

太陽病用桂枝湯法第一五十七證方五首
太陽病用麻黄湯法第二一十六證方四首
太陽病用青龍湯法第三四證方二首
太陽病用柴胡湯法第四一十五證方七首
太陽病用承氣湯法第五九證方四首
太陽病用陷胷湯法第六三十一證方一十六首

太陽病雜療法第七二十證方一十三首
陽明病狀第八七十五證方一十一首
少陽病狀第九九證

卷之十

太陰病狀第一八證方二首
少陰病狀第二四十五證方一十六首
厥陰病狀第三五十六證方七首
傷寒宜忌第四十五章
發汗吐下後病狀第五三十證方一十五首
霍亂病狀第六一十證方三首
陰易病已後勞復第七七證方四首附方六首

卷之十一

養小兒第一合八十九條方二十首灸法二首論一首

小兒雜治第二方五十七首論一首
眼病第三合一百三十三方灸法二首論一首

卷之十二

養性禁忌第一論一首
養性服餌第二方三十七首
養老大例第三論三首
養老食療第四方十七首論五首

卷之十三辟穀

服茯苓第一方六首
服松柏脂第二方二十首論一首
服松柏實第三方一十九首
酒膏散第四方六首論一首
服雲母第五方三首論一首

服水第六論一首法七首

卷之十四退居

擇地第一
締剏第二
服藥第三
飲食第四
養性第五
種造藥第六法三十五首
雜忌第七

卷之十五補益

敘虛損論第一論一首
大補養第二論一首方八首
解散發動第三論一首方三十五首與第二十二卷通

補五藏第四方四十五首
五藏氣虚第五方九首
補虚圓散第六方二十二首
卷之十六中風
諸酒第一方二十首
諸散第二方九首論一首
諸膏第三方三首
喎僻第四方四首
心風第五方一十四首
風眩第六方一十七首
卷之十七
中風第一方三十五首論四首灸法二首
脚氣第二論一首方二十一首

癭瘤第三方一十六首灸法一首
癧瘍第四方一十四首灸法一首

卷之十八雜病

霍亂第一方二十七首
痎瘧第二方二十首禳法十二首鍼灸法七首
黃疸第三論三首方二十八首鍼灸二十法
吐血第四論三首方三十首
胷中熱第五方一十七首
壓熱第六方一十三首論一首

卷之十九

消渴第一方二十二首
淋病第二方二十首
水腫第三方二十六首并五不治證

痰飲第四方一十四首
癖積第五方一十四首
寒冷第六方九首
飲食不消第七方一十七首論一首
雜療第八方法一百二十首

卷之二十

備急第一方二十七首論一首
蠱毒第二論一首方七首灸法一首
藥毒第三方一十二首
從高墮下第四方一十一首
金瘡第五方六十二首
沙蝨第六方三十一首
癭病第七方九首

陰病第八 方十四首

卷之二十一

總療萬病第一 論一首

阿伽陀圓理萬病第二

耆婆療惡病第三 方一十一首 論七首

蹋麴療冷第四 方六首

卷之二十二

飛鍊研煑鍾乳及和草藥服療第一 方六首

飛鍊研煑五石及和草藥服療第二 方二十一首 論一首

服石及寒食散已違失節度發病療之法合四十五條第三 論三首

解石及寒食散并下石第四 論一首 方六十九首

卷之二十三 瘡癰

黃父相癰疽論第一
診癰疽起發處第二方一首
候癰疽色法第三
診知是癰疽法第四
診癰疽有膿法第五
候人年得疽法第六
相五色疽死生法第七
薄貼第八方三十一首
處療癰疽第九論一首方三十三首

〇卷之二十四

癰疽發背第一方九首
鼠瘻第二論一首方二十一首灸法三首
瘰疽第三方八首

惡核第四論一首方一十三首
丹胗第五方二十八首
甘濕第六論二首方三十八首
腸痔第七方二十六首論一首
疥癬第八論一首方三十四首灸法一首
代指第九方六首
濕熱瘡第十方三十四首

卷之二十五

診氣色法第一
診脉大意第二
診四時脉第三
診寸口脉第四
診關上脉第五

診尺中脉第六
診雜病脉第七

卷之二十六 針灸

取孔穴法第一
婦人第二 法四十五首
小兒驚癇第三 法二十一首
鼻病第四 法七首
舌病第五 法二十五首
脚氣第六 法三首論一首
諸風第七 法六十九首論
時行第八 法四首
黄疸第九 法一十一首
瘧病第十 法一十三首

卷之二十七

肝病第一 五十一法
膽病第二 一十二法
心病第三 一十八法
小腸病第四 八十一法訣二首
脾病第五 三十二法
胃病第六 三十四法
肺病第七 四十五法
大腸病第八 二十二法論一首
腎病第九 二十四法
膀胱病第十 三十二法

卷之二十八

消渴第一 一十二法論一首

淋病第二 二十二法
尿血第三 七法
水病第四 二十五法
癰疽第五 七法論一首
痔漏第六 十八法
脫肛第七 四十法
卒死第八 十三法
雜法第九
鍼灸宜忌第十

卷之二十九 禁經

持禁齋戒法第一
受禁法第二
雜受禁法第三

禁法大例第四
掌訣法第五
禁鬼客忤氣第六
禁温疫時行第七
禁瘧病第八
禁瘡腫第九
禁喉痺第十
禁産運第十一

卷之三十

禁金瘡第十二
禁蠱毒第十三
禁遁注第十四
禁邪病第十五

禁惡獸虎狼第十六
禁蛇毒第十七
禁蠍蜂第十八
禁狗鼠第十九
護身禁法第二十
禁賊盜第二十一
呪童子令說鬼姓字第二十二

千金翼方目録終

千金翼方卷第一

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

藥錄纂要

採藥時節第一

論曰：夫藥採取不知時節。不以陰乾暴乾。雖有藥名。終無藥實。故不依時採取。與朽木不殊。虛費人功。卒無裨益。其法雖具。大經學者尋覽造次難得。是以甄別。即日可知耳。

萎蕤 立春後採陰乾　菊花 正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾

白英 春採葉夏採莖秋採花冬採根　絡石 正月採　飛廉 正月採根七八月採花陰乾

藁本 正月二月採暴三十日成　通草 正月採陰乾　女菀 正月二月採陰乾

烏頭烏喙 正月二月採春採為烏頭冬採為附子八月上旬採根陰乾　蒴藋 春夏採葉秋冬採莖根

柏葉 四時各依方面採陰乾　枸杞 春夏採葉秋採莖實冬採根陰乾　茗 春採

桃梟 正月採　天門冬 二月三月七月八月採暴　麥門冬 二月三月八月十月採陰乾

术二月三月八月九月採暴　黃精二月採陰　乾地黃二月八月採陰　署預二月八月採暴
甘草二月八月採暴乾十日成　人參二月四月八月上旬採暴乾無令見風
牛膝二月八月十月採陰　細辛二月八月採陰　獨活二月八月採暴　升麻二月八月採日乾
柴胡二月八月採暴　龍膽二月八月十一月十二月採陰　巴戟天二月八月採陰
白蒿二月採　防風二月十月採暴　黃連二月八月採　沙參二月八月採暴
王不留行二月八月採　黃耆二月十月採陰　杜若二月八月採暴
茜根二月三月採暴　當歸二月八月採陰　秦艽二月八月採暴　芍藥二月八月採暴
前胡二月八月採暴　知母二月八月採暴　栝樓二月八月採根暴三十日成
石龍芮五月五日採子二月八月採皮陰　石韋二月採陰　狗脊二月八月採暴
萆薢二月八月採暴　菝葜二月八月採暴　白芷二月八月採暴　紫菀二月三月採陰
百合二月八月採暴　牡丹二月八月採陰　防已二月八月採陰　地榆二月八月採暴
莎草根二月八月採　大黃二月八月採火乾　桔梗二月八月採暴　甘遂二月採陰
赭魁二月採　天雄二月採陰　貫衆二月八月採陰　虎掌二月八月採陰

白斂二月八月採暴　羊桃二月採陰　狼毒二月八月採陰　鬼臼二月八月採
茯苓茯神二月八月採陰　桂二月八月十月採陰　杜仲二月五月六月九月採
商陸二月八月採日乾　丁香二月八月採　榆皮二月採皮暴乾八月採實
豬苓二月八月採陰　秦皮二月八月採陰　石南二月四月採葉八月採實陰
藍葉二月三月採暴本草無　赤箭三月四月八月採暴　防葵三月三日採暴
芎藭三月四月採暴　徐長卿三月採　黃芩三月三日採陰　大青三月四月採陰
玄參三月四月採暴　苦參三月八月十月採暴　杜蘅三月三日採暴　紫草三月採陰
白薇三月三日採陰　紫參三月採火乾　澤蘭三月三日採陰　王瓜三月採陰
垣衣三月三日採陰　文葉三月三日採暴　水萍三月採暴　芫花三月三日採陰
澤漆三月三日七月七日採陰　藜蘆三月採陰　羊躑躅三月採陰
茵芋三月三日採陰　射干三月三日採陰　青葙子三月採莖葉陰五月六月採子
紫葳三月八月採日乾　白附子三月採　桑上寄生三月三日採陰
厚朴三月九月十月採陰　蕪荑三月採陰　黃環三月採陰　烏芋三月三日採暴

桃花三月三日採陰　苦菜三月三日採陰　遠志四月採陰　菥蓂子四月五月採暴

景天四月四日七月七日採陰　蒲黃四月採　蘭草四月五月採

蘼蕪四月五月採暴　白頭翁四月採　夏枯草四月採　溲疏四月採

鼠尾草四月採葉七月採花陰　昌蒲五月十二月採陰　卷柏五月七月採陰

澤瀉五月六月八月採陰葉五月採實九月採　車前子五月五日採陰

茺蔚子五月採　石龍芻五月七日採暴　丹參五月採暴　天名精五月採

肉蓯蓉五月五日採陰　蛇牀子五月採陰　茵蔯蒿五月及立秋採陰

旋花五月採陰　葛根五月採暴　酸漿五月採陰　蠡實五月採陰

大小薊五月採　紫草五月採實　旋復花五月採日乾　鳶尾五月採

半夏五月八月採暴　莨菪子五月採　蜀漆五月採陰　䕡茹五月採陰

萹蓄五月採陰　生漆夏至後採　蕤核五月六月採日乾　松蘿五月採陰

五加皮五月七月採莖十月採根陰　莽草五月採陰　郁李根五月六月採

欒華五月採　覆盆子五月採　梅實五月採火乾　杏核人五月採

蘩蔞五月五日採　葫五月五日採　蒜五月五日採　青蘘五月本草無採
紫芝六月八月採　茅根六月採　蕘花六月採陰　昨葉何草夏採日乾
松脂六月採　五木耳六月採暴乾　石斛七月八月採陰　蒺藜子七月八月採暴
續斷七月八月採陰　薇銜七月採　麻黄立秋採陰　瞿麥立秋採陰
海藻七月七日採暴　陸英立秋採　菌桂立秋採　槐實七月七日十月巳日採
桃核仁七月採陰　瓜蔕七月七日採陰　水蘇七月採　麻蕡七月七日採
蔄婢七月採陰　蓍實八月九月採日乾　薏苡仁八月採實根無時　地膚子八月十月採陰
漏蘆八月採陰　營實八月九月採陰　五味子八月採陰　敗醬八月採
恒山八月採陰　牙子八月採暴　蛇含八月採陰　雚菌八月採陰
連翹八月採陰　屋遊八月九月採　女青八月採陰　牡荊實八月九月採陰
酸漿八月採陰　楮實八月九月採日乾　秦椒八月九月採　衛矛八月採陰
巴豆八月採陰　蜀椒八月採陰　雷丸八月採暴　大棗八月採暴
藕實八月採　鷄頭實八月採　白瓜子八月採　菟絲子九月採暴

蓋草九月十月採　乾薑九月採　松實九月採陰　辛夷九月採暴
枳實九月十月採陰　山茱萸九月十月採陰　吳茱萸九月九日採陰　梔子九月採暴
皂莢九月十月採陰　栗九月採　荏九月採陰　麻子九月採
大豆九月採　菴蕳子十月採　決明子十月十日採陰百日　雲實十月採暴
貝母十月採暴　女貞立冬採　橘柚十月採　款冬花十一月採陰
棘刺冬至後一百二十日採　莧實十一月採　忍冬十二月採陰　大戟十二月採陰
木蘭十二月採陰　冬葵子十二月採　白鮮四月五月採陰　葶藶立夏後採陰

論曰。凡藥皆須採之有時日。陰乾暴乾則有氣力。若不依時採之。則與凡草不別。徒棄功用。終無益也。學者當要及時採掇。以供所用耳。

藥名第二

論曰。有天竺大醫耆婆云。天下物類皆是靈藥。萬物之中無一物而非藥者。斯乃大醫也。故神農本草舉其大綱。未盡其

理。亦猶咎繇創律。但述五刑。豈卒其事。且令後學者因事典法。觸類長之無窮竭。則神農之意。從可知矣。所以述錄藥名品。欲令學徒知無物之非藥耳。

玉泉　玉屑　丹砂　空青　綠青
曾青　白青　扁青　石膽　雲母
朴消　消石　芒消　滑石　石鍾乳
紫石英　礬石馬齒礬黃礬　絳礬青礬　白石英　五石脂
太一餘粮　紫禹餘粮　石中黃子　禹餘粮　黃禹餘粮
金屑　銀屑　水銀附汞粉　雄黃　雌黃
殷孽　孔公孽　石腦　石硫黃　熏黃
陽起石　凝水石　石膏　磁石　玄石
理石　長石　膚青　石黛　鐵落
鐵　生鐵　剛鐵　鐵精　鐵漿

食鹽　光明鹽　綠鹽　密陀僧　桃花石
珊瑚　石花　乳牀　青琅玕　礜石
特生礜石　握雪礜石　方解石　蒼石　土陰孽
代赭　鹵鹹　大鹽　戎鹽　青鹽
赤鹽　白堊　鉛丹　錫粉　錫銅鏡鼻
銅弩牙　金牙　石灰　冬灰　炭
鍛竈灰　伏龍肝　東壁土　半天河　地漿
硇砂　薑石　赤銅屑　銅礦石　銅青
白瓷瓦屑　烏古瓦　石鷰　梁上塵　不灰木
青芝　赤芝　黃芝　白芝　黑芝
紫芝　赤箭　天門冬　麥門冬　朮
女萎萎蕤　黃精　乾地黃　昌蒲　遠志小草
澤瀉葉實　署預　菊花　甘草　人參

石斛　牛膝　卷柏　細辛　獨活
升麻　柴胡　防葵　薯蕷　菴䕡子
薏苡仁　車前子葉附　析蓂子　茺蔚子　木香
龍膽　菟絲子　巴戟天　白英　白蒿
肉蓯蓉　地膚子　忍冬　蒺藜子　防風葉附
石龍芻　絡石　千歲蘽　黃連　沙參
丹參　藍實　景天　天名精　王不留行
蒲黃　蘭草　決明子　芎藭　香蒲蒲根附
蘼蕪　續斷　雲實　黃耆　徐長卿
杜若　蛇牀子　茵陳蒿　漏蘆　茜根
飛廉　營實　薔薇根　薇銜　五味子
旋花　白兔藿　鬼督郵　白花藤　當歸
秦艽　黃芩　芍藥　藁本實附　乾薑生薑附

麻黃附根子　葛根附花附葉　前胡　知母　大青
貝母　栝樓附實附莖葉　玄參　苦參　石龍芮
石韋　狗脊　萆薢　菝葜　通草
瞿麥　敗醬　白芷　杜蘅　紫草
紫菀　白鮮皮　白薇　莫耳　茅根
百合　酸漿　王參　女萎　淫羊藿
蠡實附花葉　款冬花　牡丹　防己　女菀
澤蘭　地榆　王孫　爵牀　白前
百部根　王瓜　薺苨　高良薑　馬先蒿
蜀羊泉　積雪草　惡實　莎草　大小薊
垣衣　艾葉　水萍　海藻　昆布
葒草　陟釐　蔛草　鳧葵　井中苔萍附藍
鱧腸　蒟醬　百脉根　蘿摩子　白藥

蘘香子　鬱金　薑黃　百兩金　阿魏
大黃　桔梗　甘遂　葶藶　芫花
澤漆　大戟　蕘花　旋復花　鉤吻
藜蘆　赭魁　及己　天雄　烏頭附罔烏喙附
附子　側子　羊躑躅　茵芋　射干
鳶尾　貫衆花附　半夏　由跋　虎掌
莨菪子　蜀漆　恒山　青葙子　牙子
白斂　白及　蛇含　草蒿　雚菌
連翹　白頭翁　藺茹　苦芙　羊桃
羊蹄　鹿藿　牛扁　陸英　蒴藋
藎草　夏枯草　烏韭　蚤休　虎杖
石長生　鼠尾草　馬鞭草　馬勃　松脂實葉根節等附
蛇莓　苧根　菰根　狼跋子　弓弩弦

敗天公　敗蒲席　敗船茹　屋遊　赤地利
赤車使者　三白草　牽牛子　豬膏母　劉寄奴草
紫葛　萆麻子　葎草　格注草　獨行根
狗舌草　烏蘞莓　豨薟　狼毒　鬼臼
蘆根　甘蕉根　萹蓄　酢漿草　苘實
蒲公草　商陸　女青　水蓼　角蒿
白附子　鶴虱　魚網　馬絆繩　昨葉何草
破扇　故紙　甑帶灰　鬼蓋　屐屧鼻繩
雀麥　茯苓茯神附　琥珀玉附　柏實柏葉皮等附　麻布叩幅頭
箘桂　牡桂　桂　杜仲　故麻鞋底
楓香脂皮附　乾漆生漆附　蔓荊實　牡荊　女貞實
蕪荑　五加皮　沈香薰陸香雞舌香藿香詹糖香楓香等附
丁香　蘗木根附　辛夷　木蘭　桑上寄生

榆皮花附　酸棗　槐實枝皮等附　枸杞　楮實葉皮莖白汁附

蘇合香　龍眼　厚朴　豬苓　竹葉根汁實瀝皮茹筍附

枳實刺茹附　山茱萸　吳茱萸根附　秦皮　梔子

檳榔　合歡　秦椒　衛矛　紫葳

蕪荑　食茱萸　椋子木　折傷木　每始王木

茗苦搽　蜀桑根　松蘿　桑根白皮葉耳五木耳桑灰等附

白棘　安息香　龍腦　菴摩勒　棘刺花實棗針附

毗梨勒　紫鉚　騏驎竭　胡桐淚　黃環

石南實附　巴豆　蜀椒　莽草　郁李仁根附

鼠李　欒華　杉材　楠材　釣樟根皮

椰實　蔓椒　雷丸　溲疏　櫸樹皮

白楊皮　水楊葉　欒荊　小蘗　莢蒾

釣藤　藥實根　皂莢　楝實根附　柳華葉實汁附

桐葉花附　梓白皮　蘇枋木　接骨木　枳椇
木天蓼　烏臼木　赤瓜木　訶梨勒　楓柳皮
賣子木　大空　紫真檀　胡椒　椿木葉雋木附
橡實　無食子　楊櫨木　槲若　鹽麩子
紫荊　髮髲　亂髮　人乳汁　頭垢
屎溺
龍骨白龍骨齒角等附　牛黃　麝香　象牙齒睛等附
馬乳　牛乳　羊乳　酥　熊脂膽附
白膠　阿膠　醍醐　底野迦　酪
犀角　羚羊角　鹿茸　羖羊角髓肺骨肉齒骨頭血肚脂靨蹄屎附
牛角鰓髓膽腎心肝齒眼尾脂肉疾龍腊中毛耳中垢屎溺屎中豆等附　麞骨肉髓等附
豹肉　狼牙　狸骨肉陰莖等附　虎骨膏爪肉威等附
兔頭骨腦肝肉等附　筆頭灰　六畜毛蹄甲

鼺鼠　麋脂（角附）　豚卵（蹄心腎膽肚胵毛筋齒膏肉耳中垢等附）

鼹鼠　獺肝（肉屎附）　狐陰莖（五藏腸屎等附）　猯膏（肉胞等附）

野猪黄　驢屎（尿乳軸垢等附）　豺皮　野駝脂　敗鼓皮

白馬莖（頭蹄齒心肝肺肉骨鬐膏鬐毛溺通汁屎中粟等附）　狗陰莖（腹心腦齒血肉糞中骨等附）

丹雄雞（白雄雞黃雌雞脂烏雄雞肉膽心血冠血肪肝屎白腸肶胵裏黃皮左右翮毛黑雌雞黃雌雞雞子卵中白皮雞冢東門上雞頭等附）

白鵝膏（毛肉子等附）　鶩肪

鴈肪　鷓鴣　雉肉（猪下白毛附）　鷹屎白（脂鵰屎附）

鸛骨　雄鵲　鴝鵒　鷰屎　雀卵（腦頭血屎附）

伏翼　天鼠屎　孔雀　鸕鷀屎（頭附）　鴟頭

石蜜　蜜蠟（白蠟附）　牡蠣　桑螵蛸　蜂子（黃蜂土蜂附）

海蛤　文蛤　魁蛤　石決明　真珠

秦龜　龜甲　蠡魚　鮑魚　鯉魚膽（肉骨附）

鮧魚　鱓魚（血附）　鯽魚　黃魚膽　蝟皮

石龍子　露蜂房　樗雞　蚱蟬　白殭蠶
木虻　蜚虻　蜚蠊　䗪蟲　蠐螬
蛞蝓　蝸牛　水蛭　水馬　鼈甲肉附
鮀魚甲肉附　蟹爪附　螈蠶蛾附原蠶子紙　烏賊魚骨
鰻鱺魚　鮫魚皮　紫貝　蝦蟇　龜
牡鼠肉附糞　蚺蛇膽膏附　蝮蛇膽肉附　陵鯉甲　蜘蛛
蜻蛉　石蠶　蛇蛻　蛇黃　烏蛇
蜈蚣　馬陸　蠮螉　雀甕　鼠婦
螢火　衣魚　螻蛄　蜣蜋　白頸蚯蚓
斑猫　芫青　地膽　馬刀　葛上亭長
貝子　甲香　珂　田中螺汁
豆蔻　葡萄　蓬虆　覆盆子　大棗生棗附及
藕實莖　雞頭實　芰實　栗　櫻桃

橘柚　橙葉　梅實　枇杷葉　柿
木瓜　甘蔗　石蜜　沙糖　芋
烏芋　杏核仁花實附　桃核仁花梟毛蠹皮葉膠實附
李核仁根實附　梨葉附　柰　安石榴殼根附
白瓜子　白冬瓜　瓜蔕子附　莧實　冬葵子根葉附
苦菜　薺　蕪菁　萊服　龍葵
菘　芥　苜蓿　荏子　蓼
葱實　薤　白蘘荷　菾菜　蘇
水蘇　假蘇　香薷　薄荷　秦荻梨
苦瓠　水靳　馬芹子　蓴　落葵
蘩蔞　雞腸草　蕺　葫　蒜
堇　芸薹
胡麻葉附　青蘘　麻蕡子附　飴糖　大豆黃卷生豆附

赤小豆　豉　大麥　穬麥　小麥

麥奴　青粱米　黃粱米　白粱米　粟米

丹黍米　蘖米　秫米　陳廩米　春杵頭糠

酒　腐婢　藊豆葉附　黍米　粳米

稻米附稻穰　稷米　醋　醬　蓽豆

右六百八十種皆今時見用藥並可收採以備急要用也

藥出州土第三

論曰按本草所出郡縣皆是古名今之學者卒尋而難曉自聖唐開闢四海無外州縣名目事事惟新所以須甄明即因土地名號後之學者容易即知其出藥土地凡一百三十三州合五百一十九種其餘州土皆有不堪進御故不繁錄耳

關內道

雍州　柏子仁　茯苓

華州　覆盆子　柏白皮　杜衡　茯苓　茵芋　茯神　木防己　天門冬　黃精　署預　白朮　王不留行
款冬花　白芷　牛膝　白斂　細辛　狼牙　鼈甲　水蛭　丹參　松花　鬼臼　鼈頭
桑螵蛸　五味子　松子　菝葜　松蘿　桔梗　兔肝　玄參　遠志　沙參　澤瀉　續斷
山茱萸　石南　萆薢　石韋　白薇　龜頭　通草　麥門冬　小草

同州　寒水石　麻黃根　茈菑　蕪荑　麻黃　蒲黃　䗪虫　麻黃

岐州　鬼督郵　及己　樗雞　藜蘆　麞骨　秦艽　麞髓　甘草

寧州　菴閭子　菴閭花　芫青　荊子　萹蓄　蝱蟲

鄜州　芍藥　黃芩　䕡茹　秦艽

原州　敳狼牙　河柳皮　蓯蓉　白藥　黃耆

延州　蕪荑

涇州　澤瀉　秦艽　防風　黃芩

靈州　代赭　蓯蓉　野豬黃　徂脂

鹽州　青鹽

○河南道

洛州　秦椒　黃石脂　黃魚膽

穀州　半夏　桔梗

鄭州　秦椒

陝州　栝樓　柏子仁

汝州　鹿角　鹿茸

許州　鹿茸

虢州茯苓　細辛　茯神　栝樓　桔梗　白石英　桑上寄生　豫州吳茱萸　鹿茸

齊州阿膠　防風　榮婆藥　萊州牡蠣　文蛤　蕳茹　牛黃　海藻　海蛤　馬刀　烏賊魚　七孔決明

兗州防風　雲母　羊石　紫石英　仙靈脾　桃花石　密州海蛤　牛黃　泗州麋脂　麋角

徐州桑上寄生　淄州防風　沂州紫石英

○河東道

蒲州龍骨　石膽　紫參　龍角　蒲黃　龍齒　五味子　絳州防風

隰州當歸　大黃　汾州石龍芮　石膏　潞州赤石脂　人參　不灰木　白石脂

澤州人參　防風　禹餘糧　白石英　并州白菀　礬石　鬼督郵　礜石　白龍骨　甘草　柏子仁

晉州白堊　紫參　代州柏子仁　蔚州杈子　慈州白石脂

○河北道

懷州牛膝　相州知母　磁石　箕州人參　滄州雚菌

幽州人參　蛇膽　知母　檀州人參　營州野豬黃　平州野豬黃

○山南西道

梁州小蘗　蘇子　芒消　狟脂　理石　防己　皂莢　野豬黃　洋州野豬黃　狟脂　鳳州鹿茸

始州重臺　巴戟天　通州藥子　渠州賣子木

商州香零皮　楓香木　厚朴　秦艽　熊膽　辛夷　龍膽　恒山　楓香脂　獺肝　菖蒲　熊

杜仲　枳實　莽草　芍藥

金州獺肝　麋肉　枳茹　枳實　莽草　枳刺　蜀漆　恒山

○山南東道

鄧州夜干　蜈蚣　甘菊花　梔子花　蜥蜴　牡荊子　均州萎蕤　荊州橘皮

襄州石龍芮　鸕鷀頭　藍實　橙葉　蜀水花　梔子花　茗草　蜥蜴　雷丸　蜈蚣　陵鯉甲　孔公孽　烏梅　敗醬　牽牛子　貝母　乾白

夔州橘皮　硤州杜仲　房州野豬黃　狟脂　唐州鹿茸

○淮南道

楊州白芷　蛇床子　鹿脂　鹿角　壽州光州蘄州黃州舒州並出生　石斛　申州白及

○江南東道

潤州躑躅　鬼臼　貝母　半夏　卷柏　越州榧子　劉寄奴

婺州　睦州　歙州　建州並出黃連　泉州乾薑

○江南西道

宣州半夏黃連　饒州黃連　吉州陟釐　江州生石斛

岳州杉木楠木蟬蛻鼈甲　潭州生石斛　朗州牛黃

永州石鷰　郴州鈎樟根　辰州丹砂

○隴右道

秦州防葵狼牙芎藭麝香狼毒蘼蕪　鹿角　成州防葵狼牙

蘭州蓯蓉鹿角膠　武州石膽雌黃　雄黃　廓州大黃

宕州藁本當歸　獨活

○河西道

涼州大黃鹿茸　白附子　甘州椒根　肅州肉蓯蓉百脉根

伊州伏翼葵子　瓜州甘草　西州蒲桃　沙州石膏

○劒南道

益州 苧根 蜀漆 枇杷葉 百兩金 黃環 薏苡 鬱金 恒山 姜黃 乾姜 木蘭 百部根 沙糖 慎火草

眉州 巴豆 綿州 天雄 側子 烏頭 甘皮 附子 巴戟天 烏喙

資州 折傷木 嘉州 巴豆 紫葛 邛州 賣子木 瀘州 蒟醬

茂州 升麻 朴消 羌活 大黃 金牙 雄黃 芒消 礬石 馬齒礬 馬牙消

巂州 高良薑 松州 當州 並出當歸 扶州 芎藭

龍州 側子 烏頭 巴戟天 烏喙 天雄 附子 柘州 黃連

○嶺南道

廣州 石斛 決明子 白藤花 甘拔根 丁根 韶州 石斛 鍾乳 牡桂

賀州 梧州 象州 並出蚺蛇膽 春州 封州 瀧州 並出石斛

恩州 蚺蛇膽 桂州 滑石 蚺蛇膽 柳州 桂心 鉤樟根

融州 桂心 潘州 蚺蛇膽 交州 檳榔 龍眼 三百兩銀 木藍子

峯州 豆蔲

馬牙石。一名長石。一名土乳。一名牛腦石。出在齊州歷城縣。

論曰。既知無物非藥及所出土地。復採得時時。須在貯積。以供時急。不得虛棄光陰。臨事忽遽。失其機要。使風燭不救。實可悲哉。博學者深可思之。用爲備耳。

用藥處方第四

論曰。凡人在身感病無窮。而方藥醫療有限。由此觀之。設藥方之篇。是以攸其大意。豈能得之萬一。聊舉所全以發後學。此篇凡有六十五章。總攝衆病。善用心者。所以觸類長之。其救苦亦以博矣。臨事處方。可得依之取訣也。

治風第一

當歸　秦艽　乾薑　藁本　麻黃
葛根　前胡　知母　石韋　狗脊
萆薢　杜衡　白薇　白芷　葈耳
女萎　桔梗　大戟　烏頭　烏喙

附子 側子 天雄 躑躅 茵芋
貫衆 白及 蒴藋 䕡茹 鬼箭
磁石 石膏 天門冬 萎蕤 白朮
昌蒲 澤瀉 署預 菊花 細辛
獨活 升麻 菴䕡 薏苡 巴戟天
松葉 松節 石南 蜀椒 莽草
防風 王不留行 芎藭 黃耆 杜若
辛夷 牡荊子 五加皮 木蘭 枸杞
竹葉 厚朴 松實 秦皮 牡丹皮
防己 秦椒 女萎 澤蘭 竹瀝
山茱萸 吳茱萸 蒺藜子 曾青 礜石
代赭

濕痺腰脊第二

白膠　阿膠　鹿茸　鹿角　鹿脂
雞頭　蔓荊　竹瀝　肉蓯蓉　防風
芎藭　景天　丹參　絡石　千歲虆汁
王不留行　山櫻木汁　蛇床　漏盧　茜根
飛廉　礜石　桔梗　芫花　旋覆花
附子　側子　天雄　躑躅　茵芋
當歸　秦艽　芍藥　乾薑　葛根
石龍芮　狗脊　萆薢　菝葜　敗醬
藁耳　白鮮　蠡實　青蘘　大豆卷
石南　蜀椒　蔓荊　皂莢　天門冬
白朮　萎蕤　乾地黃　昌蒲　澤瀉
菊花　署藥　石斛　牛膝　細辛
柴胡　菴䕡　薏苡　車前子　柏子仁

菥蓂　蒴藋　桂心　杜仲　乾漆
五加皮　酸棗　枸杞　松子　上寄生
續斷　天名

攣急嚲曳第三

秦艽　藁本　狗脊　萆薢　通草
石南　防風　芎藭　續斷　天門冬
女萎　乾地黃　石斛　牛膝　薏苡
菟絲　杜仲　乾漆　荊子　枸杞
大豆卷　天雄　附子　野葛　蒴藋

身瘙痒第四

青琅玕　石灰　丹砂　雄黃　水銀
硫黃　芥子　白及　鐵落　枳實
蒺藜子　莽草　柳花　蜀羊泉　水萍

防風　蔄茹　羊蹄　藎草　敗醬
藜蘆　青葙　青蒿　羖羊角　蟬蛻
秦艽　天鼠矢

驚癇第五

鉛丹　紫石英　白石脂　秦皮　銀屑
玄石　鐵精　鈎藤　款冬花　牡丹皮
白鮮皮　紫菀　女菀　柏子仁　茯苓
茯神　桔梗　蕘花　莨菪子　蛇銜
遠志　人參　細辛　防葵　龍膽
杏仁　龍骨　龍齒　牛黃　頭髮
白芝　龍角　羊齒　羊骨　亂髮
牛齒　白馬莖　白馬齒　赤馬齒　白馬懸蹄
鹿茸　牡狗齒　豚卵　狐五藏　石蚕

海蛤　蚱蟬　露蜂房　白殭蠶　蛇脫
雀甕　蛇黃　鼠婦　蜣蜋　六畜毛蹄甲

鬼魅第六

代赭　粉錫　金牙　衞矛　赤箭
銅鏡鼻　升麻　牛黃　青木香　藍實
蘼蕪　徐長卿　雲實　黃環　狸骨
獺肝　桃花　桃梟　蜈蚣　蛇膽
亭長　芫青　斑猫　石長生　狼毒
鬼臼　商陸　躑躅　白及　野葛
琥珀　六畜毛蹄甲

蠱毒第七

方解石　代赭　金牙　衞矛　赤箭
徐長卿　升麻　瓜蔕　雷丸　紫菀

黃環　青木香　巴豆　麝香　景天
蘘荷　犀角　羚羊角　虵蛻　獺肝
狐莖　鸛骨　蜂房　胡鷰屎　鮫魚皮
白頸蚯蚓　蛇蛻　蜈蚣　班猫　芫青
芫花　藜蘆　野葛　樝子　猪苓
敗鼓皮　桑上亭長　六畜毛蹄甲

痰實第八

淡竹葉　枳實　吳茱萸　厚朴　胡椒
檳榔仁　萊菔　茯苓　恒山　松蘿
旋復花　大黃　芫花　蕘花　半夏
烏頭　黃芩　前胡　巴豆　柴胡
白术　細辛　朴消　芒消

固冷積聚腹痛腸堅第九

礜石　雄黃　殷孽　厚朴　特生礜石
曾青　戎鹽　硫黃　陽起石　石膏
理石　高良薑　朴消　芫花　桔梗
吳茱萸　葶藶　旋復花　麥門冬　太一餘粮
澤瀉　茯苓　人參　柴胡　蒺藜
雚菌　防葵　牡丹　蕘花　海藻
肉蓯蓉　丹參　巴戟天　莽草　芍藥
烏頭　麻黃　貝母　乾薑　玄參
苦參　藺茹　狼毒　大黃　附子

腹痛脹滿嘔吐第十

厚朴　竹茹　枳實　吳茱萸　檳榔
葛根　桑白皮　松蘿　橘皮　大黃
桔梗　甘遂　乾薑　大戟　藜蘆

半夏　恒山　朴消　生薑　藁本
阿膠　禹餘粮　人參　戎鹽

胷脅滿第十一

方解石　蘭草　杜若　莎草　竹葉
厚朴　枳實　乾薑　前胡　玄參
紫菀　枸杞　桔梗　蕘花　茯苓
芫花　旋復花　射干　烏頭　半夏
恒山　人參　菊花　細辛　柴胡

補五臟第十二

白石脂　五石脂　琥珀　紫菀　石韋
大黃　桔梗　石蜜　龍骨　牛髓
鹿肉　鵝肉　乾漆　柏子仁　女貞
銀屑　沙參　酸棗　五味子　枳實

山茱萸　麥門冬　乾地黃　昌蒲　澤瀉
署藥　人參　石斛　細辛　菥蓂
龍膽　巴戟天　牡丹　韭　貝母
蕪青　葱白　覆盆　當歸　鍾乳
玄參　苦參

益氣第十三

玉泉　鍾乳　五石脂　白石英　柏子仁
柏葉　蘭草　續斷　茵蔯　黃耆
飛廉　營實　五味子　旋花　澤瀉
署藥　巴戟天　大棗　牡蒙　青蘘
烏麻　枳實　赤箭　蕪青子　苦菜
蒲桃　覆盆子　芍藥　紫草　淫羊藿
羊肉　桑螵蛸　牛髓　蠟　牛肉

鹿茸 鹿角 麋角 猪肚 雲母粉
兔屎 兔肉 戎鹽 石蚕

長陰陽益精氣第十四

羊腎 牛腎 肉蓯蓉 蓬虆 磁石
理石 地膚子 決明子 杜若 白棘
蛇床子 茜根 黑石脂 五味子 天雄
附子 栝樓 玄參 石韋 石龍芮
白薇 萆薢 紫參 麥門冬 遠志
小草 署藥 石斛 牛膝 卷柏
細辛 柴胡 車前子 茺蔚子 菟絲子
巴戟天 茯苓 枸杞 杜仲 丹砂
扁青 雲母 滑石 鍾乳

補骨髓第十五

五石脂　乾漆　金屑　乾地黄　防葵
菟絲子　烏麻　天門冬　青蘘　貝母
淫羊藿　附子　天雄　羊腎　零羊角
磁石
長肌肉第十六
藁本　天門冬　當歸　白馬莖　桑上寄生
冬葵子　白芷　蠡實　垣衣　麥門冬
麻仁　乾地黄　澤瀉　署蕷　菟絲子
石斛　甘草　女貞子　五加皮　枳實
胡麻　玉泉　磁石　赤石脂　厚朴
蒲桃　赤箭　五味子　酸棗仁
堅筋骨第十七
玉泉　雲母　杜仲　乾漆　枸杞

硫黄　蔓荊　絡石　磁石　戎鹽
續斷　烏麻　金屑　五加皮　酸棗仁

陰下濕痒第十八

木蘭　槐皮　五加皮　杜仲　蛇床子
漏蘆　飛廉　陽起石

消渴第十九

曾青　滑石　紫石英　白石英　凝水石
丹砂　石膏　理石　竹笋　桑白皮
枸杞根　松脂　茯苓　馬乳　兎骨
紫參　赤小豆　大麥　小麥　澤瀉
菰𦵔　人參　麥門冬　蓴菜　䗪蜱
粟米　青粱　甘草　牡蠣　猪肚
雞屎白　雲實　黄連　礜石　栝樓

葛根　玄參　苦參　茅根　竹根
長石　知母　菰根　生葛汁　王瓜
冬瓜　水萍　羊酪

消食第二十

白朮　桔梗　大黄　黄芩　大豆屑熬
麴蘗　皂莢　萊菔根　麥門冬　吳茱萸
檳榔　橘皮　小蒜　厚朴　苦參

淋閉第二十一

玉泉　石膽　芒消　茯苓　琥珀
石鷰　瞿麥　胡鷰屎　茅根　鯉魚齒
髮髮　亂髮　頭垢

利小便第二十二

消石　滑石　紫參　栝樓　百合

白石脂　海藻　揄皮　地膚子　山茱萸
蒲黄　棘人　天門冬　車前子　麻子仁
赤小豆　郁李仁　冬瓜　冬葵子　牽牛子
茅根　葎草　犍牛尿　橘皮　楝實
長石　天名精　苦參　茵陳　秦艽

止小便利第二十三

赤石脂　鉛丹　粉錫　昌蒲　王瓜
栝樓　菝葜　牡蠣　菰根　蘆根
雞腸草　龍骨　鹿茸　鹿角　雞肶胵
山茱萸

明目第二十四

玉泉　丹砂　空青　紫貝　螢火
貝齒　馬珂　石膽　鍾乳　礜石

五石脂　鹵鹹　戎鹽　理石　特生礜石
蔓荊子　桑椹子　槐子　蕤仁　地膚子
鐵精　長石　黃連　景天花　香蒲
決明子　飛廉　杜若　枳實　秦艽
合歡　秦椒　棘仁　人參　細辛
蓍實　菴閭　菟絲子　茺蔚子　菥蓂
烏麻　蘼子　蕪青子　蓼子　葱子
前胡　玄參　瞿麥　石決明　石龍芮
羚羊角　羖羊角　青牛膽　兔肝　狗脊

止淚第二十五

空青　曾青　蔓荊　蕤仁　綠鹽
苦參　白芷　杜若　菊花　欒花
菥蓂　皂莢　芎藭　決明子　白朮

目赤痛第二十六

空青　車前子　石膽　礬石　曾青　戎鹽　菥蓂　蕤人　蕤子　欒花　鯉魚膽　蘗木　石鹽　蕤子　決明子

益肝膽第二十七

空青　曾青　礬石　酸棗仁　細辛　龍膽　苦參　蘘菜　黃連

補養心氣第二十八

紫石英　遠志　羚羊角　人參

補養腎氣第二十九

六畜腎　絡石　澤瀉　石南　萆薢　車前子　狗脊　栗子　沙參　白棘　玄參　黑石脂　磁石　瞿麥　粟米

石斛　鹿茸

補脾第二十

大棗　櫻桃　甘蔗　石蜜

欬逆上氣第二十一

石膽　蘼蕪　蜀椒　款冬　桑根白皮

狼毒　竹葉　女菀　白前　吳茱萸

百部根　當歸　麻黃　貝母　紫菀

白鮮皮　蕘花　藜蘆　烏頭　附子

鬼臼　射干　半夏　蜀漆　昌蒲

遠志　甘草　細辛　防葵　杏仁

桃仁　瓜丁　猯脂肉　牡蠣　桂心

白石脂　羊肺　紫石英　鍾乳　硫黃

蒺藜　芫花　五味子　茯苓

下氣第二十二

鈆丹　梅實　蛇床　石韋　水蘇
竹葉　蘇子　薄荷　蒺藜　秦荻梨
甘草　石斛　細辛　牡荊　枇杷葉
甘蔗　署藥　馬肉　白石英　麋茸
杏仁　石膏　橘皮　鍾乳　雲母
礜石　胡椒

霍亂轉筋第二十三

木瓜　雞屎白　乾薑　附子　瞿麥
女萎　香薷　藊豆　薄荷　橘皮
人參　桂心　白朮　厚朴

腸痔第二十四

石膽　消石　丹砂　五石脂　水銀

雄黃　殷孽　石硫黃　孔公孽　礠石
蘗木　槐子　桐皮　飛廉　敗醬
露蜂房　鰻鱺魚　蛇脫皮　蠡魚　蝟皮
鼈甲　豬後足懸蹄

鼠漏并痔第二十五

黃耆　續斷　連翹　夏枯草　王不留行
鼠尾草　萹蓄　通草　狼毒　敗醬
桐葉　及已　蛇銜草　側子　地榆
王瓜　昆布　牡蠣　蠡魚　露蜂房
文蛤　龜甲　蝟皮　鼈甲　蚺蛇膽
蛇脫皮　斑猫　虎骨　地膽　豬懸蹄
五石脂　陵鯉甲

三蟲第二十六

粉錫　梓白皮　山茱萸　檳榔　衛矛
蕪荑　天門冬　天名精　桑白皮　乾漆
蔓荊　苦參　蘼蕪　雷丸　特生礜石
楝實　莧實　麝香　通草　白頸蚯蚓
桃仁　桃花　連翹　貫衆　鶴蝨
萹蓄　青葙　雚蘆　牙子　榧實
槲皮　薏苡根

下部䘌第三十七

石硫黃　雄黃　雌黃　苦參　艾葉
大蒜　鹽　馬鞭草　蚺蛇膽

崩中下血第三十八

白瓷屑　伏龍肝　敗船茹　青石脂　衛矛
桃毛　紫葳　蘗木　當歸　桑上寄生

白斂　茅根　牡狗齒　玉泉　鯉魚骨
白殭　龍骨　白膠　阿膠　牛角䚡
陽起石　地榆　生地黃　茜根　白芷
艾葉　景天花　烏賊魚骨　小麥　大小薊根

女人血閉第三十九

銅鏡鼻　銅弩牙　桃仁　茅根　烏賊魚骨
白芷　栝樓　大黃　桑螵蛸　牛角䚡
蠐螬　蝱蟲　䗪蟲　水蛭　芎藭
菴蕳子　陽起石　紫葳　黃芩　巴豆
牛膝　瞿麥　當歸

女人寒熱疝瘕漏下第四十

白堊　乾漆　茯苓　黃耆　蛇床子
禹餘粮　陽起石　秦椒

產難胞衣不出第四十一

代赭　石鷰　冬葵子　弓弩絃　滑石

蚱蟬　澤瀉　續斷　羖羊角　王不留行

女人陰冷腫痛第四十二

松蘿　白鮮皮　卷柏

陰蝕瘡第四十三

土陰孽　蓋畜　五加皮　黑石脂　礬石

蘗木　桐葉　礜石　石膽　蝦蟇

龜甲　狐莖

傷寒温疫第四十四

犀角屑　羖羊角　徐長卿　麻黄　前胡

生葛汁　葛根　大青　栝樓　柴胡

青木香　吴藍　貝母　玄參　白薇

知母　桂心　芍藥

健志第四十五

遠志　菖蒲　人參　茯神　薏實

蕳茹　白馬心　龍膽　龜甲　通草

通九竅第四十六

大棗　芥子　遠志　菖蒲　細辛

蔓荊

下部䘌第四十七

檳實　龍骨　鼠尾草　營實　黃連

黃芩　乾薑　附子　倉米　蜀椒

五石脂　無食子　槲若　地榆　龍膽

黃蘗

虛損洩精第四十八

白棘　韭子　鹿茸　山茱萸　澤瀉
菟絲子　牡蠣　白龍骨
唾粘如膠并唾血第四十九
紫菀　紫參　旋復花　麻黃　茯苓
桂心　槐子　芎藭　乾薑　射干
小麥
吐血第五十
戎鹽　柏葉　水蘇　敗船茹　生地黃汁
竹茹　蠐螬　艾葉　白膠　大小薊根
羚羊角　馬屎
下血第五十一
白瓷屑　伏龍肝　柏葉　青羊脂　艾葉
五石脂　赤箭　天名精　蒲黃　生地黃

黄芩　茜根　敗船茹　水蘇　白膠
馬屎　槲脉

衄血第五十二

亂髮灰　水蘇　紫參　柏葉　王不留行
生地黄汁

尿血第五十三

龍骨　戎鹽　鹿茸　葱涕汁

耳聾第五十四

磁石　昌蒲　山茱萸　烏雞脂　鵝脂
通草　王爪

止汗第五十五

牡蠣　龍骨　柏實　衞矛

出汗第五十六

山茱萸 細辛 石膏 蜀椒 乾薑
葱白鬚 桂心 葛根 麻黃
堅齒第五十七
桑上寄生 香蒲 蔓荊 秦椒
蜀椒 鼠李根 戎鹽
癰腫第五十八
營實 飛廉 蒺藜子 白棘 王不留行
木蘭皮 絡石 紫石英 五石脂 磁石
芍藥 防己 澤蘭 大黃 連翹
黃耆 白斂 苦參 敗醬 通草
王瓜
惡瘡第五十九
白及 雚蘆 蛇銜 青葙 牙子

狼毒　營實　黄芩　當歸　苦參
萆薢　雌黄　松脂　漏蘆　及己
通草　地楡　蜀羊泉

熱極喘口舌焦乾第六十

石膏　石蜜　麥門冬　栝樓　絡石
杏仁　茯苓　松脂　紫菀　款冬
梅子　大黄　甘草

利血脉第六十一

玉泉　丹砂　空青　長石　芒消
乾地黄　人參　甘草　通草　芍藥
桂心　蜀椒　麻子

失魂魄第六十二

玉泉　丹砂　紫石英　茯神　琥珀

龍骨　人參　牛黃

悅人面第六十三

白瓜子　雄黃　丹砂　落葵子　鹿髓

菌桂　旋復花　麝香　瓜樓

口瘡第六十四

黑石脂　乾地黃　黃連　龍膽　大青

升麻　蘗木　小蘗　苦竹葉　酪

酥　豉　石蜜

腳弱疼冷第六十五

石斛　石鍾乳　殷孽　孔公孽　石硫黃

附子　豉　丹參　五加皮　竹瀝

大豆　天雄　側子　木防已　獨活

松節　牛膝

一卷終

千金翼方卷第二

本草上

論曰金石草木自有本經而條例繁富非淺學近識所能悟之忽逢事逼豈假披討所以録之於卷附之於方使忠臣孝子忩遽之際造次可見故録之以冠篇首焉

玉石部上品二十二味

玉泉 味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久服耐寒暑不飢渴不老神仙輕身長年人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生藍田山谷採無時

玉屑 味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服久服輕身長年生藍田採無時

丹砂 味甘微寒無毒主身體五臟百病養精神安魂魄益氣

明目通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡久服通神明不老輕身神仙能化爲汞作末名眞朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時

空青 味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

綠青 味酸寒無毒主益氣療鼽鼻止洩痢生山之陰穴中色青白

曾青 味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補

不足。盛陰氣。久服輕身不老。能化金銅。生蜀中山谷及越巂。採無時。

白青 味甘酸鹹。平。無毒。主明目。利九竅。耳聾。心下邪氣。令人吐。殺諸毒三蟲。久服通神明。輕身延年。不老。可消爲銅劍。辟五兵。生豫章山谷。採無時。

扁青 味甘。平。無毒。主目痛明目。折跌癰腫。金瘡不瘳。破積聚。解毒氣。利精神。去寒熱風痺。及丈夫莖中百病。益精。久服輕身不老。生朱崖山谷。武都朱提。採無時。

石膽 味酸辛。寒。有毒。主明目。目痛。金瘡諸癇痙。女子陰蝕痛。石淋寒熱。崩中下血。諸邪毒氣。令人有子。散癥積。欬逆上氣。及鼠瘻惡瘡。鍊餌服之。不老。久服增壽神仙。能化鐵爲銅成金銀。一名畢石。一名黑石。一名碁石。一名銅勒。生羌道山谷。羌里句青山。二月庚子辛丑日採。

雲母　味甘。平。無毒。主身皮死肌。中風寒熱。如在車船上。除邪氣。安五藏。益子精。明目。下氣。堅肌。續絕。補中。療五勞七傷。虛損少氣。止痢。久服輕身延年。悅澤不老。耐寒暑。志高神仙。一名雲珠。色多赤。一名雲華。五色具。一名雲英。色多青。一名雲液。色多白。一名雲砂。色青黃。一名磷石。色正白。生太山山谷。齊盧山及琅邪北定山石間。二月採。

石鍾乳　味甘。溫。無毒。主欬逆上氣。明目。益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳汁。益氣。補虛損。療腳弱疼冷。下焦腸竭。強陰。久服延年益壽。好顏色。不老。令人有子。不鍊服之。令人淋。一名公乳。一名蘆石。一名夏石。生少室山谷及太山。採無時。

朴消　味苦辛。寒。大寒。無毒。主百病。除寒熱邪氣。逐六腑積聚。結固留癖。胃中食飲熱結。破留血閉絕。停痰痞滿。推陳致新。能化七十二種石。鍊餌服之。輕身神仙。鍊之白如銀。能寒能

熱。能滑能濇。能辛能苦。能鹹能酸。入地千歲不變。色青白者佳。黃者傷人。赤者殺人。一名消石朴。生益州山谷。有鹹水之陽。採無時。

消石 味苦辛。寒。大寒。無毒。主五臟積熱。胃脹閉。滌去蓄結飲食。推陳致新。除邪氣。療五藏十二經脉中百二十疾。暴傷寒。腹中大熱。止煩滿消渴。利小便。及瘻蝕瘡。鍊之如膏。久服輕身。天地至神之物。能化成十二種石。一名芒消。生益州山谷。及武都隴西西羌。採無時。

芒消 味辛苦。大寒。主五臟積聚。久熱胃閉。除邪氣。破留血。腹中痰實結搏。通經脉。利大小便及月水。破五淋。推陳致新。生於朴消。

礬石 味酸。寒。無毒。主寒熱。洩痢白沃。陰蝕惡瘡。目痛。堅骨齒。除固熱在骨髓。去鼻中息肉。鍊餌服之。輕身不老增年。岐伯

云久服傷人骨能使鐵爲銅一名羽碮一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時

滑石味甘寒大寒無毒主身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷山採無時

紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絶孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄塡下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年生太山山谷採無時

白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久

服輕身長年。耐寒熱。生華陰山谷及太山。大如指。長二三寸。六面如削。白澈有光。其黃端白稜名黃石英。赤端名赤石英。青端名青石英。黑端名黑石英。二月採。亦無時。

青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平。主黃疸泄痢腸澼膿血陰蝕下血赤白。邪氣癰腫疽痔惡瘡。頭瘍疥瘙。久服補髓益氣。肥健不飢。輕身延年。五石脂各隨五色補五藏。生南山之陽山谷中。

青石脂味酸平無毒。主養肝膽氣。明目。療黃疸泄痢腸澼。女子帶下百病及疽痔惡瘡。久服補髓益氣。不飢延年。生齊區山及海崖。採無時。

赤石脂味甘酸辛大溫無毒。主養心氣。明目益精。療腹痛泄澼下痢赤白。小便利及癰疽瘡痔。女子崩中漏下產難胞衣不出。久服補髓。好顏色。益智不飢。輕身延年。生濟南射陽及

太山之陰採無時。

黃石脂 味苦平無毒主養脾氣安五藏調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年生嵩高山色如鶯雛採無時。

白石脂 味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年生太山之陰採無時。

黑石脂 味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無時。

太一餘糧 味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利大飽絕力身重久服耐寒暑不飢輕身飛行千里。

神仙。一名石腦。生太山山谷。九月採。

石中黃子 味甘平。無毒。久服輕身延年。不老。此禹餘粮殼中。未成餘粮。黃濁水也。出餘粮處有之。陶云。芝品中有石中黃子。非也。

禹餘粮 味甘。寒平。無毒。主欬逆寒熱煩滿。下赤白。血閉。癥瘕。大熱。療小腹痛結煩疼。鍊餌服之不飢。輕身延年。一名白餘粮。生東海池澤。及山島中。或池澤中。

玉石部中品二十九品

金屑 味辛平。有毒。主鎮精神。堅骨髓。通利五藏。除邪毒氣。服之神仙。生益州。採無時。

銀屑 味辛平。有毒。主安五藏。定心神。止驚悸。除邪氣。久服輕身長年。生永昌。採無時。

水銀 味辛寒。有毒。主疥瘙。痂瘍。白禿。殺皮膚中蝨。墮胎。除熱。

以傳男子陰。陰消無氣。殺金銀銅錫毒。鎔化還復為丹。久服神仙不死。一名汞。生符陵平土。出於丹砂。

雄黃 味苦甘。平。寒。大溫。有毒。主寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。療疥。蟲䘌瘡。目痛。鼻中息肉。及絕筋。破骨。百節中大風。積聚。癖氣。中惡腹痛。鬼疰。殺精物。惡鬼。邪氣。百蟲毒。勝五兵。殺諸蛇虺毒。解藜蘆毒。悅澤人面。鍊食之。輕身神仙。餌服之。皆飛入人腦中。勝鬼神。延年益壽。保中不飢。得銅可作金。一名黃食石。生武都山谷。燉煌山之陽。採無時。

雌黃 味辛甘。平。大寒。有毒。主惡瘡。頭禿。痂疥。殺毒蟲蝨。身痒。邪氣諸毒。蝕鼻中息肉。下部䘌瘡。身面白駮。散皮膚死肌。及恍惚邪氣。殺蜂蛇毒。鍊之。久服輕身。增年不老。令人腦滿。生武都山谷。與雄黃同山生。其陰山有金。金精熏則生雌黃。採無時。

殷孽 味辛溫無毒主爛傷瘀血泄痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採無時

孔公孽 味辛溫無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通石殷孽根也青黃色生梁山山谷

石腦 味甘溫無毒主風寒虛損脚腰疼痺安五藏益氣一名石飴餅生名山土石中採無時

石硫黃 味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭秃療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲能化金銀銅鐵奇物生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也

陽起石 味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣

寒熱腹痛。無子。陰痿不起。補不足。療男子莖頭寒。陰下濕痒。去臭汗。消水腫。久服不飢。令人有子。一名白石。一名石生。一名羊起石。雲母根也。生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山。採無時。

凝水石 味辛甘。寒。大寒。無毒。主身熱。腹中積聚邪氣。皮中如火燒煩滿。水飲之。除時氣熱盛。五藏伏熱。胃中熱煩滿。止渴。水腫。小腹痺。久服不飢。一名白水石。一名寒水石。一名凌水石。色如雲母可析者良。鹽之精也。生常山山谷。又水中縣及邯鄲。

石膏 味辛甘。微寒。大寒。無毒。主中風寒熱。心下逆氣驚喘。口乾舌焦。不能息。腹中堅痛。除邪鬼。產乳。金瘡。除時氣頭痛。身熱。三焦大熱。皮膚熱。腸胃中膈氣。解肌發汗。止消渴煩逆。腹脹暴氣。喘息咽熱。亦可作浴湯。一名細石。細理白澤者良。黃

若令人淋。生齊山山谷。及齊盧山。魯蒙山。採無時。

磁石　味辛。鹹。寒。無毒。主周痺風濕。肢節中痛。不可持物。洗洗酸痟。除大熱煩滿及耳聾。養腎藏。強骨氣。益精。除煩。通關節。消癰腫。鼠瘻。頸核。喉痛。小兒驚癎。錬水飲之。亦令人有子。一名玄石。一名處石。生太山川谷及慈山山陰。有鐵處則生其陽。採無時。

玄石　味鹹。溫。無毒。主大人小兒驚癎。女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。一名玄水石。一名處石。生太山之陽。山陰有銅。銅者雌。玄者雄。

理石　味辛。甘。寒。大寒。無毒。主身熱。利胃。解煩。益精明目。破積聚。去三蟲。除榮衛中去來大熱。結熱。解煩毒。止消渴。及中風痿痺。一名立制石。一名肌石。如石膏順理而細。生漢中山谷。及盧山。採無時。

長石 味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間邪氣久服不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒方面潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄採無時

膚青 味辛鹹平無毒主蠱毒蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷

鐵落 味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中除胷膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及祊城或析城採無時

鐵 主堅肌耐痛

生鐵 微寒主療下部及脫肛

鋼鐵 味甘無毒主金瘡煩滿熱中胷膈氣塞食不化一名跳鐵

鐵精 平微温主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癇陰癀脫肛

光明鹽 味鹹甘。平。無毒。主頭面諸風。目赤痛。多眵淚。生鹽州五原。鹽池下鑿取之。大者如升。皆正方光澈。一名石鹽。

緑鹽 味鹹苦辛。平。無毒。主目赤淚出。膚瞖眵暗。

蜜陀僧 味鹹辛。平。有小毒。主久痢。五痔。金瘡。面上瘢皯。面膏藥用之。

桃花石 味甘。温。無毒。主大腸中冷膿血痢。久服令人肌熱能食。

珊瑚 味甘。平。無毒。主宿血。去目中瞖。鼻衄。末吹鼻中。生南海。

石花 味甘。温。無毒。酒漬服。主腰脚風冷。與殷孽同。一名乳花。

石牀 味甘。温。無毒。酒漬服。與殷孽同。一名乳牀。一名逆石。

玉石部下品三十一味

青琅玕 味辛。平。無毒。主身痒。火瘡。癰傷。白禿。疥瘙。死肌。浸淫在皮膚中。煑鍊服之。起陰氣。可化爲丹。一名石珠。一名青珠。生蜀郡平澤。採無時。

礜石　味辛甘。大熱。生溫。熟熱。有毒。主寒熱。鼠瘻蝕瘡。死肌。風痺。腹中堅癖邪氣。除熱。明目。下氣。除膈中熱。止消渴。益肝氣。破積聚。痼冷腹痛。去鼻中息肉。久服令人筋攣。火鍊百日服一刀圭。不鍊服則殺人及百獸。一名青分石。一名立制石。一名固羊石。一名白礜石。一名太白石。一名澤乳。一名食鹽。生漢中山谷及少室。採無時。

特生礜石　味甘溫。有毒。主明目。利耳。腹內絕寒。破堅結及鼠瘻。殺百蟲惡獸。久服延年。一名蒼礜石。一名鼠毒。生西域。採無時。

握雪礜石　味甘溫。無毒。主痼冷積聚。輕身延年。多食令人熱。

方解石　味苦辛。大寒。無毒。主胷中留熱結氣。黃疸。通血脈。去蠱毒。一名黃石。生方山。採無時。

蒼石　味甘平。有毒。主寒熱。下氣。瘻蝕。殺禽獸。生西域。採無時。

土陰孽 味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時

代赭 味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有染爪甲不渝者良採無時

鹵鹹 味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池

大鹽 味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胷中病令人吐生邯鄲及河東池澤

戎鹽 味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛

溺血。吐血。齒舌血出。一名胡鹽。生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角。北海青。南海赤。十月採。

白堊 味苦辛。溫。無毒。主女子寒熱癥瘕月閉積聚。陰腫痛漏下。無子。洩痢不可久服。傷五藏。令人羸瘦。一名白善。生邯鄲山谷。採無時。

鉛丹 味辛。微寒。主吐逆胃反。驚癎瘨疾。除熱下氣。止小便利。除毒熱臍攣。金瘡溢血。鍊化還成九光。久服通神明。一名鉛華。生於鉛。生蜀郡平澤。

粉錫 味辛。寒。無毒。主伏尸毒螫。殺三蟲。去鼈瘕。療惡瘡。墮胎。止小便利。一名解錫。

錫銅鏡鼻 主女子血閉。癥瘕伏腸。絕孕。及伏尸邪氣。生桂陽山谷。

銅弩牙 主婦人產難。血閉月水不通。陰陽隔塞。

金牙 味鹹。無毒。主鬼疰毒蠱諸疰。生蜀郡。如金色者良。

石灰 味辛。溫。主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉。殺痔蟲。去黑子息肉。療髓骨疽。一名惡灰。一名希灰。生中山川谷。

冬灰 味辛。微溫。主黑子去肬息肉疽蝕疥瘙。一名藜灰。生玄谷川澤。

鍛竈灰 主癥瘕堅積。去邪惡氣。

伏龍肝 味辛。微溫。主婦人崩中吐血。止欬逆止血。消癰腫毒氣。

東壁土 主下部瘡脫肛。

紫鉚騏驎竭 味甘鹹平。有小毒。主五藏邪氣。帶下。止痛。破積血。金瘡生肉。與騏驎竭二物。大同小異。

硇砂 味鹹苦辛。溫。有毒。不宜多服。主積聚。破結血爛胎。止痛。下氣。療欬嗽宿冷。去惡肉。生好肌。柔金銀。可為銲藥。出西戎。形如牙消光淨者良。驢馬藥亦用。

薑石　味鹹，寒，無毒。主熱，豌豆瘡，丁毒等腫。生土石間，狀如薑，有五種色，白者最良。所在有之，以爛不磣者好。齊州歷城東者良。

赤銅屑　以酷和如麥飯，袋盛，先刺腋下脉出血，封之，攻腋臭神效。又熬使極熱，投酒中服五合，日三，主賊風反折。又燒赤銅五斤，内酒二斗中，百遍，服同前，主賊風甚驗。

銅鑛石　味酸，寒，有小毒。主丁腫惡瘡，驢馬脊瘡，臭腋。石上水磨取汁塗之。其丁腫末之，傅瘡上良。

白瓷瓦屑　平，無毒。主婦人帶下，白崩，止嘔吐，逆，破血，止血。水磨塗瘡滅瘢。定州者良，餘皆不如。

烏古瓦　寒，無毒。以水煑及漬汁飲，止消渴。取屋上年深者良。

石燕　以水煑汁飲之，主淋有效。婦人難產，兩手各把一枚，立驗。出零陵。

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡

草部上品之上四十味

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙一名龍芝生泰山

赤芝味苦平主胷腹結益心氣補中增智惠不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩高山

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黑芝味鹹平主癃利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙一名玄芝生常山

紫芝味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久

服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月八月採

赤箭 味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

天門冬 味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛勒生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾

麥門冬 味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏色有子久服輕身不老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚名

馬韭。越名羊耆。一名禹葭。一名禹餘糧。葉如韭。冬夏長生。生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處。二月三月八月十月採。陰乾。

朮 味苦甘。溫。無毒。主風寒濕痺。死肌痙疸。止汗除熱。消食。主大風在身面。風眩頭痛。目淚出。消痰水。逐皮間風水結腫。除心下急滿。及霍亂吐下不止。利腰臍間血。益津液。暖胃消穀嗜食。作煎餌久服輕身延年不飢。一名山薊。一名山薑。一名山連。生鄭山山谷漢中南鄭。二月三月八月九月採根。暴乾。

女萎萎蕤 味甘。平。無毒。主中風暴熱不能動搖。跌筋結肉。諸不足。心腹結氣。虛熱濕毒腰痛。莖中寒。及目痛眥爛淚出。久服去面黑䵟。好顏色潤澤。輕身不老。一名熒。一名地節。一名玉竹。一名馬薰。生太山山谷及丘陵。立春後採。陰乾。

黃精 味甘。平。無毒。主補中益氣。除風濕。安五藏。久服輕身延

年不飢。一名重樓。一名菟竹。一名雞格。一名救窮。一名鹿竹。生山谷。二月採根。陰乾。

乾地黃 味甘苦。寒。無毒。主折跌絕筋傷中。逐血痺。塡骨髓。長肌肉。作湯。除寒熱積聚。除痺。主男子五勞七傷。女子傷中胞漏下血。破惡血。溺血。利大小腸。去胃中宿食。飽力斷絕。補五藏內傷不足。通血脉。益氣力。利耳目。生者尤良。

生地黃 大寒。主婦人崩中血不止。及產後血上薄心悶絕。傷身胎動下血。胎不落。墮墜踠折。瘀血留血。衂鼻吐血。皆擣飲之。久服輕身不老。一名地髓。一名芐。一名芑。生咸陽川澤黃土地者佳。二月八月採根。陰乾。

菖蒲 味辛。溫。無毒。主風寒濕痺。欬逆上氣。開心孔。補五藏。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾。癰瘡。溫腸胃。止小便利。四肢濕痺不得屈伸。小兒溫瘧。身積熱不解。可作浴湯。久服輕身。聰

耳明目。不忘不迷惑。延年益心智。高志不老。一名昌陽。生上洛池澤及蜀郡嚴道。一寸九節者良。露根不可用。五月十二月採根。陰乾。

遠志 味苦溫。無毒。主欬逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智惠。耳目聰明。不忘。強志倍力。利丈夫。定心氣。止驚悸。益精。去心下膈氣。皮膚中熱。面目黃。久服輕身不老。好顏色。延年。葉名小草。主益精補陰氣。止虛損夢洩。一名棘菀。一名葽繞。一名細草。生太山及冤句川谷。四月採根葉。陰乾。

澤瀉 味甘鹹寒。無毒。主風寒濕痹。乳難消水。養五藏。益氣力。肥健。補虛損五勞。除五藏痞滿。起陰氣。止洩精。消渴淋瀝。逐膀胱三焦停水。久服耳目聰明。不飢。延年輕身。面生光。能行水上。扁鵲云。多服病人眼。一名水瀉。一名及瀉。一名芒芋。一名鵠瀉。生汝南池澤。五月六月八月採根。陰乾。

葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採

署預味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土藷生嵩高山谷二月八月採根暴乾

菊花味苦甘平無毒主風頭頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節華一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾

甘草 味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草一名蕗草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成

人參 味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胷脅逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風

石斛 味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰

益精。補內絕不足。平胃氣。長肌肉。逐皮膚邪熱。痱氣。脚膝疼冷痺弱。久服厚腸胃。輕身延年。定志除驚。一名林蘭。一名禁生。一名杜蘭。一名石遂。生六安山、谷水傍石上。七月八月採莖。陰乾。

牛膝 爲君。味苦酸。平。無毒。主寒濕痿痺。四肢拘攣。膝痛不可屈伸。逐血氣。傷熱火爛。墮胎。療傷中少氣。男子陰消。老人失溺。補中續絕。填骨髓。除腦中痛及腰脊痛。婦人月水不通。血結。益精。利陰氣。止髮白。久服輕身耐老。一名百倍。生河內川谷及臨朐。二月八月十月採根。陰乾。

卷柏 味辛甘。溫平。微寒。無毒。主五藏邪氣。女子陰中寒熱痛。癥瘕。血閉絕子。止欬逆。治脫肛。散淋結。頭中風眩。痿蹷。強陰益精。久服輕身。和顏色。令人好容體。一名萬歲。一名豹足。一名求股。一名交時。生常山山、谷石間。五月七月採。陰乾。

細辛味辛溫。無毒。主欬逆頭痛。腦動。百節拘攣。風濕痺痛。死肌。溫中下氣。破痰。利水道。開胷中。除喉痺。齆鼻。風癇癲疾。下乳結。汗不出。血不行。安五藏。益肝膽。通精氣。久服明目。利九竅。輕身長年。一名小辛。生華陰山谷。二月八月採根。陰乾。

獨活味苦甘平。微溫。無毒。主風寒所擊。金瘡止痛。賁豚癇痓。女子疝瘕。療諸賊風。百節痛風無久新者。久服輕身耐老。一名羌活。一名羌青。一名護羌使者。一名胡王使者。一名獨搖草。此草得風不搖。無風自動。生雍州川谷。或隴西南安。二月八月採根。暴乾。

升麻味甘苦平。微寒。無毒。主解百毒。殺百精老物殃鬼。辟溫疫瘴氣邪氣蠱毒。入口皆吐出。中惡腹痛。時氣毒癘。頭痛寒熱風腫諸毒。喉痛口瘡。久服不夭。輕身長年。一名周麻。生益州山谷。二月八月採根。日乾。

茈胡　爲君。味苦平。微寒。無毒。主心腹。去腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。推陳致新。除傷寒。心下煩熱。諸痰熱結實。胷中邪逆。五藏閒遊氣。大腸停積水脹。及濕痺拘攣。亦可作浴湯。久服輕身。明目益精。一名地薰。一名山菜。一名茹草葉名芸蒿。辛香可食。生弘農川谷及宛句。二月八月採根暴乾。

防葵　味辛甘苦。寒。無毒。主疝瘕腸洩。膀胱熱結溺不下。欬逆溫瘧。癲癇驚邪狂走。療五藏虛氣。小腹支滿臚脹。口乾。除腎邪。強志。久服堅骨髓。益氣輕身。中火者不可服。令人恍惚見鬼。一名梨蓋。一名房慈。一名爵離。一名農果。一名利茹。一名方蓋。生臨淄川谷及嵩高太山少室。三月三日採根暴乾。

蓍實　味苦酸平。無毒。主益氣。充肌膚。明目聰慧先知。久服不飢不老輕身。生少室山谷。八月九月採實日乾。

菴䕡子　味苦微寒。微溫。無毒。主五藏瘀血。腹中水氣。臚脹留

熱。風寒濕痹。身體諸痛。療心下堅。膈中寒熱。周痹。婦人月水不通。消食。明目。久服輕身延年不老。駏驉食之神仙。生雍州川谷。亦生上黨及道邊。十月採實。陰乾。

薏苡仁 味甘微寒無毒。主筋急拘攣。不可屈伸。風濕痹。下氣。除筋骨邪氣不仁。利腸胃。消水腫。令人能食。久服輕身益氣。其根下三蟲。一名解蠡。一名屋菼。一名起實。一名贛。生眞定平澤及田野。八月採實。採根無時。

車前子 味甘鹹寒無毒。主氣癃。止痛。利水道小便。除濕痹。男子傷中。女子淋瀝。不欲食。養肺強陰益精。令人有子。明目。療赤痛。久服輕身耐老。

葉及**根** 味甘寒。主金瘡。止血衄鼻。瘀血血瘕。下血。小便赤。止煩下氣。除小蟲。一名當道。一名芣苢。一名蝦蟇衣。一名牛遺。一名勝舄。生眞定平澤丘陵阪道中。五月五日採。陰乾。

菥蓂子 味辛。微温。無毒。主明目。目痛淚出。除痺。補五藏。益精光。療心腹腰痛。久服輕身不老。一名蔑菥。一名大戢。一名馬辛。一名大蕺。生咸陽川澤及道傍。四月五月採。暴乾。

茺蔚子 味辛甘。微温。微寒。無毒。主明目。益精。除水氣。療血逆大熱。頭痛。心煩。久服輕身。

莖 主癮疹上音隱下音敃。癢。可作浴湯。一名益母。一名益明。一名大札。一名貞蔚。生海濱池澤。五月採。

木香 味辛。温。無毒。主邪氣。辟毒疫温鬼。強志。主淋露。療氣劣。肌中偏寒。主氣不足。消毒。殺鬼精物。温瘧蠱毒。行藥之精。久服不夢寤魘寐。輕身致神仙。一名蜜香。生永昌山谷。

龍膽 味苦。寒。大寒。無毒。主骨間寒熱。驚癇。邪氣。續絕傷。定五藏。殺蠱毒。除胃中伏熱。時氣温熱。熱泄下痢。去腸中小蠱。益肝膽氣。止驚惕。久服益智不忘。輕身耐老。一名陵游。生齊朐

山谷及寃句。二月八月十一月十二月採根。陰乾。

菟絲子 味辛甘平無毒。主續絕傷。補不足。益氣力。肥健。汗去面䵟。養肌。强陰。堅筋骨。主莖中寒精自出。溺有餘瀝。口苦燥渴。寒血為積。久服明目。輕身延年。一名菟蘆。一名菟縷。一名蓎蒙。一名玉女。一名赤網。一名菟纍。生朝鮮川澤田野。蔓延草木之上。色黃而細為赤網。色淺而大為菟纍。九月採實。暴乾。

巴戟天 味辛甘微溫無毒。主大風邪氣。陰痿不起。强筋骨。安五藏。補中。增志。益氣。療頭面遊風。小腹及陰中相引痛。下氣。補五勞。益精。利男子。生巴郡及下邳山谷。二月八月採根。陰乾。

白英 味甘寒無毒。主寒熱。八疸。消渴。補中益氣。久服輕身延年。一名穀菜。一名白草。生益州山谷。春採葉。夏採莖。秋採花。冬採根。

白蒿 味甘平無毒。主五藏邪氣。風寒濕痺。補中益氣。長毛髮。

令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老。

草部上品之下　三十八味

肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾。

地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十日採實陰乾。

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月採陰乾。

蒺藜子味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痹乳難身體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰

㿉可作摩粉其葉主風癢可煑以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名止行一名豺羽一名升推一名即蔾一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾

防風 味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痹煩滿脅痛脅風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙久服輕身葉主中風熱汗出一名銅芸一名回草一名百枝一名屏風一名蕳根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾

石龍芻 味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍朱一名龍華一名懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾

絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通神一名石鯪一名石蹉一名略石一名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月採

千歲虆汁味甘平無毒主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名虆蕪生太山川谷

黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷淚出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人

一名知母。一名苦心。一名志取。一名虎鬚。一名白參。一名識美。一名文希。生河內川谷及寃句般陽續山。二月八月採根。暴乾。

丹參 味苦微寒無毒。主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿。益氣。養血。去心腹痼疾結氣。腰脊強脚痹。除風邪留熱。久服利人。一名郄蟬草。一名赤參。一名木羊乳。生桐柏山川谷及太山。五月採根。暴乾。

王不留行 味苦甘平無毒。主金瘡。止血。逐痛。出刺。除風痹內寒。止心煩。鼻衄。癰疽。惡瘡。瘻乳。婦人產難。久服輕身。耐老增壽。生太山山谷。二月八月採。

藍實 味苦寒無毒。主解諸毒。殺蠱蚑。疰鬼。螫毒。久服頭不白。輕身。其葉汁殺百藥毒。解狼毒。射罔毒。其莖葉可以染青。生河內平澤。

景天 味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕寒熱風痒諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名愼火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾

天名精 味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痺除胷中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門精一名彘顱一名蟾蜍蘭一名覲生平原川澤五月採

蒲黃 味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

香蒲 味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老一名睢一名醮生南海池澤

蘭草 味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胷中痰癖久

服益氣輕身不老通神明。一名水香。生大吳池澤。四月五月採

決明子 味鹹苦甘平微寒無毒。主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出。療脣口青。久服益精光輕身。生龍門川澤。石決明生豫章。十月十日採。陰乾百日。

芎藭 味辛溫無毒。主中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急。金瘡婦人血閉無子。除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛溫中內寒。一名胡藭。一名香果。其葉名蘼蕪。生武功川谷斜谷西嶺。三月四月採根暴乾。

蘼蕪 味辛溫無毒。主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲。久服通神。主身中老風頭中久風風眩。一名薇蕪。一名茳蘺。芎藭苗也。生雍州川澤及冤句。四月五月採葉暴乾。

續斷 味苦辛微溫無毒。主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋

骨。婦人乳難。崩中漏血。金瘡血內漏。止痛生肌肉。及踠傷惡血。腰痛關節緩急。久服益氣力。一名龍豆。一名屬折。一名接骨。一名南草。一名槐。生常山山谷。七月八月採。陰乾。

雲實 味辛苦溫無毒。主泄痢腸澼。殺蟲蠱毒。去邪惡結氣。止痛除寒熱。消渴。花主見鬼精物。多食令人狂走。殺精物。下水。燒之致鬼。久服輕身通神明。益壽。一名員實。一名雲英。一名天豆。生河間川谷。十月採。暴乾。

黃耆 味甘微溫無毒。主癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。婦人子藏風邪氣。逐五藏間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛泄痢。益氣。利陰氣。生白水者冷補。其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡。一名戴糝。一名戴椹。一名獨椹。一名芰草。一名蜀脂。一名百本。生蜀郡山谷白水漢中。二月十日採。陰乾。

徐長卿 味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三月採

杜若 味辛微溫無毒主胸脅下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛多涕淚出眩倒目䀮䀮止痛除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜連一名白連一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月採根暴乾

蛇床子 味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺床一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆蘼生臨淄川谷及田野五月採實陰乾

茵蔯蒿 味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身

發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及五陵坂岸上五月及立秋採陰乾

漏盧 味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾

茜根 味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹藘一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾

飛廉 味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服令人身輕益氣明目不老可煑可乾一名漏盧一名天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採花陰乾

營實 味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除邪逆氣疽癰諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌一名牆薇一名牆麻一名牛棘一名牛勒一名薔蘼一名山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

薇銜 味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫暴癥逐水療痿蹷久服輕身明目一名麋銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及寃句邯鄲七月採莖葉陰乾

五味子 味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾

旋花 味甘溫無毒主益氣去面皯黑色媚好其根味辛主腹

中寒熱邪氣。利小便。久服不飢。輕身。一名筋根花。一名金沸。
一名美草。生豫州平澤。五月採。陰乾。

白兔藿 味苦平。無毒。主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒。鬼疰風疰。諸大毒不可入口者。皆消除之。又去血。可末著痛上立消。毒入腹者。煮飲之即解。一名白葛。生交州山谷。

鬼督郵 味辛苦平。無毒。主鬼疰卒忤中惡。心腹邪氣。百精毒。溫瘧疫疾。強腰腳。益膂力。一名獨搖草。

白花藤 味苦寒。無毒。主解諸藥菜肉中毒。酒漬服之。主虛勞風熱。生嶺南交州廣州平澤。

草部中品之上　三十七味

當歸 味甘辛。溫。大溫。無毒。主欬逆上氣。溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中。婦人漏下絕子。諸惡瘡瘍金瘡。煮飲之。溫中止痛。除客血內塞。中風痓。汗不出。濕痹。中惡客氣虛冷。補五藏。生肌肉。

一名乾歸。生隴西川谷。二月八月採根。陰乾。

秦膠 味苦辛。平。微溫。無毒。主寒熱邪氣。寒濕風痺。肢節痛。下水。利小便。療風無問久新。通身攣急。生飛烏山谷。二月八月採根。暴乾。

黃芩 味苦。平。大寒。無毒。主諸熱黃疸。腸澼洩痢。逐水。下血閉。惡瘡。疽蝕。火瘍。療痰熱。胃中熱。小腹絞痛。消穀。利小腸。女子血閉。淋露下血。小兒腹痛。一名腐腸。一名空腸。一名內虛。一名黃文。一名經芩。一名妒婦。其子主腸澼膿血。生秭歸川谷及宛句。三月三日採根。陰乾。

芍藥 味苦酸。平。微寒。有小毒。主邪氣腹痛。除血痺。破堅積。寒熱疝瘕。止痛。利小便。益氣。通順血脈。緩中。散惡血。逐賊血。去水氣。利膀胱大小腸。消癰腫。時行寒熱。中惡腹痛腰痛。一名白朮。一名餘容。一名犁食。一名解倉。一名鋋。生中岳川谷及

立陵。二月八月採根。暴乾。

乾薑 味辛溫大熱無毒。主胷滿欬逆上氣。溫中止血出汗。逐風濕痺腸澼下痢。寒冷腹痛中惡霍亂脹滿。風邪諸毒。皮膚閒結氣。止唾血。生者尤良。

生薑 味辛微溫。主傷寒頭痛鼻塞。欬逆上氣。止嘔吐。久服去臭氣。通神明。生犍爲川谷及荆州揚州。九月採。

槀本 味辛苦溫微溫微寒無毒。主婦人疝瘕陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅顏色。辟霧露潤澤。療風邪嚲曳。金瘡可作沐藥面脂。實主風流四肢。一名鬼卿。一名地新。一名微莖。生崇山山谷。正月二月採。乾暴乾三十日成。

麻黄 味苦溫微溫無毒。主中風傷寒頭痛溫瘧。發表出汗。去邪熱氣。止欬逆上氣。除寒熱。破癥堅積聚。五藏邪氣緩急。風脅痛。字乳餘疾。止好唾。通腠理。疎傷寒頭疼。解肌泄邪惡氣。

消赤黑斑毒。不可多服。令人虛。一名早相。一名龍沙。一名早鹽。生晉地及河東。立秋採莖。陰乾。令青。

葛根 味甘平。無毒。主消渴。身大熱。嘔吐。諸痺。起陰氣。解諸毒。療傷寒中風頭痛。解肌發表出汗。開腠理。療金瘡。止痛。脅風痛。生根汁大寒。療消渴。傷寒壯熱。葛穀主下痢十歲已上。白葛燒以粉瘡。止痛斷血。葉主金瘡。止血。花主消酒。一名雞齊根。一名鹿藿。一名黃斤。生汶山川谷。五月採根。暴乾。

前胡 味苦微寒。無毒。主療痰滿。胸脅中痞。心腹結氣。風頭痛。去痰實。下氣。治傷寒寒熱。推陳致新。明目益精。二月八月採根。暴乾。

知母 味苦寒。無毒。主消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水。補不足。益氣。療傷寒久瘧煩熱。脅下邪氣。膈中惡。及風汗內疸。多服令人洩。一名蚳母。一名連母。一名野蓼。一名地參。一名水

參。一名水浚。一名貫母。一名蝭母。一名女雷。一名女理。一名兒草。一名鹿列。一名韭逢。一名兒踵草。一名東根。一名水須。一名沈燔。一名蕁。生河內川谷。二月八月採根暴乾。

大青 味苦大寒無毒。主療時氣頭痛大熱口瘡。二月四月採莖陰乾。

貝母 味辛苦平微寒無毒。主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙。療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣。止煩熱渴出汗安五臟利骨髓。一名空草。一名藥實。一名苦花。一名苦菜。一名商草。一名勤母。生晉地。十月採根暴乾。

栝樓根 味苦寒無毒。主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷。除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣。通月水止小便利。一名地樓。一名果蠃。一名天瓜。一名澤姑。實名黃瓜。主

胷痺。悅澤人面。莖葉療中熱傷暑。生弘農川谷及山陰地。入土深者良。生鹵地者有毒。二月八月採根暴乾。三十日成。

玄參 味苦鹹。微寒。無毒。主腹中寒熱積聚。女子産乳餘疾。補腎氣。令人目明。主暴中風傷寒。身熱支滿。狂邪忽忽不知人。温瘧洒洒。血瘕下寒血。除胷中氣。下水。止煩渴。散頸下核癰腫。心腹痛堅癥。定五臟。久服補虚明目。強陰益精。一名重臺。一名玄臺。一名鹿腸。一名正馬。一名咸。一名端。生河間川谷及寃句。三月四月採根暴乾。

苦參 味苦寒。無毒。主心腹結氣。癥瘕積聚。黄疸。溺有餘瀝。逐水。除癰腫。補中。明目。止淚。養肝膽氣。安五藏。定志益精。利九竅。除伏熱腸澼。止渴醒酒。小便黄赤。療惡瘡。下部䘌。平胃氣。令人嗜食輕身。一名水槐。一名苦蘵。一名地槐。一名菟槐。一名橋槐。一名白莖。一名虎麻。一名禄莖。一名禄白。一名陵

郎。生汝南山谷及田野。二月八月十月採根。暴乾。

石龍芮 味苦平無毒。主風寒濕痹。心腹邪氣。利關節。止煩滿。平腎胃氣。補陰氣不足。失精莖冷。久服輕身明目不老。令人皮膚光澤有子。一名魯果能。一名地椹。一名石能。一名彭根。一名天豆。生太山川澤石邊。五月五日採子。二月八月採皮。陰乾。

石韋 味苦甘平無毒。主勞熱邪氣。五癃閉不通。利小便水道。止煩下氣。通膀胱滿。補五勞。安五藏。去惡風。益精氣。一名石韀。一名石皮。用之去黃毛。毛射人肺。令人欬不可療。生華陰山谷石上。不聞水及人聲者良。二月採葉。陰乾。

狗脊 味苦甘平微溫無毒。主腰背強。關機緩急。周痹寒濕膝痛。頗利老人。療失溺不節。男子腳弱腰痛。風邪淋露。少氣。目闇。堅脊。利俛仰。女子傷中。關節重。一名百枝。一名強膂。一名

扶蓋。一名扶筋。生常山川谷。二月八月採。暴乾。

萆解 味苦甘平無毒。主腰背痛。強骨節。風寒濕周痺。惡瘡不瘳。熱氣。傷中恚怒。陰痿失溺。關節老血。老人五緩。一名赤節。生眞定山谷。二月八月採根。暴乾。

菝葜 味甘平溫無毒。主腰背寒痛。風痺。益血氣。止小便利。生山野。二月八月採根。暴乾。

通草 味辛甘平無毒。主去惡蟲。除脾胃寒熱。通利九竅血脈關節。令人不忘。療脾疸。常欲眠。心煩。噦。出音聲。療耳聾。散癰腫諸結不消。及金瘡惡瘡。鼠瘻。踒折。齆鼻息肉。墮胎。去三蟲。一名附支。一名丁翁。生石城山谷及山陽。正月採枝。陰乾。

瞿麥 味苦辛寒無毒。主關格諸癃結。小便不通。出刺。決癰腫。明目去翳。破胎墮子。下閉血。養腎氣。逐膀胱邪逆。止霍亂。長毛髮。一名巨句麥。一名大菊。一名大蘭。生太山川谷。立秋採

實陰乾

敗醬 味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後腹痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

白芷 味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目癢可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白茝一名囂一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾

杜衡 味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾

紫草 味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皻一名紫丹一名

紫芙生碭山山谷及楚地。二月採根。陰乾。

紫菀味苦辛。溫。無毒。主欬逆上氣。胸中寒熱結氣。去蠱毒。痿蹷。安五藏。療欬唾膿血。止喘悸。五勞體虛。補不足。小兒驚癇。一名紫蒨。一名青菀。生房陵山谷及真定邯鄲。二月三月採根。陰乾。

白鮮味苦鹹。寒。無毒。主頭風黃疸。欬逆淋瀝。女子陰中腫痛。濕痺死肌。不可屈伸起止行步。療四肢不安。時行腹中大熱飲水。欲走大呼。小兒驚癇。婦人產後餘痛。生上谷川谷及冤句。四月五月採根。陰乾。

白薇味苦鹹。平。大寒。無毒。主暴中風。身熱支滿。忽忽不知人。狂惑邪氣。寒熱酸疼。溫瘧洗洗。發作有時。療傷中淋露。下水氣。利陰氣。益精。一名白幕。一名薇草。一名春草。一名骨美。久服利人。生平原川谷。三月三日採根。陰乾。

葈耳實味甘苦溫。葉味苦辛。微寒。有小毒。主風頭寒痛。風濕周痺。四肢拘攣痛。惡肉死肌。膝痛。溪毒。久服益氣。耳目聰明。強志。輕身。一名胡葈。一名地葵。一名葹。一名常思。生安陸川谷及六安田野。實熟時採。

茅根味甘寒。無毒。主勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血。血閉。寒熱。利小便。下五淋。除客熱在腸胃。止渴。堅筋。婦人崩中。久服利人。其苗主下水。一名蘭根。一名茹根。一名地菅。一名地筋。一名兼杜。生楚地山谷田野。六月採根。

百合味甘平。無毒。主邪氣腹脹。心痛。利大小便。補中益氣。除浮腫。臚脹。痞滿。寒熱。通身疼痛。及乳難。喉痺腫。止涕淚。一名重箱。一名重邁。一名摩羅。一名中逢花。一名強瞿。生荊州川谷。二月八月採根。暴乾。

酸漿味酸平寒。無毒。主熱煩滿。定志。益氣。利水道。產難。吞其

實立產。一名酢漿。生荊楚川澤及人家田園中。五月採。陰乾。

紫參 味苦辛。寒。微寒。無毒。主心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。療腸胃大熱。唾血。衄血。腸中聚血。癰腫諸瘡。止渴。益精。一名牡蒙。一名衆戎。一名童腸。一名馬行。生河西及宛句山谷。三月採根。火炙使紫色。

女萎 味辛。溫。主風寒洒洒。霍亂。洩痢。腸鳴。遊氣。上下無常。驚癇。寒熱。百病。出汗。李氏本草云。止下。消食。

淫羊藿 味辛。寒。無毒。主陰痿。絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。堅筋骨。消瘰癧。赤癰。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令人無子。一名剛前。生上郡陽山山谷。

蠡實 味甘。平。溫。無毒。主皮膚寒熱。胃中熱氣。風寒濕痺。堅筋骨。令人嗜食。止心煩滿。利大小便。長肌肉肥大。久服輕身。花葉。去白蟲。療喉痺。多服令人溏洩。一名荔實。一名劇草。一名

三堅。一名豕首。生河東川谷。五月採實。陰乾。

草部中品之下　三十九味

款冬 味辛甘溫無毒。主欬逆上氣。善喘。喉痹。諸驚癇。寒熱邪氣。消渴。喘息呼吸。一名橐吾。一名顆東。一名虎鬚。一名菟奚。一名氐冬。生常山山谷及上黨水傍。十一月採花。陰乾。

牡丹 味辛苦寒微寒無毒。主寒熱中風瘈瘲。痙。驚癇邪氣。除癥堅。瘀血留舍腸胃。安五藏。療癰瘡。除時氣頭痛。客熱。五勞勞氣。頭腰痛。風噤。癲疾。一名鹿韭。一名鼠姑。生巴郡山谷及漢中。二月八月採根。陰乾。

防己 味辛苦平溫無毒。主風寒。溫瘧熱氣。諸癇。除邪。利大小便。療水腫風腫。去膀胱熱。傷寒寒熱邪氣。中風手腳攣急。止洩。散癰腫惡結。諸蝸疥癬蟲瘡。通腠理。利九竅。一名解離。文如車輻理解者良。生漢中川谷。二月八月採根。陰乾。

女菀 味辛。溫。無毒。主風寒。洗洗。霍亂。洩痢。腸鳴。上下無常處。驚癇。寒熱。百疾。療肺傷。欬逆。出汗。久寒在膀胱。支滿。飲酒夜食發病。一名白菀。一名織女菀。一名茆。生漢中川谷或山陽。正月二月採。陰乾。

澤蘭 味苦甘。微溫。無毒。主乳婦內衄。中風餘疾。大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。金瘡。癰腫瘡膿。產後金瘡內塞。一名虎蘭。一名龍棗。一名虎蒲。生汝南諸大澤傍。三月三日採。陰乾。

地榆 味苦甘酸。微寒。無毒。主婦人乳痓痛。七傷。帶下十二病。止痛。除惡肉。止汗。療金瘡。止膿血。諸瘻惡瘡。消酒。除消渴。補絕傷。產後內塞。可作金瘡膏。生桐柏及冤句山谷。二月八月採根。暴乾。

王孫 味苦。平。無毒。主五藏邪氣。寒濕痺。四肢疼酸。膝冷痛。療百病。益氣。吳名白功草。楚名王孫。齊名長孫。一名黃孫。一名

黃昏。一名海孫。一名蔓延。生海西川谷及汝南城郭垣下。

爵牀 味鹹寒。無毒。主腰脊痛不得著牀。俛仰艱難。除熱。可作浴湯。生漢中川谷及田野。

白前 味甘微溫。無毒。主胸脅逆氣。欬嗽上氣。

百部根 微溫有小毒。主欬嗽上氣。

王瓜 味苦寒。無毒。主消渴內痺瘀血月閉。寒熱酸疼。益氣愈聾。療諸邪氣熱結鼠瘻。散癰腫留血。婦人帶下不通。下乳汁。止小便數不禁。逐四肢骨節中水。療馬骨刺人瘡。一名土瓜。生魯地平澤田野及人家垣牆間。三月採根陰乾。

薺苨 味甘寒。無毒。主解百藥毒。

高良薑 大溫。無毒。主暴冷。胃中冷逆。霍亂腹痛。

馬先蒿 味苦平。無毒。主寒熱鬼疰中風濕痺。女子帶下病無子。一名馬屎蒿。生南陽川澤。

蜀羊泉 味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療齲齒女子陰中内傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷

積雪草 味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荆州川谷

惡實 味辛平無毒主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

莎草根 味甘微寒無毒主除胸中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名薃一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

大小薊根 味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

垣衣 味酸無毒主黄疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡内塞久服補中益氣長肌好顔色一名昔邪一名烏韭一名垣嬴一名天韭一名鼠韭生古垣墻陰或屋上三月三日採陰乾

艾葉味苦。微温。無毒。主灸百病。可作煎。止下痢。吐血。下部䘌瘡。婦人漏血。利陰氣。生肌肉。辟風寒。使人有子。一名冰臺。一名醫草。生田野。三月三日採。暴乾。作煎。勿令見風。

水萍味辛酸。寒。無毒。主暴熱身痒。下水氣。勝酒。長鬚髮。止消渴。下氣。以沐浴。生毛髮。久服輕身。一名水花。一名水白。一名水蘇。生雷澤池澤。三月採。暴乾。

海藻味苦鹹。寒。無毒。主癭瘤氣。頸下核。破散結氣。癰腫癥瘕堅氣。腹中上下鳴。下十二水腫。療皮間積聚暴㿉。留氣熱結。利小便。一名落首。一名藫。生東海池澤。七月採。暴乾。

昆布味鹹。寒。無毒。主十二種水腫。癭瘤聚結氣。瘻瘡。生東海。

葒草味鹹。微寒。無毒。主消渴。去熱。明目。益氣。一名鴻藹。如馬蓼而大。生水傍。五月採實。

陟釐味甘。大温。無毒。主心腹大寒。温中消穀。強胃氣。止泄痢。

生江南池澤。

井中苔及**萍**　大寒。主漆瘡。熱瘡。水腫。井中藍。殺野葛巴豆諸毒。

蘮草　味甘寒。無毒。主暴熱喘息。小兒丹腫。一名蘮榮。生水傍。

鳧葵　味甘冷。無毒。主消渴。去熱淋。利小便。生水中。即荇菜也。一名接余。五月採。

菟葵　味甘寒。無毒。主下諸石五淋。止虎蛇毒。

鱧腸　味甘酸平。無毒。主血痢。針灸瘡發洪血不可止者。傅之立已。汁塗鬚眉生速而繁。生下濕地。

蒟醬　味辛溫。無毒。主下氣溫中。破痰積。生巴蜀。

百脉根　味甘苦微寒。無毒。主下氣。止渴。去熱。除虛勞。補不足。酒浸若水煮丸散兼用之。出肅州巴西。

蘿摩子　味甘辛溫。無毒。主虛勞。葉食之。功同於子。陸璣云。一名芄蘭。幽州謂之雀瓢。

白藥 味辛。溫。無毒。主金瘡。生肌。出原州。

懷香子 味辛。平。無毒。主諸瘻。霍亂。及蛇傷。

鬱金 味辛。苦。寒。無毒。主血積。下氣。生肌。止血。破惡血。血淋。尿血。金瘡。

薑黃 味辛。苦。大寒。無毒。主心腹結積。疰忤。下氣。破血。除風熱。消癰腫。功力烈於鬱金。

阿魏 味辛。平。無毒。主殺諸小蟲。去臭氣。破癥積。下惡氣。除邪鬼蠱毒。生西番及崑崙。

千金翼方卷第二

千金翼方卷第三

本草中

草部下品之上 三十五味

大黄 將軍 味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黄良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾

桔梗 味辛苦微温有小毒主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及冤句二月八月採根暴乾

甘遂 味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲

宿食。破癥堅積聚。利水穀道。下五水。散膀胱留熱。皮中痞熱。氣腫滿。一名甘槀。一名陵槀。一名陵澤。一名重澤。一名主田。生中山川谷。二月採根陰乾。

葶藶 味辛苦寒大寒無毒。主癥瘕積聚結氣。飲食寒熱。破堅。逐邪。通利水道。下膀胱水伏留熱氣。皮間邪水上出。面目浮腫。身暴中風熱痱痒。利小腹。久服令人虛。一名丁歷。一名蕇蒿。一名大室。一名大適。生藁城平澤及田野。立夏後採實陰乾。得酒良。

芫花 味辛苦溫微溫有小毒。主欬逆上氣。喉鳴喘咽腫短氣。蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫。殺蟲魚。消胷中痰水。喜唾水腫。五水在五藏皮膚及腰痛。下寒毒肉毒。久服令人虛。一名去水。一名毒魚。一名杜芫。其根名蜀桑根。療疥瘡。可用毒魚。生淮源川谷。三月三日採花陰乾。

澤漆 味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾

大戟 味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名邛鉅生常山十二月採根陰乾

蕘花 味苦辛寒微寒有毒主傷寒温瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾

旋復花 味鹹甘温微温冷利有小毒主結氣脅下滿驚悸除水去藏間寒熱補中下氣消胸上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痹皮間死肉目中眵䁾利大腸通血脈益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤

川谷五月採花日乾二十日成

鉤吻 味辛溫有大毒主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傅高山谷及會稽東野

藜蘆 味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱菼一名山葱生太山山谷三月採根陰乾

赭魁 味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採

及已 味苦平有毒主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡

烏頭 味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍

間痛。肩胛痛不可俛仰。目中痛不可久視。又墮胎。其汁煎之名射罔。殺禽獸。

射罔味苦。有大毒。療尸疰癥堅。及頭中風痺痛。一名奚毒。一名即子。一名烏喙。

烏喙味辛。微溫。有大毒。主風濕。丈夫腎濕陰囊痒。寒熱歷節掣引腰痛不能行步。癰腫膿結。又墮胎。生朗陵山谷。正月二月採。陰乾。長三寸以上為天雄。

天雄味辛甘。溫。大溫。有大毒。主大風寒濕痺。歷節痛。拘攣緩急。破積聚。邪氣。金瘡。強筋骨。輕身健行。療頭面風去來疼痛。心腹結積。關節重不能行步。除骨間痛。長陰氣。強志。令人武勇力作不倦。又墮胎。一名白幕。生少室山谷。二月採根。陰乾。

附子味辛甘。溫。大熱。有大毒。主風寒欬逆邪氣。溫中。金瘡。破癥堅積聚。血瘕。寒濕踒躄拘攣。膝痛。脚疼冷弱。不能行步。腰

脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨强陰又墮胎爲白藥長生犍爲山谷及廣漢冬月採爲附子春採爲烏頭

側子 味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎

羊躑躅 味辛温有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛温瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾

茵芋 味苦温微温有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛療久風流走四肢脚弱一名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾

射干 味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏翣一

名烏吹一名草薑生南陽川谷田野二月三日採根陰乾

鳶尾 味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採

貫眾 味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人泄一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁符一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及寃句少室山二月八月採根陰乾

半夏 味辛平生微寒熟溫有毒主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胷脹欬逆腸鳴止汗消心腹胷膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八日採根暴乾

由跋 主毒腫結熱

虎掌 味苦温微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及冤句二月八月採陰乾

莨菪子 味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濵川谷及雍州五月採子

蜀漆 味辛平微温有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪結氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

恒山 味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發温瘧鬼毒胷中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾

青葙子 味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡子名草決明療脣口青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

牙子 味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名犬牙生淮南川谷及寃句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

白斂 味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名兔核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾

白及 味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草生北山川谷又寃句及越山

蛇合　味苦。微寒。無毒。主驚癇。寒熱邪氣。除熱。金瘡疽痔。鼠瘻。惡瘡頭瘍。療心腹邪氣。腹痛濕痹。養胎。利小兒。一名蛇銜。生益州山谷。八月採。陰乾。

草蒿　味苦。寒。無毒。主疥瘙痂痒惡瘡。殺蝨。留熱在骨節間。明目。一名青蒿。一名方潰。生華陰川澤。

雚菌　味鹹甘。平。微溫。有小毒。主心痛。溫中。去長蟲。白㿀。蟯蟲。蛇螫毒。癥瘕。諸蟲。疽蝸。去蚘蟲。寸白。惡瘡。一名雚蘆。生東海池澤及渤海章武。八月採。陰乾。

草部下品之下　六十八味

連翹　味苦。平。無毒。主寒熱。鼠瘻。瘰癧癰腫。惡瘡癭瘤。結熱蠱毒。去白蟲。一名異翹。一名蘭華。一名折根。一名軹。一名三廉。生太山山谷。八月採。陰乾。

白頭翁　味苦。溫。無毒。有毒。主溫瘧。狂易寒熱。癥瘕積聚。癭氣。

逐血止痛。療金瘡。皐衄。一名野丈人。一名胡王使者。一名柰何草。生高山山谷及田野。四月採。亦療毒痢。

蔄茹 味辛酸寒微寒。有小毒。主蝕惡肉敗瘡死肌。殺疥蟲。排膿惡血。除大風熱氣。善忘不樂。主熱痺。破癥瘕。除息肉。一名屈据。一名離婁。生代郡川谷。五月採根陰乾。黑頭者良。

苦芙 微寒。主面目通身漆瘡。作灰療金瘡大驗。

羊桃 味苦寒有毒。主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍。除小兒熱。去五藏五水大腹。利小便益氣。可作浴湯。一名鬼桃。一名羊腸。一名萇楚。一名御弋。一名銚弋。生山林川谷及生田野。二月採陰乾。

羊蹄 味苦寒無毒。主頭禿疥瘙。除熱。女子陰蝕浸淫疽痔。殺蟲。一名東方宿。一名連蟲陸。一名鬼目。一名蓄。生陳留川澤。

鹿藿 味苦平無毒。主蠱毒。女子腰腹痛不樂。腸癰瘰癧瘍氣。

生汶山山谷。

牛扁 味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病生桂陽川谷。

陸英 味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及寃句立秋採。

蒴藋 味酸溫有毒主風瘙癮軫身痒濕痺可作浴湯一名菫草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根。

藎草 味苦平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採。

夏枯草 味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採。

烏韭 味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療黃疸

金瘡內塞。補中益氣。好顏色。生山谷石上。

蚤休 味苦微寒有毒。主驚癇搖頭弄舌。熱氣在腹中。癲疾癰瘡。陰蝕。下三蟲。去蛇毒。一名蚩休。生山陽川谷及寃句。

虎杖根 微溫。主通利月水。破留血癥結。

石長生 味鹹苦微寒有毒。主寒熱惡瘡大熱。辟鬼氣不祥。下三蟲。一名丹草。生咸陽山谷。

鼠尾草 味苦微寒無毒。主鼠瘻寒熱。下痢膿血不止。白花者主白下。赤花者主赤下。一名葝。一名陵翹。生平澤中。四月採葉。七月採花。陰乾。

馬鞭草 主下部䘌瘡。

胡桐淚 味鹹苦大寒無毒。主大毒熱。心腹煩滿。水和服之取吐。又主牛馬急黃黑汗。水研二三兩灌之立差。又爲金銀銲藥。出肅州以西平澤及山谷中。形似黃礬而堅實。有夾爛木

者云。是胡桐樹滋淪入土石鹼鹵地作之。其樹高大。皮葉似白楊青桐桑蕫。故名胡桐木。堪器用。又名胡桐律。西域傳云。胡桐似桑而曲。

馬勃 味辛平。無毒。主惡瘡馬疥。一名馬疕。生園中久腐處。

雞腸草 主腫上小便利。

蛇莓汁 大寒。主胸腹大熱不止。療溪毒射工傷寒大熱甚良。

苧根 寒。主小兒赤丹。其漬苧汁療渴。

菰根 大寒。主腸胃固熱消渴。止小便利。

狼跋子 有小毒。主惡瘡蝸疥。殺蟲魚。

弓弩弦 主難產胞衣不出。

舂杵頭細糠 主卒噎。

敗天公 平。主鬼疰精魅。

半天河 微寒。主鬼疰狂邪氣惡毒。洗諸瘡用之。

地漿 寒。主解中毒煩悶。

敗蒲席 平。主筋溢惡瘡。

敗船茹 平。主婦人崩中吐痢血不止。燒作灰服之。

敗鼓皮 平。主中蠱毒。燒作灰水服。

屋遊 味甘寒。主浮熱在皮膚往來寒熱。利小腸膀胱氣。生屋上陰處。八月九月採。

赤地利 味苦平。無毒。主赤白冷熱諸痢。斷血破血。帶下赤白。生肌肉。所在山谷有之。

赤車使者 味辛苦溫。有毒。主風冷邪疰。蠱毒癥瘕。五藏積氣。

劉寄奴草 味苦溫。主破血下脹。多服令人痢。生江南。

三白草 味甘辛寒。有小毒。主水腫脚氣。利大小便。消痰破癖。除積聚。消丁腫。生池澤畔。

牽牛子 味苦寒。有毒。主下氣。療脚滿水腫。除風毒。利小便。

豬膏莓 味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傳並良

紫葛 味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣為末醋和封之生山谷中不入方用

蓖麻子 味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之葉主腳氣風腫不仁擣蒸傅之

葎草 味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之生故墟道傍

格注草 味辛苦溫有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生齊魯山澤

獨行根 味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之日三四立瘥水煮一二兩取汁服吐蠱毒

狗舌草 味苦寒有小毒主蠱疥瘙殺小蟲

烏斂莓 味酸苦寒無毒主風毒熱腫游丹蛇傷擣傅并飲汁

狶薟 味苦寒有小毒主熱䵟煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐

狼毒 味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沈水者良

鬼臼 味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚瞖殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名解毒生九真山谷及寃句二月八月採根

蘆根 味甘寒主消渴客熱止小便利

甘蕉根 大寒主癰腫結熱

萹蓄 味苦平無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕生

東萊山谷。五月採。陰乾。

酢漿草 味酸寒。無毒。主惡瘡瘑瘻。擣傅之。殺諸小蟲。生道傍。

苘實 味苦平。無毒。主赤白冷熱痢。散服飲之。吞一枚破癰腫。

蒲公草 味甘平。無毒。主婦人乳癰腫。水煑汁飲之。及封之。立消。一名構耨草。

商陸 味辛酸平。有毒。主水脹疝瘕痺。熨除癰腫。殺鬼精物。療胷中邪氣。水腫痿痺。腹滿洪直。疏五藏。散水氣。如人形者有神。一名𦺇根。一名夜呼。生咸陽川谷。

女青 味辛平。有毒。主蠱毒。逐邪惡氣。殺鬼。温瘧。辟不祥。一名雀瓢。蛇銜根也。生朱崖。八月採。陰乾。

水蓼 主蛇毒。擣傅之。絞汁服。止蛇毒入內。心悶。水煑漬捋脚。消氣腫。

角蒿 味辛苦平。有小毒。主甘濕䘌。諸惡瘡。有蟲者。

昨葉何草 味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾

白附子 主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採

鶴虱 味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦圓散中用生西戎

甑帶灰 主腹脹痛脫肛煑汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出

屐屧鼻繩灰 水服主噎哽心痛胷滿

故麻鞋底 水煑汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止

雀麥 味甘平無毒主女人產不出煑汁飲之一名蘥一名燕麥生故墟野林下葉似麥

筆頭灰 久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒

灰水服之。

木部上品二十七味

茯苓　味甘平無毒主胸脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸府調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年一名伏菟其有木根者名茯神

茯神　平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾。

琥珀　味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌。

松脂　味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主

惡痺。久服輕身。不老延年。一名松膏。一名松肪。生太山山谷。六月採。

松實 味苦。温。無毒。主風痺寒氣。虛羸少氣。補不足。九月採。陰乾。

松葉 味苦。温。主風濕瘡。生毛髮。安五藏。守中。不飢延年。

松節 温。主百節久風。風虛脚痺疼痛。

松根白皮 主辟穀不飢。

柏實 味甘。平。無毒。主驚悸。安五藏。益氣。除風濕痺。療恍惚虛損吸吸。歷節腰中重痛。益血止汗。久服令人潤澤美色。耳目聰明。不飢不老。輕身延年。生太山山谷。柏葉尤良。

柏葉 味苦。微温。無毒。主吐血衂血。利血崩中赤白。輕身益氣。令人耐寒暑。去濕痺。止飢。四時各依方面採。陰乾。

柏白皮 主火灼爛瘡。長毛髮。

菌桂 味辛。温。無毒。主百病。養精神。和顏色。爲諸藥先聘通使。

久服輕身不老。面生光華。媚好常如童子。生交阯桂林山谷巖崖間。無骨。正圓如竹。立秋採。

牡桂 味辛溫無毒。主上氣欬逆結氣。喉痺吐吸。心痛脅風脅痛。溫筋通脉。止煩出汗。利關節。補中益氣。久服通神。輕身不老。生南海山谷。

桂 味甘辛大熱有小毒。主溫中。利肝肺氣。心腹寒熱。冷疾。霍亂轉筋。頭痛腰痛。出汗。止煩止唾。欬嗽鼻齆。能墮胎。堅骨節。通血脉。理疎不足。宣導百藥。無所畏。久服神仙不老。生桂陽。二月八月十月採皮。陰乾。

杜仲 味辛甘平溫無毒。主腰脊痛。補中益精氣。堅筋骨。強志。除陰下痒濕。小便餘瀝。脚中酸疼不欲踐地。久服輕身耐老。一名思仙。一名思仲。一名木綿。生上虞山谷及上黨漢中。二月五月六月九月採皮。

楓香脂味辛苦平無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煑汁用之所在大山皆有

乾漆味辛溫無毒有毒主絶傷補中續筋骨塡髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之

蔓荊實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人潤澤顏色小荊實亦等

牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾

女貞實 味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採

桑上寄生 味苦甘平無毒主腰痛小兒背強癰腫安胎充飢膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦生弘農川谷桑上三月三日採莖葉陰乾

蕤核 味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不飢生函谷川谷及巴西

五加皮 味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩腳疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名犲漆一名犲節五葉者良生漢中及

宛句。五月七月採莖。十月採根。陰乾。

沉香 **薰陸香** **雞舌香** **藿香** **詹糖香** **楓香** 並微溫。悉療風水毒腫。去惡氣。薰陸、詹糖去伏尸。雞舌、藿香療霍亂心痛。楓香療風癮疹痒毒。

蘗木 味苦寒無毒。主五藏腸胃中結氣熱。黃疸腸痔。止洩痢。女子漏下赤白。陰傷蝕瘡。療驚氣在皮間。肌膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。久服通神。

根 一名**檀桓**。主心腹百病。安魂魄。不飢渴。久服輕身延年通神。生漢中山谷及永昌。

辛夷 味辛溫無毒。主五藏身體寒熱。風頭腦痛。面䵟。溫中解肌。利九竅。通鼻塞涕出。治面腫引齒痛。眩冒身兀兀如在車船之上者。生鬚髮。去白蟲。久服下氣。輕身明目。增年耐老。可作膏藥用之。去心及外毛。毛射人肺。令人欬。一名辛矧。一名

侯桃。一名房木。生漢中川谷。九月採實。曝乾。

木蘭味苦寒。無毒。主身大熱在皮膚中。去面熱赤皰酒皶。惡風癲疾。陰下癢濕。明耳目。療中風傷寒。及癰疽水腫。去臭氣。一名林蘭。一名杜蘭。皮似桂而香。生零陵山谷。及太山。十二月採皮。陰乾。

榆皮味甘平。無毒。主大小便不通。利水道。除邪氣。腸胃邪熱氣。消腫。性滑利。久服輕身不飢。其實尤良。療小兒頭瘡痂疕。花主小兒癇。小便不利。傷熱。一名零榆。生潁川山谷。二月採皮。取白曝乾。八月採實。並勿令中濕。濕則傷人。

酸棗味酸平。無毒。主心腹寒熱。邪結氣聚。四肢酸疼。濕痺。煩心不得眠。臍上下痛。血轉久泄。虛汗煩渴。補中益肝氣。堅筋骨。助陰氣。令人肥健。久服安五藏。輕身延年。生河東川澤。八月採實。陰乾。四十日成。

槐實 味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作圓大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年枝主洗瘡及陰囊下濕癢皮主爛瘡根主喉痹寒熱生河南平澤可作神燭

楮實 味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉 味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉皮主逐水利小便莖主癮疹癢單煑洗浴皮間白汁療癬

枸杞 味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痹風濕下胸脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地

骨。一名枸忌。一名地輔。一名羊乳。一名却暑。一名仙人杖。一名西王母杖。生常山平澤及諸丘陵阪岸。冬採根。春夏採葉。秋採莖實。陰乾。

蘇合香 味甘溫無毒。主辟惡。殺鬼精物。溫瘧蠱毒。癇痓。去三蟲。除邪。令人無夢魘。久服通神明。輕身長年。生中臺川谷。

橘柚 味辛溫無毒。主胸中瘕熱逆氣。利水穀。下氣。止嘔欬。除膀胱留熱。停水五淋。利小便。主脾不能消穀。氣衝胸中。吐逆霍亂。止洩。去寸白。久服之去臭氣。通神明。長年。一名橘皮。生於南山川谷。及生江南。十月採。

木部中品二十九味

龍眼 味甘平無毒。主五藏邪氣。安志。厭食。除蠱去毒。久服強魂聰明。輕身不老。通神明。一名益智。其大者似檳榔。生南海山谷。

厚朴 味苦，溫，大溫，無毒。主中風傷寒，頭痛寒熱，驚悸，氣血痺，死肌，去三蟲，溫中益氣，消痰下氣，療霍亂及腹痛脹滿，胃中冷逆，胸中嘔不止，泄痢淋露，除驚，去留熱，心煩滿，厚腸胃。一名厚皮，一名赤朴，其樹名榛，其子名逐折，療鼠瘻，明目，益氣。生交趾、冤句。三月、九月、十月採皮，陰乾。

猪苓 味甘苦，平，無毒。主痎瘧，解毒蠱疰不祥，利水道。久服輕身耐老。一名猳猪屎。生衡山山谷及濟陰、冤句。二月、八月採，陰乾。

菫竹葉 味苦，平，大寒，無毒。主欬逆上氣，溢筋急，惡瘍，殺小蟲，除煩熱，風痙，喉痺，嘔吐。根，作湯益氣止渴，補虛下氣，消毒。汁，主風痓。實，通神明，輕身益氣。生益州。

淡竹葉 味辛，平，大寒。主胸中痰熱，欬逆上氣。瀝，大寒，療暴中風風痺，胸中大熱，止煩悶。

皮茹　微寒。主嘔啘。溫氣。寒熱。吐血。崩中。溢筋。

竹筍　味甘。無毒。主消渴。利水道。益氣。可久食。

枳實　味苦酸。寒。微寒。無毒。主大風在皮膚中。如麻豆苦癢。除寒熱結。止痢。長肌肉。利五藏。益氣輕身。除胸脅痰澼。逐停水。破結實。消脹滿。心下急痞痛。逆氣。脅風痛。安胃氣。止溏泄。明目。生河內川澤。九月十月採。陰乾。

山茱萸　味酸。平。微溫。無毒。主心下邪氣。寒熱。溫中。逐寒濕痺。去三蟲。腸胃風邪。寒熱疝瘕。頭風。風氣去來。鼻塞。目黃。耳聾。面皰。溫中下氣。出汗。強陰益精。安五藏。通九竅。止小便利。久服輕身明目。強力長年。一名蜀棗。一名雞足。一名鬾實。生漢中山谷及琅邪宛句東海承縣。九月十月採實。陰乾。

吳茱萸　味辛。溫。大熱。有小毒。主溫中下氣。止痛。欬逆。寒熱。除濕血痺。逐風邪。開腠理。去痰冷。腹內絞痛。諸冷實不消。中惡

心腹痛。逆氣。利五藏。根殺三蟲。根白皮殺蟯蟲。治喉痹。欬逆。止洩注。食不消。女子經產餘血。療白癬。一名藙。生上谷川谷及冤句。九月九日採。陰乾。

秦皮 味苦微寒。大寒。無毒。主風寒濕痹。洗洗寒氣。除熱。目中青翳白膜。療男子少精。婦人帶下。小兒癇。身熱。可作洗目湯。久服頭不白。輕身。皮膚光澤。肥大有子。一名岑皮。一名石檀。生廬江川谷及冤句。二月八月採皮。陰乾。

梔子 味苦寒。大寒。無毒。主五內邪氣。胃中熱氣。面赤酒皰皶鼻。白癩赤癩。瘡瘍。療目熱赤痛。胸心大小腸大熱。心中煩悶。胃中熱。一名木丹。一名越桃。生南陽川谷。九月採實。暴乾。

檳榔 味辛溫。無毒。主消穀逐水。除痰癖。殺三蟲伏尸。療寸白。生南海。

合歡 味甘平。無毒。主安五藏。利心志。令人歡樂無憂。久服輕

身明目得所欲生益州山谷

秦椒 味辛温生温熟寒有毒主風邪氣温中除寒痹堅齒髮明目療喉痹吐逆疝瘕去老血産後餘疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顔色耐老增年通神生大山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實

衛矛 味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾

紫葳 味酸微寒無毒主婦人産乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎

莖葉 味苦無毒主痿蹷益氣一名陵苕一名茇華生西海川谷及山陽

蕪荑 味辛平無毒主五内邪氣散皮膚骨節中淫淫温行毒

去三蟲。化食。逐寸白。散腸中嗢嗢喘息。一名無姑。一名殿蘠。生晉山川谷。三月採實。陰乾。

食茱萸 味辛苦。大熱。無毒。功用與吴茱萸同。少爲劣爾。療水氣。用之乃佳。

椋子木 味甘鹹。平。無毒。主折傷。破惡血。養好血。安胎。止痛。生肉。

每始王木 味苦。平。無毒。主傷折跌筋骨。生肌。破血。止痛。酒水煑濃汁飲之。生資州山谷。

折傷木 味甘鹹。平。無毒。主傷折筋骨。疼痛。散血補血。產後血悶。止痛。酒水煑濃汁飲之。生資州山谷。

茗 **苦搽茗** 味甘苦。微寒。無毒。主瘻瘡。利小便。去痰熱渴。令人少睡。春採之。

苦搽 主下氣。消宿食。作飲加茱萸葱薑等良。

桑根白皮 味甘寒。無毒。主傷中。五勞六極。羸瘦。崩中。脉絕。補

虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人藥主除寒熱出汗汁解蜈蚣毒

桑耳 味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥五木耳名檽益氣不飢輕身強志生犍爲山谷六月多雨時採即暴乾

松蘿 味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採陰乾

白棘 味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍

州川谷。

棘刺花 味苦平無毒。主金瘡内漏。冬至後百二十日採之。實主明目。心腹痿痺。除熱。利小便。生道傍。四月採。一名菥蓂。一名馬朐。一名刺原。又有棗鍼。療腰痛。喉痺不通。

安息香 味辛苦平無毒。主心腹惡氣鬼疰。出西戎。似松脂。黄黑色爲塊。新者亦柔韌。

龍腦香及**膏香** 味辛苦微寒。一云温平無毒。主心腹邪氣風濕積聚。耳聾。明目。去目赤膚瞖。出婆律國。形似白松脂。作杉木氣。明淨者善。久經風日。或如雀屎者不佳。一云合糯粳一作米炭相思子貯之。則不耗。膏主耳聾。

菴摩勒 味苦甘寒無毒。主風虛熱氣。一名餘甘。生嶺南交廣愛等州。

毗梨勒 味苦寒無毒。功用與菴摩勒同。出西域及嶺南交愛

等州戎人謂之三果。

木部下品　四十五味

黃環 味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷二月採根陰乾。

石南 味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾。

巴豆 味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五藏六府開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可鍊餌之益血脉令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮。

蜀椒 味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蓎藙生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

莽草 味辛苦溫有毒主風頭癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼一名葞一名春草生上谷山谷及寃句五月採葉陰乾

郁李仁 味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道根主齒齗腫齲齒堅齒去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

鼠李 主寒熱瘰癧瘡。

其皮 味苦微寒無毒主除身皮熱毒。一名牛李。一名鼠梓。一名椑。生田野採無時。

欒華 味苦寒無毒主目痛淚出傷眥消目腫生漢中川谷五月採。

杉材 微溫無毒主療漆瘡。

楠材 微溫主霍亂吐下不止。

榧實 味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌。

蔓椒 味苦溫無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛。一名豕椒。一名豬椒。一名彘椒。一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒。

釣樟根皮 主金瘡止血。

雷丸 味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈

夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾

溲疏 味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採

欅樹皮 大寒主時行頭痛熱結在腸胃

白楊皮 味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣游易在皮膚中痰癖等酒漬服之取葉圓大蒂小無風自動者良

水楊葉 嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效

欒荊 味辛苦温有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂痙濕痹寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花

功用又别非此花也。

小蘗 味苦大寒無毒主口瘡甘䘌殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴。

莢蒾 味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀。

釣藤 微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇。

藥實根 味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絶傷補骨髓一名連木生蜀郡山谷採無時。

皂莢 味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾。

楝實 味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道。

根微寒。療蚘蟲。利大腸。生荊山山谷。

柳葉味苦寒。無毒。主風水。黃疸。面熱黑。痂疥惡瘡。金瘡。一名柳絮。葉主馬疥痂瘡。取煎煮以洗馬疥。立愈。又療心腹內血。止痛。實主潰癰。逐膿血。子汁療渴。生琅邪川澤。

桐葉味苦寒。無毒。主惡蝕瘡著陰。皮主五痔。殺三蟲。療賁豘氣病。花主傅猪瘡。飼猪肥大三倍。生桐柏山谷。

梓白皮味苦寒。無毒。主熱。去三蟲。療目中疾。葉擣傅猪瘡。飼猪肥大三倍。生河內山谷。

蘇方木味甘鹹平。無毒。主破血。產後血脹悶欲死者。水煮若酒煮五兩。取濃汁服之效。

接骨木味甘苦平。無毒。主折傷。續筋骨。除風癢齲齒。可作浴湯。

枳椇味甘平。無毒。主頭風。小腹拘急。一名木蜜。其木皮溫無毒。主五痔。和五藏。以木為屋。屋中酒則味薄。此亦奇物。

木天蓼 味辛。温。有小毒。主癥結積聚風勞虛冷。生山谷中。

烏臼木根皮 味苦。微温。有毒。主暴水癥結積聚。生山南平澤。

赤爪木 味苦。寒。無毒。主水痢風頭身癢。生平陸。所在有之。

實 味酸。冷。無毒。汁服主水痢。沐頭及洗身上瘡癢。一名羊梂。一名鼠查。

訶梨勒 味苦。温。無毒。主冷氣心腹脹滿。下食。生交愛州。

楓柳皮 味辛。大熱。有毒。主風齲齒痛。出原州。

賣子木 味甘。微鹹。平。無毒。主折傷血内溜續絕補骨髓。止痛安胎。生山谷中。其葉似柿。出劒南邛州。

大空 味辛苦。平。有小毒。主三蟲。殺蟣虱。生山谷中。取根皮作末。油和塗蟣虱皆死。

紫真檀 味鹹。微寒。主惡毒風毒。

椿木葉 味苦。有毒。主洗瘡疥風疽。水煮葉汁用之。皮主甘䘌。

樗木根葉 尤良。

胡椒 味辛，大溫，無毒。主下氣，溫中，去痰，除藏腑中風冷。生西戎，形如鼠李子，調食用之，味甚辛辣，而芳香當不及蜀椒。

橡實 味苦，微溫，無毒。主下痢，厚腸胃，肥健人。其殼為散，及煮汁服，亦主痢，并堪染用。一名杼斗，槲櫟皆有斗，以櫟為勝。所在山谷中皆有。

無食子 味苦，溫，無毒。主赤白痢，腸滑，生肌肉。出西戎。

楊櫨木 味苦，寒，有毒。主疽瘻惡瘡，水煮葉汁洗瘡，立瘥。生籬垣間。一名空疏。所在皆有。

檞若 味甘苦，平，無毒。主痔，止血，療血痢，止渴。取脉灸用之。

皮 味苦。水煎濃汁，除蠱毒及瘻。俗用甚效。

人獸部 五十六味

髮髲 味苦，溫，小寒，無毒。主五癃關格不通，利小便水道，療小

兒癇。大人痓。仍自還神化。合鷄子黃煎之。消爲水。療小兒驚熱。

亂髮　微溫。主欬嗽。五淋。大小便不通。小兒驚癇。止血。鼻衄燒之吹內立止。

人乳汁　主補五藏。令人肥白悅澤。

頭垢　主淋閉不通。

人屎　寒。主療時行大熱狂走。解諸毒。宜用絕乾者擣末。沸湯沃服之。

人溺　療寒熱頭疼。溫氣。童男者尤良。溺白垽。療鼻衄。湯火灼瘡。東向圊廁溺坑中青泥。療喉痺。消癰腫。若已有膿即潰。

龍骨　味甘。平。微寒。無毒。主心腹鬼疰。精物老魅。欬逆。洩痢膿血。女子漏下。癥瘕堅結。小兒熱氣驚癇。療心腹煩滿。四肢痿枯。汗出。夜卧自驚。恚怒。伏氣在心下。不得喘息。腸癰內疽。陰蝕。止汗。縮小便。溺血。養精神。定魂魄。安五藏。

白龍骨 療夢寐洩精。小便洩精。齒主小兒大人驚癇癲疾狂走。心下結氣。不能喘息。諸痙。殺精物。小兒五驚十二癇。身熱不可近。大人骨間寒熱。又殺蠱毒。

角 主驚癇瘈瘲。身熱如火。腹中堅。及熱洩。久服輕身。通神明延年。生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處。採無時。

牛黃 味苦平。有小毒。主驚癇寒熱。熱盛狂痓。除邪逐鬼。療小兒百病。諸癇熱。口不開。大人狂癲。又墮胎。久服輕身增年。令人不忘。生晉地平澤。於牛得之。即陰乾百日使時燥。無令見日月光。

麝香 味辛溫。無毒。主辟惡氣。殺鬼精物。溫瘧。蠱毒。癇痓。去三蟲。療諸凶邪鬼氣。中惡。心腹暴痛。脹急。痞滿。風毒。婦人產難。墮胎。去面䵟。目中膚翳。久服除邪。不夢寤魘寐。通神仙。生中臺川谷。及益州雍州山谷。春分取之。生者益良。

馬乳 止渴。

牛乳 微寒。補虛羸。止渴。

羊乳 溫。補寒冷虛乏。

酥 微寒。補五藏。利大腸。主口瘡。

熊脂 味甘。微寒。微溫。無毒。主風痺不仁。筋急。五藏腹中積聚。寒熱羸瘦。頭瘍白禿。面皯皰。食飲吐嘔。久服強志。不飢。輕身長年。生雍州山谷。十一月取。

白膠 味甘。平。溫。無毒。主傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。療吐血下血。崩中不止。四肢酸疼。多汗淋露。折跌傷損。久服輕身延年。一名鹿角膠。生雲中。煮鹿角爲之。得火良。

阿膠 味甘。平。微溫。無毒。主心腹內崩。勞極。洒洒如瘧狀。腰腹痛。四肢酸疼。女子下血。安胎。丈夫小腹痛。虛勞羸瘦。陰氣不

足腳酸不能久立。養肝氣。久服輕身益氣。一名傅致膠。生東平郡。煮牛皮作之。出東阿。

醍醐味甘平。無毒。主風邪痺氣。通潤骨髓。可為摩藥。性冷利。功優於酥。生酥中。

底野迦味辛苦平。無毒。主百病中惡客忤邪氣。心腹積聚。出西戎。

酪味甘酸寒。無毒。主熱毒。止渴。解散發利。除胸中虛熱。身面上熱瘡肌瘡。

犀角味苦酸鹹。微寒。無毒。主百毒蠱疰。邪鬼瘴氣。殺鉤吻鴆羽蛇毒。除邪。不迷惑魘寐。療傷寒溫疫。頭痛寒熱。諸毒氣。久服輕身駿健。生永昌山谷及益州。

羚羊角味鹹苦寒。微寒。無毒。主明目。益氣起陰。去惡血注下。辟蠱毒惡鬼不祥。安心氣。常不魘寐。療傷寒時氣寒熱。熱在

肌膚。溫風注毒伏在骨間。除邪氣驚夢。狂越僻謬。及食噎不通。久服强筋骨。輕身。利丈夫。生石城山川谷及華陰山。採無時。

羖羊角 味鹹苦。溫微寒。無毒。主青盲明目。殺疥蟲。止寒洩。辟惡鬼虎狼。止驚悸。療百節中結氣。風頭痛及蠱毒。吐血。婦人産後餘疾。燒之殺鬼魅。辟虎狼。久服安心益氣。輕身。生河西川谷。取無時。勿使中濕。濕即有毒。

羊髓 味甘。溫。無毒。主男女傷中。陰氣不足。利血脉。益經氣。以酒服之。

青羊膽 主青盲明目。

羊肺 補肺。主欬嗽。

羊心 止憂恚膈氣。

羊腎 補腎氣。益精髓。

羊齒 主小兒羊癎寒熱。三月三日取之。

羊肉味甘。大熱。無毒。主緩中。字乳餘疾。及頭腦大風汗出。虛勞寒冷。補中益氣。安心止驚。

羊骨熱。主虛勞寒中羸瘦。

羊屎燔之。主小兒洩痢腸鳴驚癇。

牛角䚡下閉血瘀血疼痛。女人帶下血。燔之。味苦。無毒。

水牛角療時氣寒熱頭痛。髓補中填骨髓。久服增年。

髓味甘。溫。無毒。主安五藏。平三焦。溫骨髓。補中。續絕傷。益氣。止洩痢消渴。以酒服之。

膽可圓藥。膽味苦。大寒。除心腹熱渴。利口焦燥。益目精。

心主虛忘。

肝主明目。

腎主補腎氣。益精。

齒主小兒牛癇。

肉 味鹹。平。無毒。主消渴。止吐洩。安中。益氣。養脾胃。自死者不良。

屎 寒。主水腫惡氣。用塗門戶著壁者。燔之。主鼠瘻惡瘡。

黃犍牛 **烏牯牛** 溺主水腫腹脹脚滿。利小便。

白馬莖 味鹹甘。平。無毒。主傷中脉絶。陰不起。強志益氣。長肌肉肥健。生子。小兒驚癇。陰乾百日。

眼 主驚癇腹滿瘧疾。

懸蹄 主驚邪瘈瘲。乳難。辟惡氣鬼毒蠱疰不祥。止衄血內漏。

齲齒 生雲中平澤。

白馬蹄 療婦人瘻下白崩。

赤馬蹄 療婦人赤崩。

齒 主小兒馬癇。

鬐頭膏 主生髮。

鬐毛 主女子崩中赤白。

心 主喜忘。

肺 主寒熱。小兒莖痿。

肉 味辛苦。冷。主熱。下氣。長筋。強腰脊。壯健。強志。輕身。不飢。**脯** 療寒熱痿痺。

屎 名馬通。微溫。主婦人崩中。止渴及吐下血。鼻衄。金瘡。止血

頭骨 主喜眠。令人不睡。

溺 味辛。微寒。主消渴。破瘕堅積聚。男子伏梁積疝。婦人瘕疾。銅器承飲之。

牡狗陰莖 味鹹。平。無毒。主傷中。陰痿不起。令強熱大。生子。除女子帶下十二疾。一名狗精。六月上伏取。陰乾百日。

膽 主明目。痂瘍惡瘡。

心 主憂恚氣。除邪。

腦 主頭風痺。下部䘌瘡。鼻中息

齒主癲癇寒熱卒風痱伏日取之。

頭骨主金瘡止血。

四腳蹄煮飲之下乳汁。

白狗血味鹹無毒主癲疾發作。

肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣。

屎中骨主寒熱小兒驚癇。

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢。

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥。

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月取。

髓味甘。温。主丈夫女子傷中絕脉。筋急痛。欬逆。以酒和服之良。

腎平。主補腎氣。

肉温補中。強五藏。益氣力。生者療口僻。割薄之。

麞骨微温。主虚損洩精。

肉温補益五藏。

髓益氣力。悅澤人面。

虎骨主除邪惡氣。殺鬼疰毒。止驚悸。主惡瘡鼠瘻。頭骨尤良

膏主狗齧瘡。

爪辟惡魅。

肉主惡心欲嘔。益氣力。

豹肉味酸平。無毒。主安五藏。補絕傷。輕身益氣。久服利人。

狸骨味甘。温。無毒。主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者。心腹痛。走無常處。及鼠瘻惡瘡。頭骨尤良。

肉 療諸瘡。

陰莖 主月水不通。男子陰㿉。燒之以東流水服之。

兔頭骨 平。無毒。主頭眩痛。癲疾。

骨 主熱中消渴。

腦 主凍瘡。

肝 主目暗。

肉 味辛。平。無毒。主補中益氣。

六畜毛蹄甲 味鹹。平。有毒。主鬼疰蠱毒。寒熱驚癇。癲痓狂走。

駱駝毛 尤良。

鼺鼠 主墮胎。令產易。生山都平谷。

麋脂 味辛。溫。無毒。主癰腫惡瘡死肌。寒風濕痹。四肢拘緩不收。風頭腫氣。通腠理。柔皮膚。不可近陰。令痿。一名宮脂。

角 味甘。無毒。主痹。止血。益氣力。生南山山谷及淮海邊。十月取。

豚卵 味甘。温。無毒。主驚癇癲疾。鬼疰蠱毒。除寒熱賁豚。五癃邪氣攣縮。一名豚顛。陰乾藏之。勿令敗。

懸蹄 主五痔。伏熱在腸。腸癰內蝕。

猪四足 小寒。主傷撻諸敗瘡。下乳汁。

心 主驚邪憂恚。

腎 冷。和理腎氣。通利膀胱。

膽 主傷寒熱渴。

肚 主補中益氣。止渴利。

齒 主小兒驚癇。五月五日取。

鬐膏 生髮。

肪膏 主煎諸膏藥。解斑猫芫青毒。

豭猪肉 味酸。冷。療狂病。

凡猪肉 味苦。主閉血脉。弱筋骨。虚人肌。不可久食。病人金瘡

者尤甚。

猪屎主寒熱黃疸濕痺。

鼹鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之。

獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之。

肉療疫氣溫病及牛馬時行病煑屎灌之亦良。

狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰㿗卵腫。

五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇。

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是。

猯肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病。

肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大效胞乾之湯磨如雞卵許空腹服吐諸蠱毒。

野猪黄 味辛甘平。無毒。主金瘡。止血生肉。療癲癇。水研如棗核。日二服效。

驢屎 熬之主熨風腫瘻瘡。

屎汁 主心腹卒痛。諸疰忤。

尿 主癥癖。胃反吐不止。牙齒痛。水毒。

牝驢尿 主燥水。

駁驢尿 主濕水。一服五合良。燥水者畫體成字。濕水者不成字。

乳 主小兒熱急黄等。多服使痢。

尾下軸垢 主瘧。水洗取汁。和麪如彈丸二枚。作燒餅。瘧未發前食一枚。至發時食一枚。療瘧無久新。發無期者。

豺皮 性熱。主冷痺脚氣。熟之以纏病上即瘥。

丹雄雞 味甘微温微寒。無毒。主女人崩中漏下。赤白沃。補虛温中。止血。久傷乏瘡。通神。殺毒。辟不祥。

頭 主殺鬼。東門上者尤良。

白雄雞肉 味酸。微溫。主下氣。療狂邪。安五藏。傷中消渴。

烏雄雞肉 微溫。主補中。止痛。

膽 微寒。主療目不明。肌瘡。

心 主五邪。

血 主踒折骨痛及痿痹。

肪 主耳聾。

腸 主遺溺。小便數不禁。

肝 及左翅毛。主起陰。

冠血 主乳難。

肶胵裏黃皮 微寒。主洩利。小便利。遺溺。除熱。止煩。

屎白 微寒。主消渴。傷寒寒熱。破石淋及轉筋。利小便。止遺溺。滅瘢痕。

黑雌雞主風寒濕痺。五緩六急。安胎。

血無毒。主中惡腹痛及踒折骨痛。乳難。

翮羽主下血閉。

黃雌雞味酸甘平。主傷中消渴。小便數不禁。腸澼洩利。補益。

五臟續絕傷。療勞。益氣。

肋骨主小兒羸瘦。食不生肌。

雞子主除熱火瘡。癇痓。可作虎魄神物。

卵白微寒。療目熱赤痛。除心下伏熱。止煩滿欬逆。小兒下洩。婦人產難。胞衣不出。醯漬之一宿。療黃疸。破大煩熱。

卵中白皮主久欬結氣。得麻黃紫菀和服之。立已。雞白蠹肥脂。生朝鮮平澤。

白鵝膏主耳卒聾。以灌之。

毛主射工水毒

肉 平利五藏。

鶩肪 味甘無毒。主風虛寒熱。

白鴨屎 名通。主殺石藥毒。解結縛。散蓄熱。

肉 補虛除熱。和藏腑。利水道。

鴈肪 味甘平無毒。主風攣拘急偏枯。氣不通利。久服長毛髮鬚眉。益氣不飢。輕身耐老。一名鶩肪。生江南池澤。取無時。

鷓鴣 味甘溫無毒。主嶺南野葛菌毒。生金毒。及溫瘴久欲死不可差者。合毛熬酒漬服之。生擣取汁服最良。生江南。形似母雞。鳴云鉤輈格磔者是。

雉肉 味酸微寒無毒。主補中益氣力。止洩痢。除蟻瘻。

鷹屎白 主傷撻滅瘢。

雀卵 味酸溫無毒。主下氣。男子陰痿不起。強之令熱。多精有子。

腦 主耳聾。

頭血主雀盲。

雄雀屎療目痛。決癰癤。女子帶下。溺不利。除疝瘕。五月取之良。

鸛骨味甘。無毒。主鬼蠱諸疰毒。五尸心腹疾。

雄鵲肉味甘。寒。無毒。主石淋。消結熱。可燒作灰。以石投中散解者。是雄也。

鴝鵒肉味甘。平。無毒。主五痔。止血。炙食或爲散飲服之。

鷰屎味辛。平。有毒。主蠱毒鬼疰。逐不祥邪氣。破五癃。利小便。生高山平谷。

孔雀屎微寒。主女子帶下。小便不利。

鸕鷀屎一名蜀水花。去面黑䵟䵳誌。

頭微寒。主鯁及噎。燒服之。

鴟頭味鹹。平。無毒。主頭風眩顛倒癇疾。

千金翼方卷第二

千金翼方卷第四

本草下

蟲魚部七十一味　論一首

石蜜 味甘平微溫無毒主心腹邪氣諸驚癇痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

蜜蠟 味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絶傷金瘡益氣不飢耐老

白蠟 療久洩澼後重見白膿補絶傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間

蜂子 味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛

大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服令人光澤好顏色不老輕身益氣。

大黃蜂子 主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣。

土蜂子 主癰腫嗌痛一名蜚零生武都山谷。

牡蠣 味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時。

桑螵蛸 味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一名蝕肬生桑枝上螳蜋子也二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩。

海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰痿一名魁蛤生東海

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胷痺腰痛脅急鼠瘻大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

魁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文取無時

石決明味鹹平無毒主目障翳痛青盲久服益精輕身生南海

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧五痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顖不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋生南

海池澤及湖水中。採無時。勿令中濕。中濕即有毒。

鯉魚膽 味苦寒。無毒。主目熱赤痛。青盲。明目。久服強悍。益志氣。

肉 味甘。主欬逆上氣。黃疸。止渴。生者主水腫。脚滿。下氣。

骨 主女子帶下赤白。

齒 主石淋。生九江池澤。取無時。

蠡魚 味甘寒。無毒。主濕痺。面目浮腫。下大水。療五痔。有瘡者不可食。令人瘢白。一名銅魚。生九江池澤。取無時。

鮑魚 味辛臭溫。無毒。主墜墮。骽蹷。踠折。瘀血。血痺在四肢不散者。女子崩中血不止。勿令中鹹。

鮧魚 味甘。無毒。主百病。

鱓魚 味甘大溫。無毒。主補中益血。療瀋脣。五月五日取頭骨燒之。止痢。

鯽魚 主諸瘡。燒以醬汁和塗之。或取猪脂煎用。又主腸癰。頭

灰主小兒頭瘡。口瘡。重舌。目翳。一名鮒魚。合蓴作羹主胃弱不下食。作膾主久赤白痢。

伏翼 味鹹平無毒主目瞑。癢痛。淋利水道。明目。夜視有精光。久服令人喜樂媚好無憂。一名蝙蝠。生太山川谷及人家屋間。立夏後採。陰乾。

天鼠屎 味辛寒無毒主面癰腫。皮膚洗洗時痛。腹中血氣。破寒熱積聚。除驚悸。去面黑皯。一名鼠法。一名石肝。生合浦山谷。十月十二月取。

蝟皮 味苦平無毒主五痔。陰蝕。下血赤白五色。血汁不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。又療腹痛疝積。亦燒爲灰酒服之。生楚山川谷田野。取無時。勿使中濕。

石龍子 味鹹寒有小毒主五癃。邪結氣。破石淋。下血。利小便。利水道。一名蜥蜴。一名山龍子。一名守宫。一名石蜴。生平陽川

谷及荊山山石間。五月取著石上令乾。

露蜂房 味苦鹹平有毒。主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔。火熬之良。又療蜂毒毒腫。一名蜂腸。一名百穿。一名蜂𡢃。生牂牁山谷。七月七日採陰乾。

樗雞 味苦平有小毒。主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身。又療腰痛下氣強陰多精。不可近目。生河內川谷樗樹上。七月採暴乾。

蚱蟬 味鹹甘寒無毒。主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出。又墮胎。生楊柳上。五月採蒸乾之。勿令蠹。

白殭蠶 味鹹辛平無毒。主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白產後餘病滅諸瘡瘢痕。生潁川平澤。四月取自死者。勿令中濕。中濕有毒不可用。

木䖟 味苦平有毒。主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸斷。

無子。一名魂常。生漢中川澤。五月取。

蜚蝱 味苦微寒。有毒。主逐瘀血。破下血積。堅痞。癥瘕寒熱。通利血脉及九竅。女子月水不通。積聚。除賊血在胷腹五藏者。及喉痹結塞。生江夏川谷。五月取。腹有血者良。

蜚蠊 味鹹寒。有毒。主血瘀。癥堅寒熱。破積聚。喉咽痹。內寒無子。通利血脉。生晉陽川澤及人家屋間。立秋採。

䗪蟲 味鹹寒。有毒。主心腹寒熱洗洗。血積癥瘕。破堅下血閉。生子大良。一名地鼈。一名土鼈。生河東川澤及沙中人家墻壁下土中濕處。十月取暴乾。

蠐螬 味鹹微溫微寒。有毒。主惡血血瘀。痹氣。破折血在脅下。堅滿痛月閉。目中淫膚青瞖白膜。療吐血在胷腹不去。及破骨踒折。血結。金瘡內塞。産後中寒。下乳汁。一名蟦蠀。一名肥齊。一名勃齊。生河內平澤及人家積糞草中。取無時。反行者良。

蛞蝓味鹹寒無毒主賊風喎僻軼筋及脫肛驚癇攣縮一名陵蠡一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八月取

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇

水蛭味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子利水道及墮胎一名蚑一名至掌生雷澤池澤五月六月採暴乾

鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉療温瘧血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

鮀魚甲味辛微温有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃眥潰

肉 主少氣。吸吸足不立地。生南海池澤。取無時。

烏賊魚骨 味鹹。微溫。無毒。主女子漏下赤白。經汁血閉。陰蝕腫痛。寒熱。癥瘕。無子。驚氣入腹。腹痛環臍。陰中寒腫。令人有子。又止瘡多膿汁不燥。

肉 味酸。平。主益氣強志。生東海池澤。取無時。

蟹 味鹹。寒。有毒。主胷中邪氣。熱結痛。喎僻面腫。敗漆燒之致鼠。解結散血。愈漆瘡。養筋益氣。

爪 主破胞墮胎。生伊洛池澤諸水中。取無時。

原蚕蛾 雄者有小毒。主益精氣。強陰道。交接不倦。亦止精。

屎 溫。無毒。主腸鳴。熱中消渴。風痺癮軫。

鰻鱺魚 味甘。有毒。主五痔瘡瘻。殺諸蟲。

鮫魚皮 主蠱氣。蠱疰方用之。即裝刀靶䱜魚皮也。

紫貝 主明目。去熱毒。

蝦蟇。味辛寒。有毒。主邪氣。破癥堅血。癰腫陰瘡。服之不患熱病。療陰蝕。疽癘惡瘡。猘犬傷瘡。能合玉石。一名蟾蜍。一名䖿。又一名去甫。一名苦蠪。生江湖池澤。五月五日取。陰乾。東行者良。

鼃。味甘。寒。無毒。主小兒赤氣。肌瘡臍傷。止痛。氣不足。一名長股。生水中。取無時。

牡鼠。微溫。無毒。療踒折。續筋骨。擣傅之。三日一易。四足及尾。主婦人墮胎。易產。

肉。熱。無毒。主小兒哺露大腹。炙食之。

糞。微寒。無毒。主小兒癇疾。大腹。時行勞復。

蚺蛇膽。味甘苦。寒。有小毒。主心腹䘌痛。下部䘌瘡。目腫痛。

膏。平。有小毒。主皮膚風毒。婦人產後腹痛餘疾。

蝮蛇膽。味苦。微寒。有毒。主䘌瘡。

肉 釀作酒。療癩疾。諸瘻。心腹痛。下結氣。除蠱毒。其腹中吞鼠有小毒。療鼠瘻。

鮫鯉甲 微寒。主五邪驚啼悲傷。燒之作灰以酒或水和方寸匕。療蟻瘻。

蜘蛛 微寒。主大人小兒㿗。七月七日取其網。療喜忘。

蜻蛉 微寒。強陰止精。

石蚕 味鹹寒有毒。主五癃破石淋墮胎。

肉 解結氣。利水道。除熱。一名沙蝨。生江漢池澤。

蛇蛻 味鹹甘平無毒。主小兒百二十種驚癇瘈瘲癲疾寒熱。腸痔蟲毒。蛇癇弄舌搖頭。大人五邪。言語僻越。惡瘡嘔欬。明目。火熬之良。一名龍子衣。一名蛇符。一名龍子皮。一名龍子單衣。一名弓皮。生荊州川谷及田野。五月五日十五日取之良。

蛇黄　主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煑研服汁出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色

蜈蚣　味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精溫瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江南赤頭足者良

馬陸　味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白秃療寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬軸生玄菟川谷

蠮螉　味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出刺出汗療鼻窒其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁或人屋間

雀甕　味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名燥舍生漢中採蒸之生樹枝間蛅蟖房也八月取

鼠婦　味酸溫微寒無毒主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱利水道一名負蟠一名蛜蝛一名蜲蟓生魏郡平谷

及人家地上。五月五日取。

螢火 味辛。微溫。無毒。主明目。小兒火瘡傷。熱氣蠱毒鬼疰。通神精。一名夜光。一名放火。一名熠燿。一名即炤。生階地池澤。七月七日取。陰乾。

衣魚 味鹹。溫。無毒。主婦人疝瘕。小便不利。小兒中風項強背起。摩之。又療淋。墮胎。塗瘡滅瘢。一名白魚。一名蟫。生咸陽平澤。

白頸蚯蚓 味鹹。寒。大寒。無毒。主蛇瘕。去三蟲。伏尸。鬼疰蠱毒。殺長蟲。仍自化作水。療傷寒。伏熱狂謬。大腹黃疸。一名土龍。生平土。三月取。陰乾。

螻蛄 味鹹。寒。無毒。主產難。出肉中刺。潰癰腫。下哽噎。解毒。除惡瘡。一名蟪蛄。一名天螻。一名螜。生東城平澤。夜出者良。夏至取。暴乾。

蜣蜋 味鹹。寒。有毒。主小兒驚癇。瘈瘲。腹脹。寒熱。大人癲疾。狂

易。手足端寒。肢滿賁豚。一名蛣蜣。火熬之良。生長沙池澤。五月五日取。蒸藏之。臨用當炙。勿置水中。令人吐。

斑猫　味辛。寒。有毒。主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎。一名龍尾。生河東川谷。八月取。陰乾。

芫青　味辛。微温。有毒。主蠱毒風疰鬼疰墮胎。三月取。暴乾。

葛上亭長　味辛。微温。有毒。主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎。七月取。暴乾。

地膽　味辛。寒。有毒。主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎。蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下。一名蚖青。一名青蛙。生汶山川谷。八月取。

馬刀　味辛。微寒。有毒。主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠。除五藏間熱肌中鼠鼷止煩滿補中去厥痺利機關用之當

鍊得水爛人腸。又云得水良。一名馬蛤。生江湖池澤及東海。取無時。

田中螺汁 大寒。主目熱赤痛。止渴。

貝子 味鹹平。有毒。主目翳鬼疰蠱毒腹痛下血五㾭利水道。除寒熱溫疰解肌散結熱燒用之良。一名貝齒。生東海池澤。

甲香 味鹹平。無毒。主心腹滿痛氣急止痢下淋。生南海。

珂 味鹹平。無毒。主目中翳斷血生肌。貝類也。大如鰒皮黃黑而骨白以爲馬飾。生南海。採無時。

論曰。鳥獸蟲魚之類凡一百一十六種。皆是生命。各各自保愛其身與人不殊。所以稱近取諸身遠取諸物。人自受命即鳥獸自愛固可知也。是以須藥者皆須訪覓先死者。或市中求之。必不可得自殺生以救己命。若殺之者非立方之意也。慎之慎之。

果部二十五味

豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海。

葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷。

蓬藟味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子又療暴中風身熱大驚久服輕身不老一名覆盆一名陵藟一名陰藟生荊山平澤及寃句。

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採。

大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼久服輕身長年不飢神仙。一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾**三歲陳核中人**燔之味苦主腹痛邪氣。

生棗 味甘辛。多食令人多寒熱。羸瘦者不可食。

葉 覆麻黃能令出汗。生河東平澤。

藕實 莖味甘平寒無毒。主補中養神益氣力除百疾。久服輕身耐老不飢延年。一名水芝丹。一名蓮。生汝南池澤。八月採。

雞頭實 味甘平無毒。主濕痺腰脊膝痛補中。除暴疾益精氣強志。令耳目聰明。久服輕身不飢耐老神仙。一名鴈喙實。一名芡。生雷澤池澤。八月採。

芰實 味甘平無毒。主安中補五藏不飢輕身。一名菱。

栗 味鹹溫無毒。主益氣厚腸胃補腎氣。令人耐飢。生山陰。九月採。

櫻桃 味甘。主調中益脾氣。令人好顏色美志。

梅實 味酸平無毒。主下氣除熱煩滿安心。肢體痛偏枯不仁。死肌。去青黑誌惡疾。止下痢好唾口乾。生漢中川谷。五月採。

火乾。

枇杷葉 味苦。平。無毒。主卒啘不止。下氣。

柿 味甘。寒。無毒。主通鼻耳氣。腸澼不足。

木瓜實 味酸。溫。無毒。主濕痺邪氣。霍亂大吐下。轉筋不止。其枝亦可煑用之。

甘蔗 味甘。平。無毒。主下氣。和中。助脾氣。利大腸。

石蜜 味甘。寒。無毒。主心腹熱脹。口乾渴。性冷利。出益州及西戎。煎鍊沙糖爲之。可作餅塊。黃白色。

沙糖 味甘。寒。無毒。功體與石蜜同而冷利過之。笮甘蔗汁煎作。蜀地西戎江東並有之。

芋 味辛。平。有毒。主寬腸胃。充肌膚。滑中。一名土芝。

烏芋 味苦甘。微寒。無毒。主消渴。痺熱。溫中益氣。一名藉姑。一名水萍。二月生葉如芋。三月三日採根。暴乾。

杏核仁 味甘苦。溫冷利。有毒。主欬逆上氣。雷鳴。喉痺。下氣。產乳。金瘡。寒心。賁豚。驚癇。心下煩熱。風氣去來。時行頭痛。解肌。消心下急。殺狗毒。五月採之。其兩仁者殺人。可以毒狗。

花 味苦。無毒。主補不足。女子傷中。寒熱痺。厥逆。

實 味酸。不可多食。傷筋骨。生晉山川谷。

桃核仁 味苦甘。平。無毒。主瘀血。血閉瘕。邪氣。殺小蟲。止欬逆上氣。消心下堅。除卒暴擊血。破癥瘕。通月水。止痛。七月採取仁。陰乾。

桃花 殺疰惡鬼。令人好顏色。味苦。平。無毒。主除水氣。破石淋。利大小便。下三蟲。悅澤人面。三月三日採。陰乾。

桃梟 味苦。微溫。主殺百鬼精物。療中惡。腹痛。殺精魅。五毒不祥。一名桃奴。一名梟景。是實著樹不落。實中者。正月採之。

桃毛 主下血瘕。寒熱。積聚。無子。帶下。諸疾。破堅閉。刮取毛用之。

桃蠹　殺鬼辟邪惡不祥。食桃樹蟲也。

莖白皮　味苦辛。無毒。除邪鬼中惡腹痛。去胃中熱。

葉　味苦平。無毒。主除尸蟲。出瘡中蟲。

膠　鍊之主保中不飢。忍風寒。

實　味酸。多食令人有熱。生太山川谷。

李核仁　味苦平。無毒。主僵仆躋。瘀血骨痛。

根皮　大寒。主消渴。止心煩逆奔氣。

實　味苦。除痼熱。調中。

梨　味甘微酸。寒。多食令人寒中。金瘡乳婦尤不可食。

柰　味苦寒。多食令人臚脹。病人尤甚。

安石榴　味甘酸。無毒。主咽燥渴。損人肺。不可多食。

酸實殼　療下痢。止漏精。

東行根　療蚘蟲寸白。

菜部二十七味

白瓜子 味甘。平寒。無毒。主令人悅澤。好顏色。益氣不飢。久服輕身耐老。主除煩滿不樂。久服寒中。可作面脂。令面悅澤。一名水芝。一名白瓜（切則綴）子。生嵩高平澤。冬瓜人也。八月採。

白冬瓜 味甘。微寒。主除小腹水脹。利小便。止渴。

瓜蔕 味苦。寒。有毒。主大水身面四肢浮腫。下水。殺蠱毒。欬逆上氣。及食諸果病在胸腹中。皆吐下之。去鼻中息肉。療黃疸。

花 主心痛欬逆。生嵩高平澤。七月七日採。陰乾。

冬葵子 味甘。寒。無毒。主五藏六腑寒熱。羸瘦。五癃。利小便。療婦人乳難內閉。久服堅骨。長肌肉。輕身延年。生少室山。十二月採之。

葵根 味甘。寒。無毒。主惡瘡。療淋。利小便。解蜀椒毒。

葉 為百菜主。其心傷人。

莧實 味甘寒大寒無毒主青盲白瞖明目除邪利大小便去寒熱殺蚘蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

苦菜 味苦寒無毒主五藏邪氣厭穀胃痺腸澼渴熱中疾惡瘡久服安心益氣聰察少卧輕身耐老耐飢寒高氣不老一名荼苦一名選一名游冬生益州川谷山陵道傍凌冬不死三月三日採陰乾

薺 味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

蕪菁及蘆菔 味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪菁子主明目

萊菔根 味辛甘溫無毒散服及炮煑服食大下氣消穀去痰澼肥健人生擣服主消渴試有大效

龍葵 味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所

在有之。

菘味甘。温。無毒。主通利腸胃。除胸中煩。解酒渴。

芥味辛。温。無毒。歸鼻。主除腎邪氣。利九竅。明耳目。安中。久食温中。

苜蓿味苦。平。無毒。主安中。利人。可久食。

荏子味辛。温。無毒。主欬逆。下氣。温中。補體。葉主調中。去臭氣。九月採。陰乾。

蓼實味辛。温。無毒。主明目。温中。耐風寒。下水氣。面目浮腫。癰瘍。葉歸於舌。除大小腸邪氣。利中。益志。馬蓼去腸中蛭蟲。輕身。生雷澤川澤。

葱實味辛。温。無毒。主明目。補中不足。其莖葱白。平。可作湯。主傷寒寒熱。出汗。中風。面目腫。傷寒骨肉痛。喉痹不通。安胎。歸於目。除肝邪氣。安中。利五藏。益目睛。殺百藥毒。

葱根　主傷寒頭疼。

葱汁　平。温。主溺血。解藜蘆毒。

薤　味辛苦。温。無毒。主金瘡瘡敗。輕身不飢耐老。歸於骨。菜芝也。除寒熱。去水氣。温中散結。利病人。諸瘡中風寒。水腫以塗之。生魯山平澤。

韭　味辛微酸。温。無毒。歸於心。安五藏。除胃中熱。利病人。可久食。子主夢泄精溺白。根主養髮。白蘘荷微温。主中蠱及瘧。

菾菜　味甘苦大寒。主時行壯熱。解風熱毒。

紫蘇　味辛。温。主下氣。除寒中。其子尤良。

水蘇　味辛微温。無毒。主下氣。殺穀。除飲食。辟口臭。去毒。辟惡氣。久服通神明。輕身耐老。主吐血衄血血崩。一名雞蘇。一名勞祖。一名芥葅。一名芥苴。生九真池澤。七月採。

假蘇　味辛。温。無毒。主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡。破結聚氣。下瘀血。

除濕痺。一名鼠蓂。一名薑芥。生漢中川澤。

香薷 味辛微溫。主霍亂腹痛吐下。散水腫。

薄荷 味辛苦溫無毒。主賊風傷寒。發汗惡氣。心腹脹滿。霍亂。宿食不消。下氣。煮汁服。亦堪生食。人家種之。飲汁發汗。大解勞乏。

秦荻梨 味辛溫無毒。主心腹冷脹。下氣消食。人所啖者。生下濕地。所在有之。

苦瓠 味苦寒有毒。主大水。面目四肢浮腫。下水。令人吐。生晉地川澤。

水芹 味甘平無毒。主女子赤沃。止血養精。保血脉。益氣。令人肥健嗜食。一名水英。生南海池澤。

馬芹子 味甘辛溫無毒。主心腹脹滿。下氣消食。調味用之。香似橘皮而無苦味。

蓴　味甘寒無毒主消渴熱痹

落葵　味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一名蘩露

蘩蔞　味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日日中採乾用之

蕺　味辛微溫主蠷螋溺瘡多食令人氣喘

葫　味辛溫有毒主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採

蒜　味辛溫有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痹毒氣五月五日採之

堇汁　味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之堇菜也出小品方萬異方云除蛇蝎毒及癰腫

芸薹　味辛溫無毒主風游丹腫乳癰

米穀部二十八味

胡麻 味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鴻藏葉名青蘘生上黨川澤

青蘘 味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽巨勝苗也生中原川谷

麻蕡 味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破積止痺散膿多食令人見鬼狂走久服通神明輕身一名麻勃此麻花上勃勃者七月七日採良

麻子 味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脉乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服肥健不老神仙九月採入土者損人生太山川谷

飴糖 味甘微溫主補虛乏止渴去血。

大豆黄卷 味甘平無毒主濕痹筋攣膝痛五藏胃氣結積益氣止毒去黑奸潤澤皮毛。

生大豆 味甘平塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除胃中熱痹傷中淋露下瘀血散五藏結積內寒殺烏頭毒久服令人身重炒爲屑味甘主胃中熱去腫除痹消穀止腹脹生太山平澤九月採。

赤小豆 味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下脹滿。

豉 味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒。

大麥 味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云令人多熱爲五穀長。

穬麥 味甘。微寒。無毒。主輕身除熱。久服令人多力健行。以作蘖溫消食和中。

小麥 味甘。微寒。無毒。主除熱。止躁渴咽乾。利小便。養肝氣。止漏血唾血。以作麴溫消穀止痢。以作麪溫不能消熱止煩。

青粱米 味甘。微寒。無毒。主胃痺熱中消渴。止洩利小便益氣補中。輕身長年。

黃粱米 味甘平。無毒。主益氣和中。止洩。

白粱米 味甘。微寒。無毒。主除熱益氣。

粟米 味鹹。微寒。無毒。主養腎氣。去胃脾中熱。益氣。陳者味苦。主胃熱消渴。利小便。

丹黍米 味苦。微溫。無毒。主欬逆霍亂。止洩除熱。止煩渴。

蘗米 味苦。無毒。主寒中下氣。除熱。

秫米 味甘。微寒。止寒熱。利大腸。療漆瘡。

陳廩米 味鹹酸溫。無毒。主下氣。除煩渴。調胃。止洩。

酒 味苦甘辛。大熱。有毒。主行藥勢。殺百邪惡氣。

腐婢 味辛平。無毒。主痎瘧寒熱。邪氣洩痢。陰不起。止消渴。病酒頭痛。生漢中。即小豆花也。七月採。陰乾。

藊豆 味甘。微溫。主和中下氣。葉主霍亂吐下不止。

黍米 味甘溫。無毒。主益氣補中。多熱。令人煩。

粳米 味甘苦。平。無毒。主益氣。止煩。止洩。

稻米 味苦。主溫中。令人多熱。大便堅。

稷米 味甘。無毒。主益氣。補不足。

醋 味酸溫。無毒。主消癰腫。散水氣。殺邪毒。

醬 味鹹酸。冷利。主除熱。止煩滿。殺百藥熱湯及火毒。

食鹽 味鹹溫。無毒。主殺鬼蠱邪疰毒氣。下部䘌瘡。傷寒寒熱。吐胸中痰澼。止心腹卒痛。堅肌骨。多食傷肺。喜欬。

有名未用一百九十六味

青玉 味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名璧玉生藍田

白玉髓 味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英 味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十二月採

璧玉 味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石 味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肪

紫石華 味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時

白石華 味辛無毒主癉消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時

黑石華 味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞

山陰石間採無時。

黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時。

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石花採無時。

石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀如肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是。

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝。

石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時。

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠。

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時。

陵石 味甘。無毒。主益氣。耐寒。輕身長年。生華山。其形薄澤。

碧石青 味甘。無毒。主明目益精。去白瘢。延年。

遂石 味甘。無毒。主消渴傷中。益氣。生太山陰。採無時。

白肌石 味辛。無毒。主強筋骨。止渴不飢。陰熱不足。一名肌石。一名洞石。生廣焦國卷山青石間。

龍石膏 無毒。主消渴。益壽。生杜陵。如鐵脂中黃。

五羽石 主輕身長年。一名金黃。生海水中蓬葭山上倉中黃如金。

石流青 味酸。無毒。主療洩。益肝氣。明目。輕身長年。生武都山石間青白色。

石流赤 味苦。無毒。主婦人帶下。止血。輕身長年。理如石耆。生山石間。

石耆 味甘。無毒。主欬逆氣。生石間。色赤如鐵脂。四月採。

紫加石 味酸。主痺血氣。一名赤英。一名石血。赤無理。生邯鄲山。如爵茈。二月採。

終石 味辛。無毒。主陰痿痺。小便難。益精氣。生陵陰。採無時。

玉伯 味酸溫。無毒。主輕身益氣止渴。一名玉遂。生石上。如松。高五六寸。紫花。用莖葉。

文石 味甘。主寒熱心煩。一名黍石。生東郡山澤中水下。五色。有汁潤澤。

曼諸石 味甘。主益五藏氣。輕身長年。一名陰精。六月七月石上青黃色。夜有光。

山慈石 味苦平。有毒。主女子帶下。一名爰茈。生山之陽。正月生葉如藜蘆。莖有衣。

石濡 主明目益精氣。令人不飢渴。輕身長年。一名石芥。

石芸 味甘。無毒。主目痛淋露寒熱溢血。一名螫烈。一名顧喙。

二月五月採莖葉。陰乾。

石劇　味甘。無毒。主渴消中。

路石　味甘酸。無毒。主心腹。止汗。生肌。酒痂。益氣。耐寒。實骨髓。一名陵石。生草石上。天雨獨乾。日出獨濡。花黄。莖赤黒。三歲一實。赤如麻子。五月十月採莖葉。陰乾。

曠石　味甘。平。無毒。主益氣。養神。除熱。止渴。生江南。如石草。

敗石　味苦。無毒。主渴痺。

越砥石　味甘。無毒。主目盲。止痛。除熱瘙。

金莖　味苦。平。無毒。主金瘡。内漏。一名葉金草。生澤中高處。

夏臺　味甘。主百疾。濟絶氣。

柒紫　味苦。主小腹痛。利小腹。破積聚。長肌肉。久服輕身。長年。生宛句。二月七月採。

鬼目　味酸。平。無毒。主明目。一名來甘。實赤如五味。十月採。

鬼蓋　味甘平無毒主小兒寒熱癇一名地蓋生垣墻下叢生赤日生暮死

馬顛　味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐　味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採

馬逢　味辛無毒主癬蟲

牛舌實　味鹹溫無毒主輕身益氣一名彖尸生水中澤傍實大葉長尺五月採

羊乳　味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採立夏後母死

羊實　味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂癬生蜀郡

犀洛　味甘無毒主癃一名星洛一名泥洛

鹿良　味鹹臭主小兒驚癇賁豚瘛瘲大人痓五月採

【克棗】味酸。無毒。主輕身益氣。生丹陽陵地。高尺許。實如棗。

【雀梅】味酸。寒。有毒。主蝕惡瘡。一名千雀。生海水石谷間。葉與實如麥李。

【雀翹】味鹹。主益氣明目。一名去母。一名更生。生藍中。葉細黃。莖赤有刺。四月實。兌黃中黑。五月採。陰乾。

【雞涅】味甘。平。無毒。主明目。目中寒。風諸不足。水腹邪氣。補中。止洩痢。療女子白沃。一名陰洛。生雞山。採無時。

【相烏】味苦。主陰痿。一名烏葵。如蘭香。赤莖。生山陽。五月十五日採。陰乾。

【鼠耳】味酸。無毒。主痹寒。寒熱。止欬。一名無心。生田中下地。厚華肥莖。

【蛇舌】味酸。平。無毒。主除留血。驚氣。蛇癇。生大水之陽。四月採花。八月採根。

龍常草 味鹹。溫。無毒。主輕身。益陰氣。療痹寒濕。生河水傍。如龍芻。冬夏生。

離樓草 味鹹。平。無毒。主益氣力。多子。輕身長年。生常山。七月八月採實。

神護草 可使獨守。叱咄人。寇盜不敢入門。生常山北。八月採。

黃護草 無毒。主痹。益氣。令人嗜食。生隴西。

吳唐草 味甘。平。無毒。主輕身。益氣。長年。生故稻田中。日夜有光。草中有膏。

天雄草 味甘。溫。無毒。主益氣。陰痿。生山澤中。狀如蘭。實如大豆。赤色。

雀醫草 味苦。無毒。主輕身。益氣。洗浴爛瘡。療風水。一名白氣。春生。秋花白。冬實黑。

木甘草 主療癰腫盛熱。煮洗之。生木間。三月生。大葉如蛇床。

四四相值。但折枝種之便生。五月花白。實核赤。三月三日採。

益決草 味辛溫。無毒。主欬逆肺傷。生山陰。根如細辛。

九熟草 味甘溫。無毒。主出汗。止洩療悶。一名烏粟。一名雀粟。生人家庭中。葉如棗。一歲九熟。七月採。

兌草 味酸平。無毒。主輕身。益氣長年。生蔓草木上。葉黃有毛。冬生。

酸草 主輕身延年。生名山醴泉上陰居。莖有五葉。青澤。根赤黃。可以消玉。一名醜草。

異草 味甘。無毒。主痿痺寒熱。去黑子。生籬木上。葉如葵。莖傍有角。汁白。

灌草葉 主癰腫。一名鼠肝。葉滑青白。

茆草 味辛。無毒。主傷金瘡。

莘草 味甘。無毒。主盛傷痺腫。生山澤。如蒲黃。葉如芥。

勒草　味甘。無毒。主瘀血。止精溢盛氣。一名黑草。生山谷。如栝樓。

英草華　味辛平。無毒。主痹氣。強陰。療面勞疽。解煩。堅筋骨。療風頭。可作沐藥。生蔓木上。一名鹿英。九月採。陰乾。

吴葵華　味鹹。無毒。主理心。心氣不足。

封華　味甘。有毒。主疥瘡。養肌。去惡肉。夏至日採。

北荇華　味苦。無毒。主氣脉溢。一二厶片華。

腆華　味甘。無毒。主上氣。解煩。堅筋骨。

排華　味苦。主水氣。去赤蟲。令人好色。不可久服。春生乃採。

節華　味苦。無毒。主傷中。痿痹。溢腫。皮主脾中客熱氣。一名山節。一名達節。一名通漆。十月採。暴乾。

徐李　主益氣。輕身。長年。生太山陰。如李小形。實青色。無核。熟採食之。

新雉木　味苦香。溫。無毒。主風眩痛。可作沐藥。七月採。陰乾。實

如桃。

合新木 味辛。平。無毒。解心煩。止瘡痛。生遼東。

俳蒲木 味甘。平。無毒。主少氣。止煩。生陵谷。葉如柰。實赤。三核。

遂陽木 味甘。無毒。主益氣。生山中。如白楊葉。三月實。十月熟赤。可食。

學木核 味甘。寒。無毒。主脅下留飲。胃氣不平。除熱。如雞核。五月採。陰乾。

木核 療腸澼。華療不足。子療傷中。根療心腹逆氣。止渴。十月採。

栒核 味苦。療水。身面癰腫。五月採。

荻皮 味苦。止消渴。去白蟲。益氣。生江南。如松葉。有刺。實赤黄。十月採。

桑莖實 味酸。溫。無毒。主字乳餘疾。輕身益氣。一名草王。葉如荏。方莖大葉。生園中。十月採。

蒲陰實　味酸平無毒。主益氣除熱止渴利小便輕身長年。生深山谷及園中。莖如芥。葉小。實如櫻桃。七月成。

可聚實　味甘溫無毒。主輕身益氣明目。一名長壽。生山野道中。穗如麥。葉如艾。五月採。

讓實　味酸。主喉痺。止洩痢。十月採。陰乾。

蕙實　味辛。主明目補中。

根莖中湯　一作涕。療傷寒寒熱。出汗。中風面腫。消渴熱中。逐水。生魯山平澤。

青雌　味苦。主惡瘡禿敗瘡火氣。殺三蟲。一名蟲損。一名孟推。生方山山谷。

白背　味苦平無毒。主寒熱洗浴疥惡瘡。生山陵。根似紫葳。葉如燕盧。採無時。

白女腸　味辛溫無毒。主洩痢腸澼。療心痛破疝瘕。生深山谷。

中。葉如藍。實赤。赤女腸亦同。

白扇根　味苦。寒。無毒。主瘧。皮膚寒熱。出汗。令人變。

白給　味辛。平。無毒。主伏蟲。白癬腫痛。生山谷。如藜蘆。根白相連。九月採。

白并　味苦。無毒。主肺欬上氣。行五藏。令百病不起。一名玉簫。一名箭悍。葉如小竹。根黃皮白。生山陵。三月四月採根。暴乾。

白辛　味辛。有毒。主寒熱。一名脫尾。一名羊草。生楚山。三月採根。白而香。

白昌　味甘。無毒。主食諸蟲。一名水昌。一名水宿。一名莖蒲。十月採。

赤舉　味甘。無毒。主腹痛。一名羊飴。一名陵渴。生山陰。二月花。

紀蔓草　上五月實黑。中有核。三月三日採葉。陰乾。

赤涅　味甘。無毒。主疰崩中。止血。益氣。生蜀郡山石陰地濕處。

採無時。

黃秫味苦。無毒。主心煩。止汗出。生如桐根。

徐黃味辛。平。無毒。主心腹積瘕。莖主惡瘡。生澤中。大莖細葉。香如藁本。

黃白支生山陵。三月四月採根。暴乾。

紫藍味鹹。無毒。主食肉得毒。能消除之。

紫給味鹹。主毒風頭洩注。一名野葵。生高陵下地。三月三日採根。根如烏頭。

天蓼味辛。有毒。主惡瘡。去痺氣。一名石龍。生水中。

地朕味苦。平。無毒。主心氣。女子陰疝血結。一名承夜。一名夜光。三月採。

地芩味苦。無毒。主小兒癎。除邪。養胎。風痺。洗洗寒熱。目中青瞖。女子帶下。生腐木積草處。如朝生。天雨生蓋。黃白色。四月採。

地筋 味甘。平。無毒。主益氣止渴。除熱在腹臍。利筋。一名菅根。一名土筋。生澤中。根有毛。三月生。四月實白。三月三日採根。

地耳 味甘。無毒。主明目益氣。令人有子。生丘陵。如碧石青。

土齒 味甘。平。無毒。主輕身益氣長年。生山陵地中。狀如馬牙。

燕齒 主小兒癇寒熱。五月五日採。

酸惡 主惡瘡。去白蟲。生水傍。狀如澤瀉。

酸赭 味酸。主內漏。止血不足。生昌陽山。採無時。

巴棘 味苦。有毒。主惡疥瘡出蟲。一名女木。生高地。葉白有刺。根連數十枚。

巴朱 味甘。無毒。主寒。止血帶下。生雒陽。

蜀格 味苦。平。無毒。主寒熱痿痹。女子帶下。癰腫。生山陽。如雚菌有刺。

纍根 主緩筋。令不痛。

苗根　味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草藤上莖有刺實如椒。

參果根　味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根。

黃辯　味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯。

良達　主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小。

對廬　味苦寒無毒主疥諸久瘡不瘳生死肌除大熱煑洗之八月採似菴閭。

糞藍　味苦主身癢瘡白禿漆瘡洗之生房陵。

委蛇　味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子。

麻伯　味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裹莖實赤黑九月採根。

王明　味苦。主身熱邪氣。小兒身熱。以浴之。生山谷。一名王草。

類鼻　味酸。溫。無毒。主痿痹。一名類重。生田中高地。葉如天名精。美根。五月採。

師系　味甘。無毒。主癰腫惡瘡。煮洗之。一名臣堯。一名臣骨。一名鬼芭。生平澤。八月採。

逐折　殺鼠。益氣。明目。一名百合。厚實。生禾間。莖黃。七月實黑如大豆。

并苦　主欬逆上氣。益肺氣。安五藏。一名蜮薰。一名玉荆。三月採。陰乾。

領灰　味甘。有毒。主心腹痛。鍊中不足。葉如芒草。冬生。燒作灰。

父陛根　味辛。有毒。以熨癰腫膚脹。一名膏魚。一名梓藻。

索干　味苦。無毒。主易耳。一名馬耳。

荊莖　療灼爛。八月十月採。陰乾。

鬼麗生石上。挼之。日柔爲沐。

竹付味甘。無毒。主止痛。除血。

秘惡味酸。無毒。主療肝邪氣。一名杜逢。

唐夷味苦。無毒。主療踒折。

知杖味甘。無毒。主療疝。

坔松味辛。無毒。主眩痹。

河煎味酸。主結氣癰在喉頸者。生海中。八月九月採。

區余味辛。無毒。主心腹熱癃。

三葉味辛。主寒熱。蛇蜂螫人。一名起莫。一名三石。一名當田。生田中。莖小黑白。高三尺。根黑。三月採。陰乾。

五母麻味苦。有毒。主痿痹不便。下痢。一名鹿麻。一名歸澤麻。一名天麻。一名若一草。生田野。五月採。

疥拍腹味辛。溫。無毒。主輕身。療痹。五月採。陰乾。生上黨。

常吏之生　味苦平無毒主明目實有刺大如稻米

救赦人者　味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宫室五月十月採暴乾

丁公寄　味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如磧黄有汁七月七日採

城裏赤柱　味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣生晋平陽

城東腐木　味鹹温主心腹痛止洩便膿血

芥　味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載　味酸無毒主諸惡氣

慶　味苦無毒主欬嗽

腂　味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

雄黄蟲　主明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉

天社蟲 味甘。無毒。主絕孕益氣。如蜂大腰。食草木葉。三月採。

桑蠹蟲 味甘。無毒。主心暴痛。金瘡。肉生不足。

石蠹蟲 主石癃。小便不利。生石中。

行夜 療腹痛寒熱。利血。一名負盤。

蝸籬 味甘。無毒。主燭館明目。生江夏。

麋魚 味甘。無毒。主痺。止血。

丹戩 味辛。主心腹積血。一名飛龍。生蜀都。如鼠負青股蜚翼赤。七月七日採。

扁前 味甘。有毒。主鼠瘻癃。利水道。生山陵。如牛虻。翼赤。五月八月採。

蚖類 療痺內漏。一名蚖短。土色而文。

蜚厲 主婦人寒熱。

梗雞 味甘。無毒。療痺。

益符 療閉。一名無舌。

地防 令人不飢不渴。生黃陵。如濡居土中。

黃蟲 味苦。療寒熱。生地上。赤頭長足有角。羣居。七月七日採。

唐本退二十味

薰草 味甘。平。無毒。主明目。止淚。療洩精。去臭惡氣。傷寒頭痛。上氣腰痛。一名蕙草。生下濕地。二月採。陰乾。脫節者良。

姑活 味甘。溫。無毒。主大風邪氣。濕痺寒痛。久服輕身益壽耐老。一名冬葵子。生河東。

別羇 味苦。微溫。無毒。主風寒濕痺。身重。四肢疼酸。寒邪歷節痛。一名別枝。一名別騎。一名鼈羇。生藍田川谷。二月八月採。

牡蒿 味苦。溫。無毒。主充肌膚。益氣。令人暴肥。不可久服。血脉滿盛。生田野。五月八月採。

石下長卿 味鹹。平。有毒。主鬼疰精物。邪惡氣。殺百精蠱毒老

魅注易。士走啼哭悲傷恍惚。一名徐長卿。生隴西池澤山谷。

鬼臼　味辛微温無毒。主霍亂腹痛吐逆心煩。生水中。五月採。

練石草　味苦寒無毒。主五癃破石淋膀胱中結氣利水道小便。生南陽川澤。

弋共　味苦寒無毒。主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒。無色。生益州山谷。

蕈草　味鹹平無毒。主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可作鹽花。生淮南平澤。七月採。

五色符　味苦微温。主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺虱。青符白符赤符黑符黄符各隨色補其藏。白符一名女木。生巴郡山谷。

蘘草　味甘苦寒無毒。主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥。生淮南山谷。

薽根味甘。寒。平。有小毒。主下熱氣。益陰精。令人面悅好。明目。久服輕身耐老。以作蒸飲酒病人。生高高平澤。二月八月採。

鼠姑味苦。平寒。無毒。主欬逆上氣。寒熱鼠瘻惡瘡邪氣。一名鼸。生丹水。

船虹味酸。無毒。主下氣。止煩滿。可作浴湯。藥色黃。生蜀郡。立秋取。

屈草味苦。微寒。無毒。主胸脅下痛。邪氣腸間寒熱。陰痹。久服輕身益氣耐老。生漢中川澤。五月採。

赤赫味苦。寒。有毒。主痂瘍惡敗瘡。除三蟲邪氣。生益州川谷。二月八月採。

淮木味苦。平。無毒。主久欬上氣。傷中虛羸。補中益氣。女子陰蝕漏下。赤白沃。一名百歲城中木。生晉陽平澤。

占斯味苦。溫。無毒。主邪氣濕痹。寒熱疽瘡。除水堅積。血癥月

閉。無子。小兒躄不能行。諸惡瘡瘻腫。止腹痛。令人子有子。一名炭皮。生太山山谷。採無時。

嬰桃　味辛。平。無毒。主止洩腸澼。除熱。調中。益脾氣。令人好色美志。一名牛桃。一名英豆。實大如麥。多毛。四月採。陰乾。

鴆鳥毛　有大毒。入五藏爛。殺人。其口主殺蝮蛇毒。一名鴆日。生南海。

千金翼方卷第四

千金翼方卷第五

婦人一

論曰：婦人之病難療，比之丈夫十倍費功。所以古人別立婦人之方焉。是以今方具在四卷。一卷泛療婦人，三卷專論產後。好學者宜細意用心觀之，迺得覩其深趣耳。

婦人求子第一 論一首 方七首

論曰：夫人求子者，服藥須有次第，不得不知。其次第者，男服七子散，女服盪胞湯，及坐藥，并服紫石門冬丸，則無不得效矣。不知此者，得力鮮焉。

七子散 主丈夫風虛目闇，精氣衰少，無子，補不足方。

牡荊子　五味子　菟絲子　車前子

菥蓂子　石斛　薯蕷　乾地黃

杜仲炙去皮　鹿茸炙　遠志各貳兩　附子炮去皮

蛇牀子　芎藭各壹兩半　山茱萸　天雄炮去皮
人參　茯苓　黃耆　牛膝各伍分
桂心貳兩　巴戟天叁兩　肉蓯蓉柒分　鍾乳貳兩，無亦得
右貳拾肆味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日二，不知，加至二匕。以知爲度，忌生冷醋滑猪雞魚蒜油麪。不能酒者，蜜和丸服亦佳。一方加覆盆子二兩。行房法一依素女經，女人月信斷一日爲男，二日爲女，三日爲男，四日爲女，以外無子。每日午時夜半後行事，生子吉，餘時生子不吉。

盪胞湯　主婦人斷緒二三十年，及生來無子，并數數失子，服此皆有子，長命無病方。

朴消　桃仁去皮尖兩，人者熬　茯苓　牡丹皮
大黃各叁兩　人參　桂心　芍藥　厚朴炙
細辛　牛膝　當歸　橘皮各貳兩　附子炮去皮，壹兩半

䗪蟲（去翅足，熬）　水蛭（各柒拾枚，熬）

右壹拾陸味，㕮咀，以酒五升、水六升，合漬一宿，煑取三升，分肆服，日三夜一服，每服相去三時辰，少時更服，如常覆被少取汗，汗不出，冬月著火籠，必下積血及冷赤膿如赤小豆汁。本為婦人子宮內有此惡物令然，或天陰臍下痛，或月水不調，為有冷血不受胎，若斟酌下盡，氣力弱，大困，不堪更服，亦一日二三服即止，如大悶不堪，可食酢飯冷漿，一口即止，然恐去惡物不盡，不大得藥力，若能忍服盡大好，一日後仍著導藥。（千金更有桔梗、甘草各貳兩）

坐導藥方

皂莢（壹兩，炙，去皮子）　五味子　乾薑　細辛（各叁兩）

葶藶子（熬）　苦瓠（各叁分。千金作山茱萸）　礬石（燒半日）　大黃

戎鹽　蜀椒（汗）　當歸（各貳兩）

右壹拾壹味。擣篩。內輕絹袋子中。如指許大。長三寸。盛藥令滿。內子門中。坐臥任意。勿行走急。小便時即去之。仍易新者。一日當下青黃冷汁。汁盡止。即可幸御。自有子。若未見病出。亦可至十日安之。千金無葶藶。一本又有砒霜三分。著藥後一日。廼服紫石天門冬丸。

紫石天門冬圓

紫石英七日研之　烏頭炮去皮　天門冬去心各參兩

烏賊魚骨　牛膝各壹兩半　人參　牡丹皮

桑寄生　乾薑　細辛　厚朴炙　食茱萸

續斷各五分　署預壹兩　柏子仁壹兩　牡荊子千金作牡蒙

禹餘糧　紫葳　石斛　辛夷心　卷柏

當歸　芎藭　桂心　乾地黃　甘草炙各貳兩

右貳拾陸味。擣篩為末。鍊蜜和丸。如梧桐子。酒服十丸。日

三稍加至參拾丸。愼如藥法。

白薇丸 主久無子。或斷緒上熱下冷。百病皆療方。

白薇　車前子各三分　澤蘭　太一餘粮
赤石脂　細辛　人參　桃仁去皮尖熬　覆盆子
麥門冬去心　白芷各一兩半　紫石英　石膏研　藁本
菴蕳子　卷柏各五分　蒲黃　桂心各二兩半　當歸
芎藭　蛇牀子各一兩　乾薑　蜀椒汗
乾地黃各二兩　茯苓　遠志去心　白龍骨各二兩
橘皮半兩

右貳拾捌味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如梧桐子。酒服拾伍丸。日再。增至肆拾丸。以知爲度。亦可增至伍拾丸。愼猪雞蒜生冷醋滑驢馬等肉。覺有娠則止。祕之勿妄傳也。

慶雲散 主丈夫陽氣不足。不能施化。施化無成方。

覆盆子　五味子各貳升　菟絲子壹升　白朮熬令色亦久

石斛各三兩　天雄壹兩炮去皮　天門冬玖兩去心　紫石英貳兩

桑寄生肆兩

右玖味。擣篩爲散。先食酒服方寸匕。日三。素不耐冷者。去寄生。加細辛肆兩。陽氣不少而無子者。去石斛。加檳榔拾伍枚。良。

承澤丸　主婦人下焦三十六疾。不孕絕産方。

梅核仁　辛夷各壹升　葛上亭長柒枚　澤蘭子伍合

溲疏　藁本各壹兩

右陸味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如大豆。先食酒服貳丸。日三。不知。稍增之。若腹中無堅積者。去亭長。加通草壹兩。惡甘者。和藥先以苦酒搜散。乃內少蜜和爲丸。

婦人積聚第二　方一十三首

牡蒙丸 主男子疝瘕。女子血瘕。心腹堅積聚。乳餘疾。小腹堅滿貫臍痛。熱中腰背痛。小便不利。大便難。不下食。有伏蟲臚脹腫。久寒熱。胃管有邪氣方。

牡蒙　蓯蓉　烏喙炮去皮　石膏研　藜蘆各三分

巴豆陸拾枚去心皮熬　乾薑　桂心各二兩　半夏洗伍分

右玖味。擣篩為末。別擣巴豆如膏。合諸藥。令調和擣至熟。以飲服如小豆貳丸。日三。如不相得。入少蜜。

烏頭丸 主心腹積聚。膈中氣悶脹滿。疝瘕內傷。瘀血產乳衆病及諸不足方。

烏頭炮去皮　巴豆去心皮熬各半兩　人參　消石各壹兩

大黃二兩　戎鹽壹兩半　苦參　黃芩　䗪蟲熬

半夏洗　桂心各二分

右壹拾壹味。擣篩為末。內蜜青牛膽汁拌和。擣三千杵。丸

如梧桐子大。宿不食。酒服五丸。卧須臾當下。黃者心腹積也。青如粥汁者。膈上邪氣也。下崩血如腐肉者。內傷也。赤如血者。乳餘疾也。如蟲刺者。蟲也。下已必渴。渴飲粥。飢食蘇糜。三日後當溫食。食必肥濃。四十日平復。

乾薑丸 治婦人瘕結脅肋下疾。

乾薑壹兩半　芎藭　芍藥各貳兩　前胡熬　乾地黃熬
桃仁熬，去皮尖、兩仁者　茯苓各壹兩　人參　當歸各叁兩
杏仁熬，去皮尖、兩仁者　朴消　蜀椒汗　蠐螬熬
䗪蟲熬　虻蟲去翅足，熬　水蛭各壹合，熬

右壹拾陸味。擣篩為末。鍊蜜和丸。如梧桐子。未食以飲服叁丸。可增至拾丸。千金用大黃、柴胡各貳兩，無前胡、地黃。

生地黃丸 主婦人臍下結堅。大如杯升。月經不通。發熱往來。下痢羸瘦。此為氣瘕也。若生肉癥不可瘥。未生癥者可療。方。

生地黄叁拾斤，擣絞取汁　乾漆壹斤，熬，擣篩爲末

右二味，相和，微火煎，令可圓，藥成，丸如梧桐子大，食後以酒服五圓。千金云服叁圓。集驗至七八圓止

遼東都尉所上圓

主臍下堅癖，無所不療。

恒山　巴豆去皮，熬　大黃各壹分　天雄貳枚，皆炮犬

藋蘆壹兩半，一方貳兩　乾薑　人參　苦參

丹參　沙參　玄參　細辛　白薇各叁分

龍膽　牡蒙各壹兩　芍藥　附子炮，去皮　狼牙

牛膝　茯苓各伍分

右貳拾味，擣篩爲末，鍊蜜和丸，宿勿食，酒服伍圓，日叁。主大羸瘦而黃，月水不調，當十五日服之，下長蟲，或下種種病，出二十五日，腹中所苦悉愈，肌膚充盛，五十日萬病除矣，斷緒者皆有子也。

五京圓 主婦人腹中積聚，九痛七害，久寒腰中冷引小腹，害食苦下，或熱痢，得冷便下方。

乾薑參兩　黃芩壹兩　吳茱萸壹升　附子炮去皮

狼毒　當歸　牡蠣各貳兩，熬

右柒味，擣篩為末，鍊蜜和圓，如梧桐子大，酒服伍圓，加至拾圓。此出京氏五君，故名五京圓。久患冷，當服之。

雞鳴紫圓 主婦人腹中癥瘕積聚。

大黃貳兩　前胡　人參各肆兩　皂莢炙去皮子　藜蘆

巴豆去皮心熬　礜石鍊　烏喙炮去皮，各半兩　代赭伍分

阿膠壹兩半，炙　桂心壹分　杏仁去皮尖熬　乾薑　甘草各參分

右壹拾肆味，擣篩為末，鍊蜜和圓，雞鳴時飲服壹圓，如梧桐子，日益壹圓，至伍圓止，仍從壹圓起。下白者風也，赤者癥瘕也，青者疝也，黃者心腹病也，如白汁爛腐者水也。

炎皮圓　主婦人憂恚，心下支滿，膈氣腹熱，月經不利，血氣上搶心，欲嘔不可眠，懈怠不動。

炎皮　芎藭各壹分　桂心　乾薑　乾漆熬

白朮各壹分半　蜀椒汗　黃芩　芍藥　土瓜根

大黃熬　蝱蟲各半兩去翅足熬

右壹拾貳味，擣篩為末，鍊蜜和圓，如梧桐子，飲服五圓，日參，不知稍增之。

七氣圓　主婦人勞氣、食氣、胷滿氣、吐逆大下氣，其病短氣，胷脅滿，氣結痛，小便赤黃，頭重方。

葶藶子熬　半夏洗各壹兩　大黃　玄參　人參

苦參　麥門冬去心　黃芩　乾薑　芎藭

遠志去心各壹兩半　消石壹兩　瞿麥壹兩半

右壹拾參味，擣篩為末，鍊蜜和圓，如梧桐子，以酒服陸圓。

日一服。亦理嘔逆。破積聚。

半夏湯 主婦人胷滿心下堅。咽中貼貼。如有炙腐。咽之不下。吐之不出方。

半夏壹升。洗　生薑伍兩　茯苓　厚朴各肆兩

右肆味。㕮咀。以水陸升。煮取叁升。分叁服。千金有蘇葉貳兩

厚朴湯 主婦人下焦勞冷。膀胱腎氣損弱。白汁與小便俱出。

厚朴如手大長肆寸。去皮炙。削。以酒伍升。煮兩沸。去滓。取桂心壹尺。絹篩。內汁中。調和。宿勿食。曉頓服之。

溫經湯 主婦人小腹痛方。

茯苓陸兩　芍藥　土瓜根各叁兩　薏苡仁半升

右肆味。㕮咀。以酒叁升。漬一宿。曉加叁升。水煎取貳升。分再服之。

大補內黃耆湯 主婦人七傷。骨髓疼。小腹急滿。面目黃黑。不

能食飲。并諸虛不足。少氣心悸不安方。

黄耆　半夏各叁兩洗　大棗叁拾枚　當歸　乾地黄

桂心　人參　茯苓　遠志去心　芍藥

澤瀉　五味子　麥門冬去心　白朮

甘草各貳兩炙　乾薑肆兩

右壹拾陸味。㕮咀。以水壹斗半。煑取貳升。壹服五合。日叁。

婦人乳疾第三　方六首

治乳堅方。

當歸　芍藥　黄耆　蒺藜子　雞骨

附子炮去皮　枳實各貳兩炙　桂心叁兩　人參　薏苡仁各壹兩

右壹拾味。擣篩為散。酒服方寸匕。日三服。

治乳癰始作方。

大黄　楝實　芍藥　馬蹄炙

右肆味，等分，擣篩為散，酒服方寸匕，取汗出差。廣濟云治乳癰大堅硬，赤紫色，衣不得近，痛不可忍，經宿乃消。

排膿散 主乳癰方。

鐵粉　細辛　芎藭　人參　防風

乾薑　黃芩　桂心　芍藥　蓯蓉各壹兩

當歸　甘草各伍分

右壹拾貳味，擣篩為散，酒服方寸匕，日三夜一服，加至一匕半，服十日，膿血出多，勿怪，是惡物除。

生魚薄乳癰方。

生鯽魚長五寸　伏龍肝　大黃　莽草各陸兩

右肆味，別擣魚如膏，下篩，二物更擣，令調，以生地黃汁和如粥傅腫上，日五六夜二三。

治乳癰，初有異則行此湯，并將圓補之即愈方。

麥門冬壹升，去心。　黃芩　黃耆　芍藥
茯苓　甘草炙　通草　桑寄生　防風各貳兩
人參各叁兩　糖捌兩　大棗拾枚

右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗。煮取叁升。去滓。內糖。分肆服。

次服**天門冬圓**

天門冬伍兩，去心。　通草　黃耆　防風
乾地黃　桑寄生　人參各貳兩　羌活叁兩　大黃貳兩半
白芷壹兩半　升麻壹兩半　澤蘭　茯神　天雄炮，去皮
黃芩　枳實炙　五味子各壹兩

右壹拾柒味。擣篩為末。鍊蜜和圓。酒服貳拾圓。日二。加至叁拾圓。

婦人雜病第四　方一十二首

治婦人斷產方。

故蠶子布壹尺。燒一味。末酒下。終身不復懷孕也。

治婦人無故尿血方。

龍骨伍兩

右壹味。擣篩爲散。酒服方寸匕。空腹服。日三。久者貳拾服愈。

又方

鹿角屑　大豆黃卷　桂心各壹兩

右叁味。擣篩爲散。空腹酒服方寸匕。日三服。

又方

舡故茹。爲散。酒服方寸匕。日三服。亦主遺尿。

治婦人遺尿不知出時方。

白薇　芍藥各貳兩半

右貳味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日三服。

又方

礬石燒　牡蠣熬，各叁兩

右貳味，擣篩為散，酒服方寸匕，亦治丈夫。

治姙娠得熱病五六日，小便不利，熱入五藏方。

葵子壹升　榆白皮壹把，切

右貳味，水伍升，煑五沸，服一升，日三服。

又方

葵子　茯苓各壹兩

右貳味，擣篩為散，水服方寸匕，日三，小便利則止。

治婦人小便不通方。

葵子貳升　朴消壹兩

右貳味，以水五升，煑取二升，分再服。

治婦人卒不得小便方。

杏仁柒枚，熬令變色，去皮尖。

右壹味。擣篩爲散。以水服之。立下。

又方

紫菀爲末。井花水服三指撮。立通。

治丈夫婦人轉胞不得小便八九日方。

滑石 壹兩。　寒水石 壹兩。　葵子 壹升

右叁味。以水一斗。煑取五升。服一升。即利。

婦人經服硫黄圓。忽患頭痛項冷。冷歇又心胸煩熱。眉骨眼眥癢痛。有時生瘡。喉中乾燥。四肢痛癢方。

栝樓根　麥門冬 去心　龍膽 各叁兩　土瓜根 捌兩

大黄 貳兩　杏仁 壹升。去皮尖兩仁熬

右陸味。擣篩爲末。别擣杏仁如泥。鍊蜜和圓。如梧桐子大。飲下拾圓。日三。稍加至二十圓。

婦人面藥第五　論一首　方二十九首

論曰。面脂手膏。衣香澡豆。仕人貴勝。皆是所要。然今之醫門極為祕惜。不許子弟洩漏一法。至於父子之間亦不傳示。然聖人立法。欲使家家悉解。人人自知。豈使愚於天下。令至道不行。擁蔽聖人之意。甚可怪也。

面脂主面及皴黶黑皯。凡是面上之病悉皆主之方。

丁香拾分 零陵香 桃仁去皮 土瓜根 白斂
白及 梔子花 沈香 防風 當歸
辛夷 麝香研 芎藭 商陸各叁兩 白芷
萎蕤 菟絲子 甘松香 藿香各拾五分 蜀水花
青木香各貳兩 茯苓拾肆分 木蘭皮 藁本
白殭蠶各貳兩半 冬瓜仁肆兩 鵝脂 羊髓各壹升半
羊腎脂壹升 猪胰陸具 清酒伍升 生猪肪脂叁大升

右叁拾貳味。切。以上件酒挼猪胰汁。漬藥一宿於脂中。以

炭火煎三上三下。白芷黃綿濾貯器中。以塗面。

面脂方

防風 芎藭 白芷 白殭蠶 藁本

萎蕤 茯苓 白斂 細辛 土瓜根

栝樓仁 桃仁去皮尖 蜀水花 青木香 當歸

辛夷各半兩 鵝脂壹升 羊腎脂壹升 猪脂貳升

右壹拾玖味。細切。綿裹。酒二升。漬一日一夜。內脂中。急火煎之。三上三下。然後緩火一夜。藥成。去滓。以寒水石粉半兩內脂中。以柳木篦熟攪。任用之。

又方

杏仁貳升。去皮尖 白附子叁兩 密陀僧貳兩。研如粉

生白羊髓貳升半 真珠拾肆枚。研如粉 白鮮皮壹兩

雞子白柒枚 胡粉貳兩。以帛肆重裹壹石米下蒸之熟下陰乾。

右捌味。以清酒貳升半。先取杏仁盆中研之如膏。又下雞子白。研二百遍。又下羊髓研貳百遍。擣篩諸藥內之研五百遍至千遍。彌佳。初研杏仁即少少下酒薄。漸漸下使盡藥成。以指捻看如脂。即可用也。草藥絹篩直取細如粉佳。

又方

當歸　芎藭　細辛各伍分　蜀水花　密陀僧

商陸　辛夷　木蘭皮　栝樓　白殭蠶

藁本　桃花　香附子　杜蘅　鷹屎

零陵香　萎蕤　土瓜根各叄分　麝香

丁香各半兩　白朮貳兩　白芷柒分　白附子　玉屑各壹兩

鵝脂在合　鹿髓壹升　白蠟肆兩　豬膏貳兩　羊髓壹升

右貳拾玖味。細切。醋浸密封一宿。明曉以豬膏煎三上三下。以白芷黃為藥成。去滓攪數萬遍。令色白。傅面。慎風日良。

百膏方

杜蘅　牡蠣（熬。一云杜若）　防風　藁本

細辛　白附子　白芷　當歸　木蘭皮

白术　獨活　萎蕤　天雄　茯苓

玉屑（各壹兩）　菟絲子　防己　商陸　梔子花

橘皮（一云橘仁）　白斂　人參（各叁兩）　甘松香　青木香

藿香　零陵香　丁香（各貳兩）　麝香（半兩）　白犬脂

白鵝脂（無鵝脂以羊髓代之。）　牛髓（各壹升）　羊胰（叁具）

右叁拾貳味。以水浸膏髓等五日。日別再易水。又五日。日別一易水。又十日。二日一易水。凡二十日止。以酒壹升挼羊胰令消盡。去脉。乃細切香於瓷器中浸之。密封一宿。曉以諸脂等合煎。三上三下。以酒水氣盡為候。即以綿布絞去滓。研之千遍。待凝乃止。使白如雪。每夜塗面。晝則洗却。

更塗新者。十日以後色等桃花。以臺有冬瓜仁。蕤無花。無白鮑人參。

面膏主有黑䵟及瘡瘢并皮膚皴劈方。

防風　藁本　辛夷　芍藥　當歸

白芷　牛膝　商陸　細辛　密陀僧

芎藭　獨活　雞舌香　零陵香　萎蕤

木蘭皮　麝香　丁香　未穿真珠各壹兩

蕤仁　杏仁各貳兩。去皮尖　牛髓伍升　油壹升

臘月猪脂鍊叁升。　麞鹿腦各壹具。若無麞鹿羊腦亦得

右貳拾伍味。先以水浸腦髓使白。藿香以上㕮咀如麥片。乃於腦髓脂油內煎之三上三下。即以綿裹搦去滓。乃內麝香及真珠末。研之千遍。凝即塗面上甚妙。今按藥止二十六味。後云藿香以上。而方中無藿香。必脫漏叁味也。

又方

香附子拾枚大者。白芷壹兩　零陵香貳兩　茯苓壹大兩。
蔓菁油貳升無即猪脂代之　牛髓　羊髓各壹斗
白蠟捌兩　麝香半兩
右玖味，切，以油髓微火煎五物，令色變，去滓，內麝香，研千遍，凝，每澡豆洗面而塗之。

面藥方
朱砂研　雄黃研　水銀霜各半兩　胡粉貳團　黃鷹屎壹升
右伍味，合和，淨洗面，夜塗之。以壹兩藥和面脂，令稠如泥。先於夜欲臥時，澡豆淨洗面，并手乾拭，以藥塗面，厚薄如尋常塗面厚薄，乃以指細細熟摩之，令藥與肉相入，乃臥。一上經五日五夜，勿洗面，止就上作粧即得，要不洗面。至第六夜洗面塗，一如前法。滿三度洗，更不塗也。一如常洗面也。其色光淨，與未塗時百倍也。

悦澤面方

雄黃研　朱砂研　白殭蠶各壹兩　眞珠拾枚。研末

右肆味。並粉末之。以面脂和胡粉。內藥和攪。塗面作妝。曉以醋漿水洗面訖。乃塗之。三十日後如凝脂。五十歲人塗之面如弱冠。夜常塗之勿絕。

令面生光方

蜜陀僧研。以乳煎之塗面。即生光。

令面白媚好方

白附子　白芷　杜若　赤石脂　白石脂

杏仁去皮尖　桃花　瓜子　牛膝　雞矢白

萎蕤　遠志去心

右壹拾貳味。各三分。擣篩為末。以人乳汁一升。白蜜一升。和。空腹服柒圓。日二服。

鹿角塗面方

鹿角壹握 芎藭 細辛 白蘞 白术

白附子 天門冬去心 白芷各貳兩 杏仁貳七枚，去皮尖 牛乳叁升

右壹拾味，鹿角先以水漬之百日，令軟，總內乳中，微火煎之，令汁竭，出角，以白練袋盛之，餘藥勿收，至夜，取牛乳石上摩鹿角，用塗面，曉以清漿水洗之，令老如少也。一方用酥叁兩

急面皮方

大猪蹄一具，治如食法，水二升，清漿水一升，不渝釜中煎成膠，以洗面，又和澡豆，夜塗面，曉以漿水洗，令面皮急矣。

治婦人令好顏色方

女菀貳兩半 鉛丹伍分

右貳味，擣篩為散，酒服一刀圭，日再服，男十日，女二十日。

知則止。黑色皆從大便出。色白如雪。

又方

白瓜子伍分 白楊皮叁分 桃花壹兩

右叁味。擣篩為散。以飲服方寸匕。日三服。三十日面白。五十日手足白。一云欲白加瓜子。欲赤加桃花。

令人面手白淨澡豆方

白鮮皮 白殭蠶 白附子 鷹矢白 白芷

芎藭 白朮 青木香一方用藁本 甘松香

白檀香 麝香 丁香各叁兩 桂心陸兩

瓜子壹兩。一方用土瓜根 杏仁叁拾枚。去皮尖 猪胰叁具

白梅叁柒枚 冬瓜仁伍合 雞子白柒枚 麪叁升

右貳拾味。先以猪胰和麪。暴令乾。然後合諸藥。擣篩為散。又和白豆屑二升。用洗手面。十日內色白。二十日如雪。三十日如

凝脂。千金有棗叄拾枚，無桂心。

又方

麝香貳分　猪胰兩具　大豆黃卷壹升伍合　桃花壹兩

菟絲子叄兩　冬葵子伍合，一云冬瓜子　白附子貳兩

木蘭皮叄兩　萎蕤貳合　梔子花貳兩

苜蓿壹兩

右壹拾壹味，以水浸猪胰三四度易水，血色及浮脂盡，乃擣諸味為散，和令相得，暴，擣篩，以洗手面，面淨光潤而香。一方若無前件可得者，直取苜蓿香一升，土瓜根、商陸、青木香各一兩，合擣為散，洗手面大佳。

澡豆方

細辛半兩　白朮叄分　栝樓貳枚　土瓜根叄分　皂莢伍挺，炙，去皮子

商陸壹兩半　冬瓜仁半升　雀矢半合　菟絲子貳合　猪胰壹具，去脂。

藁本　防風　白芷　白附子　茯苓

杏仁去皮尖　桃仁去皮尖各壹兩　豆末肆升　麪壹升

右壹拾玖味。擣細篩。以麪將煑豬胰壹具令爛。取汁和散。作餅子。曝之令乾。更熟擣細羅之。以洗手面甚佳。

又方

丁香　沈香　青木香　桃花　鍾乳粉

真珠　玉屑　蜀水花　木瓜花各叁兩　㮈花

梨花　紅蓮花　李花　櫻桃花　白蜀葵花

旋復花各肆兩　麝香壹銖

右壹拾柒味。擣諸花。別擣諸香。真珠玉屑別研成粉。合和大豆末柒合。研之千遍。密貯勿洩。常用洗手面作攤。一百日其面如玉。光淨潤澤。臭氣粉滓皆除。咽喉臂膊皆用洗之。悉得如意。

治面皰瘡瘢三十年以上。并冷瘡蟲瘢令滅方。

斑猫（去足翅。熬）　巴豆（去心皮。熬。各叁枚）　胡粉　鵝脂

金洮沙　蜜陀僧　高良薑　海蛤（各叁兩）

右捌味。為粉。以鵝脂和。夜半塗。曉以甘草湯洗之。

治面奸䵟方

礬石（燒）　硫黃　白附子（各壹兩）

右叁味。細研。以大醋一盞浸之一宿。淨洗面塗之。慎風。

治面皰方

白附子　青木香　麝香　由跋　細辛（各貳兩）

右五味。細末。水和之。塗面日三。（外臺方無細辛）

又方

木蘭皮（伍兩。取厚者）　梔子仁（陸兩）

右貳味。為散。以蜜漿服方寸匕。日三服。

治面皰甚如麻豆。痛癢搔之黃水出。及黑色黯黮不可去方。

冬瓜子　柏子仁　茯苓　冬葵子

右肆味等分。擣篩。飲服方寸匕。日三服。外臺方無冬瓜子

白膏 主面瘡皰疥癰惡瘡方。

附子拾伍枚　蜀椒一升　野葛一尺伍寸

右叁味。㕮咀。醋漬一宿。猪膏一斤。煎附子黃去滓。塗之日三。

梔子圓 治酒瘡鼻皰方

梔子仁叁升　芎藭肆兩　大黃陸兩

好豉叁升熬　木蘭皮半斤　甘草肆兩炙

右陸味。擣篩為末。鍊蜜和圓如梧桐子。以飲服拾圓。日三服。稍加至貳拾伍圓。

又傳方

蒺藜子　梔子仁　豉熬各一兩。木蘭皮半斤。一

右肆味。爲末。以醋漿水和之如泥。夜塗上。日未出時。以煖水洗之。亦滅瘢痕。

又方

鸕鷀矢一斤

右壹味。擣篩。臘月豬脂和如泥。夜塗之。

飛水銀霜方

水銀一斤　朴消捌兩　大醋半升　黄礬拾兩
錫貳拾兩成鍊二遍者　玄精陸兩　鹽花叁斤

右柒味。先鍊錫訖。又温水銀令熱。乃投錫中。又擣玄精黄礬令細。以絹篩之。又擣錫令碎。以鹽花并玄精等合和。以醋拌之令濕。以鹽花壹斤藉底。乃布藥。令平。以朴消蓋上訖。以盆蓋合。以鹽灰爲泥。泥縫固際。乾之。微火三日。武火四日。凡七日去火。一日開之。掃取極須勤心守。勿令須臾

闇懈慢大失矣。

錬粉方

胡粉三大升。盆中盛水。投粉於中熟攪。以雞羽水上掃取。以舊破雞子拾枚。去黃瀉白於瓷椀中。以粉置其上。以瓷椀密蓋之。伍升米下蒸之。乃暴乾研用。傅面百倍省面有光。

滅瘢方

衣魚二枚　白石脂壹分　鴈屎三分　白附子一分　白殭蠶半兩

右伍味為末。臘月猪脂和傅。愼生冷風日。令肌膩。

滅瘢方

丹參　羊脂

右貳味和煎。傅之。滅瘢神妙。

又方

以蜜塗之佳。

又方

取禹餘粮半夏等分，擣末，以雞子黃和，先以新布拭瘢上令赤，以塗之，勿見風，塗之二十日，十年瘢並滅。

手膏方

桃仁 杏仁各貳拾枚，去皮尖 橘仁壹合 赤匏拾枚

大棗三拾枚 辛夷 芎藭 當歸 牛腦

羊腦 白狗腦各貳兩，無白狗，諸狗亦得

右壹拾壹味，先以酒漬腦，又別以酒陸升，煑赤匏以上藥，令沸，停冷，乃和諸腦等，然後碎辛夷三味，以綿裹之，去棗皮核，合內酒中，以瓷器貯之，五日以後，先淨訖，取塗手，甚光潤，而忌近火炙手。

治手足皴裂血出疼痛方

取猪脂著熱酒中。以洗之即瘥。

治冬月冒涉凍凌。面目手足瘃壞。及始熱疼痛欲瘃方。

取麥窠煑取濃汁。熱漬手足兼洗之。一二五即度瘥。

治手足皴凍欲脫方。

椒　芎藭各半兩　白芷壹分　防風一分　薑一分作鹽

右伍味。以水肆升。煎。令濃。塗洗之。三數遍即瘥。

治凍傷十指欲墮方。

取馬矢叁升。煑令麻沸。漬。冷易之。半日愈。

熏衣浥衣香第六　方六首

熏衣香方

薰陸香捌兩　藿香　覽探各二兩。一方無　甲香貳兩

詹糖伍兩　青桂皮伍兩

右陸味。末。前件乾香中。先取硬者黏濕難碎者。各別擣。或

細切㕮咀，使如黍粟，然後一一薄布於盤上，自餘別擣，亦別布於其上。有須篩下者，以紗，不得木。細別煎蜜，就盤上以手搜搦令勻，然後擣之。燥濕必須調適，不得過度，太燥則難圓，太濕則難燒，濕則香氣不發，燥則煙多，煙多則惟有焦臭，無復芬芳。是故香復須麤細燥濕合度，蜜與香相稱，火又須微，使香與綠煙而共盡。

浥衣香方

沈香　首蓿香各伍兩　丁香　甘松香　藿香　青木香　艾納香　雞舌香　雀腦香各壹兩　麝香半兩　白檀香叁兩　零陵香拾兩

右壹拾貳味，各擣令如黍粟麩糠等物，令細末，乃和令相得。若置衣箱中，必須綿裹之，不得用紙。秋冬猶著，盛熱暑之時令香速浥。凡諸草香不但須新，及時乃佳。若欲少作

者。準此爲大率也。

乾香方

丁香壹兩 麝香 白檀 沈香各半兩 零陵香伍兩

甘松香柒兩 藿香捌兩

右柒味。先擣丁香令碎。次擣甘松香。合擣訖。乃和麝香合和浥衣。

五香圓并湯主療一切腫。下氣。散毒心痛方。

丁香 藿香 零陵香 青木香 甘松香各叁兩

桂心 白芷 當歸 香附子 檳榔各壹兩

麝香壹銖

右壹拾壹味。擣篩爲末。鍊蜜和擣千杵。圓如梧子大。含咽令津盡。日三夜一。一日一夜用拾貳圓。當即覺香。五日身香。十日衣被香。忌食五辛。其湯法取檳榔以前隨多少皆

等分。以水微微火上煑一炊久。大沸定。內麝香末壹銖。勿去滓。澄清服壹升。凡丁腫口中喉中脚底背甲下癰疽痔漏皆服之。其湯不瘥。作圓含之。數以湯洗之。一方有豆蔻，無麝香。

十香圓 令人身體百處皆香方。

沈香　麝香　白檀香　青木香　零陵香

白芷　甘松香　藿香　細辛　芎藭

檳榔　豆蔻各壹兩　香附子半兩　丁香叁分

右壹拾肆味。擣篩為末。鍊蜜和綿裹。如梧子大。日夕含之。咽津味盡即止。忌五辛。

香粉方

白附子　茯苓　白朮　白芷　白斂

白檀各壹兩　沈香　青木香　雞舌香　零陵香

丁香　藿香各貳兩　麝香壹分　粉英陸升

右壹拾肆味。各細擣篩絹下。以取色青黑者。乃麤擣紗下。貯粉囊中。置大合子內。以粉覆之。密閉七日後取之。粉香至盛而色白。如本欲為香粉者。不問香之白黑悉以和粉。粉雖香而色至黑。必須分別用之。不可悉和之。粉囊以熟帛雙紃作之。

令身香第七 方一十三首

香身方

甘草伍分。炙　芎藭壹兩　白芷叁分

右叁味。擣篩為散。以飲服方寸匕。日三服。三十日口香。四十日身香。

又方

瓜子　松根白皮　大棗各壹兩

右叁味。為散。酒服方寸匕。日二服。百日衣被皆香。

又方

瓜子　芎藭　藁本　當歸　杜蘅

細辛　防風各壹分

右柒味。擣篩爲散。食後以飲服方寸匕。日三服。五日口香。十日身香。二十日肉香。三十日骨香。五十日遠聞香。六十日透衣香。一方有白芷

治諸身體臭方

竹葉拾兩　桃白皮肆兩

右貳味。以水壹石貳斗。煑取五斗。浴身即香也。

治諸腋臭方

伏龍肝爲末。和作泥。傅之瘥。

又方

牛脂和胡粉參合。煎令可圓。塗之。

又方

三年苦酒和石灰塗之。

又方

赤銅屑以大醋和銅器中，炒令極熱，以布裹熨腋下，冷則易之，瘥。

又方

青木香貳兩 附子 石灰各壹兩

礬石燒，半兩。 米粉壹升

右伍味，擣篩爲散，如常粉腋良。

又方

馬齒草壹束，擣碎，以蜜和作團，紙裹之，以泥紙上厚半寸，暴乾，以火燒熟，破取，更以少許蜜和，仍令熱，勿使冷也。先以生布揩之，然後藥夾腋下，令極痛，亦忍不能得。

然後以手巾勒兩臂著身即差。

石灰散方

石灰壹升　青木香　楓香　薰陸香　丁香　陽起石各貳兩　橘皮貳兩　礬石肆兩

右捌味，並熟擣篩為散，以綿作袋，麤如肆指，長四寸，展使著藥，先以布揩令痛，夾之也。

又方

石灰伍合　馬齒草貳兩　礬石叁兩，燒　甘松香壹兩

右肆味，合擣篩，先以生布揩病上，令黃汁出，拭乾，以散傅之，滿三日差，永除。

又方

二月社日，盜取社家糜饙一團，猥地摩腋下二七遍，擲著五道頭，勿令人知，永差。人知即不效。

生髮黑髮第八 方一十九首

治髮薄不生方。

先以醋泔清洗禿處。以生布揩令火熱。腊月脂并細研鐵生煎三沸。塗之日三遍。

生髮鬚膏方

附子 荊實各貳兩 松葉 柏葉各叁兩 烏雞脂叁合

右伍味。㕮咀。合盛新瓦瓶中。陰乾百日出。擣以馬鬐膏和如薄粥。塗頭髮如澤法。裹絮中。無令中風。三十日長。

生髮膏 令髮速長而黑。傅藥時特忌風方。

烏喙 莽草 續斷 皂莢 澤蘭 白朮 細辛 竹葉各壹兩 防風 辛夷各壹兩 柏葉細切肆兩 杏仁別擣 松葉各叁兩 豬脂叁升

右壹拾肆味。切。先以三年大醋叁升漬令一宿。內藥脂中。

煎三上三下。膏成去滓。塗髮及頂上。千金有石南

生髮膏 主髮鬢禿落不生方。

升麻　薺苨各貳兩　莽草　白芷　防風各壹兩

蜣螂肆枚　馬鬐脂　驢鬐脂　雄雞脂一云熊脂

豬脂　狗脂各伍合

右拾壹味。藥伍味。脂取成煎者。並切。以酢漬一宿。曉合煎之。沸則停火。冷更上。一沸停。三上三下。去滓。傅頭。以當澤用之。三十日生矣。

又方　羊矢灰灌取汁洗之。三日一洗。不過十洗。即生矣。

治髮落方

柏葉切壹升　附子貳兩

右貳味擣篩。豬脂和作叁拾圓。洗髮時即內壹圓泔中。髮不落。其藥以布裹密器貯。勿令洩氣。

長髮方

蔓荊子叁升　大附子叁枚

右貳味，㕮咀，以酒壹斗貳升漬之，盛瓷瓶中，封頭二十日。取雞肪煎，以塗之，滓以汁櫛髮，十日長一尺，勿逼面塗。

又方

麻子仁叁升　秦椒叁升

右貳味，合以泔漬一宿，以沐髮長矣。

又方

麻子貳升　白桐葉壹把

右貳味，以米泔汁煮去滓，適寒温，沐二十日長矣。

治髮落方

石灰叁升，水拌令濕，炒令極焦，停冷，以絹袋貯之，以酒叁升漬之，密封，冬二七日，春秋七日，取酒温服一合，常

令酒氣相接。七日落止。百日服之。終身不落。新髮生也。

又方

桑白皮壹石。以水壹石煮三沸。以沐髮三過即止。

令白髮還黑方。

隴西白芷　旋覆花　秦椒各壹升　桂心壹尺

右肆味擣篩為散。以井花水服方寸匕。日三服。二十日還黑。禁房室。

又方　烏麻九蒸九暴。擣末棗膏和圓。久服之。

又方

八角附子壹枚　大酢半升

右貳味於銅器中煎取兩沸。內好礬石大如棊子壹枚。消盡內脂肪參兩。和令相得。下之攪至凝。內竹筒中。拔白髮。以膏塗上。即生黑髮。

髮黃方

臘月豬膏和羊矢灰。蒲灰等分傳之。三日一爲取黑止。

又方 以醋煑大豆爛。去豆煎冷稠塗髮。

又方

熊脂塗髮梳之。散頭牀底伏地一食頃即出形盡當黑。

用之不過一升。

染髮方

石榴叁顆皮葉亦得。針沙如棗核許。大醋陸升。水叁升。

和藥合煑得壹升沸即熟。灰汁洗乾染之。

瓜子散 治頭髮早白。又主虛勞腦髓空竭胃氣不和。諸藏虛

絶。血氣不足。故令人髮早白。少而筭髮及憂愁早白。遠視䀮

䀮風淚出。手足煩熱。恍惚忘誤。連年下痢。服之一年後大驗。

瓜子壹升 白芷去皮 當歸 芎藭 甘草炙。各貳兩

右伍味。擣篩爲散。食後服方寸匕。日三。酒漿湯飲任性服

之。一方有松子貳兩

千金翼方卷第五

千金翼方卷第六

婦人二

產後心悶第一　方四首

治產後心悶眼不得開方

當產婦頭項上取髮如指大，令人用力挽之，眼即開。

單行羚羊角散　治產後心悶，是血氣上衝心方。

羚羊角壹枚，燒成灰

右壹味，擣篩爲散，取東流水服方寸匕，若不瘥，須臾更服，取瘥止。

單行羖羊角散　治產後心悶方。

羖羊角燒作灰

右壹味，擣篩爲散，以温酒服方寸匕，若不瘥，須臾更服，取瘥止。亦治產難。

單行生赤小豆散 主産後心悶方。

赤小豆

右壹味。擣篩爲散。以東流水服方寸匕。不瘥須臾更服。即愈。

産後虚煩第二　方一十二首

薤白湯 治産後胸中煩熱逆氣方。

薤白切　半夏洗去滑　人參　甘草炙　知母各貳兩

麥門冬半升去心　石膏肆兩打碎綿裹　栝樓參兩

右捌味。㕮咀。以水壹斗參升。煮取肆升。分爲五服。日三夜再。熱甚者。加石膏知母各壹兩。

竹根湯 主産後虚煩方。

竹根細切壹斗伍升

右以水貳斗。煮取柒升。去滓。内小麥貳升。大棗貳拾枚。復煮麥熟。又内甘草壹兩炙。麥門冬壹升去心。湯成去滓。温

服伍合。不差。更服。取差。若短氣。亦服之極佳。

人參當歸湯 主產後煩悶不安方。

人參　當歸　芍藥　麥門冬去心　粳米壹升

乾地黃　桂心各壹兩　大棗貳拾枚，去核　淡竹葉切，叁升

右玖味。㕮咀。以水壹斗貳升。先煎竹葉及米。取捌升。去滓。內藥煮取叁升。適寒溫分叁服。若煩悶不安者。當取豉壹升。以水叁升。煮取壹升。盡服之甚良。

甘竹茹湯 主產後內虛煩熱短氣方。

甘竹茹　人參　茯苓　黃芩　甘草炙。各壹兩

右伍味。㕮咀。以水陸升。煮取貳升。分叁服。

知母湯 主產後乍寒乍熱。通身溫熱。胸心煩悶方。

知母叁兩　黃芩　芍藥各貳兩　桂心　甘草各壹兩

右伍味。㕮咀。以水伍升。煮取貳升伍合。分為叁服。一方不用桂心。加生地黃。

竹葉湯主產後心煩悶不解方。

生淡竹葉切 麥門冬去心 小麥各壹升 大棗拾肆枚擘

茯苓 生薑各參兩。切 甘草貳兩。炙

右柒味。㕮咀。以水一斗。先煮竹葉小麥取捌升。內諸藥煮取叁升。分爲叁服。若心中虛悸者。加人參貳兩若其人食少無氣力者。可更加白粳米伍合。氣逆者。加半夏貳兩。

淡竹茹湯主產後虛煩。頭痛短氣欲死。心中悶亂不起方。

生淡竹茹壹升 麥門冬伍合。去心 小麥伍合 大棗拾肆枚。一方用石膏

生薑參兩。切。一方用乾薑 甘草壹兩炙

右陸味。㕮咀。以水捌升。煮竹茹小麥減壹升。仍內諸藥。更煮取貳升。分爲貳服。羸人分爲三服。若有人參內壹兩。若無人參。內茯苓壹兩半亦佳。人參茯苓皆治心煩悶及心驚悸。安定精神。有即爲良。無自依本方服一劑。不瘥更作

服之。若逆氣者。加半夏貳兩。洗去滑。

單行白犬骨散 主產後煩悶不食方。

白犬骨燒之擣篩。以水和服方寸匕。

單行小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方。

小豆叁柒枚燒作屑。以冷水和頓服之。

單行蒲黃散 治產後苦煩悶方。

蒲黃

右壹味。以東流水和服方寸匕。極良。

治產後虛熱往來。心胷中煩滿。骨節疼及頭痛。壯熱。晡時輒甚。又似微瘧方。

蜀漆葉　黃芩　桂心　甘草炙。各壹兩

生地黃壹斤　黃耆　蜆母各叁兩　芍藥貳兩

右捌味。㕮咀。以水壹斗。先煑地黃。取柒升。去滓。下諸藥煑

取貳升，伍合，分叁服。湯治寒熱，不損人。

芍藥湯　治產後虛熱頭痛方。

白芍藥　乾地黃　牡蠣熬，各伍兩　桂心叁兩

右肆味，㕮咀，以水伍升，煑取叁升半，分三服。湯不損人，無毒。亦治腹中急痛，若通身發熱，更加黃芩貳兩，大熱即除。

鹿角屑豉湯　主婦人墮身，血不盡去，苦煩悶方。

鹿角屑，壹兩　香豉壹升半

右貳味，以水叁升，先煑豉三沸，去滓，內鹿角屑，攪令調，頓服，須臾血下。

陰脫第三　方八首

灰坐漬法　主產後陰道不閉方。

石灰壹升，熬令能燒草

右壹味，以水貳斗，投灰中，適寒溫，入汁中坐漬之，須臾復

易如常法。此是神秘方，不傳，已治人有驗。

當歸散 治婦人陰脫。

當歸　黃芩各貳兩　芍藥伍分　蝟皮半兩　牡蠣貳兩半，熬

右伍味，擣篩為散，酒服方寸匕，日三服。禁舉重，良。

黃芩散 治婦人陰脫。

黃芩　蝟皮各半兩　芍藥壹兩　當歸叁分　牡蠣熬

松皮及實百日陰乾，燒灰。一方用狐莖　竹皮各貳兩半

右柒味，擣篩為散，飲服方寸匕，日三服。禁勞，勿冷食。

硫黃散 治婦人陰脫。

硫黃半兩　烏賊魚骨半兩　五味子叁銖

右叁味，擣下篩，以粉其上，良。日再三粉之。

治婦人陰脫，鐵精羊脂傅方。

羊脂煎訖，適冷煖塗上，以鐵精傅脂上，多少令調，以火

灸布。溫以熨上。漸推內之。末磁石。酒服方寸匕。日三服。

亦治脫肛。

治婦人陰癢脫方。

礬石熬

右壹味。末之。每日空腹酒和服方寸匕。日三服。

又方　取車釭脂傅之。即愈。

當歸湯　治婦人產後。藏中風。陰重洗方。

當歸　獨活各叁兩　白芷　地榆皮　礬石熬各貳兩。

右伍味。㕮咀。以水壹斗伍升。煑取壹斗貳升。以洗浴之。

惡露第四　方一十八首

治產後瘕病。燒秤錘酒方。

鐵秤錘。燒令極赤。投於酒壹升中。浸令無聲。出錘。頓服之。不差更作。

紫湯 治產後惡露未盡。又兼有風身中急痛。

取大豆壹升。先取新布揩之。令光生熬。令豆不復聲繞斷。以清酒壹升投豆中。停二沸漉去滓。每服壹升。日三夜一服。

乾地黃湯 治產後惡露不盡。除諸疾補不足。

乾地黃（參兩）　芎藭　桂心　黃耆　當歸（各參兩）

細辛　人參　茯苓　防風　芍藥

甘草（各壹兩，炙）

右壹拾壹味。㕮咀。以水壹斗。煑取參升。分為三服。日再夜一。

桃仁湯 主產後往來寒熱。惡血不盡方。

桃仁（伍兩，去皮尖及雙仁）　吳茱萸（貳升）　黃耆　當歸

芍藥（各參兩）　生薑　柴胡（去苗）　百鍊蘇（各捌兩）

右捌味。㕮咀。以酒壹斗。水貳升合煑取參升。絞去滓。

適寒温先食服一升。日三服。

厚朴湯　主產後腹中痛。惡露不盡方。

厚朴炙　乾薑炮　桂心各肆兩　黃芩　芍藥

乾地黃　茯苓　大黃各叁兩　桃仁去皮尖　䗪蟲熬。去足

甘草炙。各貳兩　芒消壹兩　枳實炙　白朮各伍兩

右壹拾肆味。㕮咀。以水壹斗。清酒叁升。合煑取叁升。絞去滓。下芒消。令烊。適寒温服壹升。日三。一方用桃子拾肆枚

澤蘭湯　主婦人產後惡露不盡。腹痛不除。小腹急痛。痛引腰背。少氣力方。

澤蘭　生地黃　當歸各貳兩　生薑　芍藥各兩

大棗拾枚。擘　甘草炙。壹兩半。

右柒味。切。以水玖升。煑取叁升。分為叁服。墮身欲死者服之亦瘥。

甘草湯 治産後餘血不盡。逆搶心胷。手足冷。脣乾腹脹短氣。

甘草炙 芍藥 桂心各叁兩 大黃肆兩 阿膠叁兩

右伍味。㕮咀。以東流水壹斗。煮取叁升。絞去滓。內阿膠令烊。分爲三服。一服入腹。面即有顏色。一日一夜盡此三服。即下惡血。將養如新産婦也。

大黃湯 治産後惡露不盡。

大黃 當歸 生薑 牡丹去心 芍藥 甘草炙各壹兩 吳茱萸壹升

右柒味。㕮咀。以水壹斗。煮取肆升。分爲肆服。一日令盡。極佳。加人參貳兩。名**人參大黃湯**。

當歸湯 治産後血留下焦不去。

當歸 桂心 甘草炙各貳兩 芎藭 芍藥各叁兩

乾地黃肆兩

右陸味，㕮咀，以水壹斗，煑取伍升，分為五服。

柴胡湯 治產後往來寒熱，惡露不盡。

柴胡去苗　生薑各捌兩　桃仁伍拾枚，去皮尖　當歸

芍藥　黃耆各叁兩　吴茱萸貳升

右柒味，㕮咀，以清酒壹斗叁升，煑取叁升，先食服壹升，日三服。千金以水煑

大黃湯 主產後餘疾，有積血不去，腹大短氣，不得飲食，上衝心胷，時時煩憒，逆滿，手足煩疼，胃中結熱。

大黃　黃芩　甘草炙，各叁兩　蒲黃半兩　大棗叁拾枚，擘

右伍味，㕮咀，以水叁升，煑取壹升，清朝服至日中，當利。若下不止，進冷粥半升，即止。若不下，與少熱飲自下。人羸者半之。千金名蒲黃湯，有芒消壹兩

梔子湯 治產後兒生處空，留血不盡，小腹絞痛。

梔子叄拾枚。以水壹斗。煑取陸升。內當歸芍藥各叄兩。蜜伍合。生薑伍兩。羊脂壹兩。於梔子汁中煎取貳升。分爲三服。

大黄湯 產後血不流方。

大黄 黄芩 當歸 芍藥 芒消

甘草炙各壹兩 桃仁 杏仁各叄拾枚去皮尖。

右捌味。㕮咀。以水壹斗。煑取叄升。去滓。內芒消令烊。分爲肆服。湯當下利。利若不止。作白粥飲一盃煖服。去一炊久乃再服。

生地黄湯 治產後三日或四五日腹中餘血未盡絞痛強滿。氣息不通。

生地黄伍兩 生薑叄兩 大黄 細辛 甘草炙

桂心 黄芩 茯苓 芍藥 當歸各壹兩半

大棗貳拾枚擘

右壹拾壹味，㕮咀，以水捌升，煑取貳升伍合，分爲二服。禁生冷等。良。

大黄乾漆湯　治新産後有血，腹中切痛。

大黄　乾漆熬　乾地黄　乾薑　桂心各壹兩

右伍味，㕮咀，以水清酒各五升，煑取叁升，去滓，温服壹升，血當下。若不下，明日更服壹升，滿三服，病無不瘥。

麻子酒　治産後血不去。

麻子伍升，擣，以酒壹斗漬一宿，明旦去滓，服壹升，先食服。不瘥，復服壹升，不吐下。不得與男子交通一月，將養如初産法。

升麻湯　治産後惡物不盡，或經一月半歲一歲。

升麻叁兩，以酒伍升，煑取貳升，分再服，當吐下惡物，莫

恠之極良。

大黃苦酒治產後子血不盡。

大黃捌銖切。以苦酒貳升合。煑取壹升。適寒溫服之即血下。甚良。

心痛第五　方四首

羊肉桂心湯主產後虛冷心痛方。

羊肉叁斤　桂心肆兩　當歸　乾薑　甘草各叁兩

吳茱萸　人參　芎藭　乾地黃各貳兩

右玖味。㕮咀。以水壹斗。煑肉取汁伍升。去肉內藥。煑取貳升半。分爲叁服。一方有桔梗叁兩。

蜀椒湯主產後心痛。此大寒冷所爲方。

蜀椒貳合。汗。去目閉口者　當歸　半夏洗。去滑　桂心

甘草炙　茯苓　人參各貳兩　芍藥叁兩　蜜壹升

生薑汁伍合

右壹拾味㕮咀，以水玖升，煮椒令沸，然後內藥，煮取貳升半，去滓，內薑汁及蜜，復煎取壹升半，一服伍合，漸加至陸合，盡，勿喫冷食，佳。

治產後心痛方。一云大巖蜜湯

乾地黃　當歸　獨活　芍藥　細辛

桂心　乾薑　小草　甘草炙，各叁兩　吳茱萸壹升

右壹拾味㕮咀，以水玖升，煮取叁升，分三服。千金用蜜五合。

芍藥湯　主產後心痛，此大寒冷所為方

芍藥　桂心各叁兩　當歸　半夏洗，去滑　茯苓各貳兩

蜀椒汗，貳合　生薑汁伍合　蜜壹升

右捌味㕮咀，以水柒升，煮取貳升，去滓，內薑汁及蜜，復煎取貳升伍合，壹服五合，漸加至陸合，其服藥毋相去一炊

又再服。忌冷食。

腹痛第六　方一十六首

乾地黄湯 主產後兩脅滿痛，兼除百病。

乾地黄　芍藥各貳兩　生薑伍兩　當歸　蒲黄各叁兩

桂心陸兩　大棗貳拾枚，擘　甘草壹兩，炙

右捌味。㕮咀。以水壹斗。煑取貳升半。分叁服。

芍藥湯 主產後腹痛。

芍藥肆兩　茯苓叁兩　人參　乾地黄　甘草各貳兩

右伍味。㕮咀。以清酒兼水各陸升。煑取叁升。分服日二。

猪腎湯 治產後腹痛。

猪腎壹枚　茱萸壹升　黄耆　當歸　芎藭

人參　茯苓　乾地黄各貳兩　生薑切

厚朴炙　甘草炙，各叁兩　桂心肆兩　半夏伍兩，洗去滑

右壹拾叁味。㕮咀。以水貳斗。煑猪腎令熟。取壹斗。吹去肥膩。又以清酒貳升。煑取叁升。分為肆服。日三夜一服。

又方

羊肉壹斤　葱白壹斤　乾薑　當歸　桂心各叁兩

芍藥　芎藭　乾地黃　甘草炙，各貳兩

右玖味。㕮咀。先以水貳斗。煑肉取壹斗。去肉。内藥煎取三升。分為肆服。一日令盡。

吴茱萸湯 主婦人先有寒冷。胸滿痛。或心腹刺痛。或嘔吐。或食少。或腫。生後益劇。或寒。或下更劇。氣息綿惙欲絶。皆主之。

吴茱萸貳兩　防風　桔梗　乾薑　乾地黃

當歸　細辛　甘草炙，各半兩

右捌味。㕮咀。以水肆升。煑取壹升伍合。分為二服。

緩中葱白湯 主産後腹痛少氣。

葱白　當歸　人參　半夏（湯洗去滑）　細辛（各貳兩）

天門冬（去心）　芍藥　乾薑　甘草（炙各陸兩）　生地黃（取汁）

吳茱萸（各壹升）

右壹拾壹味。㕮咀。以水柒升。煮取貳升。壹服壹升。日夜服之令盡。

羊肉當歸湯 主產後腹中。心下切痛。不能食。往來寒熱。若中風乏氣力方。

羊肉（叁斤去脂）　當歸（貳兩）　黃芩（一方用黃耆）　芎藭

防風（各壹兩。一方用人參）　生薑（伍兩）　芍藥　甘草（炙各叁兩）

右捌味。㕮咀。以水貳斗煮肉。取壹斗。出肉。內諸藥。煎取叁升。分為三服。

蒲黃湯 主產後餘疾。胸中少氣。腹痛頭疼。餘血未盡。除腹中脹滿欲絕方。

蒲黃　生薑　生地黃各伍兩　芒消貳兩

桃仁貳拾枚，去皮尖　芎藭　桂心各壹兩　大棗拾伍枚，擘

右捌味，㕮咀，以水玖升，煮取貳升伍合，去滓，內芒消，分為三服，良驗。

敗醬湯　主產後疾痛引腰腹如錐刀刺方。

敗醬參兩

右壹味，切，以水肆升，酒貳升，微火煎取貳升，適寒溫服七合，日三，食前服之，大良。千金有桂心、芎藭各壹兩半，當歸壹兩，為肆味。

芎藭湯　主產後腹痛。

芎藭貳兩　女萎伍分　黃芩　前胡　桃仁去皮尖

桂心各壹兩　芍藥　大黃各壹兩半　蒲黃伍合　生地黃切，壹升半

甘草貳兩，炙　當歸參分

右壹拾貳味，㕮咀，以水壹升，酒參升合，煮取參升，分為肆

服日三夜一服。千金有黄耆無黄芩。

獨活湯 主産後腹痛引腰脊拘急方。

獨活 當歸 芍藥 生薑 桂心各叁兩

大棗拾枚擘 甘草貳兩炙

右柒味，㕮咀，以水捌升，煑取叁升，分叁服，相去如十里久進之。

芍藥黄耆湯 治産後心腹痛方。

芍藥肆兩 黄耆叁兩 白芷 桂心 生薑

甘草各貳兩炙 大棗拾枚擘

右柒味，㕮咀，以酒并水各伍升合，煑取叁升，空腹服壹升，日叁服。千金有人參當歸芎藭無黄茯苓爲拾貳味。

桃人芍藥湯 治産後疾痛方。

桃仁半升。去尖皮 芍藥叁兩 芎藭 當歸

乾漆熬　桂心　甘草炙各貳兩

右叁味。㕮咀。以水捌升。煮取叁升。分為叁服。服別相去一炊久。再服。

單行茱萸酒 治產後腹內疾痛方。

吳茱萸壹升。以酒叁升。漬壹宿。煎取半升。頓服之。亦可再服之。

單行桂酒 主產後疾痛及卒心腹痛方。

桂心叁兩。切。以酒叁升。煮取貳升。分為叁服。

單行生牛膝酒 主產後腹中甚痛方。

生牛膝根伍兩。切。以酒伍升。煮取貳升。分為貳服。若用乾牛膝。須以酒漬之。然後可煮。

虛損第七　方一十七首

羊肉黃耆湯 主產後虛乏。當補益方。

羊肉（叁斤） 黄耆 麥門冬（去心各叁兩） 大棗（叁拾枚擘）
乾地黄 茯苓 當歸 芍藥 桂心
甘草（炙各貳兩）

右壹拾味，㕮咀，以水貳斗煮肉，取壹斗，去肉，内藥煎取叁升，分為叁服，大良。

鹿肉湯 主產後虛羸勞損補之方。

鹿肉（肆斤） 乾地黄 芍藥 茯苓 黄耆
麥門冬（去心） 甘草（各貳兩炙） 芎藭 當歸 人參（各叁兩）
生薑（陸兩） 大棗（貳拾枚擘） 半夏（壹升洗去滑）

右壹拾叁味，㕮咀，以水叁斗煮肉，取貳斗，去肉，内藥煎取叁升，分為肆服，日三夜一服。

麞骨湯 治產後虛乏，五勞七傷，虛損不足，藏腑冷熱不調方。

麞骨（壹具碎） 遠志（去心） 黄耆 芍藥 橘皮

茯神　厚朴炙　芎藭　甘草炙各叁兩　當歸

乾薑　防風　獨活各貳兩　生薑切　桂心各肆兩

右壹拾伍味，㕮咀，以水叁斗煑麞骨，取壹斗，去滓，內藥煑取叁升，分爲肆服。

羊肉湯　主產後及傷身大虛，上氣腹痛，兼微風方。

羊肉貳斤，無羊肉，用麞肉代。　麥門冬柒合，去心。　生地黃伍兩

大棗拾貳枚，擘。　黃耆　人參　獨活　桂心

茯苓　甘草炙，各貳兩

右壹拾味，㕮咀，以水貳斗煑肉，取壹斗，去肉，內藥煑取叁升半，分爲肆服，日三夜一服。千金有乾薑。

羊肉生地黃湯　主產後三日，補中理藏，強氣力，消化血方。

羊肉貳斤　芍藥叁兩　生地黃切，貳升　當歸

芎藭　人參　桂心　甘草炙，各貳兩

右捌味㕮咀。以水貳斗煮肉。取壹斗。去肉。內藥煎取叁升。分爲肆服。日三夜一服。

羊肉杜仲湯 治產後腰痛欬嗽方。

羊肉肆斤 杜仲炙 紫菀 桂心 當歸 白朮各叁兩 細辛 五味子 款冬花 厚朴炙 附子炮去皮 萆薢 人參 芎藭 黃耆 甘草炙各貳兩 生薑切捌兩 大棗叁拾枚擘

右壹拾捌味㕮咀。以水貳斗煮肉。取壹斗。去肉。內藥煎取叁升。分溫三服。

當歸建中湯 治產後虛羸不足。腹中㽲痛不止。吸吸少氣。或若小腹拘急攣痛引腰背。不能飲食。產後一月。日得服四五劑爲善。令人強壯內補方。

當歸肆兩 桂心叁兩 甘草貳兩炙 芍藥陸兩 生薑叁兩

大棗拾貳枚，擘。

右陸味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升，分為叁服，一日令盡。若大虛，内飴糖陸兩，作湯成，内之於火上煖，令飴糖消。若無生薑，則以乾薑叁兩代之。若其人去血過多，崩傷内衄不止，加地黃陸兩，阿膠貳兩，合捌種，作湯成，去滓，内阿膠。若無當歸，以芎藭代之。

內補芎藭湯 主婦人產後虛羸，及崩傷過多，虛竭，腹中疾痛。

芎藭　乾地黃各肆兩　芍藥伍兩　桂心貳兩

大棗肆拾枚，擘。　乾薑

右柒味，㕮咀，以水壹斗貳升，煑取叁升，分為叁服。若不差，更作至叁劑。若有寒，苦微下，加附子叁兩，炮。主婦人虛羸少氣，七傷損絕，腹中拘急痛，崩傷虛竭，面目無色，及唾血。甚良。

大補中當歸湯治産後虛損不足。腹中拘急。或溺血。小腹苦痛。或從高墮下犯內。及金瘡血多內傷。男子亦宜服之。

當歸　乾薑　續斷　桂心各叁兩　乾地黃陸兩

芍藥肆兩　芎藭　麥門冬去心　白芷　甘草炙各貳兩

大棗肆拾枚擘　吳茱萸壹升

右壹拾貳味。㕮咀。以酒壹斗漬藥一宿。明旦以水捌升合煑取伍升。去滓。分溫伍服。日三夜二。服有黃耆入貳兩爲佳。

緩中湯主婦人産後腹中拘急。及虛涌少氣。産後諸虛不足。寛中補寒。

吳茱萸壹升　乾薑　當歸　白芷　人參

甘草炙各貳兩　麥門冬去心　半夏洗去滑各叁兩　芍藥陸兩

細辛壹兩　生地黃壹斤取汁

右壹拾壹味。㕮咀。以水壹斗。煑取三升。去滓。內地黃汁。更

上火合煎三兩沸。溫服壹升。日三服。若無當歸。以芎藭肆兩代之。

大補湯 治產後虛不足。少氣乏力。腹中拘急痛。及諸疾痛。內崩傷絕。虛竭裏急。腰及小腹痛。

當歸　乾地黃　半夏洗去滑　桂心各叁兩　吳茱萸壹升一本無

人參　麥門冬去心　芎藭　乾薑　甘草炙

白芷各貳兩　芍藥肆兩　大棗肆拾枚擘。

右壹拾叁味。㕮咀。以水壹斗。煮取三升。分三服。

當歸芍藥湯 治產後虛逆害飲食方。

當歸壹兩半　芍藥　人參　桂心　生薑切

甘草炙各壹兩　乾地黃貳兩　大棗貳拾枚擘

右捌味。㕮咀。以水柒升。煮取三升。分為三服。

鮑魚湯 主產後腹中虛極。水道閉絕。逆脹咽喉短氣方。

鮑魚壹斤 麻子仁 細辛 茯苓 生薑切

五味子各壹兩 地黃伍兩

右柒味，㕮咀，以水壹斗煮鮑魚，如食法，取汁柒升，內藥煎取叁升，分為叁服，大有神驗。

厚朴湯 主產後四日之中血氣，口乾噓吸方。

厚朴炙 枳實炙 生薑各叁兩 芍藥 五味子

茯苓 前胡各壹兩 人參半兩 大棗貳拾枚，擘

右玖味，㕮咀，以水陸升煮取貳升伍合，分為叁服，適寒溫服，禁冷物。

生地黃湯 主產後虛損少氣方。

生地黃 人參 知母 桂心 厚朴炙

甘草炙，各貳兩 赤小豆摻

右柒味，㕮咀，以水貳斗伍升煮地黃，取壹斗，去滓，內藥煎

取叁升。分爲叁服。

氣賁湯 主婦人賁豚氣。積勞。藏氣不足。胷中煩燥。關元以下如懷五千錢狀方。

厚朴炙　當歸　細辛　芍藥　桔梗

石膏碎　桂心各叁兩　大黃伍兩　乾地黃肆兩　乾薑

澤瀉　黃芩　甘草炙。各伍兩

右壹拾叁味。㕮咀。以水壹斗。煑取叁升。分溫叁服。服叁劑佳。千金有吳茱萸。無大黃。

杏仁湯 治產後虛氣方。

杏仁去皮尖双仁者。　蘇葉各壹升　半夏洗壹兩　生薑拾兩

桂心肆兩　人參　橘皮　麥門冬去心　白前各叁兩

右玖味。㕮咀。以水玖升。煑取貳升伍合。分叁服。

千金翼方卷第六

千金翼方卷第七　婦人二

虛損第一

柏子人圓　主婦人五勞七傷。羸弱瘦削。面無顏色。飲食減少。貌失光澤。及產後半身枯悴。傷墜斷絕。無子。令人肥白。能久服。夫婦不相識。神方。

柏子人　白石英　鍾乳　乾薑　黃耆（各貳兩）

澤蘭（九分。葉熬）　藁本　蕪荑（各叁分）　芎藭（貳兩半）　防風（伍分）

蜀椒（壹兩半。去目及閉口者。汗）　人參　紫石英　石斛

赤石脂　乾地黃　芍藥　五味子　秦艽

肉蓯蓉　厚朴（炙）　龍骨　防葵　細辛

獨活　杜仲（炙）　白芷　茯苓　桔梗

白朮　桂心（各壹兩）　當歸　甘草（炙。各伍分）

右叁拾叁味。擣篩為末。鍊蜜和圓。如梧子。空肚以酒服十

圓。不知，稍增至參拾圓。以知為度。禁食生魚肥豬肉生冷。千金有烏頭，无秦艽、龍骨、防葵、茯苓。

小澤蘭圓　治婦人產後虛損補益方。

澤蘭九分，取葉，熬　蕪荑熬　藁本　厚朴炙　細辛

人參　柏子人　白朮各參分　蜀椒去目、閉口者，汗

白芷　乾薑　食茱萸　防風各壹兩　石膏貳兩

桂心半兩　當歸　芎藭　甘草炙，各參分

一方有芍藥壹兩。

右壹拾捌味，擣篩為末，鍊蜜和圓梧子大，溫酒服貳拾圓，漸加參拾圓，日參服。忌食生魚肥豬肉。千金无乾薑、蕪荑、茯苓。

大五石澤蘭圓　主婦人產後虛損寒中，腹中雷鳴，緩急風頭痛，寒熱，月經不調，繞臍惻惻痛，或心下石堅，逆害飲食，手足常冷，多夢紛紜，身體痺痛，榮衛不和，虛弱不能動搖方。

澤蘭九分取葉熬　石膏　乾薑　白石英　陽起石各貳兩

芎藭　當歸各叄兩　人參　石斛　烏頭炮去皮

白朮　續斷　遠志去心　防風各伍分　紫石英

禹餘粮　厚朴炙　柏子人　乾地黃　五味子

細辛　蜀椒去目閉口者汗　龍骨　桂心

茯苓各壹兩半　紫菀　山茱萸各壹兩　白芷

藁本　蕪荑各叄兩　鍾乳　薯蕷　甘草炙各貳兩半

右叄拾叄味，擣篩爲末，鍊蜜和圓如梧桐子，酒服貳拾圓，漸加至叄拾圓。千金無陽起石。

小五石澤蘭圓　主婦人勞冷虛損，飲食減少，面失光色，腹中冷痛，月候不調，吸吸少氣無力，補益溫中方。

澤蘭九分取葉熬　藁本　柏子人　厚朴炙　白朮各壹兩

芍藥　蜀椒去目閉口者汗　山茱萸　人參各伍分

紫石英 鍾乳 白石英 肉蓯蓉 礬石燒

龍骨 桂心各壹兩半 石膏 乾薑 陽起石各貳兩

蕪荑熬各叁分 赤石脂 當歸 甘草各半兩炙

右貳拾叁味。擣篩為末。錬蜜和圓。如梧子。酒服貳拾圓。加至叁拾圓。日叁服。

大補益當歸圓 治産後虚羸不足。胷中少氣。腹中拘急疼痛。或引腰背痛。或産後所下過多不止。虚竭乏氣。晝夜不得眠。及崩中。面目失色。脣口乾燥。亦主男子傷絶。或從高墮下。內有所傷之處。或損血吐下。及金瘡等方。

當歸 芎藭 續斷 乾薑

阿膠炙 甘草炙各肆兩 附子炮去皮 白芷

吳茱萸 白朮各叁兩 乾地黄拾兩 桂心貳兩

赤芍藥貳兩

右壹拾叁味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子。酒服貳拾圓。日叁夜壹。漸加至伍拾圓。若有真蒲黄。可加壹升爲善。

白芷圓 治婦人產後所下過多。及崩中傷損。虛竭少氣。面目失色。腹中痛方。

白芷　續斷　乾薑　當歸各叁兩　附子壹兩。炮去皮

乾地黄伍兩　阿膠叁兩。炙

右柒味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子。酒服貳拾圓。日四五服。無當歸。用芎藭代之亦可。加蒲黃壹兩爲善。無續斷。用大薊根代之。

甘草圓 主婦人產後心虛不足。虛悸少氣。心神不安。或若恍恍惚惚。不自覺方。

甘草叁兩。炙　人參　澤瀉　桂心各壹兩　大棗伍枚

遠志去心　茯苓　麥門冬去心　菖蒲　乾薑各貳兩

右壹拾味擣篩為末鍊蜜和圓如大豆許酒服貳拾圓日四五服夜貳服不知稍增若無澤瀉用朮代之若胸中冷增乾薑

大遠志圓 主婦人產後心虛不足心下虛悸志意不安時復憒憒腹中拘急痛夜臥不安胸中吸吸少氣藥內補傷損益氣安志定心主諸虛損方

遠志去心　茯苓　桂心　麥門冬去心　澤瀉

乾薑　人參　當歸　獨活　阿膠炙

菖蒲　甘草炙　白朮各參兩　乾地黃伍兩　署預貳兩

右壹拾伍味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子空腹溫酒服貳拾圓日參服不知稍加至參拾圓大虛身體冷少津液加鍾乳參兩為善鍾乳益精氣安心鎮志令人顏色美至良

人參圓 主產後大虛心悸志意不安恍惚不自覺心中恐畏

夜不得眠虚煩少氣方。

人參　茯苓　麥門冬(去心)　甘草(炙各叁兩)　桂心(壹兩)

大棗(伍拾枚。作膏)　菖蒲　澤瀉　署蕷

乾薑(各貳兩)

右壹拾味。擣篩爲末。鍊蜜棗膏和圓。如梧子大。空腹酒下貳拾圓。日叁夜壹服。不知。稍增至叁拾圓。若有遠志得貳兩内之爲善。氣絶内當歸獨活各叁兩更善。此方亦治男子虚心悸不定良。

生地黄煎 治婦人産後虚羸短氣胷脅逆滿風寒方。

生地黄(捌兩)　茯苓　麥門冬(各壹斤。去心)　桃仁(半升去皮尖)

甘草(壹尺炙)　人參(叁兩)　石斛　桂心　紫菀(各肆兩)

右玖味。合擣篩。以生地黄汁捌升。淳清酒捌升。合調銅器中炭火上。内鹿角膠壹斤。數攪之。得壹升。次内飴叁升。白

蜜叁升，於銅器中，釜湯上煎，令調藥成，先食服如彈丸壹枚，日叁，不知，稍加至貳圓。

地黃羊脂煎　治產後諸病羸瘦，欲令肥白，食飲平調方。

生地黃汁壹斗　生薑汁　白蜜各伍升　羊脂貳斤

右肆味，先煎地黃汁，令得伍升，次內羊脂煎，令減半，內薑汁，復煎令減，內蜜著銅器中，重湯煎如飴狀，取煎如雞子大壹枚，投溫酒中飲，日叁服。

生飲白草汁　治產後勞復及腎勞方。

白草壹把

右壹味，擣絞取汁，頓服。差，勞復生蟲，去滓取汁，洗眼中蟲出。又屋漏水洗，亦蟲出。

盜汗第二　方四首

鯉魚湯　主婦人體虛流汗不止，或眠中盜汗方。

鯉魚貳斤 葱白切壹升 豉壹升 乾薑 桂心壹兩

右伍味。先以水壹斗煮魚。取六升。去魚。內諸藥。微火煮取貳升。分再服。取微汗即愈。

竹皮湯 治婦人汗血。吐血。尿血。下血。

竹皮參升 乾地黃肆兩 人參半兩 芍藥 當歸 桔梗 桂心各兩 芎藭 甘草炙各貳兩

右玖味。㕮咀。以水柒升。煮取參升。分參服。

吳茱萸湯 治婦人產後虛羸盜汗。時濇濇惡寒。

吳茱萸參兩

右壹味。以清酒參升漬之半日。所煮令蟻鼻沸減得貳升。分服壹升。日再。間日飲。

豬膏煎 治婦人產後體虛寒熱自汗出。

豬膏 生薑汁 白蜜各壹升 清酒伍合

右肆味，合煎，令調和，五上五下，膏成，隨意以酒服，差當用炭火上煎。

下乳第三　方一十六首

鍾乳湯　治婦人乳無汁。

鍾乳　白石脂　消石各一兩　通草　生桔梗各貳兩

右伍味，㕮咀，以水伍升，煮三上三下，餘壹升，去滓，內消石令烊，絞服，無多少，若小兒不能乳，大人嗍之。

漏蘆湯　治婦人乳無汁。

漏蘆　通草各貳兩　鍾乳壹兩　黍米壹升

右肆味，㕮咀，黍米宿漬，揩撻取汁叁升，煮藥叁沸，去滓，飲之，日叁服。

鯽魚湯　婦人下乳汁。

鯽魚長柒寸　猪肪半斤　漏蘆　鍾乳各貳兩

右肆味。㕮咀。藥切。豬脂魚。不須洗。清酒壹斗貳升合煑。魚熟藥成。去滓。適寒温。分五服。即乳下。良。飲其間相去須臾一飲。令藥力相及。

又方

通草　鍾乳　栝樓實　漏蘆各叁兩

右肆味。㕮咀。以水壹斗。煑取叁升。去滓。飲壹升。日叁服。

又方

通草　鍾乳各肆兩

右貳味。切。以酒五升漬一宿。明旦煑沸。去滓。服壹升。日叁服。夏冷服。冬温服之。

又方

石膏肆兩。碎。以水貳升。煑叁沸。稍稍服。一日。令盡。

又方

栝樓實壹枚青色大者。無大者用小者兩枚。無青色者黃色者亦好。

右一味熟擣。以白酒壹斗煮取肆升。去滓服壹升。日叁服。

又方

鬼箭伍兩

右一味切。以水陸升煮取肆升。壹服捌合。日叁服。亦可燒灰水服方寸匕。

鼠肉臛方 治婦人乳無汁。

鼠肉五兩　羊肉陸兩　麞肉半斤

右叁味作臛。勿令疾者知之。

鮑魚大麻子羹 治婦人產後下乳。

鮑魚肉叁斤　麻子人壹升

右貳味與鹽豉葱作羹。任意食之。

又方

通草　鍾乳

右貳味。等分擣篩。作麪粥。服方寸匕。日三服。百日後可兼養兩兒。通草横心白者是。勿取羊桃根色黄者無益。

又方

麥門冬去心　鍾乳　通草　理石

右肆味等分。擣篩。空腹酒服方寸匕。日叁服。

又方

漏蘆叁分　鍾乳　栝樓根伍分　蠐螬叁合

右肆味。擣篩。先食糖水方寸匕。日叁服。

又方

栝樓根叁兩　鍾乳肆兩　漏蘆　滑石　通草各貳兩

白頭翁壹兩

右陸味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日再服。

又方

鍾乳　通草各五分　雲母貳兩半　屋上敗草貳把，燒作灰

甘草壹兩，炙

右五味，擣篩爲散，食後以温漏蘆水服方寸匕，日三服。乳下爲度。

又方

麥門冬去心　鍾乳　通草　理石　乾地黄

土瓜根　蠐螬各等分

右柒味，擣篩爲散，食後酒服方寸匕，日三服。

中風第四方一十一首

甘草湯　治産後在蓐中風，背強不能轉動，名曰風痓。

甘草炙　乾地黄　麥門冬去心　前胡　黄芩

麻黃去節 栝樓根各貳兩 芎藭壹兩 葛根半斤

杏人五十枚去皮尖雙人

右壹拾味。㕮咀。以水壹斗。酒五升。合煑葛根。取捌升。去滓。內諸藥。煑取貳升。分再服。一劑不差。更作之。大良。千金無前胡。

羌活湯

治產後中風。身體疼痛。

羌活 防風 烏頭炮去皮 桂心 芍藥

乾地黃各叁兩 防己 女萎 麻黃去節各壹兩

葛根半斤 生薑各陸兩 甘草炙貳兩

右壹拾貳味。㕮咀。以水玖升。清酒叁升。合煑取叁升。服五合。日三夜壹服。極佳。

治產後中風時煩方。

知母 石膏碎 芍藥 甘草炙各貳兩 半夏洗壹升

生薑切 防風 白朮各叁兩 獨活肆兩 桂心肆兩

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗，清酒五升，合煮取叁升，分叁服。

獨活湯 治産後中風，口噤不得言。

獨活五兩　防風　秦艽　桂心　當歸

附子炮，去皮　白朮　甘草炙，各貳兩　木防己一兩

葛根　生薑各叁兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗貳升，煮取叁升，分叁服。

竹葉湯 治産後中風，發熱，面正赤，喘氣頭痛。

淡竹葉　葛根各叁兩　人參壹兩　防風貳兩　大附子壹枚，炮，去皮

生薑五兩　大棗拾伍枚，擘　桔梗　桂心　甘草炙，各壹兩

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗，煮取貳升半，分貳服，溫覆使汗出。頸項強，用大附子，煎藥揚去沫。若嘔者，加半夏半升，洗。

防風湯 治産後中風，裏急短氣。

防風　葛根　當歸　芍藥　人參

乾薑　甘草炙各貳兩　獨活五兩

右捌味，㕮咀，以水玖升，煑取叁升，分爲叁服。

治産後覺言鬼語，由內虛未定，外客風邪所干方。

羊心壹枚　遠志去心　芍藥　黄芩　牡蠣熬

防風　甘草炙各貳兩　乾地黄　人參各叁兩

右玖味，㕮咀，以水壹斗，煑羊心，取五升，去心，內諸藥，煎取叁升，分爲叁服。

鹿肉湯 治産後風虛頭痛，壯熱，言語邪僻。

鹿肉叁斤　半夏壹升，洗去滑　乾地黄　阿膠炙　芎藭各貳兩

芍藥　獨活　生薑切　黄耆　黄芩

人參　甘草炙各叁兩　桂心貳兩　秦艽五兩　茯神肆兩，一云茯苓一

右壹拾伍味，㕮咀，以水貳斗，煑肉，得壹斗貳升，去肉，下藥煎取叁升，內膠令烊，分肆服，日叁夜壹服。

防風酒 治產後中風。

防風　獨活各壹斤　女萎　桂心各貳兩

茵芋壹兩　石斛伍兩

右肆味，㕮咀，以清酒貳斗漬叁宿。初服壹合，稍加至叁肆合，日叁服。

木防己膏 治產後中風。

木防己半斤　茵芋五兩

右貳味，切，以苦酒玖升漬壹宿，猪膏肆升，煎三上三下，膏成，炙手摩之千遍佳。

獨活壹斤　桂心叁兩　秦艽伍兩

右叁味，㕮咀，以酒壹斗伍升漬叁日，飲伍合，稍加至壹升。不能飲，隨性多少。

心悸第五 方四首

治產後忽苦心中衝悸，或志意不定，恍恍惚惚，言語錯謬，心虛所致方。

人參　茯苓各叁兩　茯神肆兩　大棗叁拾枚，擘　生薑捌兩

芍藥　當歸　桂心　甘草各貳兩

右玖味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升，分服，日叁。

治產後忽苦心中衝悸不定，志意不安，言語錯誤，惚惚憒憒，不自覺方。

遠志去心　人參　麥門冬去心　當歸　桂心

甘草各貳兩　茯苓伍兩　芍藥壹兩　生薑陸兩　大棗貳拾枚，擘

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升，分叁服，日叁。羸者分肆服。產後得此，是心虛所致。無當歸，用芎藭。若其人心肖中逆氣，則加半夏叁兩，洗去滑。

治產後暴苦心悸不定，言語謬誤，恍恍惚惚，心中憒憒，此是

心虛所致方。

茯苓五兩　芍藥　桂心　當歸　甘草炙，各參兩

生薑陸兩　大棗二十枚，擘　麥門冬一升，去心。

右捌味，㕮咀，以水壹斗，煮取參升，分參服。無當歸，用芎藭代。若苦心不定，加人參、遠志各貳兩。若苦煩悶短氣，加生竹葉壹升，先以水壹斗參升，煮竹葉取壹斗，內藥。若有微風，加獨活參兩、麻黃貳兩、桂心貳兩，用水壹斗五升。若頸項苦急，背中強者，加獨活、葛根、麻黃、桂心各參兩，生薑捌兩，以水壹斗五升，煮取參升半，分四服，日參夜壹服。

治產後心衝，恐悸不定，恍恍惚惚，不自知覺，言語錯誤，虛煩短氣，志意不定，此是心虛所致方。

遠志貳兩，去心　人參　茯神　當歸　芍藥

甘草炙，各參兩　大棗拾伍枚，擘　麥門冬壹升，去心。

右捌味。㕮咀。以水壹斗。煑取叁升。分叁服。若苦虛煩短氣者。加生淡竹葉壹升。以水壹斗貳升。煑取壹斗。乃用諸藥。胷中少氣者。益甘草壹兩爲善。

下痢第六 方一十七首

阿膠湯 治產後下痢

阿膠　當歸　黃蘗　黃連各壹兩　陳廩米壹升

蠟如綦子叁枚

右陸味。㕮咀。以水捌升煑米蟹目沸。去米內藥。煑取貳升。去滓內膠蠟令烊。分肆服。一日令盡。

桂心湯 治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血。

桂心　甘草各貳兩　白蜜壹升　乾薑貳兩　當歸叁兩

赤石脂拾兩綿裹　附子壹兩炮去皮破

右柒味，㕮咀，以水陸升，煮取叁升，內蜜再沸，分叁服。

羊脂湯　治產後下痢，諸療不斷。

羊脂五兩　當歸　乾薑　黃蘗　黃連各叁兩

右伍味，㕮咀，以水玖升，煮取叁升，去滓，內脂令烊，分叁服。

治產後下痢虛乏羸瘦方。

黃雌雞一隻，治如食法，去藏，勿中水　赤小豆貳升　吳茱萸
獨活　人參　黃連　甘草各貳兩　黃芩
麥門冬去心　當歸各叁兩　大棗叁拾枚，擘

右壹拾壹味，㕮咀，以水貳斗，煮雞豆，令餘壹斗，去雞豆，澄清，內藥，煮取叁升，分叁服。雞買成死者。

治產後寒熱下痢方。

鹿肉叁斤　葱白壹把　人參　當歸　黃芩
桂心　甘草各壹兩　芍藥貳兩　豉壹升　生薑切

乾地黃各三兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水貳斗煮肉，取壹斗，內諸藥煮取叁升，分叁服。

當歸湯 治產後下痢腹痛。

當歸 龍骨各叁兩 乾薑 白朮各貳兩 芎藭貳兩半 熟艾 附子炮去皮 甘草炙各壹兩

右捌味，㕮咀，以水陸升，煮取叁升，分叁服，一日令盡。

甘草湯 治產後下痢兼虛極，白頭翁加阿膠。

白頭翁貳兩 黃連 秦皮 黃蘗各叁兩 加阿膠 甘草各貳兩

右陸味，㕮咀，以水柒升，煮取叁升，去滓，內膠令烊，分叁服。

鼈甲湯 治產後早起中風冷，洩痢及帶下。

鼈甲如手大，炙令黃 白頭翁壹兩 當歸 黃連

乾薑貳兩　黃蘗長壹尺廣三寸。

右陸味。㕮咀。以水柒升。煑取叁升。分叁服。千金無白頭翁。

乾地黃湯　治產後下痢。

乾地黃壹兩　白頭翁　乾薑　黃連各壹兩　蜜蠟方寸

阿膠如手掌大一枚

右陸味。㕮咀。以水五升。煑取貳升半。去滓。内膠蠟令烊。分叁服。相去一炊頃。千金無乾薑。

生地黃湯　治產後忽著寒熱下痢。

生地黃五兩　黃連　桂心　甘草各壹兩　淡竹皮貳升

大棗貳拾枚擘　赤石脂貳兩

右柒味。㕮咀。以水壹斗煑竹皮。取柒升。去滓。内藥煑取貳升伍合。分為叁服。

藍青丸　治產後下痢

藍青熬 鬼臼各壹兩半 附子炮壹兩 蜀椒汗壹兩半 黃連五兩去毛

龍骨 當歸各叄兩 黃蘗 人參 茯苓各壹兩

厚朴炙 阿膠炙 艾 甘草炙各貳兩

一方用赤石脂肆兩。

右壹拾肆味，擣篩爲末，鍊蜜和丸如梧子，空腹以飲服貳拾圓。

赤石脂圓 治產後下痢。

赤石脂叄兩 當歸 黃連 乾薑 秦皮

白朮 甘草炙各貳兩 蜀椒汗 附子各壹兩炮去皮

右玖味，擣末，鍊蜜和圓如梧子大，飲服貳拾圓，日叄服。

治產後下痢赤散方。

赤石脂叄兩 桂心壹兩 代赭貳兩

右叄味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日叄夜壹服，拾日當愈。

治產後下痢黑散方

麻黃去節　貫衆　桂心各壹兩　乾漆熬

細辛各貳兩　甘草叁兩炙。

右陸味。擣篩爲散。麥粥服伍指撮。日再。五日當愈。

治產後下痢黃散方。

黃連　大黃各貳兩　黃芩　䗪蟲熬　乾地黃各壹兩

右伍味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日叁服。拾日愈。千金無大黃。

治妊娠及產後寒熱下痢方。

黃蘗壹斤　黃連壹升　梔子貳拾枚

右叁味。㕮咀。以水五升漬一宿。煑三沸。服壹升。壹日壹夜令盡。嘔者。加橘皮壹把。生薑貳兩。

治婦人痢。欲痢輒先心痛。腹脹滿。日夜五六十行方。

神麴熬　石榴皮各捌兩　黃蘗切　黃連切

烏梅肉　艾葉各壹升　防已貳兩　附子五兩炮。乾薑

阿膠各叁兩炙

右壹拾味。擣篩為末。鍊蜜和丸如梧桐子。大飲服貳拾圓。

日叁。漸加至叁拾肆拾圓。

淋渴第七 方一十一首

桑螵蛸湯 治産後小便數。

桑螵蛸叁拾枚炙　鹿茸炙　黃耆各叁兩　生薑肆兩

人參　牡蠣熬　甘草各貳兩炙

右柒味。㕮咀。以水陸升。煑取貳升半。分叁服。

栝樓湯 治産後小便數兼渴。

栝樓根　黃連　麥門冬去心各貳兩　桑螵蛸貳拾枚炙

人參　生薑切　甘草炙各叁兩　大棗拾伍枚擘

右捌味。㕮咀。以水柒升。煑取貳升半。分叁服。

雞肶胵湯 治產後小便數。

雞肶胵貳拾具 雞腸叁具，洗 厚朴炙 人參各貳兩 生薑五兩

麻黃肆兩，去節 大棗貳拾枚，擘 當歸 乾地黃 甘草炙，各貳兩

右壹拾味，㕮咀。以水壹斗，煮雞肶胵腸棗子，柒升。去滓，內藥，煎取叁升半。分叁服。

治婦人結氣成淋。小便引痛，上至少腹。或時溺血，或如豆汁。或如膠飴。每發欲死，食不生肌，面目萎黃。師所不能療方。

貝齒肆枚，燒 葵子壹升 滑石叁兩 石膏五兩

右肆味，㕮咀。以水柒升，煮取貳升。去滓，內豬肪一合，更煎三沸。適寒溫，分叁服。病不差，更合服。

石韋湯 治產後卒淋、血淋、氣淋。

石韋去毛 黃芩 通草各壹兩 榆皮五兩 大棗叁拾枚，擘

葵子貳升 生薑切 白朮各叁兩，一方用芍藥 甘草炙，壹兩。

右㕮咀。以水捌升。煑取貳升半。分叄服。

葵根湯 治產後淋澀。

葵根乾者貳兩切壹升。一云　車前子　亂髮燒　大黃
桂心　滑石各壹兩　通草三兩　生薑切陸兩。

右㕮咀。以水柒升。煑取貳升半。分爲叄服。千金有冬瓜汁柒合。

芧根湯 治產後淋。

白茅根壹斤　桃膠　甘草炙各壹兩。　鯉魚齒壹伯枚擘
生薑切叄兩。　人參　地麥各貳兩　瞿麥　茯苓各肆兩

右㕮咀。以水壹斗。煑取貳升半。分叄服。

鼠婦散 治產後小便不利。

鼠婦七枚熬成屑。酒服之。

滑石散 治產後淋

滑石伍分　通草　車前子　葵子各壹兩

右肆味。擣篩爲散。以醋漿水服方寸匕。稍加至貳匕。

竹葉湯治產後虛渴少氣力。

竹葉　人參　茯苓　甘草炙各壹兩　大棗拾肆枚擘

麥門冬五兩去心　小麥伍合　生薑切　半夏洗各叁兩

右玖味。㕮咀。以水玖升煑竹葉小麥。取柒升。去滓。內藥更煑取貳升半。服五合。日叁夜壹服。

栝樓湯治產後渴不止。

栝樓根肆兩　人參　麥門冬各叁兩去心　大棗叁拾枚擘

土瓜根伍兩　乾地黃　甘草炙各貳兩

右柒味。㕮咀。以水捌升。煑取貳升半。分叁服。

千金翼方卷第七

婦人四

崩中第一　方三十六首

治婦人五崩，身體羸瘦，欬逆煩滿少氣。心下痛。面上生瘡。腰大痛不可俛仰，陰中腫如有瘡之狀。毛中癢，時痛與子藏相通。小便不利。常頭眩。頸項急痛。手足熱，氣逆衝急，煩不得臥。腹中急痛。食不下。吞酸噫苦。腸鳴漏下赤白黃黑汁，大臭如膠汙衣狀。熱即下赤。寒即下白。多飲即下黑。多食即下黃。多藥即下青。喜怒心中常恐。一身不可動搖。大惡風寒。鱉甲散方。

鱉甲炙　乾薑各叁分　芎藭　雲母　代赭各壹兩

烏賊魚骨　龍骨　伏龍肝　白堊

蝟皮炙各壹分　生鯉魚頭　桂心　白朮各半兩

白殭蠶半分

右壹拾肆味，擣篩為散，以淳酒內少蜜，服方寸匕，日三夜貳服。以病者十日差，新病者五日差。若頭風小腹急，加芎藭、桂心各壹兩，佳。忌生冷、豬雞魚肉。

治婦人崩中漏下，赤白青黑，腐臭不可近，令人面黑無顏色，皮骨相連，月經失度，往來無常，小腹弦急，或苦絞痛，上至於心，兩脅腫脹，令人倚坐，氣息乏少，食不生肌膚，腰背疼痛連兩腳，不能久立，但欲得臥，神驗，大慎火草散方。

慎火草　白石脂　鼈甲炙　黃連　細辛

石斛　芎藭　乾薑　芍藥　當歸

熟艾　牡蠣熬　禹餘粮各貳兩　桂心壹兩

薔薇根皮　乾地黃各肆兩

右壹拾陸味，擣篩為散，空腹酒服方寸匕，日三服，稍增至

貳匕。若寒多加附子及椒。用椒當汗。去目閉口者。熱多加
知母黃芩。加石斛兩倍。白多加乾薑白石脂。赤多（一方云青黑）
加桂心代赭。各貳兩。

治婦人崩中及痢。一日夜數十起。大命欲死。多取諸根煎丸。
得入腹即活。若諸根難悉得者。第一取薔薇根。令多多乃合
之。遇有酒以酒服。無酒以飲服。其種種根當得貳斛為佳。

薔薇根煎方。

薔薇根　柿根　菝葜　懸鉤根（各壹斛）

右肆味。皆剉。入合著釜中。以水淹使上餘肆伍寸。水煮使參
分減壹。去滓。無大釜。稍煮如初法。都畢會汁。煎如飴。可為
丸如梧桐子大。服拾丸。日參服。

治婦人崩中。去赤白。或如豆汁。伏龍肝湯方。

伏龍肝（如彈丸大柒枚）　赤石脂　桂心　艾

甘草炙各貳兩　生地黃切肆升　生薑貳兩

右柒味。㕮咀。以水壹斗。煮取叁升。分肆服。日叁夜壹服。

治婦人崩中。血出不息。逆氣虛煩。熟艾湯方。

熟艾壹升　蟹爪壹升　淡竹茹壹把　伏龍肝半斤　蒲黃貳兩

當歸壹兩　乾地黃　芍藥　桂心　阿膠

茯苓各貳兩　甘草伍寸炙。

右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗玖升。煮艾取壹斗。去滓。內藥

煮取肆升。內膠令烊盡。壹服壹升。壹日令盡。羸人以意消

息之。可減伍陸合。

治婦人崩中漏血不絕。地榆湯方。

地榆根　柏葉各捌兩　蟹爪　竹茹各壹升　漏蘆叁兩

茯苓壹兩　蒲黃叁合　伏龍肝半斤　乾薑　芍藥

當歸　桂心　甘草炙各貳兩

右壹拾叁味，㕮咀，以水壹㪷伍升煑地楡根，減叁升，內諸藥，更煑取肆升，分服，日叁夜壹服。

治婦人產後崩中去血，逆氣盪心，胷生瘡，煩熱，甘草芍藥湯方。

甘草炙　芍藥　當歸　人參　白朮各壹兩

橘皮壹把　大黃半兩

右柒味，㕮咀，以水肆升，煑取貳升，分再服，相去一炊頃。

治婦人崩中下血，櫸柳葉湯方。

櫸柳葉叁斤　麥門冬去心　乾薑各貳兩　大棗拾枚，擘　甘草壹兩，炙

右伍味，㕮咀，以水壹㪷，煑櫸柳葉，取捌升，去滓，內諸藥，又煑取叁升，分叁服。

治婦人暴崩中，去血不止，薊根酒方。

大小薊根各壹斤

右二味，以酒壹㪷漬五宿，服之，隨意多少。

治婦人崩中赤白不絕困篤，禹餘粮圓方。

禹餘粮伍兩　烏賊魚骨叁兩　白馬蹄拾兩，炙令黃

龍骨叁兩　鹿茸貳兩，炙

右伍味，擣篩，鍊蜜和丸如梧子，酒服貳拾丸，日貳服，不知，稍加至叁拾丸。

治婦人積冷，崩中去血不止，腰背痛，四肢沉重虛極，大牛角中人散方。

牛角中人壹枚，燒　防風貳兩　乾地黃　桑耳

蒲黃　乾薑　赤石脂　禹餘粮　續斷

附子炮，去皮　白朮　龍骨　礬石燒　當歸各叁兩

人參壹兩

右壹拾伍味，擣篩為散，溫酒服方寸匕，日叁服，不知，漸加之。

治婦人崩中下血虛羸少力，調中補虛止血方。

澤蘭熬。玖分　蜀椒去目。閉口者。汗。柒分　代赭　藁本
桂心　細辛　乾薑　防風各壹兩　乾地黃
牡蠣熬。各壹兩半　栢子仁　厚朴炙。各叁八分　當歸
芎藭　甘草炙。各柒分　山茱萸　蕪荑各半兩
右壹拾柒味。擣篩爲末。錬蜜和丸。如梧子。空腹酒服拾丸。
日叁服。漸加至貳拾丸。神效。一方用白芷龍骨各叁八分。人參柒八分爲貳拾味。
治婦人崩中下血。切痛不止方。
桑耳赤色　牡蠣熬。令變色。各叁兩　龍骨貳兩　黃芩
芍藥　甘草炙。各壹兩
右陸味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日叁服。稍增。以知爲度。
治婦人傷中崩中絶陰。使人怠惰。不能動作。背脅心腹四肢
滿。而身寒熱。甚溺血。桑根煎方。
桑根白皮細切壹斗。麻子仁叁升。淳清酒叁斗。煮得壹

㪷。絞去滓。大棗百枚去皮核。飴伍升。阿膠伍兩。白蜜叁升。復煎得玖升。下乾薑末厚朴闊貳寸長貳尺末。蜀椒末叁味。各壹升。桂心長壹尺貳寸。甘草㮣兩。蘗米末壹升。乾地黃肆兩。芍藥陸兩。玄參伍兩。丸如彈丸。日叁枚。

又方

小薊根葉剉　庠母各拾斤剉。

右壹味。以水伍㪷。合釜中煑爛熟。去滓。內銅器中。煎餘肆升。分肆服。壹日令盡。庠字未詳。不敢刑正。

治婦人崩中方。

白茅根貳斤　小薊根伍斤

右貳味。切。以水伍㪷。合煎。取肆升。分稍稍服之。

治婦人崩中去血及產後餘病。丹參酒方。

丹參　地黃　忍冬　地榆　艾各伍斤

右五味。先燥熟舂之。以水漬三宿。去滓。煮取汁。以黍米壹斛。釀如酒法。熟。初服肆合。稍增之。神良。

治婦人崩中去赤白方。

取倚死竹蛭。燒末。飲服半方寸匕。神良。

治婦人崩中漏下方。

取梧桐木長壹尺。燒作灰。擣篩爲散。以温酒服方寸匕。日叁服。

治婦人白崩中方。

芎藭貳兩 乾地黄 阿膠 赤石脂 桂心

小薊根貳兩

右陸味。㕮咀。以酒陸升。水四升。合煮取叁升。去滓。内膠令烊盡。絞去滓。分叁服。千金有伏龍肝如雞子大七枚。

治婦人白崩中馬通汁方。

白馬通汁貳升　乾地黃肆兩　芎藭

阿膠　小薊根　白石脂　桂心各貳兩　伏龍肝如雞子大七枚

右捌味。㕮咀。以酒柒升合馬通汁。煮取叁升。去滓。內膠令烊盡。分叁服。

治婦人帶下五賁。一曰熱病下血。二曰寒熱下血。三曰月經未斷為房室。即漏血。四曰經來舉重傷任脈下血。五曰產後藏開經利。五賁之病。外實內虛。小牛角鰓散方。

小牛角鰓伍枚，燒令赤　龍骨壹兩　禹餘粮　乾薑

當歸各貳兩　阿膠炙　續斷各叁兩

右柒味。擣篩為散。空腹酒服方寸匕。日叁服。千金有赤小豆鹿茸烏賊魚骨為拾味。

治婦人緩下十二病絕產。一曰白帶。二曰赤帶。三曰經水不利。四曰陰胎。五曰子藏堅。六曰子藏僻。七曰陰陽患痛。八曰

腹強。一作內強九日腹寒。十日五藏閉。十一日五藏酸痛。十二日

夢與鬼爲夫婦。龍骨散方。緩下。千金作淳下。

龍骨參兩　白殭蠶伍枚　烏賊魚骨　代赭各肆兩

半夏洗　桂心　伏龍肝　乾薑　黃蘗各貳兩

石葦去毛　滑石各壹兩

右壹拾壹味。擣篩爲散。溫酒服方寸匕。日三服。多白加烏賊魚骨白殭蠶各貳兩。多赤加代赭伍兩。小腹寒加黃蘗貳兩。子藏堅加薑桂各貳兩。各隨疾增之。服藥三月有子。住藥。藥太過多生兩子。當審方取藥。寡婦童女不可妄服。

治產後下血不止方。

菖蒲伍兩剉

右壹味。以清酒伍升。煑取貳升。分貳服。

治婦人下血阿膠散方。

阿膠炙捌兩　烏賊魚骨貳兩　芍藥肆兩　當歸壹兩

右肆味，擣篩為散，以蜜溲如麥飯，先食以葱羹汁服方寸匕，日叁夜壹服。一方桑耳壹兩。

治諸去血蠱方。

鹿茸炙　當歸各叁兩　瓜子伍合　蒲黃伍兩

右肆味，擣篩為散，酒服方寸匕，日叁服，不知稍增。

治婦人漏血崩中鮑魚湯方。

鮑魚　當歸各叁兩　阿膠炙肆兩　艾如雞子大叁枚

右肆味，以酒叁升，水貳升，合煮取貳升伍合，去滓，內膠烊令盡，壹服捌合，日叁服。

治婦人叁拾陸疾，胞中病，漏下日不絕，白堊丸方。

邯鄲白堊　牡蠣熬　禹餘粮　白芷

烏賊魚骨　乾薑　龍骨　白石脂

桂心 瞿麥 大黃 石韋去毛 白斂

細辛 芍藥 黃連 附子炮去皮 鍾乳

茯苓 當歸 蜀椒汗去目閉口者 黃芩

甘草炙各半兩

右貳拾叁味。擣篩為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。酒服伍丸。日貳。不知漸加至拾丸。

治婦人漏血不止。大崩中方。

龍骨 芎藭 附子炮去皮 芍藥 禹餘粮

乾薑各叁兩 赤石脂肆兩 當歸 桂心各壹兩 甘草炙伍分。

右壹拾味。擣篩為散。以溫酒服方寸匕。日叁服。稍加至貳匕。白多更加赤石脂壹兩。

治婦人漏血積月不止。馬通湯方。

赤馬通汁壹升。取新馬矢絞取汁。乾者水浸絞取汁。無赤馬凡馬亦得。 當歸

阿膠炙　乾薑各壹兩　生艾壹把　書墨彈丸大

右陸味。㕮咀。以水捌升。清酒貳升。合煮取叁升。去滓。內馬通汁及膠。微火煎取貳升。適寒溫。分再服。相去壹炊頃飲之。

治婦人白漏不絕。馬蹄骨湯方。

白馬蹄炙令焦　赤石脂各伍兩　禹餘粮

烏賊魚骨　龍骨　牡蠣熬　乾地黃

當歸各肆兩　附子炮去皮叁兩　白殭蠶熬壹兩。　甘草炙貳兩。

右壹拾壹味。㕮咀。以水壹斗陸升。煮取叁升半。分肆服。日叁夜壹服。

治婦人漏血不止方。

乾地黃　大黃各陸兩　芎藭四兩　阿膠伍兩　人參

當歸　甘草炙。各叁兩

右柒味。㕮咀。以酒壹斗。水伍升。合煮取陸升。去滓。內膠烊

令盡壹服壹升。日參夜壹服。

治婦人白漏不絕。馬蹄丸方。

白馬蹄（肆兩炙令黃） 烏賊魚骨 白殭蠶

赤石脂（各貳兩） 禹餘糧 龍骨（各參兩）

右陸味。擣篩爲末。鍊蜜和丸如梧子。酒服拾丸。不知。漸加至貳拾丸。

治婦人漏下。慎火草散方。

慎火草（拾兩熬令黃） 當歸 鹿茸（一作鹿角）

阿膠（各肆兩炙） 龍骨（貳分）

右伍味。擣篩爲散。先食酒服方寸匕。日參服。

治婦人漏下不止。蒲黃散方。

蒲黃（半升） 鹿茸（炙） 當歸（各貳兩）

右參味。擣篩爲散。酒服半方寸匕。日參服。不知。漸加至壹

方寸匕。

治婦人胞落不安。血漏下相連。月水過度。往來或多或少。小腹急痛上搶心。脅脹。食不生肌方。

蟬甲（炙叁兩）　禹餘粮　乾地黃（各陸兩）　蜂房（炙）

蛇皮（炙各壹兩）　蝟皮（炙壹具）　乾薑　防風　烏賊魚骨

桑螵蛸（炙）　䗪蟲（熬）　甘草（炙各貳兩）

右壹拾貳味。擣篩為末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。空腹酒服拾丸。日叁服。漸加至貳拾丸。

月水不利第二（方叁拾肆首）

治婦人月水不利。閉塞絕產十八年。服此藥二十八日有子。金城太守白薇丸方。

白薇　細辛（各伍分）　人參　杜蘅　半夏（洗）

厚朴（炙）　白殭蠶　牡蒙（各叁分）　牛膝　沙參

乾薑各半兩 附子炮，壹兩半 秦艽壹兩半 當歸叁分

蜀椒壹兩半，去目、閉口者，汗 紫菀叁分 防風壹兩半

右壹拾柒味，擣篩，鍊蜜和爲丸，如梧桐子。先食酒服叁丸。不知，稍增至肆伍丸。此藥不用長服，覺有身則止。崔氏有桔梗、丹參各叁分。

治經年月水不利，胞中有風冷，故須下之，大黃朴消湯方。

大黃 牛膝各伍兩 代赭 乾薑 細辛各壹兩

水蛭熬 䖟蟲去翅足，熬 芒消各貳兩 桃仁叁升，去皮尖、雙人者

麻子仁伍合 牡丹皮 紫葳各叁兩，一云紫菀 甘草炙，叁兩

朴消叁兩

右壹拾肆味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升，去滓，内消烊令盡，分叁服，五更即服，相去壹炊頃，自下。下之後，將息勿見風。

治婦人月水不利，小腹堅急，大便不通，時時見有物下，如鼻

涕。或如雞子白。皆胞中風冷也。方。

大黃肆兩　吳茱萸貳升　芍藥參兩　當歸　乾地黃

黃芩　乾薑　芎藭　桂心　牡丹皮

芒消　人參　細辛　甘草炙各貳兩　水蛭熬

䗪蟲各伍拾枚去翅足熬。　桃仁伍拾枚去皮尖。　黃雌雞壹隻治如食法。勿令中水

右壹拾捌味。㕮咀。以清酒伍升漬藥壹炊久。又別以水貳㪷煑雞。取壹㪷。去雞。下藥。合煑取參升。絞去滓。內芒消烊令盡。攪調。適寒溫服壹升。日參服。

治月水不利小腹痛方。

牡丹皮　當歸　芎藭　黃芩　大黃

乾薑　人參　細辛　消石　芍藥

桂心　甘草炙各貳兩　水蛭熬　䗪蟲去翅足熬　桃仁各伍拾枚去皮尖。

蠐螬參拾枚熬　乾地黃參兩　黃雌雞壹隻治如食法

右壹拾捌味，㕮咀，以清酒伍升漬壹宿，別以水貳㪷煑雞，取壹㪷伍升，去雞，內藥煑取叁升，去滓，內消石烊，令盡，適寒温壹服壹升，日叁服。

治久寒月水不利，或多或少方。

吴茱萸叁升　生薑壹斤　桂心壹尺　大棗貳拾枚，擘　桃仁伍拾枚，去皮尖
人參　芍藥各叁兩　小麥　半夏洗，各壹升　牡丹皮肆兩
牛膝貳兩　水蛭熬　䗪蟲熬　蝱蟲去翅足，熬　甘草炙，各壹兩

右壹拾伍味，㕮咀，以清酒叁升，水壹㪷，煑取叁升，去滓，適寒温服壹升，日叁服。不能飲酒者，以水代之。湯臨欲成，乃內諸蟲。病人不耐藥者，則飲柒合。

治婦人月水不利，腹中滿，時自減，并男子膀胱滿急，抵党湯。

方　大黃貳兩　桃仁叁拾枚，去皮尖兩仁，炙　水蛭貳拾枚，熬　虎杖貳兩，炙，一云虎掌

右肆味，㕮咀，以水叁升，煑取壹升，頓服之，當即下血。

又方

當歸　桂心　乾漆熬　大棗擘　䗪蟲去足翅熬

水蛭各貳兩熬　芍藥　細辛　黃芩　萎蕤

甘草炙各壹兩　吳茱萸　桃仁各壹升去皮尖兩仁

右壹拾叁味，㕮咀，以酒壹斗漬壹宿，明日煑之，取叁升，分叁服。

治婦人月水不利方。

當歸　芍藥　乾薑　芒消　吳茱萸各貳兩

大黃肆兩　桂心叁兩　甘草炙壹兩　桃仁去皮尖叁拾枚

右玖味，㕮咀，以水玖升，煑取叁升，去滓，內芒消，烊令盡，分叁服。

治婦人胸脅滿，月水不利，時繞臍苦痛，手足煩熱，兩脚酸。

溫經丸方

乾薑　吳茱萸　附子（炮去皮）　大黃　芍藥（各叁兩）
黃芩　乾地黃　當歸　桂心　白朮（各貳兩）
人參　石韋（去毛各壹兩）　蜀椒（壹合去目及閉口汗）　桃仁（柒拾枚去皮尖及雙仁熬）
薏苡仁（壹升）
右壹拾伍味，擣篩為末，鍊蜜和丸如梧桐子，先食酒服壹
丸，日叁服，不知稍加之，以知為度。
治婦人月水不利，手足煩熱，腹滿，不欲寐，心煩，柒熬丸方。
大黃（半兩熬）　前胡　芒消（各伍分）　乾薑（叁分）　茯苓（貳分半）
杏仁（去皮尖雙仁壹分半熬）　蜀椒（去目及閉口汗）　葶藶（各貳分熬）
桃仁（貳拾枚去皮尖雙仁熬）　水蛭（半合熬）　䗪蟲（半合去足熬）
右壹拾壹味，擣篩為末，鍊蜜和丸如梧桐子，飲服柒丸，日
叁服，漸加至拾丸，治寒先食服之。（千金有芎藭叁分。）
治婦人帶下，寒氣血積，腰腹痛，月水時復不調，手足厥逆，氣

上盪心害飲食方。

茯苓　枳實炙　乾薑各半兩　芍藥　黃芩

桂心　甘草炙各壹兩

右柒味，㕮咀，以水肆升，煮取貳升，分貳服，服別相去壹炊須。諸月水不調，皆悉主之。

治婦人月水不調，或月前，或月後，或如豆汁，腰痛如折，兩脚疼，胞中風冷，牡丹大黃湯方。

牡丹皮叄兩　大黃　朴消各肆兩　桃仁壹升去皮尖雙仁者

陽起石　人參　茯苓　水蛭熬　䗪蟲去翅足熬

甘草炙各貳兩

右壹拾味，㕮咀，以水玖升，煮取叄升，去滓，內朴消，令烊盡，分叄服，服別相去如壹炊須。

治婦人月水不調，或在月前，或在月後，或多或少，乍赤乍白。

陽起石湯方。

陽起石（貳兩） 附子（壹兩，炮，去皮）。 伏龍肝（伍兩） 生地黄（切，壹升）

乾薑 桂心 人參 甘草（炙，各貳兩） 續斷（貳兩）

赤石脂（各叁兩）

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升貳合，分肆服，日叁夜壹服。

治月水不調，或一月再來，或兩月三月一來，或月前或月後，閉塞不通，宜服杏仁湯方。

杏仁（去皮尖，雙仁） 桃仁（去皮尖，雙仁） 䖟蟲（去翅足，熬）

水蛭（熬，各叁拾枚） 大黄（叁兩）

右伍味，㕮咀，以水陸升，煑取貳升伍合，分爲叁服，壹服其病當隨大小便有所下，若下多者，止勿服；若少者，則盡貳服。

治婦人産生餘疾，月水時來，腹中絞痛方

朴消　當歸　薏苡仁　桂心各貳兩　大黃肆兩

代赭　牛膝　桃仁去皮尖兩仁熬各壹兩

右捌味，擣篩為末，鍊蜜和丸如梧桐子。先食酒服伍丸，日叁服。不知，稍增之。

治婦人經水來繞臍痛，上搶心胸，往來寒熱如瘧狀方。

薏苡仁　代赭　牛膝各貳兩　茯苓壹兩　大黃捌兩

䗪蟲貳拾枚熬　桃仁伍拾枚去皮尖雙仁熬　桂心伍寸

右捌味，擣篩為散，宿不食，明朝空腹溫酒服壹錢匕。

治婦人月事往來腰腹痛方。

䗪蟲肆枚熬　女青　芎藭各壹兩　蜀椒去目及閉口汗

乾薑　大黃各貳兩　桂心半兩

右柒味，擣篩為散，先食酒服壹刀圭，服之拾日，微去下，善養之佳。

治婦人月事不通。小腹堅痛。不得近。乾漆湯方。

乾漆熬　大黃　黃芩　當歸　芒消

桂心各壹兩　附子壹枚炮去皮　吳茱萸壹升

萎蕤　芍藥　細辛　甘草各貳兩

右壹拾貳味。㕮咀。以清酒壹斗。漬壹宿。煑取叄升。絞去滓。內芒消。烊令盡。分叄服。服別相去壹炊頃。

又方

大黃叄兩　桃仁壹升去皮尖及雙仁　芒消　土瓜根

當歸　芍藥　丹砂各貳兩研

右柒味。㕮咀。以水玖升。煑取叄升。去滓。內丹砂末及芒消。烊令盡。為叄服。服別相去壹炊頃。將下。千金有水蛭貳兩

治月水不通。心腹絞痛欲死。通血止痛。嚴蜜湯方。

吳茱萸　大黃　當歸　乾薑　蝱蟲去翅足熬

水蛭熬　乾地黃　芎藭各貳兩　梔子仁拾肆枚

桃仁壹升去皮尖熬　芍藥叁兩　細辛　甘草炙各壹兩

桂心壹兩　牛膝叁兩　麻仁半升

右壹拾陸味，㕮咀，以水玖升，煑取貳升半，分叁服，日叁服，服相去壹炊頃。

治瘕月水瘀血不通，下病散方：

大黃　細辛　朴消各壹兩　消石　附子炮去皮

䗪蟲各叁分去翅足熬　黃芩　乾薑各壹兩　芍藥

土瓜根　代赭　丹砂各貳兩　牛膝壹斤

桃仁貳升去皮尖雙仁　蠐螬貳拾枚炙

右壹拾伍味，㕮咀，以水酒各伍升，漬藥壹宿，明旦乃煑取肆升，去滓，內朴消、消石，烊令盡，分肆服，服別相去如壹炊頃。去病後宜食黃鴨羹。

又方

水蛭熬　土瓜根　芒消　當歸各貳兩　桃仁壹升，去皮尖

大黃　桂心　麻子　牛膝各叁兩

右玖味，㕮咀，以水玖升，煑取叁升，去滓，內芒消烊令盡，分叁服，服別相去壹炊頃。

治月水不通，結成癥堅如石，腹大骨立，宜破血下癥物方。

大黃　消石熬令沸定，各叁兩　蜀椒去目閉口，汗，壹兩

代赭　乾漆熬　芎藭　茯苓　乾薑

䗪蟲去翅足，熬，各貳兩　巴豆貳拾枚，去皮心，熬

右壹拾味，擣篩爲末，別治巴豆令如脂，鍊蜜丸如梧桐子大，酒服叁丸，漸加至伍丸，空腹爲始，日貳服。千金有朋砂、柴胡、水蛭、土瓜根，爲壹拾肆味。

治產後月水往來，乍多乍少，仍不復通，裏急，下引腰身重，牛

膝丸方。

牛膝　桂心　大黄　芎藭各叁兩　當歸

芍藥　人參　牡丹皮各貳兩　水蛭熬

䗪蟲熬，去足　虻蟲熬，各拾枚　蠐螬熬　蜚蠊蟲各拾枚，去翅足，熬

右壹拾叁味，擣篩爲末，鍊蜜和丸，如梧桐子大，空腹溫酒下伍丸，日叁服，不知，漸增至拾丸。

治月水閉不通，洒洒往來寒熱方。

䗪蟲去翅足，熬，壹兩　桃仁拾兩，去皮尖雙仁，熬　桑螵蛸半兩

代赭　水蛭熬　蠐螬熬，各貳兩　大黄叁兩

右柒味，擣篩爲末，別擣桃仁如膏，乃合藥，鍊蜜和爲丸，如梧桐子大，酒服伍丸，日貳服。

治月水不通，手足煩熱，腹滿，默默不欲寐，心煩方。

芎藭伍兩半　芒消　柴胡各伍兩　茯苓貳兩　杏仁伍合，去皮尖雙仁，熬

大黃壹斤　蜀椒伍合去目汗　水蛭熬

䗪蟲去翅足熬各半兩　桃仁壹百枚去皮尖雙仁熬　蝱蟲熬

牡丹皮各貳兩　乾薑陸兩　葶藶子伍合熬令紫色

右壹拾肆味，擣篩為末，別擣桃仁杏仁如泥，錬蜜和為丸。如梧桐子大，空腹酒服柒丸，日叁服，不知，稍增之。此方與前條熬丸桐多參味。

治腰腹痛，月水不通利方。

當歸肆兩　芎藭　人參　牡蠣熬　土瓜根

水蛭熬各貳兩　䗪蟲去翅足熬　丹砂研　烏頭炮去皮　乾漆熬各壹兩

桃仁伍拾枚去皮尖兩仁熬別擣如泥

右壹拾壹味，擣篩為末，錬蜜和丸，如梧桐子大，空腹酒服叁丸，日叁服。

治月閉不通，不欲食方。

大黃壹斤　柴胡　芒消各伍兩　牡蠣壹兩。熬

葶藶子貳兩。熬令紫色。別擣　芎藭貳兩半　乾薑叁兩

蜀椒壹拾兩。去目及閉口者。汗　茯苓叁兩半　杏仁伍合。熬。別擣如膏

䗪蟲熬。去翅足　水蛭熬。各半兩　桃仁柒拾枚。去皮尖雙仁。熬。別擣如膏

右壹拾叁味。擣篩爲末。和前件葶藶桃仁杏仁等脂。鍊蜜和爲丸。如梧桐子大。飲服七丸。日再。亦與七熬丸同。多貳味。

治月水不通六七年。或腫滿氣逆。腹脹瘕痛。服此方數有神效。大䗪蟲丸方。

䗪蟲肆百枚。去翅足。熬　水蛭叁百枚。熬　蠐螬壹升。熬　乾地黃

牡丹皮　乾漆熬　土瓜根　芍藥　牛膝

桂心各肆兩　黃芩　牡蒙　桃仁熬。去皮尖雙仁。各叁兩

茯苓　海藻各伍兩　葶藶伍合。熬令紫色　吳茱萸貳兩

右壹拾柒味。擣篩爲末。別擣桃仁葶藶如脂。鍊蜜和爲丸。

如梧桐子大。酒服柒丸。日叁服。千金有芒消人參。

治月水不通閉塞方。

牛膝壹斤 麻子仁叁升。蒸之 土瓜叁兩 桃仁貳升。熬。去皮尖雙仁

右肆味。以酒壹斗伍升漬伍宿。壹服伍合。漸增至壹升。日壹服。多飲益佳。

治婦人產後風冷。留血不去。停結月水閉塞方。

菴蕳子 桃仁去皮尖雙人。熬 麻子仁碎。各貳升

右叁味。以酒叁斗。合煑至貳斗。壹服伍合。日叁服。稍加至壹升佳。

治月水閉不通。結瘕腹大如甌。短氣欲死。虎杖煎方。

虎杖壹伯斤。去頭腦。洗去土。暴燥。切。 土瓜根汁 牛膝汁各貳

右叁味。以水壹斛漬虎杖壹宿。明旦煎。餘貳斗。內土瓜牛膝汁。攪令調。於湯器中煎使如飴糖。酒服壹合。日貳夜壹

服。當下。若病去。但令服盡。

治帶下。月經閉不通方。

大黃(陸兩)　朴消(伍兩)　桃仁(去皮尖及雙仁)　蝱蟲(去翅足各壹升並熬)

右肆味。擣篩爲末。別擣桃仁如膏。以淳苦酒肆升。以銅鐺著火上煎減壹升。內藥叁校之。又減壹升。內朴消。煎如餳可止。丸如雞子。投壹升美酒中。當宿不食服之。至日西下。或如豆汁。或如雞肝凝血蝦蟇子。或如膏。此是病下也。

治月水不通。陰中腫痛。菖蒲湯方。

菖蒲　當歸(各貳兩)　葱白(壹升切)　吳茱萸　阿膠(各壹兩熬)

右伍味。㕮咀。以水玖升。煑取叁升。內膠烊令盡。分爲叁服

損傷第三　方七首

治婦人因其夫陰陽過度。玉門疼痛。小便不通。白玉湯方。

白玉(貳兩半)　白朮　澤瀉(各貳兩)　肉蓯蓉　當歸(各伍兩)

右伍味，㕮咀，先以水壹㪷，煮王伍拾沸，去王，內藥煎取貳升，分叄服，每服相去壹炊頃。

治婦人傷丈夫，苦頭痛，欲嘔，心悶，桑白皮湯方。

桑白皮半兩　乾薑壹累　桂心伍寸　大棗貳拾枚，擘

右肆味，㕮咀，以水貳大升，煮取捌合，分貳服。千金一云以酒壹斗，煮叄肆沸，去滓，分溫服之，適衣，無令汗出。

治婦人嫁痛單行方。

大黃叄分

右壹味，切，以好酒壹升，煮十沸，頓服。

治婦人小戶嫁痛連日方。

芍藥半兩　生薑切　甘草炙，各叄分　桂心壹分

右肆味，㕮咀，以酒貳升，煮叄沸，去滓，適寒溫，分服。

治婦人小戶嫁痛單行方。

牛膝伍兩

右壹味。切。以酒叁升。煮再沸。去滓。分叁服。

治婦人小戶嫁痛方。

烏賊魚骨貳枚

右壹味。燒成屑。以酒服方寸匕。日叁服。立差。

治婦人姙身。為夫所動欲死。單行竹瀝汁方。

取淡竹斷兩頭節。留中節。以火燒中央。以器承兩頭得汁飲之。立差。

千金翼方卷第八

千金翼方卷第九

傷寒上

論曰傷寒熱病自古有之名賢濬哲多所防御至於仲景特有神功尋思旨趣莫測其致所以醫人未能鑽仰嘗見太醫療傷寒惟大青知母等諸冷物投之極與仲景本意相反湯藥雖行百無一效傷其如此遂披傷寒大論鳩集要妙以為其方行之以來未有不驗舊法方證意義幽隱乃令近智所迷覽之者造次難悟中庸之士絕而不思故使閭里之中歲致夭枉之痛遂想令人慨然無已今以方證同條比類相附須有檢討倉卒易知夫尋方之大意不過三種一則桂枝二則麻黃三則青龍此之三方凡療傷寒不出之也其柴胡等諸方皆是吐下發汗後不解之事非是正對之法術數未深而天下名賢止而不學誠可悲夫又有僕隷卑下冒犯風寒

天行疫癘。先被其毒。憫之酸心。聊述茲意。爲之救法。方雖是舊。弘之惟新。好古君子。嘉其博濟之利。無嗤誚焉。

太陽病用桂枝湯法第一 伍拾柒證 方伍首

論曰。傷寒與痓病濕病及熱暍相濫。故敘而論之。

太陽病。發熱無汗。而反惡寒。是爲剛痓。

太陽病。發熱汗出。而不惡寒。是爲柔痓。一云惡寒。

太陽病。發熱。其脉沉細。是爲痓。

太陽病。發其汗。因致痓。

病者身熱足寒。頸項強。惡寒。時頭熱。面赤。目脉赤。獨頭動搖。是爲痓。

右件痓狀。

太陽病而關節疼煩。其脉沉緩。爲中濕。

病者一身盡疼煩。日晡即劇。此爲風濕汗出所致也。

濕家之爲病。一身盡疼。發熱。而身色似熏黃也。

濕家之爲病。其人但頭汗出。而背強。欲得被覆。若下之早。即噦。或胷滿。小便利。舌上如胎。此爲丹田有熱。胷上有寒。渴欲飲則不能飲。而口燥也。

濕家下之。額上汗出。微喘。小便利者死。下利不止者亦死。

問曰。病風濕相摶。身體疼痛。法當汗出而解。值天陰雨溜下不止。師云此可發汗。而其病不愈者。何故。荅曰。發其汗。汗大出者。但風氣去。濕氣續在。是故不愈。若治風濕者。發其汗微微似欲出汗者。則風濕俱去也。

病人喘。頭痛鼻窒而煩。其脉大。自能飲食。腹中獨和。無病。病在頭中寒濕。故鼻窒。内藥鼻中即愈。

右件濕狀。

太陽中熱暍是也。其人汗出惡寒。身熱而渴也。

太陽中暍。身熱疼重而脉微弱。此以夏月傷冷水。水行皮膚中也。

太陽中暍。發熱惡寒。身重而疼痛。其脉弦細芤遲。小便已洗然手足逆冷。小有勞熱。口前開板齒燥。若發其汗。惡寒則甚。加溫針。發熱益甚。數下之。淋復甚。

右件暍狀。

太陽之爲病。頭項強痛而惡寒。

太陽病。其脉浮。

太陽病。發熱汗出而惡風。其脉緩。爲中風。

太陽中風。發熱而惡寒。

太陽病三四日。不吐下。見芤。乃汗之。

夫病有發熱而惡寒者。發於陽也。不熱而惡寒者。發於陰也。發於陽者。七日愈。發於陰者。六日愈。以陽數七。陰數六。故也。

太陽病頭痛至七日以上自愈者，其經竟故也。若欲作再經者，針足陽明，使經不傳則愈。

太陽病欲解時，從巳盡未。

風家表解而不了了者，十二日愈。

太陽中風，陽浮而陰濡弱，浮者熱自發，濡弱者汗自出，濇濇惡寒，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾嘔者，桂枝湯主之。

太陽病發熱汗出，此爲榮弱衛強，故使汗出，以救邪風，桂枝湯主之。

太陽病頭痛發熱，汗出惡風，桂枝湯主之。

太陽病項背強几几，而反汗出惡風，桂枝湯主之。本論云桂枝加葛根湯

太陽病下之，其氣上衝，可與桂枝湯；不衝，不可與之。

太陽病三日，已發汗吐下温針而不解，此爲壞病，桂枝湯復不中與也。觀其脉證，知犯何逆，隨證而治之。

桂枝湯本爲解肌。其人脉浮緊。發熱無汗。不可與也。常識此勿令誤也。

酒客不可與桂枝湯。得之則嘔。酒客不喜甘故也。

喘家作桂枝湯。加厚朴杏仁佳。

服桂枝湯吐者。其後必吐膿血。

太陽病初服桂枝湯。而反煩不解者。當先刺風池風府。乃却與桂枝湯則愈。

太陽病外證未解。其脉浮弱。當以汗解。宜桂枝湯。

太陽病下之微喘者。表未解故也。宜桂枝湯。一云麻黄湯

太陽病有外證未解。不可下之。下之爲逆。解外宜桂枝湯。

太陽病先發汗不解。而下之。其脉浮。不愈。浮爲在外。而反下之。故令不愈。今脉浮。故在外。當解其外則愈。宜桂枝湯。

病常自汗出。此爲榮氣和。衛氣不和故也。榮行脉中。衛行脉

外。復發其汗。衛和則愈。宜桂枝湯。

病人藏無他病。時發熱。自汗出而不愈。此衛氣不和也。先其時發汗愈。宜桂枝湯。

傷寒。不大便六七日。頭痛有熱。與承氣湯。其大便反青。此爲不在裏。故在表也。當發其汗。頭痛者必衄。宜桂枝湯。

傷寒發汗已解。半日許復煩。其脉浮數。可復發其汗。宜服桂枝湯。

傷寒。醫下之後。身體疼痛。清便自調。急當救表。宜桂枝湯。

太陽病未解。其脉陰陽俱停。必先振汗出而解。但陽微者。先汗之而解。宜桂枝湯。

太陽病未解。熱結膀胱。其人如狂。其血必自下。下者即愈。其外未解。尚未可攻。當先解其外。宜桂枝湯。

傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。不可攻痞。當先解表。宜

桂枝湯。

桂枝湯方

桂枝　芍藥　生薑各貳兩，切　甘草貳兩，炙　大棗拾貳枚，擘

右伍味，㕮咀，叁味，以水柒升，微火煑取叁升，去滓，温服壹升，須臾飲熱粥壹升餘，以助藥力，温覆令汗出壹時許，益善。若不汗，再服如前，復不汗，後服小促其間，令半日許叁服。病重者，壹日壹夜乃差，當晬時觀之，服壹劑湯，病證猶在，當復作服之，至有不汗出，當服叁劑乃解。

太陽病發其汗，遂漏而不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸，桂枝加附子湯主之，桂枝中加附子壹枚炮，即是。

太陽病下之，其脉促胷滿者，桂枝去芍藥湯主之，若微寒者，桂枝去芍藥加附子湯主之，桂枝去芍藥中加附子壹枚即是。

太陽病。得之八九日。如瘧。發熱而惡寒。熱多而寒少。其人不嘔。清便欲自可。一日再三發。其脉微緩者。爲欲愈。脉微而惡寒者。此爲陰陽俱虛。不可復吐下發汗也。面色反有熱者。爲未欲解。以其不能得汗出。身必當癢。桂枝麻黄各半湯主之。

桂枝壹兩拾陸銖　芍藥　生薑切　甘草炙

麻黄去節。各壹兩　大棗肆枚。擘　杏仁貳拾肆枚。去皮尖兩仁者

右柒味。以水伍升。先煮麻黄壹貳沸。去上沫。內諸藥。煮取壹升捌合。去滓。溫服陸合。本云桂枝湯叁合。麻黄湯叁合。併爲陸合。頓服。

服桂枝湯。大汗出。若脉洪大。與桂枝湯。其形如瘧。壹日再發。汗出便解。宜桂枝貳麻黄壹湯方。

桂枝壹兩拾柒銖　麻黄拾陸銖　生薑切　芍藥各壹兩陸銖

甘草壹兩貳銖，炙　大棗伍枚，擘　杏仁拾陸枚，去皮尖兩仁者

右柒味，以水柒升，煮麻黃壹貳沸，去上沫，內諸藥，煮取貳升，去滓，溫服壹升，日再服。本云：桂枝湯貳分，麻黃湯壹分，合為貳升，分貳服，今合為一方。

太陽病，發熱惡寒，熱多寒少，脈微弱，則無陽也，不可發汗，桂枝二越婢一湯主之方。

桂枝　芍藥　甘草炙　麻黃去節，各拾捌銖

生薑壹兩叁銖，切　石膏貳拾肆銖，碎　大棗肆枚，擘

右柒味，以水伍升，先煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取貳升，去滓，溫服壹升。本云：當裁為越婢湯、桂枝湯合之，飲壹升，今合為壹方，桂枝湯貳分。

服桂枝湯，下之，頸項強痛，翕翕發熱，無汗，心下滿，微痛，小便不利，桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方。

茯苓　白朮略各叁兩

右。於桂枝湯中惟除去桂枝壹味。加此貳味爲湯。服壹升。小便即利。本云。桂枝湯今去桂枝加茯苓白朮。

太陽病用麻黃湯法第二 壹拾陸證 方肆首

太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。體痛。嘔逆。脉陰陽俱緊。爲傷寒。

傷寒一日。太陽脉弱。至四日。太陰脉大。

傷寒一日。太陽受之。脉若靜者爲不傳。頗欲嘔。若躁煩。脉數急者。乃爲傳。

傷寒其二陽證不見。此爲不傳。

太陽病。頭痛。發熱。身體疼。腰痛。骨節疼。惡風。無汗而喘。麻黃湯主之。

太陽與陽明合病。喘而胸滿。不可下也。宜麻黃湯。

病十日已去。其脉浮細。嗜臥。此為外解。設胸滿脇痛。與小柴胡湯。浮者麻黄湯主之。

太陽病。脉浮緊。無汗而發熱。其身疼痛。八九日不解。其表證仍在。此當發其汗。服藥微除。其人發煩目瞑。增劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。宜麻黄湯。

脉浮而數者。可發其汗。宜麻黄湯。

傷寒。脉浮緊。不發其汗。因致衄。宜麻黄湯。

脉浮而緊。浮則為風。緊則為寒。風則傷衛。寒則傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。可發其汗。宜麻黄湯。

太陽病下之。微喘者。外未解故也。宜麻黄湯。壹云桂枝湯

麻黄湯方

麻黄去節。叁兩　桂枝貳兩　甘草炙。壹兩　杏仁柒拾枚。去皮尖兩仁者

右肆味。以水玖升。煑麻黄減貳升。去上沫。內諸藥。煑取貳

升半。去滓。溫服捌合。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法。

太陽病項背強几几。無汗惡風。葛根湯主之方

葛根肆兩　麻黃叁兩去節　桂枝　芍藥　甘草炙各貳兩

生薑叁兩切。大棗拾壹枚擘

右柒味。以水壹斗。煑麻黃葛根減貳升。去上沫。內諸藥。煑取叁升。去滓。分溫叁服。不須與粥。取微汗。

太陽與陽明合病。而自利。葛根湯主之。用上方。一云用後葛根黃芩黃連湯。不下利但嘔。葛根加半夏湯主之。葛根湯中加半夏半升。洗即是。

太陽病。桂枝證。醫反下之。遂利不止。其脈促。表未解。喘而汗出。宜葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤　甘草炙貳兩。　黃芩　黃連各叁兩

右肆味。以水捌升。先煑葛根減貳升。內諸藥。煑取貳升。去

滓，分溫再服。

太陽病用青龍湯法第三 肆證 方貳首

太陽中風，脉浮緊，發熱惡寒，身體疼痛，不汗出而煩，大青龍湯主之。若脉微弱，汗出惡風者，不可服之，服之則厥，筋惕肉瞤，此為逆也。方

麻黃去節陸兩　桂枝貳兩　甘草貳兩炙　杏仁肆拾枚去皮尖兩仁者

生薑參兩切　大棗拾枚擘　石膏如雞子大碎綿裹

右柒味，以水玖升，先煑麻黃，減貳升，去上沫，內諸藥，煑取叄升，去滓，溫服壹升，取微似汗，汗出多者，溫粉粉之，壹服汗者，勿再服，若復服，汗出多，亡陽，逆虛，惡風，躁不得眠。

傷寒，脉浮緩，其身不疼，但重，乍有輕時，無少陰證者，可與大青龍湯發之。方用上

傷寒表不解，心下有水氣，欬而發熱，或渴，或利，或噎，或小便

不利。少腹滿。或喘者。小青龍湯主之方

麻黃去節參兩 芍藥 細辛 乾薑 甘草炙

桂枝各參兩 五味子 半夏各半升洗

右捌味。以水壹斗。先煑麻黃減貳升。去上沫。內諸藥煑取參升。去滓。溫服壹升。渴則去半夏。加栝樓根參兩。微利者。去麻黃。加蕘花壹雞子大。熬令赤色。噎者。去麻黃。加附子壹枚炮。小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓肆兩。喘者。去麻黃。加杏仁半升。去皮。

傷寒心下有水氣。欬而微喘。發熱不渴。服湯已而渴者。此為寒去為欲解。小青龍湯主之。方用上

太陽病用柴胡湯法第四壹拾伍證方拾首

血弱氣盡。腠理開。邪氣因入。與正氣相搏。在於脅下。正邪分爭。往來寒熱。休作有時。嘿嘿不欲食飲。藏府相連。其痛必

下。邪高痛下。故使其嘔。小柴胡湯主之。服柴胡而渴者。此爲屬陽明。以法治之。

得病六七日。脉遲浮弱。惡風寒。手足溫。醫再三下之。不能食。其人脅下滿痛。面目及身黃。頸項強。小便難。與柴胡湯。後必下重。本渴飲水而嘔。柴胡復不中與也。食穀者噦。

傷寒四五日。身體熱。惡風。頸項強。脅下滿。手足溫而渴。小柴胡湯主之。

傷寒陽脉濇。陰脉弦。法當腹中急痛。先與小建中湯。不差與小柴胡湯。小建中湯見雜療門中。

傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具也。凡柴胡湯證而下之。柴胡證不罷。復與柴胡湯。解者必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。傷寒五六日。中風。往來寒熱。胸脅苦滿。嘿嘿不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。

或脅下痞堅。或心下悸。小便不利。或不渴。外有微熱。或欬。

小柴胡湯主之。

柴胡八兩　黃芩　人參　甘草炙　生薑各三兩

半夏半升洗　大棗拾貳枚擘

右柒味。以水壹斗貳升。煮取陸升。去滓。再煎溫服壹升。日叁。若胸中煩不嘔者。去半夏人參。加栝樓實壹枚。渴者。去半夏。加人參合前成四兩半。腹中痛者。去黃芩。加芍藥三兩。脅下痞堅者。去大棗。加牡蠣陸兩。心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓肆兩。不渴。外有微熱者。去人參。加桂叁兩。溫覆微發其汗。欬者。去人參大棗生薑。加五味子半升。乾薑貳兩。

傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便堅。其脉細。此爲陽微結。必有表。復有裏。沈則爲病在裏。汗出

亦爲陽微假令純陰結不得有外證悉入在於裏此爲半在外半在裏脉雖沉緊不得爲少陰所以然者陰不得有汗今頭大汗出故知非少陰也可與柴胡湯設不了了者得屎而解用上方。

傷寒十三日不解胸脅滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本當柴胡下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒消湯主之方

柴胡貳兩拾陸銖　黃芩　人參　甘草炙

生薑切各壹兩　半夏洗壹合　大棗擘肆枚　芒硝貳兩

右柒味以水肆升煮取貳升去滓溫分再服以解其外不解更作。

柴胡加大黃芒消桑螵蛸湯方。

右以前柒味以水柒升下芒消叁合大黄肆分桑螵蛸伍枚煑取壹升半去滓温服伍合微下即愈本云柴胡湯再服以解其外餘貳升加芒消大黄桑螵蛸也

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利讝語一身不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯主之方

柴胡肆兩 黄芩 人參 生薑切 龍骨

牡蠣熬 桂枝 茯苓 鈆丹各壹兩半 大黄貳兩

半夏壹合半洗 大棗陸枚擘

右壹拾貳味以水捌升煑取肆升內大黄切如碁子大更煑壹兩沸去滓温服壹升本云柴胡湯今加龍骨等

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者宜柴胡桂枝湯

發汗多亡陽狂語者不可下以爲可與柴胡桂枝湯和其榮

衛。以通津液後自愈方。

柴胡肆兩　黃芩　人參　生薑切　桂枝

芍藥各壹兩半　半夏貳合半洗　甘草壹兩炙。　大棗陸枚擘。

右玖味。以水陸升。煮取貳升。去滓。溫服壹升。本云。人參湯作如桂枝法。加柴胡黃芩。復如柴胡法。今用人參作半劑。

傷寒五六日。其人已發汗而復下之。胸脅滿微結。小便不利。渴而不嘔。但頭汗出。往來寒熱而煩。此為未解。柴胡桂枝乾薑湯主之方

柴胡捌兩　桂枝叁兩　乾薑貳兩　栝樓根肆兩　黃芩叁兩

牡蠣貳兩熬。　甘草貳兩炙。

右柒味。以水壹斗貳升。煮取陸升。去滓。更煎。溫服壹升。日貳服。初服微煩。汗出愈。

太陽病。過經十餘日。反再三下之。後四五日。柴胡證續在。先

與小柴胡湯。嘔止。小安。其人鬱鬱微煩者。爲未解。與大柴胡湯下者止。

傷寒十餘日。邪氣結在裏。欲復往來寒熱。當與大柴胡湯。

傷寒發熱。汗出不解。心中痞堅。嘔吐下利者。大柴胡湯主之。

病人表裏無證。發熱七八日。雖脉浮數可下之。宜大柴胡湯。

方

柴胡捌兩　枳實肆枚炙　生薑伍兩切　黃芩叁兩　芍藥叁兩

半夏半升洗　大棗拾貳枚擘

右柒味。以水壹斗貳升。煮取陸升。去滓。更煎。溫服壹升。日叁服。壹方加大黃貳兩。若不加。恐不名大柴胡湯。

太陽病用承氣湯法第五 方玖首 論肆首

發汗後惡寒者。虛故也。不惡寒。但熱者。實也。當和其胃氣。宜小承氣湯。

太陽病未解。其脉陰陽俱停。必先振汗出而解。但陽微者。先

汗出而解。陰微者。先下之而解。宜承氣湯。一云大柴胡湯
傷寒十三日。過經而譫語。內有熱也。當以湯下之。小便利者。
大便當堅。而反利。其脉調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。
自利者。其脉當微厥。今反和者。此爲內實。宜承氣湯。
太陽病。過經十餘日。心下温温欲吐。而胷中痛。大便反溏。其
腹微滿。鬱鬱微煩。先時自極吐下者。宜承氣湯。
二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足漐漐汗出。大便難。譫語
者。下之愈。宜承氣湯。
太陽病三日。發其汗不解。蒸蒸發熱者。調胃承氣湯主之
傷寒。吐後。腹滿者。承氣湯主之
太陽病。吐下發汗後。微煩。小便數。大便因堅。可與小承氣湯
和之則愈。

承氣湯方

大黃四兩 厚朴炙，捌兩 枳實炙，伍枚 芒消叁合

右肆味，以水壹斗，先煮貳味，取伍升，內大黃，更煮取貳升，去滓，內芒消，更煎壹沸，分再服，得下者止。

又方

大黃肆兩 厚朴炙，貳兩 枳實大者，炙，叁枚

右叁味，以水肆升，煮取壹升貳合，去滓，溫分再服，初服譫語即止服，湯當更衣，不爾盡服之。

又方

大黃肆兩 甘草炙，貳兩 芒消半兩

右叁味，以水叁升，煮取壹升，去滓，內芒消，更壹沸，頓服。

太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者即愈。其外不解，尚未可攻，當先解其外。外解，少腹急結者，乃可攻之，宜桃核承氣湯方。

桃仁伍拾枚去皮尖　大黄肆兩　桂枝貳兩　甘草貳兩炙。

芒消貳兩

右伍味。以水柒升。煑取貳升半。去滓。内芒消。更煎壹沸。分温叁服。

太陽病用陷胷湯法第六論叁拾壹證　方壹拾陸首

問曰。病有結胷。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛。其脉寸口浮。關上自沈。為結胷。何謂藏結。曰。如結胷狀。飲食如故。時下利。陽脉浮。關上細沈而緊。名為藏結。舌上白胎滑者。為難治。藏結者。無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。

夫病發於陽。而反下之。熱入因作結胷。發於陰。而反汗之。因作痞。結胷者。下之早。故令結胷。結胷者。其項亦強。如柔痓狀。下之即和。宜大陷胷丸。

結胷證。其脉浮大。不可下。下之即死。

結胷證悉具。煩躁者死。

太陽病。脉浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。數則為虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒。其表未解。醫反下之。動數則遲。頭痛即眩。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因堅。則為結胷。大陷胷湯主之。若不結胷。但頭汗出。其餘無汗。齊頸而還。小便不利。身必發黃。

傷寒六七日。結胷熱實。脉沉緊。心下痛。按之如石堅。大陷胷湯主之。

但結胷。無大熱。此為水結在胷脅。頭微汗出。大陷胷湯主之。

太陽病。重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡如小有潮熱。從心下至少腹堅滿而痛。不可近。大陷胷湯主之。若心下滿而堅痛者。此為結胷。大陷胷湯主之。

大陷胷丸方

大黄捌两　葶藶子熬　杏仁去皮尖两仁者　芒消各半升

右肆味。和擣取如彈丸壹枚。甘遂末壹錢匕。白蜜壹两。水貳升。合煑取壹升。温頓服壹宿乃下。

大陷胷湯方

大黄陸两　甘遂末壹錢匕　芒消壹升

右叁味。以水陸升。先煑大黄取貳升。去滓。内芒消煎壹两沸。内甘遂末。分再服。壹服得快利。止後服。

小結胷者。正在心下。按之即痛。其脉浮滑。小陷胷湯主之。

黄連壹两　半夏半升洗　栝樓實大者壹枚

右叁味。以水陸升。先煑栝樓取叁升。去滓。内諸藥。煑取貳升。去滓。分温叁服。

太陽病貳叁日。不能卧。但欲起者。心下必結。其脉微弱者。此本寒也。而反下之。利止者。必結胷。未止者。四五日復重下之。

此爲挾熱利。

太陽少陽併病。而反下之。結胷。心下堅。下利不復止。水漿不肯下。其人必心煩。

病在陽。當以汗解。而反以水噀之。若灌之。其熱却不得去。益煩。皮粟起。意欲飲水。反不渴。宜服文蛤散方。

文蛤伍兩

右壹味。擣爲散。以沸湯伍合。和服方寸匕。若不差。與五苓散。

五苓散方

猪苓拾捌銖去黑皮。白朮拾捌銖 澤瀉壹兩陸銖 茯苓拾捌銖 桂枝半兩

右伍味。各爲散。更於臼中治之。白飲和服方寸匕。日叁服。多飲煖水。汗出愈。

寒實結胷。無熱證者。與三物小白散方。

桔梗拾捌銖　巴豆陸銖，去皮心，熬　貝母拾捌銖

右參味，擣為散，內巴豆，更於臼中治之，白飲和服。強人半錢匕，羸者減之。病在上則吐，在下則利。不利，進熱粥一杯；利不止，進冷粥一杯。一云冷水一杯。身熱皮粟不解，欲引衣自覆，若以水潠之洗之，更益令熱却不得出，當汗而不汗即煩。假令汗出已，腹中痛，與芍藥參兩，如上法。

太陽與少陽併病，頭痛或眩冒，如結胷，心下痞而堅，當刺肺俞、肝俞、大椎第一間，慎不可發汗。發汗即譫語，譫語則脉弦，五日譫語不止，當刺期門。

心下但滿而不痛者，此為痞，半夏瀉心湯主之。

半夏半升，洗　黄芩　乾薑　人參　甘草炙，各參兩

黄連壹兩　大棗拾貳枚，擘

右柒味，以水壹斗，煑取陸升，去滓，温服壹升，日參服。

脉浮緊而下之，緊反入裏則作痞，按之自濡，但氣痞耳。

太陽中風，吐下嘔逆，表解乃可攻之。其人漐漐汗出，發作有時，頭痛，心下痞堅，滿引脅下，嘔即短氣，此為表解裏未和，十棗湯主之方

芫花熬　甘遂　大戟各等分

右參味，擣為散，以水壹升伍合，先煮大棗拾枚，取捌合，去棗，強人内藥末壹錢匕，羸人半錢匕，温服，平旦服，若下少不利者，明旦更服加半錢，得快下，糜粥自養。

太陽病發其汗，遂發熱惡寒，復下之，則心下痞，此表裏俱虚，陰陽氣併竭，無陽則陰獨，復加燒針，胸煩，面色青黃，膚瞤，此為難治。今色微黃，手足温者易愈。

心下痞，按之自濡，關上脉浮者，大黃黄連瀉心湯主之方

大黃貳兩　黄連壹兩

右貳味，以麻沸湯貳升漬之，須臾去滓，分溫再服。此方必有黃芩。

心下痞而復惡寒汗出者，附子瀉心湯主之方

附子壹枚，炮，去皮，別煑取汁　大黃貳兩　黃連　黃芩各壹兩

右肆味，以麻沸湯貳升漬之，須臾去滓，內附子汁，分溫再服。

本以下之故，心下痞，與之瀉心，其痞不解，其人渴而口燥煩，小便不利者，五苓散主之。一方言忍之一日乃愈。方用上方。

傷寒汗出解之後，胃中不和，心下痞堅，乾噫食臭，脅下有水氣，腹中雷鳴而利，生薑瀉心湯主之方

生薑肆兩，切　半夏半升，洗　乾薑壹兩　黃連壹兩　人參　黃芩　甘草各叁兩，炙　大棗拾貳枚，擘

右捌味，以水壹斗，煑取陸升，去滓，溫服壹升，日叁服。

傷寒中風，醫反下之，其人下利日數拾行，穀不化，腹中雷鳴，心下痞堅而滿，乾嘔而煩，不能得安，醫見心下痞，爲病不盡，

復重下之。其痞益甚。此非結熱。但胃中虛。客氣上逆。故使之堅。甘草瀉心湯主之。方

甘草肆兩。炙 黃芩 乾薑各參兩 黃連壹兩 半夏半升。洗

大棗拾貳枚。擘 一方有人參參兩

右陸味。以水壹斗。煑取陸升。去滓。溫服壹升。日參服。

傷寒服湯藥。下利不止。心下痞堅。服瀉心湯。復以他藥下之。利不止。醫以理中與之。而利益甚。理中治中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘粮湯主之。方

赤石脂壹斤。碎 太一禹餘粮壹斤。碎

右貳味。以水陸升。煑取貳升。去滓。分溫參服。若不止。當利小便。

傷寒吐下發汗。虛煩。脉甚微。八九日心下痞堅。脅下痛。氣上衝喉咽。眩冒。經脉動惕者。久而成痿。

傷寒發汗吐下。解後。心下痞堅。噫氣不除者。旋復代赭湯主之。方

旋復花參兩　人參貳兩　生薑伍兩。代赭壹兩。甘草參兩炙。

半夏半升洗。大棗拾貳枚擘

右柒味。以水壹斗。煮取陸升。去滓。溫服壹升。日參服。

太陽病。外證未除。而數下之。遂挾熱而利不止。心下痞堅。表裏不解。桂枝人參湯主之。方

桂枝別切肆兩。甘草肆兩炙　白朮　人參　乾薑各貳兩

右伍味。以水玖升。先煮肆味。取伍升。去滓。內桂。更煮。取參升。去滓。溫服壹升。日再夜壹服。

傷寒。大下後。復發其汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻其痞。當先解表。表解乃攻其痞。宜大黃黃連瀉心湯。方用上

病如桂枝證。頭項不強痛。脉微浮。胷中痞堅。氣上衝咽喉。不

得息。此爲胷有寒。當吐之。宜瓜蔕散方。

瓜蔕(熬)　赤小豆(各壹分)

右貳味。擣爲散。取半錢匕。豉壹合。湯柒合。漬之。須臾去滓。內散湯中和。頓服之。若不吐。稍加之。得快吐止。諸亡血虛家。不可與瓜蔕散。

太陽病雜療法第七(貳拾壹證　方壹拾叁首)

中風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入而吐。此爲水逆。五苓散主之。(方見結胷門中。)

傷寒二三日。心中悸而煩者。小建中湯主之。方

桂枝(叁兩)　甘草(貳兩炙)　芍藥(陸兩)　生薑(叁兩)　大棗(拾壹枚擘)

膠飴(壹升)

右陸味。以水柒升。煑取叁升。去滓。內飴。温服壹升。嘔家不可服。以甘故也。

傷寒脉浮。而醫以火迫刧之。亡陽。驚狂。臥起不安。桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。方

桂枝　生薑切　蜀漆各叁兩，洗去腥。　甘草貳兩，炙。

牡蠣伍兩，熬。　龍骨肆兩　大棗拾貳枚，擘

右柒味。以水捌升。先煑蜀漆減貳升。內諸藥煑取叁升。去滓。溫服壹升。一法以水壹斗貳升，煑取伍升。

燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發奔豚氣從少腹上衝者。灸其核上一壯。與桂枝加桂湯。方

桂枝伍兩　芍藥　生薑各叁兩　大棗拾貳枚，擘　甘草貳兩，炙。

右伍味。以水柒升。煑取叁升。去滓。溫服壹升。本云桂枝湯。今加桂滿伍兩。所以加桂者。以能洩奔豚氣也。

火逆下之。因燒針煩躁者。桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。方

桂枝壹兩　甘草　龍骨　牡蠣各貳兩，熬

右肆味。以水伍升。煑取貳升。去滓。溫服捌合。日叁服。

傷寒。加溫針。必驚。

太陽病六七日。出表證續在。脉微而沈。反不結胸。其人發狂者。以熱在下焦。少腹堅滿。小便自利者。下血乃愈。所以然者。以太陽隨經。瘀熱在裏故也。宜下之。以抵當湯。

太陽病。身黃。脉沈結。少腹堅。小便不利者。爲無血。小便自利。其人如狂者。血證諦也。抵當湯主之。

傷寒有熱。少腹滿。應小便不利。今反利者。爲有血也。當須下之。不可餘藥。宜抵當丸。

抵當湯方

大黃貳兩。破陸片　桃仁貳拾枚。去皮尖。熬

水蛭叁拾枚。熬　䖟蟲去足翅。熬

右肆味。以水伍升。煑取叁升。去滓。溫服壹升。不下更服。

抵當丸方

大黄（叁兩）　桃仁（貳拾伍枚，去皮尖，熬）　蝱蟲（去足翅，熬）　水蛭（各貳拾枚，熬）

右肆味，擣分爲肆丸，以水壹升，煑壹丸，取柒合服，晬時當下，不下更服。

婦人中風，發熱惡寒，經水適來，得七八日，熱除而脈遲身涼，胷脅下滿如結胷狀，譫語，此爲熱入血室，當刺期門，隨其虛實而取之。

婦人中風七八日，續得寒熱，發作有時，經水適斷者，此爲熱入血室，其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。（方見柴胡湯門）

婦人傷寒發熱，經水適來，晝日了了，暮則譫語，如見鬼狀，此爲熱入血室，無犯胃氣及上二焦，必當自愈。

傷寒無大熱，口燥渴而煩，其背微惡寒，白虎湯主之。

傷寒脉浮。發熱無汗。其表不解。不可與白虎湯。渴欲飲水無表證。白虎湯主之。

傷寒脉浮滑。此以表有熱。裏有寒。白虎湯主之方。

知母陸兩 石膏壹斤，碎 甘草貳兩，炙 粳米陸合

右肆味。以水壹斗。煑米熟湯成。去滓。溫服壹升。日叁服。

又方

知母陸兩 石膏壹斤，碎 甘草貳兩，炙 人參叁兩 粳米陸合

右伍味。以水壹斗。煑米熟湯成。去滓。溫服壹升。日叁服。立夏後至立秋前得用之。立秋後不可服。春三月病常苦裏冷。白虎湯亦不可與。與之即嘔利而腹痛。諸亡血及虛家。亦不可與白虎湯。得之則腹痛而利。但當溫之。

太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。與黃芩加半夏生薑湯。

黃芩湯方。

黃芩參兩　芍藥　甘草貳兩炙　大棗壹拾貳枚擘

右肆味。以水壹斗。煮取參升。去滓溫服壹升。日再夜壹服。

黃芩加半夏生薑湯方。

半夏半升洗　生薑壹兩半切

右貳味。加入前方中。即是。

傷寒胷中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐。黃連湯主之方

黃連　甘草炙　乾薑　桂枝　人參各參兩

半夏半升洗　大棗拾貳枚擘

右柒味。以水壹斗。煮取陸升。去滓溫分伍服。晝參夜貳服。

傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。下已脉浮而緊。桂枝附子湯主之。若其人大便堅。小便自利。朮附子湯主之。方

桂枝肆兩 附子叁枚炮 生薑叁兩切 大棗拾貳枚擘 甘草貳兩炙

右伍味。以水陸升。煑取貳升。去滓。分溫叁服。

朮附子湯方。於前方中去桂。加白朮肆兩。即是。壹服覺身痺。半日許復服之盡。其人如冒狀。勿怪。即是附子朮併走皮中。逐水氣未得除。故使之耳。法當加桂肆兩。以大便堅。小便自利。故不加桂也。

風濕相搏。骨節疼煩。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫。甘草附子湯主之方

甘草貳兩炙 附子貳枚炮 白朮叁兩 桂枝肆兩

右肆味。以水陸升。煑取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。初服得微汗即止。能食汗止復煩者。將服伍合。恐壹升多者。後服陸柒合愈。

傷寒脉結代。心動悸。炙甘草湯主之方

甘草肆兩炙。　桂枝　　生薑各叁兩切。麥門冬半升去心。
麻子仁半升　人參　　阿膠各貳兩　大棗叁拾枚擘。生地黃壹斤切。
右玖味。以清酒柒升。水捌升。煮取叁升。去滓。內膠消烊盡。
温服壹升。日叁服。

陽明病狀第八　柒拾伍證　方壹拾壹首

陽明之爲病。胃中寒是也。
問曰。病有太陽陽明。有正陽陽明。有微陽陽明。何謂也。答曰。
太陽陽明者。脾約是也。正陽陽明者。胃家實是也。微陽陽明
者。發其汗。若利其小便。胃中燥。便難是也。
問曰。何緣得陽明病。答曰。太陽病。發其汗。若下之。亡其津液。
胃中乾燥。因爲陽明。不更衣而便難。復爲陽明病也。
問曰。陽明病外證云何。答曰。身熱。汗出而不惡寒。但反惡熱。
問曰。病有得之一日。發熱惡寒者。何。答曰。然。雖二日。惡寒自

罷。即汗出惡熱也。曰。惡寒何故自罷。荅曰。陽明處中主土。萬
物所歸。無所復傳。故始雖惡寒。二日自止。是爲陽明病。
太陽初得病時。發其汗。汗先出復不徹。因轉屬陽明。
病發熱無汗。嘔不能食。而反汗出濈濈然。是爲轉在陽明。
傷寒三日。陽明脉大。
病脉浮而緩。手足溫。是爲繫在太陰。太陰當發黃。小便自利
者。不能發黃。至七八日而堅。爲屬陽明。
傷寒傳繫陽明者。其人濈然後汗出。
陽明中風。口苦咽乾。腹滿微喘。發熱惡寒。脉浮若緊。下之則
腹滿。小便難也。
陽明病。能食爲中風。不能食爲中寒。
陽明病中寒。不能食而小便不利。手足濈然汗出。此爲欲作
堅瘕也。必頭堅後溏。所以然者。胃中冷。水穀不別故也。

陽明病。初為欲食之。小便反不數。大便自調。其人骨節疼。翕翕如有熱狀。奄然發狂。濈然汗出而解。此為水不勝穀氣。與汗共并。堅者即愈。

陽明病欲解時。從申盡戌。

陽明病。不能食。下之不解。其人不能食。攻其熱必噦。所以然者。胃中虛冷故也。其人本虛。攻其熱必噦。

陽明病。脈遲。食難用飽。飽即微煩頭眩者。必小便難。此欲作穀疸。雖下之。其腹必滿如故耳。所以然者。脈遲故也。

陽明病。久久而堅者。陽明病當多汗。而反無汗。其身如蟲行皮中之狀。此為久虛故也。

冬陽明病。反無汗。但小便利。二三日嘔而欬。手足若厥者。其人頭必痛。若不嘔不欬。手足不厥者。頭不痛。

冬陽明病。但頭眩。不惡寒。故能食而欬者。其人咽必痛。若不

欬者。咽不痛。

陽明病。脉浮而緊。其熱必潮。發作有時。但浮者。必盜汗出。

陽明病。無汗。小便不利。心中懊憹。必發黃。

陽明病被火。額上微汗出。而小便不利。必發黃。

陽明病。口燥。但欲漱水。不欲咽者。必衄。

陽明病。本自汗出。醫復重發其汗。病已差。其人微煩不了了。此大便堅也。必亡津液。胃中燥。故令其堅。當問小便日幾行。若本日三四行。今日再行者。必知大便不久出。今為小便數少。津液當還入胃中。故知必當大便也。

夫病陽多者。熱下之則堅。汗出多。極發其汗亦堅。

傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻也。

陽明病。當心下堅滿。不可攻之。攻之遂利不止者。利止者愈。

陽明病。合色赤。不可攻之。必發熱。色黃者。小便不利也。

陽明病。不吐下。而煩者。可與承氣湯。

陽明病。其脉遲。雖汗出。不惡寒。其體必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱。如此者。其外爲解。可攻其裏。手足濈然汗出。此爲已堅。承氣湯主之。

若汗出多。而微惡寒。外爲未解。其熱不潮。勿與承氣湯。若腹大滿。而不大便者。可與小承氣湯。微和其胃氣。勿令至大下。

陽明病。潮熱微堅。可與承氣湯。不堅。勿與之。

若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。可與小承氣湯。若腹中轉失氣者。此爲有燥屎。乃可攻之。若不轉失氣者。此但頭堅後溏。不可攻之。攻之必腹脹滿。不能食。欲飲水者。即噦。其後發熱者。必復堅。以小承氣湯和之。若不轉失氣者。慎不可攻之。

夫實則譫語。虚則鄭聲。鄭聲者。重語是也。直視譫語。喘滿者

死。下利者亦死。

陽明病。其人多汗。津液外出。胃中燥。大便必堅。堅者則譫語。承氣湯主之。

陽明病。譫語妄言。發潮熱。其脉滑疾。如此者。承氣湯主之。因與承氣湯壹升。腹中轉氣者。復與壹升。如不轉氣者。勿與之。明日又不大便。脉反微濇。此爲裏虛。爲難治。不得復與承氣湯。

陽明病。譫語。有潮熱。反不能食者。必有燥屎五六枚。若能食者。但堅耳。承氣湯主之。

陽明病。下血而譫語者。此爲熱入血室。但頭汗出者。當刺期門。隨其實而寫之。濈然汗出者則愈。

汗出而譫語者。有燥屎在胃中。此風也。過經乃可下之。下之若早。語言必亂。以表虛裏實。下之則愈。宜承氣湯。

傷寒四五日。脉沈而喘滿。沈為在裏。而反發其汗。津液越出。大便為難。表虛裏實。久則讝語。

陽明病下之。心中懊憹而煩。胃中有燥屎者。可攻。其人腹微滿。頭堅後溏者。不可下之。有燥屎者。宜承氣湯。

病者五六日不大便。繞臍痛。躁煩。發作有時。此為有燥屎。故使不大便也。

病者煩熱。汗出即解。復如瘧狀。日晡所發者。屬陽明。脉實者當下之。脉浮虛者。當發其汗。下之宜承氣湯。發汗宜桂枝湯。方見桂枝湯門

大下後六七日不大便。煩不解。腹滿痛者。此有燥屎。所以然者。本有宿食故也。宜承氣湯。

病者小便不利。大便乍難乍易。時有微熱。怫鬱不能卧。有燥屎故也。宜承氣湯。

得病二三日。脉弱。無太陽柴胡證。而煩心下堅。至四日雖能食。以小承氣湯少與微和之。令小安。至六日。與承氣湯壹升。不大便六七日。小便少者。雖不大便。但頭堅後溏。未定成其堅。攻之必溏。當須小便利。定堅。乃可攻之。宜承氣湯。

傷寒七八日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。微熱者。此爲實。急下之。宜承氣湯。

陽明病。發熱汗多者。急下之。宜承氣湯。

發汗不解。腹滿痛者。急下之。宜承氣湯。

腹滿不減。減不足言。當下之。宜承氣湯。

陽明與少陽合病而利。脉不負者爲順。滑而數者。有宿食。宜承氣湯。〔方並見承氣湯門〕

陽明病。脉浮緊。咽乾口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反偏惡熱。其身體重。發汗即躁。心中憒憒而反譫語。加溫針必怵

惕。又煩躁不得眠。下之。胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子湯主之。

陽明病。下之。其外有熱。手足溫。不結胸。心中懊憹。若飢不能食。但頭汗出。梔子湯主之方。

梔子拾肆枚擘　香豉肆合綿裹

右貳味。以水肆升。先煮梔子。取貳升半。內豉。煮取壹升半。去滓。分再服。溫進壹服。得快吐。止後服。

三陽合病。腹滿身重。難以轉側。口不仁。言語向經。譫語遺尿。發汗則譫語。下之則額上生汗。手足厥冷。白虎湯主之。按諸本皆云向經不敢刊改

若渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎湯主之。方見雜療中

若脉浮發熱。渴欲飲水。小便不利。豬苓湯主之方。

豬苓去黑皮　茯苓　澤瀉　阿膠　滑石碎各壹兩

右伍味。以水肆升。先煑肆味。取貳升。去滓。內膠烊消。溫服柒合。日叁服。

陽明病。汗出多而渴者。不可與猪苓湯。以汗多胃中燥。猪苓湯復利其小便故也。

胃中虛冷。其人不能食者。飲水即噦。

脉浮發熱。口乾鼻燥。能食者即衄。

若脉浮遲。表熱裏寒。下利清穀。四逆湯主之方。

甘草貳兩。炙 乾薑壹兩半 附子壹枚。生。去皮。破捌片

右叁味。以水叁升。煑取壹升貳合。去滓。分溫再服。強人可大附子壹枚。乾薑叁兩。

陽明病。發潮熱。大便溏。小便自可。而胸脇滿不去。小柴胡湯主之。

陽明病。脇下堅滿。不大便而嘔。舌上胎者。可以小柴胡湯上

焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜卧一身及目悉黄小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黄湯不溺腹滿加噦不治方見柴胡湯門

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒表為未解可發汗宜桂枝湯

陽明病脉浮無汗其人必喘發汗即愈宜麻黄湯方並見上

陽明病汗出若發其汗小便自利此為內竭雖堅不可攻當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

方

蜜柒合

右壹味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸捻如指許長貳寸當熱時急作令頭銳以內穀道

中。以手急抱。欲大便時乃去之。

又方

大豬膽壹枚。瀉汁。和少法醋以灌穀道中。如一食頃。當大便出宿食惡物。已試甚良。

陽明病。發熱而汗出。此爲熱越。不能發黃也。但頭汗出。其身無有。齊頸而還。小便不利。渴引水漿。此爲瘀熱在裏。身必發黃。茵蔯湯主之。

傷寒七八日。身黃如橘。小便不利。其腹微滿。茵蔯湯主之。方

茵蔯陸兩　梔子拾肆枚，擘　大黃貳兩

右叁味。以水壹斗貳升。先煑茵蔯。減陸升。內貳味。煑取三升。去滓。分溫叁服。小便當利。溺如皂莢沫狀。色正赤。壹宿黃從小便去。

陽明證。其人喜忘。必有畜血。所以然者。本有久瘀血。故令喜

志。雖堅。大便必黑。抵當湯主之。

病者無表裏證。發熱七八日。雖脉浮數。可下之。假令下已。脉數不解。而合熱消穀喜飢。至六七日不大便者。有瘀血。抵當湯主之。若數不解。而下不止。必挾熱便膿血。方見雜療中

食穀而嘔者。屬陽明。茱萸湯主之。方

吳茱萸壹升　人參叁兩　生薑陸兩切　大棗拾貳枚擘

右肆味。以水柒升。煑取貳升。去滓。溫服柒合。日叁服。得湯反劇者。屬上焦也。

陽明病。寸口緩。關上小浮。尺中弱。其人發熱而汗出。復惡寒。不嘔。但心下痞。此為醫下之也。若不下。其人復不惡寒。而渴者。為轉屬陽明。小便數者大便即堅。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水者。但與之。當以法救渴。宜五苓散。方見雜療門

脉陽微而汗出少者。為自如。汗出多者。為太過。太過者。陽絕

於內。亡津液。大便因堅。

脉浮而芤。浮爲陽。芤爲陰。浮芤相搏。胃氣則生熱。其陽則絕。

趺陽脉浮而澀。浮則胃氣强。澀則小便數。浮澀相搏。大便即堅。其脾爲約。麻子仁丸主之方。

麻子仁貳升　芍藥　枳實炙各捌兩　大黃壹斤　厚朴壹尺炙。

杏仁壹升去皮尖兩仁者熬別作脂

右陸味。蜜和丸。如梧桐子大。飲服拾圓。日叁服。漸加。以知爲度。

傷寒發其汗。則身目爲黃。所以然者。寒濕相搏。在裏不解故也。傷寒其人發黃。梔子蘗皮湯主之方。

梔子拾伍枚擘　甘草　黃蘗拾伍分

右叁味。以水肆升。煮取貳升。去滓。分溫再服。

傷寒瘀熱在裏。身體必黃。麻黃連軺赤小豆湯主之方

麻黄去節　連翹各壹兩　杏仁參拾枚去皮尖。　赤小豆一升
大棗拾貳枚擘。生梓白皮切壹　甘草二兩炙
一方生薑貳兩切。
右柒味。以水壹斗。煑麻黄壹貳沸。去上沫。內諸藥。煑取參
升。去滓。溫服壹升。

少陽病狀第九　玖證

少陽之爲病。口苦咽乾目眩也。
少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胷中滿而煩。不可吐下。吐下則
悸而驚。
傷寒病。脉弦細。頭痛而發熱。此爲屬少陽。少陽不可發汗。發
汗則讝語。爲屬胃。胃和即愈。不和煩而悸。
太陽病不解。轉入少陽。脅下堅滿。乾嘔不能食飲。往來寒熱。
而未吐下。其脉沈緊。可與小柴胡湯。若已吐下發汗溫鍼。

譫語。柴胡證罷。此爲壞病。知犯何逆。以法治之。
三陽脉浮大。上關上。但欲寐。目合則汗。
傷寒六七日。無大熱。其人躁煩。此爲陽去入陰故也。
傷寒三日。三陽爲盡。三陰當受其邪。其人反能食而不嘔。此
　爲三陰不受其邪。
傷寒三日。少陽脉小。欲已。
少陽病欲解時。從寅盡辰。

千金翼方卷第九

千金翼方卷第十

傷寒下

太陰病狀第一 捌證 方貳首

太陰之爲病，腹滿吐，食不下，下之益甚，時腹自痛，胷下堅結。

太陰病，脉浮，可發其汗。

太陰中風，四肢煩疼，陽微陰濇而長，爲欲愈。

太陰病欲解時，從亥盡丑。

自利不渴者，屬太陰，其藏有寒故也，當溫之，宜四逆輩。

傷寒脉浮而緩，手足溫，是爲繫在太陰，太陰當發黃，小便自利，利者不能發黃，至七八日，雖煩，暴利十餘行，必自止，所以自止者，脾家實，腐穢當去故也。

本太陽病，醫反下之，因腹滿時痛，爲屬太陰，桂枝加芍藥湯主之，其實痛，加大黃湯主之。方

桂枝（叁兩）　芍藥（叁兩）　生薑（切，叁兩）。甘草（炙，貳兩）。大棗（拾貳枚，擘）

右伍味。以水柒升。煑取叁升。去滓。分温叁服。

加大黃湯方。

大黃（貳兩）

右於前方中加此大黃貳兩即是。

人無陽證。脉弱。其人續自便利。設當行大黃芍藥者。減之。其人胃氣弱。易動故也。

少陰病狀第二（四拾伍證　方壹拾陸首）

少陰之爲病。脉微細。但欲寐。

少陰病。欲吐而不煩。但欲寐。五六日自利而渴者。屬少陰虛。故引水自救。小便白者。少陰病形悉具。其人小便白者。下焦虛寒。不能制溲。故白也。夫病其脉陰陽俱緊。而反汗出。爲陽。屬少陰。法當咽痛而復吐利。

少陰病欬而下利譫語是爲被火氣刼故也小便必難爲強責少陰汗也

少陰病脉細沈數病在裏不可發其汗

少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱濇者復不可下之

少陰病脉緊者至七八日下利其脉暴微手足反温其脉緊反去此爲欲解雖煩下利必自愈

少陰病下利若利止惡寒而踡手足温者可治

少陰病惡寒而踡時自煩欲去其衣被不可治

少陰中風其脉陽微陰浮爲欲愈

少陰病欲解時從子盡寅

少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脉不足者灸其少

陰七壯。

少陰病。但厥無汗。強發之。必動血。未知從何道出。或從口鼻目出。是為下厥上竭。為難治。

少陰病。惡寒。踡而利。手足逆者。不治。

少陰病。下利止而眩。時時自冒者。死。

少陰病。其人吐利。躁逆者。死。

少陰病。四逆惡寒而踡。其脈不至。其人不煩而躁者。死。

少陰病。六七日。其息高者。死。

少陰病。脈微細沈。但欲卧。汗出不煩。自欲吐。至五六日自利。復煩燥不得卧寐者。死。

少陰病。始得之。反發熱。脈反沈者。麻黄細辛附子湯主之。方

麻黄貳兩去節　細辛貳兩　附子壹枚炮去皮破八片

右叄味。以水貳斗。先煑麻黄減壹升。去上沫。內諸藥煑取

三升。去滓。溫服一升。

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。以二三日無證。故微發汗方。

麻黃去節二兩 附子一枚泡去皮破八片 甘草二兩炙。

右三味。以水七升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取二升半。去滓。溫服八合。

少陰病得之二三日以上。心中煩不得臥者。黃連阿膠湯主之方。

黃連四兩 黃芩一兩 芍藥二兩 雞子黃二枚

阿膠三挺

右五味。以水六升。先煮三味。取二升。去滓。內膠烊盡。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。

少陰病得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。附子湯主之。

少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脉沉者。附子湯主之方。

附子二枚炮去皮破八片　茯苓三兩　人參二兩

白术四兩　芍藥三兩

右五味。以水八升。煑取三升。去滓。分溫三服。

少陰病。下利便膿血。桃花湯主之。

少陰病。二三日至四五日。腹痛。小便不利。下利不止。而便膿血者。以桃花湯主之方。

赤石脂一斤。半完。半末。　乾薑一兩　粳米一升

右三味。以水七升。煑米熟湯成。去滓。溫取七合。內赤石脂末一方寸匕。一服。止。餘勿服。

少陰病。下利便膿血者。可刺。

少陰病。吐利手足逆。煩躁欲死者。茱萸湯主之。方見陽明門

少陰病。下利咽痛。胸滿心煩。猪膚湯主之方。

猪膚一斤

右壹味。以水壹斗。煮取五升。去滓。內白蜜壹升。白粉五合。熬香。和令相得。溫分六服。

少陰病二三日。咽痛者。可與甘草湯。不差。可與桔梗湯方。

甘草

右壹味。以水叁升。煮取壹升半。去滓。溫服七合。日再服。

桔梗湯方。

桔梗一大枚 甘草二兩

右貳味。以水叁升。煮取壹升。去滓。分溫再服。

少陰病。咽中傷。生瘡。不能語言。聲不出。苦酒湯主之方。

雞子壹枚去黃內好上苦酒於殼中 半夏洗破如棗核十四枚

右貳味。內半夏著苦酒中。以雞子殼置刀環中。安火上。令三沸。去滓。少少含嚥之。不差。更作三劑愈。

少陰病。咽中痛。半夏散及湯方。

半夏洗　桂枝　甘草炙

右叁味。等分。各異擣。合治之。白飲和服方寸匕。日三服。若不能散服者。以水一升。煎七沸。內散兩方寸匕。更煮三沸。下火令小冷。少少含嚥之。半夏有毒。不當散服。

少陰病。下利。白通湯主之方。

附子壹枚生去皮破八片　乾薑一兩　葱白四莖

右叁味。以水叁升。煮取壹升。去滓。分溫再服。

少陰病。下利。脉微。服白通湯。利不止。厥逆無脉。乾煩者。白通加猪膽汁湯主之方。

猪膽汁一合　人尿五合

右貳味。內前湯中。和令相得。溫分再服。若無膽。亦可用服湯。脉暴出者死。微續者生。

少陰病。二三日不已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沉重。疼

痛而利。此爲有水氣。其人或欬。或小便不利。或下利。或嘔。玄武湯主之方

茯苓　芍藥　生姜（各叁兩）　白朮（貳兩）　附子（壹枚炮去皮破捌片）

右伍味。以水捌升。煑取叁升。去滓。温服柒合。欬者加伍味子半升。細辛壹兩。乾薑壹兩。小便自利者。去茯苓。下利者。去芍藥。加乾薑貳兩。嘔者。去附子。加生薑足前爲半斤。利不止便膿血者。宜桃花湯。

少陰病。下利清穀。裏寒外熱。手足厥逆。脉微欲絶。身反惡寒。其人面赤。或腹痛。或乾嘔。或咽痛。或利止而脉不出。通脉四逆湯主之方

甘草（貳兩炙）　附子（大者壹枚生去皮破捌片）　乾薑（叁兩強人可肆兩）

右叁味。以水叁升。煑取壹升貳合。去滓。分温再服。其脉即出者愈。面赤者。加葱白九莖。腹痛者。去葱加芍藥貳兩。嘔

者。加生薑貳兩。咽痛者。去芍藥加桔梗壹兩。利止脉不出者。去桔梗加人參貳兩。病皆與方相應者。乃加減服之。

少陰病。四逆。其人或欬。或悸。或小便不利。或腹中痛。或洩利下重。四逆散主之。方

甘草炙　枳實炙　柴胡　芍藥各拾分

右肆味。擣為散。白飲和服方寸匕。日叁服。欬者。加五味子乾薑各伍分。兼主利。悸者。加桂伍分。小便不利者。加茯苓伍分。腹中痛者。加附子壹枚炮。洩利下重者。先以水伍升。煑薤白三升。取三升。去滓。以散三方寸匕內湯中。煑取一升半。分溫再服。

少陰病。不利六七日。欬而嘔渴。心煩不得眠。豬苓湯主之。方見陽明門

少陰病。得之二三日。口燥咽乾。急下之。宜承氣湯。

少陰病。利清水色青者。心下必痛。口乾燥者。可下之。宜承氣湯。一云大柴胡。

少陰病。六七日。腹滿不大便者。急下之。宜承氣湯。方見承氣中

少陰病。其脉沈者。當溫之。宜四逆湯。

少陰病。其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之手足寒。脉弦遲。此胸中實。不可下也。當遂吐之。若膈上有寒飲。乾嘔者。不可吐。當溫之。宜四逆湯。方見陽明門

少陰病。下利。脉微澀者。即嘔汗者。必數更衣。反少。當溫其上。灸之。一云灸厥陰伍拾壯

厥陰病狀第三 伍拾陸證 方柒首

厥陰之爲病。消渴。氣上撞。心中疼熱。飢而不欲食。甚者則欲吐蚘。下之不肯止。

厥陰中風。其脉微浮爲欲愈。不浮爲未愈。

厥陰病。欲解時從丑盡卯。

厥陰病渴欲飲水者。與水飲之即愈。

諸四逆厥者。不可下之。虛家亦然。

傷寒先厥。後發熱而利者。必止。見厥復利。

傷寒始發熱六日。厥反九日而下利。厥利當不能食。今反能食。恐為除中。食之黍餅。不發熱者。知胃氣尚在。必愈。恐暴熱來出而復去也。後日脉之。其熱續在。期之旦日夜半愈。所以然者。本發熱六日。厥反九日。復發熱三日。并前六日。亦為九日。與厥相應。故期之旦日夜半愈。後三日脉之數。其熱不罷。此為熱氣有餘。必發癰膿。

傷寒脉遲。六七日。而反與黃芩湯徹其熱。脉遲為寒。與黃芩湯復除其熱。腹中冷。當不能食。今反能食。此為除中。必死。

傷寒先厥發熱。下利必自止。而反汗出。咽中強痛。其喉為痺。

發熱無汗，而利必自止，便膿血，便膿血者，其喉不痺。

傷寒一二日至四五日，厥者必發熱，前厥者後必熱，厥深熱亦深，厥微熱亦微，厥應下之，而發其汗者，口傷爛赤。

凡厥者，陰陽氣不相順接，便爲厥，厥者，手足逆者是。

傷寒病，厥五日，熱亦五日，設六日當復厥，不厥者自愈，厥不過五日，以熱五日，故知自愈。

傷寒脉微而厥，至七八日，膚冷，其人躁無安時，此爲藏寒，蚘上入其膈，蚘厥者，其人當吐蚘，今病者靜而復時煩，此爲藏寒，蚘上入其膈，故煩，須臾復止，得食而嘔又煩者，蚘聞食臭必出，其人常自吐蚘，蚘厥者，烏梅丸主之方。又主久痢

烏梅參百枚　細辛陸兩　乾薑拾兩　黃連拾陸兩　當歸肆兩

蜀椒肆兩，汗　附子陸兩，炮　桂枝陸兩　人參陸兩　黃蘗陸兩

右壹拾味，異擣，合治之，以苦酒漬烏梅一宿，去核，蒸之伍

斗米下。擣成泥。和諸藥令相得。臼中。與蜜杵千下。丸如梧桐子大。先食飲服拾丸。日參服。少少加至貳拾丸。禁生冷滑物臭食等。

傷寒熱少微厥。稍頭寒。嘿嘿不欲食。煩躁數日。小便利。色白者。熱除也。得食。其病爲愈。若厥而嘔。胷脅煩滿。其後必便血。稍頭一作指頭

病者手足厥冷。言我不結。胷少腹滿。按之痛。此冷結在膀胱關元也。

傷寒發熱四日。厥反三日。復發熱四日。厥少熱多。其病當愈。四日至六七日不除。必便膿血。

傷寒厥四日。熱反三日。復厥五日。其病爲進。寒多熱少。陽氣退。故爲進。

傷寒六七日。其脉數。手足厥。煩躁。陰厥不還者死。

傷寒。下利厥逆。躁不能卧者。死。

傷寒。發熱。下利至厥不止者。死。

傷寒六七日不利。便發熱而利。其人汗出不止者。死。有陰無陽故也。

傷寒五六日。不結胸。腹濡。脉虚復厥者。不可下之。下之亡血死。

傷寒發熱而厥。七日下利者。爲難治。

傷寒脉促。手足厥逆者。可灸之。

傷寒。脉滑而厥者。其表有熱。白虎湯主之。（表熱見裏　方見雜療中）

手足厥寒。脉爲之細絶。當歸四逆湯主之。方

當歸（參兩）　桂心（參兩）　細辛（參兩）　芍藥（參兩）　甘草（貳兩）。

通草（貳兩）　大棗（貳拾伍枚擘）

右柒味。以水捌升。煑取叁升。去滓。温服壹升。日叁服。

若其人有寒。當歸四逆加吴茱萸生薑湯主之。方

吴茱萸貳兩　生薑切，捌兩。

右前方中加此貳味，以水肆升，清酒肆升和，煑取叁升，去滓，分溫肆服。

大汗出，熱不去，拘急，四肢疼，若下利，厥而惡寒，四逆湯主之。

大汗出，若大下利而厥，四逆湯主之。方見陽明門。

病者手足逆冷，脉乍緊者，邪結在胸中，心下滿而煩，飢不能食，病在胸中，當吐之，宜瓜蔕散。方見痞門中。

傷寒厥而心下悸，先治其水，當與茯苓甘草湯，却治其厥，不爾，其水入胃，必利，茯苓甘草湯主之。方

茯苓貳兩　甘草壹兩，炙　桂枝貳兩　生薑叁兩

右肆味，以水肆升，煑取貳升，去滓，分溫叁服。

傷寒六七日，其人大下後，脉沈遲，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾膿血，洩利不止，為難治，麻黃升麻湯主之。方

麻黃（去節。貳兩半） 知母（拾捌銖） 萎蕤（拾捌銖） 黃芩（拾捌銖）
升麻（壹兩陸銖） 當歸（壹兩陸銖） 芍藥 桂枝 石膏（碎。綿裹）
乾薑 白朮 茯苓 麥門冬（去心） 甘草（炙。各陸銖）

右壹拾肆味。以水壹斗。先煮麻黃貳沸。去上沫。內諸藥煮取叄升。去滓。分溫叄服。壹炊間當汗出愈。

傷寒四五日。腹中痛。若轉氣下趣少腹。為欲自利。

傷寒本自寒下。醫復吐之。而寒格更逆吐。食入即出。乾薑黃芩黃連人參湯主之。方

乾薑 黃芩 黃連 人參（各叄兩）

右肆味。以水陸升。煮取貳升。去滓。分溫再服。

下利。有微熱。其人渴。脉弱者。自愈。

下利。脉數。若微發熱。汗出者。自愈。設脉復緊。為未解。

下利。手足厥。無脉。灸之不溫。反微喘者。死。少陰負趺陽者。為

順。

下利。脈反浮數。尺中自濇。其人必清膿血。

下利清穀。不可攻其表。汗出必脹滿。

下利脈沈弦者。下重。其脈大者。為未止。脈微弱數者。為欲自止。雖發熱。不死。

下利脈沈而遲。其人面少赤。身有微熱。下利清穀。必鬱冒汗出而解。其人微厥。所以然者。其面戴陽。下虛故也。

下利脈反數而渴者。今自愈。設不差。必清膿血。有熱故也。

下利後脈絕。手足厥。晬時脈還。手足溫者生。不還者死。

傷寒下利。日十餘行。其人脈反實者死。

下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥。通脈四逆湯主之。方見少陰門

熱利下重。白頭翁湯主之。

下利欲飲水者。為有熱。白頭翁湯主之。方

白頭翁貳兩 黃蘗叁兩 黃連叁兩 秦皮叁兩

右肆味。以水柒升。煑取貳升。去滓。溫服壹升。不差更服。

下利腹滿。身體疼痛。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。方並見上

下利而譫語。爲有燥屎。小承氣湯主之。方見承氣門

下利後更煩。按其心下濡者。爲虛煩也。梔子湯主之。方見陽明門

嘔家有癰膿。不可治嘔。膿盡自愈。

嘔而發熱。小柴胡湯主之。方見柴胡門

嘔而脉弱。小便復利。身有微熱。見厥難治。四逆湯主之。方見上

乾嘔吐涎沫。而復頭痛。吳茱萸湯主之。方見陽明門

傷寒大吐下之。極虛復極汗者。其人外氣怫鬱。復與其水。以發其汗。因得噦。所以然者。胃中寒冷故也。

傷寒噦而腹滿者。視其前後。知何部不利。利之則愈。

傷寒宜忌第四十五章

忌發汗第一

少陰病。脉細沉數。病在裏。忌發其汗。

脉浮而緊。法當身體疼痛。當以汗解。假令尺中脉遲者。忌發其汗。何以知然。此爲榮氣不足。血氣微少故也。

少陰病。脉微。忌發其汗。無陽故也。

咽中閉塞。忌發其汗。發其汗即吐血。氣微絕。逆冷。

厥。忌發其汗。發其汗即聲亂。咽嘶。舌萎。

太陽病。發熱惡寒。寒多熱少。脉微弱則無陽也。忌復發其汗。

咽喉乾燥者。忌發其汗。

亡血家。忌攻其表。汗出則寒慄而振。

衄家。忌攻其表。汗出必額上促急。

汗家。重發其汗。必恍惚心亂。小便已陰疼。

淋家忌發其汗。發其汗必便血。
瘡家雖身疼痛。忌攻其表。汗出則痓。
冬時忌發其汗。發其汗必吐利。口中爛生瘡。欬而小便利。若失小便。忌攻其表。汗則厥逆冷。
太陽病發其汗。因致痓。

宜發汗第二

大法春夏宜發汗。
凡發汗。欲令手足皆周。漐漐一時間益佳。不欲流離。若病不解當重發汗。汗多則亡陽。陽虛不得重發汗也。
凡服湯藥發汗。中病便止。不必盡劑也。
凡云宜發汗而無湯者。丸散亦可用。然不如湯藥也。
凡脉浮者。病在外。宜發其汗。
太陽病。脉浮而數者。宜發其汗。

陽明病。脉浮虛者。宜發其汗。

陽明病。其脉遲。汗出多。而微惡寒者。表為未解。宜發其汗。

太陰病。脉浮。宜發其汗。

太陽中風。陽浮而陰濡弱。浮者熱自發。濡弱者汗自出。濇濇惡寒。淅淅惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔。桂枝湯主之。

太陽頭痛發熱。身體疼。腰痛骨節疼痛。惡風無汗而喘。麻黃湯主之。

太陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身體疼痛。不汗出而煩躁。大青龍湯主之。

少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。

忌吐第三

太陽病。惡寒而發熱。今自汗出。反不惡寒而發熱。關上脉細而數。此吐之過也。

少陰病。其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之
手足寒。脉弦遲。若膈上有寒飲。乾嘔。忌吐。當溫之。
諸四逆病厥。忌吐。虛家亦然。

宜吐第四

大法春宜吐。

凡服吐湯。中病便止。不必盡劑也。

病如桂枝證。其頭項不強痛。寸口脉浮。胷中痞堅。上撞咽喉。
不得息。此爲有寒。宜吐之。

病胷上諸實。胷中鬱鬱而痛。不能食。欲使人按之。而反有涎
唾。下利日十餘行。其脉反遲。寸口微滑。此宜吐之。利即止。

少陰病。其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。宜吐之。

病者手足逆冷。脉乍緊。邪結在胷中。心下滿而煩。飢不能食。
病在胷中。宜吐之。

宿食在上管。宜吐之。

忌下第五

咽中閉塞。忌下。下之則上輕下重。水漿不下。諸外實忌下。下之皆發微熱。亡脉則厥。

諸虛忌下。下之則渴。引水易愈。惡水者劇。

脉數者忌下。下之必煩利不止。

尺中弱濇者。復忌下。

脉浮大。醫反下之。此為大逆。

太陽證不罷。忌下。下之為逆。

結胷證。其脉浮大。忌下。下之即死。

太陽與陽明合病。喘而胷滿者。忌下。

太陽與少陽合病。心下痞堅。頸項強而眩。忌下。

凡四逆病厥者。忌下。虛家亦然。

病欲吐者忌下。

病有外證未解。忌下。下之為逆。

少陰病。食入即吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。手足寒。脉弦遲。此胷中實。忌下。

傷寒五六日。不結胷。腹濡。脉虛。復厥者。忌下。下之亡血則死。

宜下第六

大法秋宜下。

凡宜下。以湯勝丸散。

凡服湯下。中病則止。不必盡叁服。

陽明病。發熱汗多者。急下之。

少陰病。得之二三日。口燥咽乾者。急下之。

少陰病。五六日。腹滿不大便者。急下之。

少陰病。下利清水。色青者。心下必痛。口乾者。宜下之。

下利。三部脉皆浮。按其心下堅者。宜下之。

下利。脉遲而滑者。實也。利未欲止。宜下之。

陽明與少陽合病。利而脉不負者爲順。脉數而滑者。有宿食。宜下之。

問曰。人病有宿食。何以別之。答曰。寸口脉浮大。按之反濇。尺中亦微而濇。故知有宿食。宜下之。

下利。不欲食者。有宿食。宜下之。

下利差。至其時復發。此爲病不盡。宜復下之。

凡病腹中滿痛者。爲寒。宜下之。

腹滿不減。減不足言。宜下之。

傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。微熱者。此爲實。急下之。

脉雙弦而遲。心下堅。脉大而緊者。陽中有陰。宜下之。

傷寒有熱。而少腹滿。應小便不利。今反利。此為血。宜下之。

病者煩熱。汗出即解。復如瘧。日晡所發者。屬陽明。脉實者。當下之。

宜溫第七

大法冬宜服溫熱藥。

師曰。病發熱頭痛。脉反沉。若不差。身體更疼痛。當救其裏。宜溫藥四逆湯。

下利。腹脹滿。身體疼痛。先溫其裏。宜四逆湯。

下利。脉遲緊。為痛未欲止。宜溫之。

下利。脉浮大者。此為虛。以強下之故也。宜溫之。與水必噦。

少陰病下利。脉微澀。嘔者。宜溫之。

自利不渴者。屬太陰。其藏有寒故也。宜溫之。

少陰病。其人飲食入則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐。始得之。

手足寒。脉弦遲。若膈上有寒飲。乾嘔。宜温之。

少陰病。脉沈者。宜急温之。

下利。欲食者。宜就温之。

忌火第八

傷寒。加火針。必驚。

傷寒。脉浮。而醫以火迫劫之。亡陽。必驚狂。卧起不安。

傷寒。其脉不弦緊而弱。弱者必渴。被火必譫語。

太陽病。以火熏之。不得汗。其人必躁。到經不解。必清血。

陽明病。被火。額上微汗出。而小便不利。必發黄。

少陰病。欬而下利。譫語。是爲被火氣劫故也。小便必難。爲强責少陰汗也。

宜火第九

凡下利。穀道中痛。宜炙枳實若熬鹽等熨之。

忌灸第十

微數之脉。慎不可灸。因火爲邪。則爲煩逆。

脉浮。當以汗解。而反灸之。邪無從去。因火而盛。病從腰以下必重而痺。此爲火逆。

脉浮熱甚。而反灸之。此爲實。實以虛治。因火而動。咽燥必唾血。

宜灸第十一

少陰病一二日。口中和。其背惡寒。宜灸之。

少陰病吐利。手足逆。而脉不足。灸其少陰七壯。

少陰病下利。脉微澀者。即嘔。汗者。必數更衣。反少者。宜温其上灸之。一云灸厥陰伍拾壯

下利。手足厥。無脉。灸之。主厥。厥陰是也。灸不温。反微喘者。死。

傷寒六七日。其脉微。手足厥。煩躁。灸其厥陰。厥不還者。死。

脉促。手足厥者。宜灸之。

忌刺第十二

大怒無刺　新内無刺　大勞無刺　大醉無刺
大飽無刺　大渴無刺　大驚無刺　無刺熇熇之
熱。無刺渌渌之汗。無刺渾渾之脉。無刺病與脉相逆者。
上工刺未生。其次刺未盛。其次刺其衰。工逆此者。是謂伐形。

宜刺第十三

太陽病。頭痛至七日。自當愈。其經竟故也。若欲作再經者。宜
刺足陽明。使經不傳則愈。
太陽病。初服桂枝湯。而反煩不解。宜先刺風池風府。乃却與
桂枝湯則愈。
傷寒。腹滿而譫語。寸口脉浮而緊者。此爲肝乘脾。名曰縱。宜
刺期門。

傷寒。發熱濇濇惡寒。其人大渴。欲飲酨漿者。其腹必滿。而自汗出。小便利。其病欲解。此爲肝乘肺。名曰横。宜刺期門。

陽明病。下血而譫語。此爲熱入血室。但頭汗出者。刺期門隨其實而寫之。

太陽與少陽合病。心下痞堅。頸項強而眩。宜刺大椎肺俞肝俞。勿下之。

婦人傷寒懷身。腹滿不得小便。加從腰以下重。如有水氣狀。懷身七月。太陰當養不養。此心氣實。宜刺寫勞宮及關元。小便利則愈。

傷寒喉痺。刺手少陰。穴在腕當小指後動脉是也。針入叁分補之。

少陰病。下利便膿血者。宜刺。

忌水第十四

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘
下利其脈浮大此為虚以強下之故也設脈浮革因爾腸鳴當溫之與水必噦
太陽病小便利者為水多心下必悸

宜水第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水當稍飲之令胃氣和則愈
厥陰渴欲飲水與水飲之即愈
嘔而吐膈上者必思煑餅急思水者與五苓散飲之水亦得也

發汗吐下後病狀第五 叁拾證 方壹拾伍首

發汗後水藥不得入口為逆
未持脈時病人手叉自冒心師因教試令欬而不即欬者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虚故也

發汗後身熱，又重發其汗，胃中虛冷，必反吐也。

大下後發汗，其人小便不利，此亡津液，勿治，其小便利，必自愈。

病人脈數，數爲熱，當消穀引食，而反吐者，以醫發其汗，陽氣微，膈氣虛，脈則爲數，數爲客熱，不能消穀，胃中虛冷，故吐也。

病者有寒，復發其汗，胃中冷，必吐蚘。一云吐逆

發汗後重發其汗，亡陽譫語，其脈反和者，不死。服桂枝湯，汗出，大煩渴不解，若脈洪大，與白虎湯。方見雜療中

發汗後身疼痛，其脈沈遲，桂枝加芍藥生薑人參湯主之。

方

桂枝參兩　芍藥四兩　生薑四兩　甘草貳兩，炙　大棗拾貳枚，擘

人參參兩

右陸味，以水壹斗貳升，煮取參升，去滓，溫服壹升。本云桂

枝湯令加芍藥生薑人參。

太陽病。發其汗而不解。其人發熱。心下悸。頭眩。身瞤而動。振振欲擗地者。玄武湯主之。（方見少陰門）

發汗後。其人臍下悸。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

方　茯苓（半斤）　桂枝（肆兩）　甘草（壹兩。炙）　大棗（拾伍枚擘）

右肆味。以水壹斗。先煮茯苓減貳升。內諸藥。煮取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。

發汗過多。以後其人叉手自冒心。心下悸。而欲得按之。桂枝甘草湯主之。**方**

桂枝（肆兩）　甘草（貳兩。炙）

右貳味。以水叁升。煮取壹升。去滓。頓服即愈。

發汗。脉浮而數。復煩者。五苓散主之。（方見結胸門中）

發汗後。腹脹滿。厚朴生薑半夏甘草人參湯主之。**方**

厚朴（炙半斤）。生薑（切半斤）。半夏（洗半升）。甘草（炙貳兩）。人參（壹兩）

右伍味。以水壹斗。煑取叁升。去滓。溫服壹升。日叁服。

發其汗不解。而反惡寒者。虛故也。芍藥甘草附子湯主之。方

芍藥　甘草（各叁兩炙）　附子（壹枚炮去皮破六片）

右叁味。以水叁升。煑取壹升貳合。去滓。分溫叁服。

不惡寒。但熱者。實也。當和其胃氣。宜小承氣湯。方（見承氣湯門一云調胃承氣）

傷寒。脉浮自汗出。小便數。煩。復微惡寒。而脚攣急。反與桂枝欲攻其表。得之便厥。咽乾煩躁。吐逆。當作甘草乾薑湯。以復其陽。厥愈足溫。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸。而胃氣不和。可與承氣湯。重發汗。復加燒針者。四逆湯主之。甘草乾薑湯。方

甘草（四兩炙）。　乾薑（貳兩）

右貳味。以水叁升。煑取壹升。去滓。分温再服。

芍藥甘草湯方

芍藥　甘草（炙各四兩）

右貳味。以水叁升。煑取壹升半。去滓。分温再服。

凡病若發汗。若吐。若下。若亡血無津液。而陰陽自和者。必自愈。

傷寒。吐下發汗後。心下逆滿。氣上撞胷。起即頭眩。其脉沉緊。發汗即動經。身爲振搖。茯苓桂枝白朮甘草湯主之方。

茯苓（四兩）　桂枝（叁兩）　白朮　甘草（炙各貳兩）

右肆味。以水陸升。煑取叁升。去滓。分温叁服。

發汗吐下以後不解。煩躁。茯苓四逆湯主之方

茯苓（四兩）　人參（壹兩）　甘草（貳兩。炙）　乾薑（壹兩半）　附子（壹枚。生。去皮。破八片）

右伍味。以水伍升。煑取貳升。去滓。温服柒合。日叁服。

發汗吐下後，虛煩不得眠，劇者反覆顛倒，心中懊憹，梔子湯主之。若少氣，梔子甘草湯主之。若嘔者，梔子生薑湯主之。

梔子湯方見陽明門

梔子甘草湯方

於梔子湯中加甘草貳兩即是。

梔子生薑湯方

於梔子湯中加生薑伍兩即是。

傷寒下後，煩而腹滿，臥起不安，梔子厚朴湯主之。方

梔子拾肆枚，擘　厚朴肆兩，炙　枳實肆枚，炙

右叁味，以水叁升半，煮取壹升半，去滓，分貳服，溫進壹服，快吐，止後服。

下以後，發其汗，必振寒，又其脉微細，所以然者，內外俱虛故也。

發汗若下之，煩熱，胷中窒者，屬梔子湯證。

下以後復發其汗者，則晝日煩躁不眠，夜而安靜，不嘔不渴，而無表證，其脉沉微，身無大熱，屬附子乾薑湯方。

附子（壹枚，生，去皮，破捌片）　乾薑（壹兩）

右貳味，以水叁升，煮取壹升，去滓，頓服即安。

太陽病，先下而不愈，因復發其汗，表裏俱虛，其人因冒，冒家當汗出自愈，所以然者，汗出表和故也，表和故下之。

傷寒，醫以丸藥大下後，身熱不去，微煩，梔子乾薑湯主之方。

梔子（拾肆枚，擘）　乾薑（貳兩）

右貳味，以水叁升半，煮取壹升半，去滓，分貳服，溫進壹服，得快吐，止後服。

脉浮數，法當汗出而愈，而下之，則身體重，心悸者，不可發其汗，當自汗出而解，所以然者，尺中脉微，此裏虛，須表裏實，津液自和，自汗出愈。

發汗以後。不可行桂枝湯。汗出而喘。無大熱。與麻黃杏子石膏甘草湯。

麻黃肆兩去節。杏仁伍拾枚去皮尖。石膏半斤碎 甘草貳兩炙。

右肆味。以水柒升。先煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煮取叁升。去滓。溫服壹升。本云黃耳杯。

傷寒。吐下後。七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升。白虎湯主之。方見雜療中。

傷寒。吐下後未解。不大便五六日。至十餘日。其人日晡所發潮熱。不惡寒。猶如見鬼神之狀。劇者發則不識人。循衣妄撮。怵惕不安。微喘直視。脈弦者生。澀者死。微者但發熱譫語。與承氣湯。若下者。勿復服。

大下後。口燥者。裏虛故也。

霍亂病狀第八 壹拾論 方叁首

問曰。病有霍亂者。何也。答曰。嘔吐而利。此為霍亂。

問曰。病者發熱頭痛。身體疼痛。惡寒而復吐利。當屬何病。答曰。當為霍亂。霍亂吐下利止。復更發熱也。

傷寒。其脉微濇。本是霍亂。今是傷寒。却四五日。至陰經上轉入陰。當利。本素嘔下利者。不治。若其人即欲大便。但反失氣。而不利者。是為屬陽明。必堅。十二日愈。所以然者。經竟故也。

下利後。當堅。堅能食者愈。今反不能食。到後經中。頗能食。復一經能食。過之一日當愈。若不愈。不屬陽明也。惡寒脉微而復利。利止必亡血。四逆加人參湯主之。方

四逆湯中加人參壹兩即是。

霍亂而頭痛發熱。身體疼痛。熱多欲飲水。五苓散主之。寒多不用水者。理中湯主之。方　五苓散見結胸門

人參　乾薑　甘草炙　白朮各叄兩

右肆味，以水捌升，煑取叄升，去滓，溫服壹升，日叄服。臍上築者，爲腎氣動，去朮加桂肆兩。吐多者，去朮加生薑叄兩。下利多者，復用朮。悸者，加茯苓貳兩。渴者，加朮至肆兩半。腹中痛者，加人參至肆兩半。寒者，加乾薑至肆兩半。腹滿者，去朮加附子壹枚。服藥後，如食頃，飲熱粥壹升，微自溫暖，勿發揭衣被。壹方，蜜和丸，如雞黃許大，以沸湯數合和壹丸，研碎溫服，日叄夜貳。腹中未熱，益至叄肆丸。然不及湯。

吐利止而身體痛不休，當消息和解其外，宜桂枝湯小和之。

吐利汗出，發熱惡寒，四肢拘急，手足厥，四逆湯主之。旣吐且利，小便復利，而大汗出，下利清穀，裏寒外熱，脉微欲絶，四逆湯主之。

吐已下斷，汗出而厥，四肢不解，脉微欲絶，通脉四逆加猪膽

湯主之。方

於通脉四逆湯中加猪膽汁半合即是。服之。其脉即出。

無猪膽。以羊膽代之。

吐利發汗。其人脉平。而小煩。此新虚不勝穀氣故也。

陰昜病已後勞復第七 論壹方四首 隂方六首

傷寒陰昜之為病。身躰重少氣。少腹裏急。或引陰中拘攣。熱上衝胷。頭重不欲舉。眼中生花。痂胞赤。膝脛拘急。燒褌散主之。方

婦人裏褌近隱處燒灰。

右壹味。水和服方寸匕。日叁。小便即利。陰頭微腫。此為愈。

大病已後。勞復。枳實梔子湯主之。方

枳實叁枚炙。　豉壹升綿裹。　梔子拾肆枚擘。

右叁味。以酢漿柒升。先煎取肆升。次內貳味。煑取貳升。內

豉。煮五六沸。去滓。分溫再服。若有宿食。內大黃如博棊子

大五六枚。服之愈。

傷寒差已後。更發熱。小柴胡湯主之。脉浮者。以汗解之。脉沈

實一作緊者。以下解之。

大病已後。腰以下有水氣。牡蠣澤瀉散主之。方

牡蠣熬　澤瀉　蜀漆洗　商陸　葶藶熬

海藻洗　栝樓根各等分

右柒味。擣為散。飲服方寸匕。日叁服。小便即利。

傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯主之。方

竹葉貳把　半夏半升洗　麥門冬壹升去心　甘草炙

人參各貳兩　石膏壹斤碎　粳米半升

右柒味。以水壹斗。煮取陸升。去滓。內粳米熟湯成。溫服壹

升。日叁服。

大病已後。其人喜唾。久久不了。胷上有寒。當溫之。宜理中丸。

病人脉已解而日暮微煩者。以病新差。人強與穀。脾胃氣尚弱。不能消穀。故令微煩。損穀即愈。

雜方附

華佗曰。時病差後。七日內。酒肉五辛油麪生冷醋滑房室皆斷之。永差。

書生丁季受殺鬼丸方。

虎頭骨炙　丹砂　真珠　雄黃　雌黃

鬼臼　曾青　女青　皂莢去皮子炙　桔梗

蕪荑　白芷　芎藭　白朮　鬼箭削取皮羽

鬼督郵　藜蘆　菖蒲以上各貳兩

右壹拾捌味。擣篩。蜜和如彈丸大。帶之。男左女右。

劉次卿彈鬼丸方。

雄黃　丹砂各貳兩　石膏肆兩　烏頭　鼠負各壹兩

右伍味。以正月建除日。執厭日亦得。擣爲散。白蠟伍兩。銅器中火上消之。下藥攪令凝。丸如楝實。以赤縠裹壹丸。男左女右肘後帶之。

度瘴散方

麻黃去節　升麻　附子炮，去皮　白朮各壹兩　細辛

乾薑　防己　防風　桂心　烏頭炮，去皮

蜀椒汗　桔梗各貳兩

右壹拾貳味。擣篩爲散。密貯之。山中所在有瘴氣之處。旦空腹飲服壹錢匕。覆取汗。病重稍加之。

老君神明白散方

白朮　附子炮，去皮，各貳兩。　桔梗　細辛各壹兩

烏頭肆兩，炮，去皮。

右伍味。麤擣篩。絳囊盛帶之。所居閭里皆無病。若有得疫者。溫酒朝壹方寸匕。覆取汗。得吐即差。或經三四日者。以叄方寸匕內伍升水中煑令沸。分溫三服。

太一流金散方。

雄黃叄兩　雌黃　羖羊角貳兩

礬石壹兩燒汁盡　鬼箭削皮羽壹兩半

右伍味。擣篩爲散。以細密帛裹之。作叄角絳囊盛壹兩帶心前。并挂門閤窻牖上。若逢大疫之年。以朔旦平明時。以青布裹壹刀圭中庭燒之。有病者。亦燒熏之。若遭毒螫者。以唾和塗之。

務成子螢火丸。主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒。五兵白刃盜賊凶害。昔冠軍將軍武威太守劉子南從尹公受得此方。以永平十二年。於北界與虜戰敗績。士卒略盡。子南

被圍。矢下如雨未至子南馬數尺。矢輒墮地。虜以爲神人。乃解圍而去。子南以方教子及諸兄弟爲將者。皆未嘗被傷。累世祕之。漢末青牛道士得之。以傳安定皇甫隆。隆以傳魏武帝。乃稍有人得之。故一名冠軍丸。一名武威丸方。

螢火　鬼箭削取皮羽　蒺藜各壹兩　雄黃　雌黃

礜石燒汁盡貳兩。　羖羊角　鍛竈灰

鐵鎚柄入鐵處。燒焦。各壹兩半

右玖味。擣篩爲散。以雞子黃并丹雄雞冠壹具和之。如杏仁大。作叁角絳囊盛伍丸。帶左臂。若從軍繫腰中勿離身。若家挂戶上甚辟盜賊絕止也。

千金翼方卷第十

千金翼方卷第十一

小兒

養小兒第一 合八十九條方二十首 灸法二十首論一首

凡兒在胎一月胚。二月胎。三月有血脉。四月形體成。五月能動。六月諸骨具。七月毛髮生。八月藏腑具。九月穀入胃。十月百神備則生矣。生後六十日瞳子成。能咳笑應和人。百五十日任脉成。能自反覆。百八十日髖骨成。能獨坐。二百一十日掌骨成。能扶伏。三百日臏骨成。能立。三百六十日膝臏成。能行也。若不能依期者。必有不平之處。

兒初生落地。口中有血。即當去之。不去者。兒若吞之。成痞病死。

治兒生落地不作聲法。取煖水一盆灌浴之。須臾即作聲。

小兒始生即當舉之。舉之遲晚。則令中寒。腹中雷鳴。先浴之。然後乃斷臍。斷臍當令長至足趺。短則中寒。令腹中不調。當

下痢。若先斷臍後浴之。則令臍中水。中水則發腹痛。若臍中水及中冷。則腹絞痛。夭糺啼呼。面目青黑。此是中水之過。當灸粉絮以熨之。不時治護。臍至腫者。當隨輕重。重者便灸之。乃可至八九十壯。輕者臍不大腫。但出汁。時時啼呼者。但擣當歸末粉傳之。灸粉絮日日熨之。至百日乃愈。以啼呼止爲候。若兒尿清者。冷也。與臍中水同。

凡初生斷兒臍。當令長六寸。臍長則傷肌。臍短則傷藏。不以時斷臍。若臍汁不盡者。即自生寒。令兒風臍也。

裹臍法。

椎治帛。令柔軟。方四寸。新綿厚半寸。與帛等合之。調其緩急。急則令兒吐哯。兒生二十日乃解視臍。若十許日兒怒啼似衣中有刺者。此或臍燥。還刺其腹。當解之。易衣更裹臍。時當閉戶下帳。然火左右。令帳中温煖。換衣亦然。仍以温粉粉之。

此謂冬之時寒也。若臍不愈。燒絳帛末作灰粉之。若過一月臍有汁不愈。燒蝦蟆灰治末粉臍中。日三四度。若臍未愈。乳兒太飽。令兒風臍也。

兒新生不可令衣過厚熱。令兒傷皮膚肌肉。血脉發雜瘡及黃。

凡小兒始生。肌膚未成。不可暖衣。暖衣則令筋骨緩弱。宜時見風日。若不見風日。則令肌膚脆軟。便易中傷。皆當以故絮衣之。勿用新綿也。天和暖無風之時。令母將兒於日中嬉戲。數令見風日。則血凝氣剛。肌肉牢密。堪耐風寒。不致疾病。若常藏在幃帳中。重衣溫暖。譬猶陰地之草。不見風日。軟脆不堪當風寒也。

兒生十日始得哺。如棗核大。二十日倍之。五十日如彈丸大。百日如棗大。若乳汁少。不從此法。當用意少少增之。若三十日乃哺者。令兒無疾。兒若早哺之及多者。令兒頭面身體喜

生瘡。差而復發。亦令兒尫弱難食。

小兒生滿三十日。乃當哺之。若早哺之。兒不勝穀氣。令兒病。則多肉耗。三十日後雖哺勿多。若不嗜食勿強與。強與不消。復成疾病。哺乳不進者。腹中皆有痰澼也。當以四物紫丸微下之。節哺乳數日便自愈也。

小兒寒熱亦皆當爾。要當下之。然後乃差。

凡乳母乳兒。當先以手極挼散其熱。勿令乳汁奔出。令兒咽輒奪其乳。令得息息已。復乳之。如是十反五反。視兒飢飽節度。知一日之中幾乳而足。以爲常。又常捉去宿乳。

兒若臥。乳母當臂枕之。令乳與兒頭平乃乳之。如此令兒不噎。母欲寐則奪其乳。恐填口鼻。又不知飢飽也。

兒生有胎寒。則當腹痛。痛者偃啼。時時吐哯。或腹中如雞子黄者。按之如水聲。便沒。沒已復出。此無所苦爾。宜早服當歸

圓。黄耆散即愈。當歸圓方見千金方中。黄耆散方。本闕

凡乳兒不欲大飽。飽則令吐。凡候兒吐者。是乳太飽也。當以空乳乳之。即消。夏若不去熱乳。令兒嘔逆。冬若不去寒乳。令兒欬痢。母新房。以乳兒。令兒羸瘦。交脛不能行。

母患熱以乳兒。令兒變黄。不能食。

母怒以乳兒。令兒喜驚。發氣疝。又令兒上氣癲狂。母新吐下以乳兒。令兒虛羸。

母醉以乳兒。令兒身熱腹滿。

凡小兒不能哺乳。當服紫丸下之。

凡浴小兒湯。極須令冷熱調和。冷熱失所。令兒驚。亦致五藏疾。

凡兒冬不可久浴。浴久則傷寒。夏不可久浴。浴久則傷熱。

凡兒又不當數浴。背冷則令發癎。若不浴又令兒毛落。

小兒生輒死。治之法。當候視兒口中懸癰前上腭上有赤胞者。以指擿取。決令潰。以少綿拭去。勿令血入咽。入咽殺兒。急急慎之。

凡兒生三十二日一變。六十四日再變。變且蒸。九十六日三變。百二十八日四變。變且蒸。百六十日五變。百九十二日六變。變且蒸。二百二十四日七變。二百五十六日八變。變且蒸。二百八十八日九變。三百二十日十變。變且蒸。積三百二十日小蒸畢。後六十四日大蒸。蒸後六十四日復大蒸。蒸後百二十八日復大蒸。積五百七十六日。大小蒸畢。

凡變者上氣。蒸者體熱。凡蒸平者五日而衰。遠者十日而衰。先變蒸五日。後五日。爲十日之中。熱乃除爾。

兒生三十二日一變。二十九日先期而熱。便治之如法。至三十六七日蒸乃畢爾。恐不解了。故重說之。審計變蒸之日當

其時有熱微驚。不得灸刺也。得服藥及變且蒸之時。不欲驚動。勿令傍多人。兒變蒸時或早或晚。不如法者多。兒變蒸時壯熱不欲食。食輒吐哯。若有寒加之。即寒熱交爭。腹腰夭糾啼不止。熨之當愈也。

凡小兒身熱。脉亂汗出者。蒸之候也。

兒變蒸時。目白者重。赤黑者微。變蒸畢。目精明矣。

兒上脣頭小白泡起。如死魚目珠子者。蒸候也。初變蒸時有熱者。服黑散發汗。熱不止。服紫丸。熱差便止。勿復與丸。自當有餘熱。變蒸盡乃除爾。

兒身壯熱。而耳冷。髖亦冷者。即是蒸候。愼勿治之。兒身熱髖耳亦熱者。病也。乃須治之。

紫圓 治小兒變蒸發熱不解。并挾傷寒溫壯汗後熱不歇。及腹中有痰澼。哺乳不進。乳則吐哯。食癎先寒熱方。

代赭石　赤石脂各壹兩　巴豆叁拾枚去皮心熬　杏仁伍拾枚去皮尖熬

右肆味。末之。巴豆杏仁别擣為膏。和更擣二千杵。當自相得。若硬入少蜜同擣。密器中收之。三十日兒服如麻子一圓。與少乳汁令下。食頃後與少乳。勿令多。至日中當小下熱除。若未全除。明日更與一丸。百日兒服如小豆一丸。以此準量增減。夏月多熱。喜令發疹。二三十日輒一服佳。此丸無所不治。雖下不虛人。

黑散 治小兒變蒸中挾時行温病。或非變蒸時而得時行方。

麻黄去節　杏仁去皮尖熬各半兩　大黄壹分

右叁味。擣為散。一月兒服小豆大一枚。以乳汁和服。抱令得汗。汗出温粉粉之。勿使見風。百日兒服如棗核大小量之。

相兒命長短法

兒生枕骨不成者。能言而死。

膝骨不成者。能倨而死。

掌骨不成者。能扶伏而死。

踵骨不成者。能行而死。

臏骨不成者。能立而死。

生身不收者死。

魚口者死。

股間無生肉者死。

顱下破者死。

陰不起者死。

囊下白者死。赤者死。

相法甚博。略述十數條而已。

兒初生額上有旋毛者。早貴。妨父母。

兒初生陰大而與身色同者。成人。

兒初生叫聲連延相屬者。壽。聲絕而復揚急者。不壽。

兒初生汗血者。多厄不壽。

兒初生目視不正。數動者。大非佳人。

兒初生自開目者。不成人。

兒初生通身軟弱如無骨者。不成人。

兒初生髮稀少者。強不聽人。

兒初生臍小者。不壽。

兒初生早坐早行早語早齒生。皆惡性。非佳人。

兒初生頭四破者。不成人。

兒初生頭毛不周匝者。不成人。

啼聲散。不成人。

啼聲深。不成人。

汗不流。不成人。

小便凝如脂膏。不成人。

常摇手足者。不成人。

無此狀候者。皆成人也。

兒初生臍中無血者好。

卵下縫通達而黑者壽。

鮮白長大者壽。

論曰。兒三歲以上。十歲以下。觀其性氣高下。即可知其夭壽大略。兒小時識悟通敏過人者多夭。則項託顏回之流是也。小兒骨法成就威儀。迴轉遲舒。稍費人精神雕琢者壽。其預知人意。迴旋敏速者亦夭。則楊脩孔融之流是也。由此觀之。夭壽大略可知也。亦由梅花早發。不覩歲寒。甘菊晚榮。終於年事。是知晚成者。壽之兆也。

凡小兒之癇有三種。有風癇。有驚癇。有食癇。然風癇驚癇時

時有爾十人之中未有一二是食癇者凡是先寒後熱發癇者皆是食癇也驚癇當按圖灸之風癇當與豚心湯下之食癇當下乃愈紫丸佳

凡小兒所以得風者緣衣暖汗出風因而入也風癇者初得之時先屈指如數乃發作此風癇也驚癇者起於驚怖先啼乃發作此驚癇也驚癇微者急持之勿復更驚之或自止也其先不哺乳吐而變熱後發癇此食癇也早下之則差四味紫丸逐澼飲最良去病速而不虛人赤丸差駃病重者當用之小兒衣甚寒薄則腹中乳食不消其大便皆酢臭此欲為癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀勿使大下也稀後便漸減之矢不酢臭乃止藥驚癇但灸及摩生膏不可下也驚癇心氣不定下之內虛益令甚爾驚癇甚者特為難治故養小兒常當慎驚勿令聞大聲抱持之間

當安徐勿令怖也。又天雷時須塞其耳。但作餘小聲以亂之也。
凡小兒微驚者。以長血脉。但不欲大驚。大驚乃灸驚脉。
小兒有熱不欲哺乳。卧不安。又數驚。此癇之初也。服紫丸便愈。不差更服之。兒立夏後有病。治之慎勿妄灸。不欲吐下。但以除熱湯浴之。除熱散粉之。除熱赤膏摩之。又臍中以膏塗之。令兒在涼處。勿禁水漿。常以新水飲之。兒眠時小驚者。一月輒一以紫丸下之。減其盛氣。令兒不病癇也。
小兒氣盛有病。但下之。必無所損。若不時下。則將成病。固難治矣。
凡下。四味紫丸最善。雖下不損人。足以去疾。爾若四味紫丸不時下者。當以赤丸下之。赤丸不下。當更倍之。若已下而餘熱不盡。當按方作龍膽湯。稍稍服之。并摩赤膏。
凡小兒冬月下無所畏。夏月下難差。然有病者不可不下。下

後腹中當小脹滿。故當節哺乳數日。不可妄下。又乳哺小兒。常令多少有常劑。兒漸大。當稍稍增之。若減少者。此腹中已有小不調也。便微服藥。停哺但與乳。甚者十許日。微者五六日止哺。自當如常。若不肯哺而欲乳者。此是有癖。為疾重要。當下之。無不差者。不下則致寒熱。或反吐而發癎。或更致下痢。此皆病重。不早下之所為也。為難治。但先治其輕時。兒不耗損而病速愈。

凡小兒屎黃而臭者。此腹中有伏熱。宜微將服龍膽湯。若白而酢者。此挾寒不消也。當服紫圓。微者少與藥。令內消。甚者小增。令小下。皆須節乳哺數日。令胃氣平和。若不節乳哺。則病易復。復下之則傷其胃氣。令腹脹滿。再三下之尚可。過此傷矣。

凡小兒有癖。其脈大必發癎。此為食癎。下之便愈。當候掌中與三指脈。不可令起而不時下。致於發癎則難治也。若早下

之。此脉終不起也。脉在掌中尚可早治。若至指則病増也。

凡小兒腹中有疾生則身寒熱。寒熱則血脉動。血脉動則心不定。心不定則易驚。驚則癇發速也。

龍膽湯治小兒出腹血脉盛實。寒熱温壯。四肢驚掣。發熱大吐哯者。若已能進哺中食實不消。壯熱及變蒸不解。中客人鬼氣。并諸驚癇。方悉主之。十歲以下小兒皆服之。小兒龍膽湯第一。此是出腹嬰兒方。若日月長大者。以次依此爲例。若必知客忤及魅氣者。可加人參當歸。各如龍膽多少也。一百日兒加半分。二百日加一分。一歲兒加半兩。餘藥皆準耳。

龍膽　鈎藤　柴胡去苗　黄芩　桔梗

芍藥　茯神　甘草炙各壹分　蜣蜋貳枚炙　大黄壹兩

右壹拾味。㕮咀。以水貳升。煮取五合。爲一劑也。取之如後節度。藥有虚實。虚藥宜足數合水也。兒生一日至七日分

一合。爲三服。兒生八日至十五日。分一合半。爲三服。兒生十六日至二十日。分二合。爲三服。兒生二十日至三十日。分三合。爲三服。兒生三十日至四十日。盡以五合爲三服。十歲亦準此。皆溏下即止。勿復服也。

治少小心腹熱。除熱丹參赤膏方。

丹參 雷丸 芒消 戎鹽 大黄各叁兩

右伍味。切。以苦酒半升。浸四種一宿。以成鍊猪脂一斤。煎三上三下。去滓。内芒消。膏成。以摩心下。冬夏可用。一方但丹參雷丸。

治少小新生肌膚幼弱。喜爲風邪所中。身體壯熱。或中大風手足驚掣。五物甘草生摩膏方。

甘草炙 防風各壹兩 白朮貳拾銖 雷丸貳兩半 桔梗貳拾銖

右伍味。切。以不中水猪肪壹斤。微火煎爲膏。去滓。取彈丸

大一枚，灸手以摩兒百過。寒者更熱，熱者更寒。小兒無病

早起常以膏摩顖上及手足心，甚辟風寒。

礬石圓 主小兒胎寒偃啼，驚癇臚脹滿，不嗜食，大便青黃，并

治大人虛冷，內冷或有實，不可吐下方。

馬齒礬石（壹斤，燒半日）

右壹味，末之，棗膏和圓。大人服如梧子二枚，日三服，小兒

減之，以意增損，以腹中溫暖爲度，有實亦去，神良。

小兒客忤愼忌法。

凡小兒衣裳帛綿中，不得令有頭髮，履中亦然。

凡白衣青帶，青衣白帶者，皆令兒中忤。

諸遠行來，馬汗未解，行人未澡洗及未易衣而見兒者，皆中

客忤。見馬及馬上物、馬氣，皆忌之。

小兒中客之爲病，吐下青黃汁，腹中痛，及反倒偃側，似癇狀。

但目不上揷。少睡。面色變五色。脉弦急。若失時不治。小久則難治。治之法。

以水和豉擣令熟。丸如雞子大。以轉摩兒顖上。及手足心各五遍。又摩心腹臍上下行轉摩之。食頃破視其中有細毛。棄圓道中。病愈矣。

若吐不止。灸手心主。間使。大都。隱白。三陰交各三炷。

又可用粉丸如豉法。並用唾之。唾之呪如左。　呪曰。

摩家公　摩家母　摩家兒若客忤。從我始。扁鵲雖良不如善唾良。唾訖棄丸於道中。

又方

取一刀横著竈上。解兒衣。撥其心腹訖。取刀持向兒呪之唾。輒以刀擬向心腹曰。咻咻。曰煌煌日出東方。背陰向陽。葛公葛母不知何公子。來不視。去不顧。過與生人忤。梁上。

塵天之神。戶下二鬼。所經大刀環犀。對竈君二七唾。客愈兒驚唾咪咪如此二七。咪咪每唾以刀擬之。呪當三遍乃畢。用豉丸一如上法五六遍訖。取此丸破看。其中有毛棄丸於道中。即愈矣。

治小兒卒客忤法。

取銅鏡鼻燒令赤。著少許酒中。大兒飲之。小兒不能飲者。含哺之愈。

又方

取馬矢三升。燒令煙絕。以酒三升。煑三沸。去滓。浴兒即愈。

千金湯 主小兒暴驚啼絕死。或有人從外來。邪氣所逐。令兒得病。衆醫不治方。

蜀漆壹分。壹 一云蜀椒 左顧牡蠣壹分。熬

右貳味。㕮咀。以酢漿水壹升。煑取伍合。一服一合。良。

治小兒新生客忤中惡。發癇發熱。乳哺不消。中風反折。口吐舌。并注忤。面青目上插。腹滿癲癇。羸瘦疰。及三歲不行。雙丸方。

上麝香貳兩　牛黃貳兩　黃連貳兩宣州者　丹砂壹兩　特生礜石壹兩燒　附子壹兩炮去皮　雄黃壹兩　巴豆陸拾枚去皮心熬　桂心壹兩　烏賊魚骨壹兩　赤頭蜈蚣壹兩熬。

右壹拾壹味。各異擣篩。別研巴豆如膏。乃內諸藥。鍊蜜和擣三千杵。密塞之。勿洩氣。生十日二十日至一月日。服如黍米大二丸。四十日至百日。服如麻子大二丸。一歲以上以意增加。有兒雖小而病重者。增大其丸。不必依此丸。小兒病客忤。率多耐藥。服藥當汗出。若汗不出者。不差也。一日一夜四五服。以汗出為差。凡候兒中人者。為人乳子未了而有子者。亦使兒客忤。口中銜血。即月客也。若有此者。當尋服此藥。即兒可全也。口聚唾。腹起熱者。當灸臍中。不

過二七壯。并勤服此藥。若喜失子者。產訖兒墮落地聲未絕。便即以手指刮舌上。當得所銜血如韭葉者。便以藥二丸如粟米大服之。作七日乃止。無不痊也。若無赤頭蜈蚣。赤足者亦得三枚。皆斷取前兩節。其後分不可用也。

小兒雜治第二論一首 方五十七首

竹葉湯主五六歲兒溫壯。腹中急滿氣息不利。或有微腫。亦主極羸。不下飲食。堅痞。手足逆冷方。

竹葉切，壹升 小麥半升 甘草炙 黃芩 栝樓根 澤瀉 知母 人參 茯苓 白朮 大黃各壹兩 生薑壹兩半，切 麥門冬貳兩，去心 桂心貳銖 半夏貳兩，洗 當歸叁兩 分

右壹拾陸味。㕮咀。以水渠升。煑麥竹葉取四升。去滓內諸藥。煑取一升六合。分四服。

治小兒連壯熱實滯不去。寒熱往來。微驚方。

大黃　黃芩各壹兩　栝樓根叁分　甘草炙　牡蠣熬

人參各半兩　桂心貳兩　龍骨　凝水石　白石脂各半兩

滑石貳兩碎　消石半兩

右壹拾貳味。㕮咀。加紫石英半兩。以水四升。煑取一升半。分服三合。一日令盡。

治小兒寒熱欬逆。膈中有澼。乳若吐。不欲食方。

乾地黃肆兩　麥門冬半升去心　五味子半升　大黃壹兩

消石壹兩　蜜半升

右陸味。㕮咀。以水三升。煑取一升。去滓。内消石蜜。更煑令沸。服二合。日三。胸中當有宿乳一升許出。兒大者服五合。

射干湯 主小兒欬逆喘息如水雞聲方。

射干貳兩　麻黃貳兩去節　紫菀壹兩　甘草壹兩炙　桂心伍寸

半夏（伍枚，洗去滑）　生薑（壹兩，切）　大棗（肆枚，擘）

右捌味，㕮咀，以水柒升，煑取一升半，去滓，內蜜半斤，更煑一沸，飲三合，日三服。

又方

半夏（肆兩，洗）　桂心（貳兩）　生薑（貳兩，切）　紫菀（貳兩）　細辛（貳兩）

阿膠（貳兩）　甘草（貳兩，炙）　蜜（壹合）　款冬花（貳合）

右玖味，㕮咀，以水一斗，煑半夏取六升，去滓，內諸藥，更煑取壹升伍合，伍歲兒飲一升，貳歲兒服六合，量大小加減之。

治小兒欬逆短氣，胷中吸吸，呵出涕唾，欬出臭膿，亦治大人。

燒淡竹瀝，煑二十沸，小兒一服一合，日五服，大人服一升，亦日五服，不妨食息乳哺。

杏仁圓　主小兒大人欬逆上氣方。

杏仁（三升，去尖皮兩人，熬令黃）

右一味。熟擣如膏。蜜一升為三分。以一分內杏仁擣令強。更內一分擣之如膏。又內一分擣熟止。先食已含之。咽汁多少自在量之。

治小兒火灼瘡。一身皆有如麻子小豆。戴膿乍痛乍痒熱方。

甘草生用　芍藥　白斂　黃芩各叁分

黃連　黃檗各半兩

右六味。擣篩。以白蜜和塗上。日再。亦可作湯浴之。千金有苦參

治小兒火瘡方。

熟煑大豆濃汁溫浴之。亦令無瘢。

又方

以蜜塗之。日十遍。

苦參湯　主小兒頭面熱瘡方。

苦參捌兩　大黃叁兩　蛇牀子壹升　芍藥叁兩　黃芩貳兩

黃檗伍兩　黃連叁兩　菝葜壹斤

右捌味。切。以水叁斗。煮取壹斗半。洗之。日三度。大良。千金云治上下偏身生瘡

又方

大黃　黃芩　黃蘗　澤蘭　礬石

石南各壹兩　戎鹽貳兩　蛇牀子叁合

右捌味。切。以水柒升。煮取三升。以絮內湯中。洗拭之。日三度。

又方

熬豉。令黃。末之。以傅瘡上。不過三度愈。

治二百日小兒頭面瘡起身體大熱方。

黃芩叁分　升麻壹兩　柴胡壹兩。去苗　石膏壹兩。碎　甘草貳分半。炙

大黃叁兩　當歸半兩

右柒味。㕮咀。以水四升。煮取貳升。分為四服。日三夜一。多煮洗瘡佳。

治小兒身體頭面悉生瘡方。

取榆白皮灼令燥。下篩。酢和。塗綿覆上。蟲出自差。

治小兒手足身體腫方。

以小便溫煖漬之良。

又方并治癮疹。

巴豆五拾枚去心皮。

右壹味。以水三升。煮取一升。以綿內湯中拭病上。隨手減。神良。

治小兒風瘙癮疹方。

蒴藋壹兩　防風壹兩　羊桃根壹兩　石南壹兩　茵芋壹兩

茺蔚壹兩　礬石壹兩　蒺藜壹兩

右捌味。切。以酢漿水壹斗。煮取伍升。去滓。內礬石。煎令小沸。溫浴之。千金有秦椒苦參蛇牀枳實升麻爲十三味。

治小兒丹數十種皆主之搨湯方。

大黃壹兩 甘草壹兩，炙 當歸壹兩 芎藭壹兩 白芷壹兩

獨活壹兩 黃芩壹兩 芍藥壹兩 升麻壹兩 沈香壹兩

青木香壹兩 芒消叁兩 木蘭皮壹兩

右壹拾叁味，切，以水壹斗貳升，煮取四升，去滓，內芒消，令烊，以綿搵湯中，適寒溫搨之，乾則易，取差止。

治小兒丹發方。

生慎火草擣絞取汁，以拭丹上，日十遍，夜二四。

治小兒丹腫方。

棗根 升麻 白斂 黃蘖 黃連

大黃 梔子 甘草生用，各貳兩 生地黃汁壹升

右玖味，切，以水壹斗肆升，煮取柒升，去滓，內地黃汁，煎三沸，以故帛兩重內湯中，以搨丹上，小燥即易之，常令溫。

澤蘭湯 主丹胗入腹殺兒方。

澤蘭　芎藭　附子炮去皮　莽草　藁本
細辛　茵芋各半兩
右柒味，㕮咀，以水叁升，煑取壹升半，分四服，服此湯，然後作餘湯洗之。
治小兒半身皆紅赤，漸漸長引者方。
牛膝　甘草生用
右貳味，細剉，各得伍升，以水貳斗，煑取叁伍沸，去滓，和竈下黄土塗之。
治小兒頭髮不生方。
取楸葉中心擣絞取汁塗之，生。
治小兒禿瘡無髮苦痒方。
野葛末壹兩　猪脂　羊脂各壹兩
右叁味，合煎略盡，令凝，塗之，不過三數傅即愈。

治小兒禿瘡方。

取雄雞矢陳醬清和洗。瘡了。傅之三兩遍差。

治小兒白禿方。

取芫花末臘月猪肪。脂和如泥。先以灰汁洗拭。塗之日三遍。

治小兒頭瘡方。

胡粉壹兩 黃連貳兩

右貳味。擣爲末。洗瘡去痂。拭乾傅之即愈。發即如前再傅。亦治陰瘡。

又方

胡粉貳兩 水銀壹兩 白松脂貳兩 猪肪脂肆兩

右肆味。合煎。去滓。內水銀胡粉。攪令和調。塗之。大人亦同。

治小兒頭無髮方。

燒鯽魚作末。醬汁和。傅之即生。

治小兒顖開不合方。

防風壹兩半 白及半兩 柏子仁半兩

右叁味，擣爲散，乳汁和，以塗顖上，日一度，十日知，二十日合。

治小兒臍瘡方。

燒甑帶灰傅之愈。

治小兒鼻塞不通有涕出方。

杏仁半兩，去皮尖 椒壹分 附子壹分半，炮去皮 細辛壹分半

右肆味，切，以酢伍合漬一宿，明旦以豬脂五兩煎之，附子色黄膏成，去滓，以塗絮，導於鼻中，日再，又摩顖上。

治小兒口瘡不能取乳方。

大青叁分 黄連貳兩

右貳味，㕮咀，以水貳升，煮取一升二合，一服一合，日再夜一。

又方

取礬石如雞子大，置酢中，研塗兒足下，三七遍立愈。

治小兒重舌方。

取三屠家肉各如指許大，切，摩舌，兒立能乳便啼。

又方

衣魚燒作灰，以傅舌上。

又方

重舌，舌強不能收唾者，取鹿角末如大豆許，安舌上，日三即差。

又方

取蛇皮燒灰末，和大酢，以雞毛取之，以掠舌上，日三遍。

治小兒重舌，舌生瘡涎出方。

以蒲黄傅舌上，不過三度愈。

又方

取田中蜂房燒之，以淳酒和，傅喉咽下，立愈。

治小兒咽痛不得息，若毒氣哽咽，及毒攻咽喉方。

生薑貳兩　橘皮壹兩　升麻貳兩　射干貳兩

右肆味，㕮咀，以水陸升，煮取貳升，分爲三服。亦治大人。

治小兒喉痺咽腫方。

以魚膽二七枚，和竈底黄土，以塗咽喉，立差。

雀矢丸 主小兒卒中風，口噤不下一物方。

取雀矢如麻子大，丸之，飲服，即愈。大良。雞矢白亦良。

治小兒數歲不行方。

葬家未閉戶時，盜取其飯，以哺之，不過三日即行，勿令人知之。

治小兒食土方。

取肉壹斤

右壹味，以繩繫肉，曳地行數里，勿洗，火炙噉之，不食土矣。

治小兒遺尿方。

瞿麥　龍膽　石韋　皂莢炙去皮子　桂心各半兩

人參壹兩　雞腸草壹兩　車前子伍分

右捌味。末之。鍊蜜和。先食服如小豆五圓。日三。加至六七丸。

治小兒羸瘦有蚘蟲方

雚蘆伍兩　黍米泔貳升

右貳味。切。以内泔中。以水三升五合。煑取二升。五歲兒服五合。日三服。兒大者服一升。

治小兒三蟲方。

雷丸　芎藭

右貳味。等分。爲散。服一錢匕。日三服。

治小兒陰瘡膿水出方。

煑狼牙汁洗之。愈。

治小兒氣癩方。

土瓜根壹兩　芍藥壹兩　當歸壹兩

右叁味，㕮咀，以水貳升，煮取一升，服五合，日二服。

治小兒狐疝傷損生㿗方。

桂心叁分　地膚子貳兩半　白朮伍分

右叁味，末之，鍊蜜和，白酒服如小豆七丸，日三服，亦治大人。

又方

芍藥叁分　茯苓叁分　大黃半兩　防葵半兩

半夏壹分，洗。　桂心壹分　椒汗壹分　乾薑壹分

右捌味，末之，鍊蜜和如大豆，每服一丸，日五服，可加至三丸。千金無乾薑

治小兒核腫壯熱有實方。

甘遂叁分　麝香叁銖　大黃　前胡各壹兩

黃芩半兩　甘草半兩，炙。　青木香叁分　石膏叁分，碎。

右擣味。㕮咀。以水柒升。煑取壹升玖合。服三合。日四夜一服。

治小兒誤吞針方。

吞磁石。如棗核大。針立下。

論曰。文王父母有胎教之法。此聖人之道。未及中庸。是以中庸養子。十歲以下。依禮小學。而不得苦精功程。必令兒失心驚懼。及不得苦行杖罰。亦令兒得癲癇。此事大可傷怛。但不得大散大漫。令其志蕩。亦不得稱讚聰明。尤不得誹毀小兒。十一以上。得漸加嚴教。此養子之大經也。不依此法。令兒損傷。父母之殺兒也。不得怨天尤人。

眼病第三 合一百三十二方 灸法二首 論一首

真珠散 主目翳覆瞳睛不見物方。

上光明朱砂半兩 貝子五枚。炭火燒末之 白魚七枚。炙

乾薑半分。末

右肆味研之如粉以熟帛三篩爲散仰卧遣人以小指爪挑少許付眼中差亦主白膚瞖

七寶散主目瞖經年不愈方

琥珀壹分　白眞珠壹分　珊瑚壹分　紫貝壹分　馬珂壹分

朱砂貳分　蕤仁半兩　决明子壹分　石膽壹分

右玖味下篩極細付目中如小豆日三大良

礬石散主目瞖及努肉方

礬石上上白者末内如黍米大於瞖上及努肉上即令淚出以綿拭之令得惡汁盡日一其病逐惡汁出盡日日漸自薄便差好上上礬石無過絳礬色明淨者慎如療眼當法也

去瞖方

貝子拾枚燒末

右壹味。搗篩。取如胡豆著瞖上。日再。正仰卧。令人傳之。如炊一石米久。乃拭之。息肉者加珍珠如貝子等分。研如粉。

治眼漠漠無所見。決明洗眼方。

決明子 貳拾伍枚。千金作壹合。 蕤仁 秦皮

黃連 宣州者。佳。各半兩。千金作拾捌銖 螢火蟲 柒枚

右伍味。以水捌合。微火煎取叁合。冷。以綿注洗目。日叁度。

治五藏客熱上熏。一作衝 眼外受風寒。令眼病不明方。

地膚子 半兩。千金作貳合 柏子仁 壹合半 大黃 貳兩 決明子 伍合

藍子 瓜子仁 蕤仁 茺蔚子 青葙子

蒺藜子 各貳合。 菟絲子 壹合。千金作貳合。 黃連 壹兩半。宣州者。

細辛 伍合。千金壹兩陸銖。 桂心 柒分 螢火 壹合。千金作陸銖。

右壹拾伍味。搗篩。煉蜜和丸如梧子。每服拾伍丸。食後日叁服。

治肝膈上大熱。目暗不明方。

升麻　大青　黃蘗各叁兩　射干
生玄參肆兩　薔薇根白皮各肆兩　蜜壹升
右柒味，㕮咀，以水柒升，煮取壹升半，去滓，下蜜兩沸，細細含咽之。

治眼暮無所見方。

豬肝壹具
右，細切，以水壹斗，煮取熟，置小口器中，及熱以目臨上，大開勿閉也，冷復温之，取差為度。

治熱病差後百日内食五辛目暗方。

以鯽魚作臛熏之，如前法，良。

兔肝散 主失明方。

兔肝炙　石膽　貝齒　芒硝
蕤仁　黃連　礬石燒　松葉

螢火　菊花　地膚子　決明子各壹分

右壹十貳味。食後爲散。服半錢匕。不知。稍稍加服。藥不可廢。若三日停。則與不服等。愈後仍可常服之。

治風痰膏滿眼赤闇方。

決明子　竹葉千金貳兩　杏仁去皮尖雙仁熬　防風　黃芩

枳實炙千金作貳兩　澤瀉各叁兩　芍藥　柴胡去苗

梔子仁各肆兩。千金作貳兩。一方無。　細辛　芒硝各貳兩

右壹拾貳味。㕮咀。以水玖升。煑取貳升半。去滓。分三服。千金有大黃肆兩。升麻貳兩。無芒硝防風細辛。名瀉肝湯。

眼暗方。

蔓菁子壹斗

右壹味。淨淘。以水肆斗。煑自旦至午。去汁。易水又煑至晚。去汁。易水又煑至旦。暴乾。以布袋貯之。一度擣三升。以粥

汁服三方寸匕。日三服。美酒等任性所便。

補肝湯 主肝氣不足方。

甘草炙　黄芩　人參　桂心各貳兩

右肆味。㕮咀。以水陸升。煑取貳升。去滓。分叁服。

瀉肝湯 主臟中痰實熱衝眼漠漠闇方。

苦竹根捌兩　半夏肆兩洗。　乾薑　茯苓　枳實

白朮各叁兩　杏仁去皮尖兩仁　乾地黄各壹兩　細辛　甘草各貳兩炙

右壹拾味。㕮咀。以水壹斗貳升。煑取貳升柒合。去滓。分叁服。

瀉肝湯 主漠漠無所見。或時痛赤。腹有痰飲。令人眼闇方。

大黄　白朮各貳兩　甘草炙　芍藥

當歸　茯苓　桂心　人參

黄芩　細辛各壹兩半　生薑叁兩切。　半夏肆兩洗。

右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗。煑取叁升。分肆服。

補肝湯 主肝氣不足。兩脅拘急痛。寒熱目不明。并婦人心痛。乳癰膝脛熱消渴。爪甲枯。口面青者方。

甘草（叁兩） 柏子仁（貳兩） 防風（叁兩） 大棗（貳拾枚擘） 烏頭（貳兩炮） 細辛（貳兩） 茯苓（壹兩） 蕤仁（壹兩） 桂心（壹兩）

右玖味。㕮咀。以水捌升。煑取三升。分爲三服。

蕪菁子主明目病益肌膚方。

蕪菁子（叁升）

右壹味。淘。高著水煑之二十沸。出著水盆中淘之。令水清。接取以別釜煑之。水盡即添益。時嘗看味羙滑。出暴乾。擣篩。酒飲等任意和服三方寸匕。日惟服七合。飽食任性酒服。服無限時。慎生冷。百日身熱瘡出。不久自差。

治青盲方。

長尾蛆淨洗。暴乾。作末。内眼中差。

決明圓主眼風虛勞熱暗運內起方。

石決明燒　石膽　光明砂　芒消熬　空青

黃連不用貴　青葙子　決明子以苦酒漬經三日暴乾　蕤仁

防風　鯉魚膽　細辛

右壹拾貳味，等分，擣篩，石研令極細，以魚膽和圓如梧子，暴乾，研碎，銅器貯之，勿洩，每取黃米粒大內眥中，日一夜一，稍稍加，以知為度。

補肝圓主明目方。

地膚子貳合　藍子貳合　蒺藜子貳合　細辛伍合　桂心伍分

車前子貳合　菟絲子貳合　瓜子貳合　螢火蟲伍合　黃連壹兩半

茺蔚子貳合　青葙子貳合　大黃貳兩　決明子伍合

右壹拾肆味，擣篩，鍊蜜和，飲服如梧子十五丸，可加至二十丸，慎熱麪、食生冷、酢滑、油、蒜、豬、雞、魚、蕎麪、黃米、眼暗神

方也。

治目赤痛方。

雄黃壹銖　細辛壹銖　乾薑壹銖　黃連肆銖

右肆味。細篩綿裹。以唾濡頭注藥內大眥。必閉目。目中淚出。須臾自止。勿手近。勿用冷水洗。

又方

雄黃壹分　乾薑壹分　黃連壹分　礬石壹分燒半日

右肆味。合用之。如前方。可加細辛壹分。

治目赤口乾脣裂方。

石膏壹斤碎　生地黃汁壹升　赤蜜壹升　淡竹葉切伍升

右肆味。以水壹斗二升。煑竹葉取柒升。去滓。澄清。煑石膏。取壹升半。去滓。下地黃汁兩沸。下蜜取三升。細細服之。

治赤眼方。

取杏仁肆拾玖顆末之。絹袋裹飯底蒸之。熱絞取脂。以銅青胡粉各如大豆。乾薑鹽各如半大豆。熟研之。以雞毛沾取掠眼中皆頭。日二。不過三差。

赤眼方。

杏仁脂壹合　鹽綠如棗核大　印成鹽三顆

右叁味。取杏仁脂法。先擣杏仁如脂。布袋盛蒸。熱絞取脂。置蜜器中。內諸藥。直坐著其中。密蓋二七日。夜臥注目四皆。不過七度差止。

治赤眼不問久遠方。

硇砂叁兩

右壹味。以酢漿坩器中浸。日中暴之。三日藥著器。四畔乾。者取如粟米大。夜著兩皆頭。不過三四度永差。并石鹽石膽等尤佳。

治眼赤運白膜瞖方

麻燭一尺薄批豬脂裹使匝然燭以銅器承取脂內蕤仁叁拾枚研胡粉少許合和令熟夜內兩眥中

又方

枸杞汁洗目日五度良煑用亦得

治赤眼方

石膽 蕤仁 鹽綠 細辛各壹兩 生鹽脂壹合

右伍味爲末以乳汁和夜點兩眥

治眯目不明方

稚羊鹿筋擘之如披筋法內筋口中熟嚼擘眼內著瞳子瞼上以手當瞼上輕挼之若有眯者二七過挼便出之視眯當著筋出來即止未出者復爲之此法常以平旦日未出時爲之以差爲度出訖當以好蜜注四眥頭鯉魚膽亦佳若數挼目痛可間日挼之

鼻病第四（論一首　方八首）

治鼻不利香膏方。

當歸　薰草（一方用木香）　通草　細辛

蕤仁（各叁分）　芎藭　白芷（各半兩）　羊髓（肆兩）

右捌味，切，合煎，微火上三上三下，以白芷色黃膏成，去滓。取如小豆大，內鼻中，日三。大熱鼻中赤爛者，以黃芩梔子代當歸細辛。

治鼻中窒塞香膏方。

白芷　芎藭（各半兩）　通草（壹兩）　當歸　細辛

薰草（各三分，千金作莽草）　辛夷仁（伍分）

右柒味，切，以苦酒漬一宿，以不中水猪肪一升，煎三上三下，以白芷色黃膏成，去滓，綿裹取棗核大，內鼻中，日三。（一方加桂心十八銖。）

治鼻齆方。

通草壹分 細辛壹分 附子壹分。炮去皮

右叄味。下篩。蜜和綿裹。內鼻中。良。

治鼻中息肉通草散方。

通草半兩 礬石壹兩。燒 真珠壹銖

右叄味。下篩。畏綿如棗核。取藥如小豆。內綿頭入鼻中。日三度。一方有桂心、細辛各壹兩

治齆鼻鼻中息肉不得息方。

礬石燒 藜蘆各半兩 瓜蒂貳七枚 附子半兩。炮

右肆味。各擣下篩。合和。以小竹管取藥如小豆大。內鼻孔中吹之。以綿絮塞鼻中。日再。以愈爲度。一方加葶藶半兩

治鼻中息肉塞鼻。不得喘息方。

取細辛。以口濕之。盈頭內鼻中。傍內四畔。多著。日十易之。

滿二十日外。以葶藶子壹兩。松蘿半兩。二味擣篩。以綿裹薄如棗核大。內鼻中。日五六易之。滿二十日外。以吴白礬上上者貳兩。內瓦杯裏。相合。令密。置窑中燒之。待瓦熟取擣篩。以面脂和。如棗核大。內鼻中。日五六易。盡更和。不得頓和。二十日外。乃差。慎行作勞及熱食并蒜麪百日。

治齆鼻有息肉。不聞香臭方。

瓜蔕　細辛各半兩

右貳味。爲散。絮裹豆大。塞鼻中。須臾即通。

羊肺散 主鼻中息肉梁起方。

羊肺一具。乾之　白术肆兩　蓯蓉貳兩　通草貳兩

乾薑貳兩　芎藭貳兩

右陸味。爲散。食後以粥汁服伍分匕。日貳服。加至方寸匕。

論曰。凡人往往有鼻中肉塞。眠食皆不快。利得鼻中出息而

俗方亦衆。而用之皆無成效。惟見本草云。雄黃主鼻中息肉。此言不虛。但時人不知用雄黃之法。醫者生用。故致困斃。曾有一人患鼻不得喘息。余以成鍊雄黃。日內一大棗許大。過十日。肉塞自出。當時即得喘息。更不重發。其鍊雄黃法在仙冊方中具有之。宜尋求也。斯有神驗。

口病第五 論二首 方十七首

凡口瘡忌食鹹膩及熱麪乾棗等。宜純食甜粥。勿食鹽菜。三日即差。

凡口中面上生息肉轉大。以刀決潰去膿愈。

治積年口瘡不差。薔薇湯方。

薔薇根壹升

右壹味。以水柒升。煑取三升。去滓。含之久久。極即吐之。定更含。少少入咽亦佳。夜未睡已前亦含之。三日不差。更令

含之。差爲度。驗秘不傳也。

治口中瘡。身體有熱氣痱瘰。薔薇丸方。

薔薇根壹兩 黄芩壹兩 鼠李根壹兩 當歸壹兩

葛根壹兩 白斂壹兩 栝樓根貳兩 石龍芮壹兩

黄蘗壹兩 黄耆壹兩 芍藥壹兩 續斷壹兩

黄連壹兩

右壹拾叁味。末之。鍊蜜和服。如梧子拾圓。日三服。千金無黄連

治熱病口爛。咽喉生瘡。水漿不得入膏方。

當歸壹兩 射干壹兩 升麻壹兩 附子半兩炮去皮 白蜜肆兩

右伍味。切。以猪膏肆兩先煎之。令成膏。下著地。勿令大熱。内諸藥。微火煎。令附子色黄。藥成。絞去滓。内蜜。復火上令相得。盛器中令凝。取如杏子大含之。日四五輒咽之。差。

治口中瘡。咽喉塞不利。口燥膏方。

猪膏壹斤　白蜜壹斤　黄連壹兩，切。

右叁味，合煎，去滓，令相得，含如半棗，日四五夜二。

治口吻生白瘡，名曰鷰口方。

取新炊甑下飯，訖，以口兩吻銜甑脣，乘熱柱兩口吻二七下，差。

口傍惡瘡方。

亂髮灰　故絮灰　黄連末　乾薑末各等分

右肆味，合和爲散，以粉瘡上，不過三度。

治口臭方。

濃煮細辛，含汁，久乃吐卻，三日當愈。

又方

井華水三升，漱口，吐廁中。

又方

橘皮伍分　木蘭皮壹兩　桂心叁分　大棗四十枚，去核，蒸之，去皮。

右肆味，末之，以棗肉丸如梧子，服貳拾圓，日貳服，稍稍至三十丸。一方有芎十八銖

又方

桂心　甘草各等分

右貳味，細末，三指撮，酒服，二十日香。

又方

蜀椒汗　桂心各壹兩

右貳味，服如前方。

治口乾方

猪脂若羊脂如雞子大，擘之，苦酒半升中漬一宿，絞取汁含之。

又方

石膏五合，碎　蜜貳升

右貳味。以水叄升。煑石膏取貳升。內蜜。煑取壹升。去滓。含如棗核大。咽汁盡即含之。

又方　含一片梨即愈。夜睡當時即定。

又方

羊胎大雛子　酒半升　大棗柒枚

右叄味。合漬七日。取棗食之。差。

又方　禁夜勿食酸食及熱麪。

治口卒噤不開方。

擣附子末。內管中。開口吹口中。良。

脣病第六方四首

緊脣方。

以亂髮蜂房及六畜毛燒作末。傅瘡上。猪脂和亦佳。

又方

緊卷故青布。燒令然。斧上柱。取斧上熱汁塗之。并治瀋脣。

治脣黑腫痛痒不可忍方。

取四文大錢。於磨石上以臘月猪脂磨取汁塗之。不過數遍即愈。

又方

以竹弓彈之。出其惡血立差。

齒病第七 方二十七首

含漱湯 主齒痛方

獨活叄兩　黃芩叄兩　芎藭叄兩　當歸叄兩

細辛　蓽撥各壹兩　丁香壹兩

右柒味。㕮咀。水五升。煮取貳升半。含漱之。食頃乃吐。更含之。一方有甘草貳兩

又方　含白馬尿。隨左右含之。不過三口差。

治裂齒痛方。

腐棘針二百枚。

右壹味。以水貳升。煑取一升。含漱之。日四五。差止。

又方

取死曲蟮末。傅痛處即止。

治齒痛方。

夜向北斗手拓地灸指頭地。呪曰。蝎蟲所作。斷木求風蟲所作。灸便休。疼痛疼痛。北斗收即差。

又方

人定後。向北斗呪曰。北斗七星。三台尚書。某甲患齗。若是風齗閉門。戶若是蟲齗盡收取。急急如律令。再拜三夜作。

治牙疼方。

蒼耳子伍升

右壹味。以水壹斗。煑取伍升。熱含之。疼則吐。吐復含。不過二劑愈。無子莖葉皆得用之。

又方

莽草伍兩

右壹味，切，以水壹斗，煑水伍升，含漱之，一日令盡。

又方　內藜蘆末於牙孔中，勿咽汁，神良。

又方　取門上桃橛燒取瀝汁，少少內孔中，以蠟固之。

針牙疼方。

隨左右邊疼手大指次指掌間入一寸，得氣絕補三十九息。

灸牙疼方。

取桑東南引枝長一尺餘，大如匙柄，齊兩頭，口中柱著痛牙上，以三姓火灸之，呪曰：南方赤帝子，教我治蟲齒，三姓灸桑條，條斷蝎蟲死，急急如律令，大效。

治蟲食齒疼痛方。

閉氣細書曰：南方赤頭蟲飛來，入某姓名裂齒裏，今得蝎

蟲孔安置耐居上。急急如律令。小牋紙內著屋柱北邊蝎蟲孔中。取水一盃。禹步如禁法。還誦上文。以水沃孔。以淨黃土泥之。勿令洩氣。永愈。

治蟲食齒根肉黑方。

燒腐棘取瀝塗之十遍。雄黃末傅即愈。若齒黑者。以松木灰揩之。細末雄黃塗齗百日。日再塗之七日慎油猪肉神效。

治齒蟲方。

以檐一枚。令病人存坐橫檐於膝上。引兩手尋使極住手。伸中指灸中指頭檐上三壯。兩頭一時下火。病人口誦呪曰。啖牙蟲名字齵。莫啖牙莫啖骨。灸人亦念之。

齒根腫方。

松葉壹握　鹽壹合　好酒叁升

右叁味煎取一升。含之。

齒根動痛方。

生地黃叁兩　獨活叁兩

右貳味。切。以酒漬一宿。含之。

又方

常以白鹽末封齒齗上。日三夜二。

又方

扣齒三百下。日一夜二。即終身不發。至老不病齒。

治齒牙根搖欲落方。

生地黃大者一寸。綿裹著牙上。嚼咽汁。汁盡去之。日三。

即愈。可十日含之。更不發也。

治齒根空腫痛困弊無聊賴方。

獨活肆兩　酒叁升

右貳味。於器中漬之。塘火煨之。令煖。稍稍沸。得半。去滓。熱

含之。不過四五度。

又方

取地黃如指大長一寸。以灸令大熱。著木椎之。以綿裹著齒上嚼之咽汁盡。即三易。差止。

又方

燒松栢槐枝令熱。柱病齒孔須臾蟲緣枝出。

治牙齗疼痛方。

杏仁壹百枚。去皮尖兩仁者　鹽末方寸匕

右貳味。以水壹升。煑令沫出。含之。味盡吐却。更含。不過再三差。

治牙車急。口眼相引舌不轉方。

牡蠣熬　伏龍肝　附子炮去皮　礬石燒

右肆味等分。末之。以白酒和為泥。傅其上。乾則塗之。取差止。

治齒齲方。

切白馬懸蹄。可孔塞之。不過三度。

治齒血出不止方

刮生竹茹貳兩，酢漬之，令其人解衣坐，乃別令一人含噀其背上三過，并取竹茹濃煑取汁，勿與鹽，適寒溫含漱之，終日為度。

治失欠頰車脫臼，開張不合方。

以一人捉頭，著兩手指牽其頤，以漸推之，令復入口中，安竹筒如指許大，不爾嚙傷人指。

舌病方。

治舌卒腫如吹胞，滿口溢出，氣息不得通，須臾不治殺人方。

急以指刮破潰去汁，即愈，亦可以鈹刀於前決破之。（千金云兩邊破之。）

又方

以苦酒壹升，煑半夏一十枚，令得入合，稍稍含漱吐之，半夏戟人咽，須熟洗去滑盡用之，勿咽汁也。加生薑一兩佳。

治舌上黑，有數孔，出血如涌泉，此心藏病也方。

戎鹽伍兩 黄芩伍兩 黄蘗伍兩 大黄伍兩 人參貳兩

桂心貳兩 甘草壹兩，炙。

右柒味，末之。錬蜜和圓。飲服拾圓如梧子。日三服。仍燒鐵烙之。

治舌卒腫起如吹胞狀。滿口塞喉。氣息欲不復。須臾不治殺人。治之方。

以刀鋒決兩邊第一大脉出血。勿使刺著舌下中央脉，血出不止殺人。血出數升。以燒鐵令赤，熨瘡數過，以絶血也。

又方 含甘草汁佳。

喉病第九 方十四首

治喉卒腫不下食方。

韭一把，擣熬傅之。冷即易之。佳。

又方 含荊瀝，稍稍咽之。

又方　含上好酢。口舌瘡亦佳。

治喉痺藥唾不得方。

　半夏

右壹味。細破如棊子拾肆枚。雞子一枚。扣其頭如粟大出却黃白。內半夏於中內酢令滿極微火上煎之。取半。小冷飲之即愈。

喉痺方。

取附子壹枚。去皮。蜜塗火炙令乾。復塗蜜炙。須臾含之。咽汁愈。

又方　含蜀升麻壹片立愈。

治喉痺方。

以繩纏手大指。刺出血一大豆以上。差。小指亦佳。

治馬喉痺方。

燒馬藺根灰一方寸匕。燒桑枝瀝汁和服。

治咽痛不得息。若毒氣哽咽。毒攻咽喉方。

桂心半兩 杏仁壹兩。去尖皮，熬之

右貳味。爲散。以綿裹如棗大。含咽其汁。

又方

刺小指爪文中出血即差。左右刺出血。神秘立愈。

治尸咽語聲不出方。

酒壹升 乾薑拾兩。末之 酥壹升

右叁味。酒二合。酥一匙。薑末一匕。和服之。日三。食後服之。

亦治肺病。

治尸咽。咽中癢痛。吐之不出。咽之不入。如中蠱毒方。

含生薑五十日差。

治咽中腫垂肉不得食方。

先以竹筒内口中。熱燒鐵從竹中拄之。不過數度愈。

治懸癰垂下暴腫長方。

乾薑半夏等分末少少著舌本半夏洗之如法用。

又方　鹽末筋頭張口拄之日五自縮。

噎病第十方二首

酥蜜生薑汁合一升微火煎二沸每服兩棗許內酒中溫服。

又方　以手巾布裹舂杵頭糠拭齒

耳病第十一方二十四首

治耳聾方。

生地黃極麤大者長一寸半　杏仁七枚燒令黑　印成鹽兩顆

巴豆七枚去皮熬令紫色　頭髮雞子大燒之

右伍味擣作末以髮薄裹內耳中一日一夜若少損即卻之直以髮塞耳耳中黃水及膿出漸漸有效不得更著若未損一宿後更內一日一夜還去藥一依前法。

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾如此久聾。耳中作聲補腎治五聾方。

山茱萸貳兩　乾薑　巴戟天　芍藥

澤瀉　桂心　菟絲子　黃耆

乾地黃　遠志去心　蛇牀子　茯苓

石斛　當歸　細辛　蓯蓉

牡丹皮　人參　甘草炙　附子炮去皮。各貳兩

防風壹兩半　昌蒲壹兩　羊腎貳枚

右貳拾叁味。擣篩。鍊蜜和爲圓。如梧子大。服十五丸。日二。加至三十四十丸。

又方

草麻伍分　杏仁壹兩。去尖皮　桃仁肆分。去皮尖　巴豆仁壹分。去心皮熬

石鹽叁分　附子半兩炮。　昌蒲壹兩　磁石壹兩

薰陸香壹分　松脂貳兩半　蠟貳兩　通草半兩

右壹拾貳味，先擣諸石等，令細，別擣諸物等，加松脂及蠟合擣數千杵，令可丸乃止。取如棗核大，綿裹塞耳，一日四五度，出之轉捻，不過三四度，日一易之。

又湯方

磁石肆兩　牡荊子貳兩，一云牡蠣　石菖蒲參兩

山茱萸貳兩　芎藭貳兩　茯神貳兩　白芷貳兩

枳實貳兩，炙　地骨皮參兩　天門冬參兩，去心　甘草參兩，炙

橘皮貳兩　生薑貳兩　竹瀝貳升

右壹拾肆味，㕮咀，以水捌升，煮取減半，下竹瀝，煮取貳升半，分為三服，五日服一劑，三劑後著散。

又散方

石菖蒲貳兩　山茱萸貳兩　磁石肆兩　土瓜根貳兩

白斂貳兩　牡丹皮貳兩　牛膝貳兩

右柒味。擣篩為散。綿裹塞耳。日一易。仍服大三五七散一劑。

又方

硫黃　雌黃一云雄黃。

右貳味。等分。末之。綿裹塞耳。數日聞聲。

又方　以童子尿灌耳中。三四度差。

赤膏主耳聾齒痛方。

丹參伍兩　蜀椒貳升　大黃壹兩　白朮壹兩

大附子拾枚炮去皮　細辛壹兩　乾薑貳兩　巴豆拾枚去皮。

桂心肆寸　芎藭壹兩

右壹拾味。切。以淳苦酒漬一宿。內成煎豬膏三斤。著火上。煎三上三下。藥成去滓。可服可摩。耳聾者。綿裹膏內耳中。齒冷痛著齒間。諸痛皆摩。若腹中有病。以酒和服如棗許

大咽喉痛，吞如棗核一枚。

治二十年聾方。

成煎雞肪伍兩　桂心　野葛各半兩

右叁味，切，膏中銅器內，微火煎三沸，去滓，密貯勿洩，以葦筒盛如棗核大，火炙令少熱，仰傾耳灌之，如此十日，耵聹自出，大如指長一寸，久聾不過三十日，以髮裹膏深塞，勿使洩氣，五日乃出之。

又方

以器盛石鹽，飯底蒸，令消，以灌耳中，驗。

治亭耳出膿汁方。

礬石燒，叁兩　龍骨壹兩　黃連壹兩　烏賊魚骨壹兩

右肆味，下篩，取如棗核大，綿裹塞耳，日三易。一方用赤石脂，無龍骨

治底耳方。

礬石燒之　石鹽末之

右貳味。先以紙繩紝之。展卻汁令乾。以鹽末粉耳中令通。
次下礬石末。粉上須臾。臥勿起。日再。
治耳疼痛方。
附子炮去皮 菖蒲
右貳味等分。裹塞之。
治蟲入耳方。
末蜀椒一撮。內半升酢中。灌之。行二十步。蟲出差。
治百蟲入耳方。
擣韭汁。灌之耳中。立出。
又方
灌葱涕。須臾蟲出差。
又方
以木葉裹鹽炙令熱。以掩耳。冷即易之。出。
又方
薑汁滴耳中。 又灌牛乳良。 又桃葉塞耳。

治蚰蜒入耳方。

牛乳灌之。蚰蜒自出。若入腹者。空腹服酢酪一升。不出更服。仍以和麪燒餅。乘熱坐上。須臾出。

又方　以油灌之。

又方　灌驢乳於耳中。即變成水。入腹。飲之即差。

又方　桃葉汁灌之。

又方　打銅椀於耳邊。

又方　炒胡麻以布袋盛枕頭。

千金翼方卷第十一

養性

養性禁忌第一

論曰張湛稱養性繕寫經方在於代者甚衆嵇叔夜論之最精然辭旨遠不會近余之所言在其義與事歸實録以貽後代不違情性之歡而俯仰可從不棄耳目之好而顧眄可行使旨約而睹廣業少而功多所謂易則易知簡則易從故其大要一曰嗇神二曰愛氣三曰養形四曰導引五曰言論六曰飲食七曰房室八曰反俗九曰醫藥十曰禁忌過此已往未之或知也

列子曰一體之盈虛消息皆通於天地應於物類故陰氣壯則夢涉大水而恐懼陽氣壯則夢涉大火而燔焫陰陽俱壯則夢生殺甚飽則夢與甚飢則夢取是以浮虛爲疾者則夢

揚。沉實爲疾者。則夢溺。藉帶而寢者。則夢蛇飛鳥銜髮者。則夢飛。心躁者。夢火。將病者。夢飲酒歌舞。將衰者。夢哭。是以和之於始。治之於終。靜神滅想。此養生之道備也。

彭祖曰。每施寫訖。輒導引以補其虛。不爾。血脉髓腦日損。犯之者生疾病。俗人不知補寫之義故也。飲酒吐逆。勞作汗出。以當風臥濕。飽食大呼。疾走舉重。走馬引強。語笑無度。思慮太深。皆損年壽。是以爲道者務思和理焉。口目亂心。聖人所以閉之。名利敗身。聖人所以去之。故天老曰。丈夫處其厚不處其薄。當去禮去聖。守愚以自養。斯乃德之源也。

彭祖曰。上士別牀。中士異被。服藥百裹。不如獨臥。色使目盲。聲使耳聾。味使口爽。苟能節宣其宜適。抑揚其通塞者。可以增壽。一日之忌者。暮無飽食。一月之忌者。暮無大醉。一歲之忌者。暮須遠內。終身之忌者。暮常護氣。夜飽損一日之壽。夜

醉損一月之壽。一接損一歲之壽。愼之。清旦初以左右手摩交耳從頭上挽兩耳又引髮則面氣通流。如此者令人頭不白耳不聾。又摩掌令熱以摩面從上向下二七過去皯氣令人面有光。又令人勝風寒時氣寒熱頭痛百疾皆除。眞人曰。欲求長生壽考服諸神藥者。當須先斷房室肅齋沐浴熏香。不得至喪孝家及產乳處愼之愼之。古之學道者所以山居者。良以此也。

老子曰。人欲求道勿起五逆六不祥。凶。大小便向西一逆。向北二逆。向日三逆。向月四逆。仰視日月星辰五逆。夜半裸形一不祥。旦起瞋心二不祥。向竈罵詈三不祥。以足內火四不祥。夫妻晝合五不祥。盜師父物六不祥。旦起常言善事天與之福。勿言奈何及禍事。名請禍。愼勿牀上仰臥大凶。臥伏地大凶。飽食伏地大凶。以匙筯擊盤大凶。大勞行房室露臥發

癲病。醉勿食熱。食畢摩腹能除百病。熱食傷骨。冷食傷肺。熱無灼脣。冷無冰齒。食畢行步踟躕則長生。食勿大言。大飽血脉閉。臥欲得數轉側。冬溫夏涼慎勿冒之。大醉神散越。大樂氣飛揚。大愁氣不通。久坐傷筋。久立傷骨。凡欲坐。先解脫右靴履。大吉。用精令人氣乏。多睡令人目盲。多唾令人心煩。貪美食令人泄痢。沐浴無常不吉。沐與浴同日。凶。夫妻同日沐浴。凶。說夢者。凶。

凡日月蝕救之吉。活千人。除殃。活萬人。與天地同功。日月薄蝕大風大雨虹蜺地動雷電霹靂大寒大霧四時節變不可交合陰陽。慎之。

凡夏至後丙丁日冬至後庚辛日皆不可合陰陽。大凶。

凡大月十七日。小月十六日。此名毀敗日。不可交會犯之傷血脉。

九月二日三日五日九日二十日此生日也。交會令人無疾。凡新沐遠行及疲飽食醉酒。大喜大悲。男女熱病未差。女子月血新產者。皆不可合陰陽。熱疾新差交者死。

老子曰。凡人生多疾病者。是風日之子。生而早死者。是晦日之子。在胎而傷者。是朔日之子。生而母子俱死者。是雷霆霹靂日之子。能行步有知而死者。是下旬之子。兵血死者。是月水盡之子。又是月蝕之子。雖胎不成者。是弦望之子。命不長者。是大醉之子。不癡必狂者。是大勞之子。生而不成者。是平曉之子。意多恐悸者。是日出之子。好為盜賊貪慾者。是禺中之子。性行不良者。是日中之子。命能不全者。是日昳之子。好詐反妄者。是晡時之子。不盲必聾者。是人定之子。天地閉氣不通。其子死。夜半合陰陽。生子上壽賢明。夜半後合會生子。中壽聰明智慧。雞鳴合會生子下壽。剋父母。此乃天地之常

理也。

天老曰。人稟五常形皃。而尊卑貴賤不等。皆由父母合會稟氣壽也。得合八星陰陽。各得其時者上也。即富貴之極。得合八星陰陽。不得其時者中也。得中宮。不合八星陰陽。得其時者下也。得下宮。不合此宿。不得其時者。則爲凡人矣。合宿交會者。非惟生子富貴。亦利身大吉。八星者。室參井鬼柳張房心。一云九宿也。是月宿所在此星。可以合陰陽。

老子曰。人生大限百年。節護者可至千歲。如膏用小炷之與大炷。衆人大言而我小語。衆人多繁而我小記。衆人悖暴而我不怒。不以不事累意。不臨時俗之儀。淡然無爲。神氣自滿。以此爲不死之藥。天下莫我知也。勿謂闇昧。神見我形。勿謂小語。鬼聞我聲。犯禁滿千。地收人形。人爲陽善。人自報之。人爲陰善。鬼神報之。人爲陽惡。人自治之。人爲陰惡。鬼神治之。

故天不欺人示之。以影。地不欺人示之。以響。人生天地氣中。動作喘息皆應於天。為善為惡。天皆鑒之。人有修善積德而遭凶禍者。先世之餘殃也。為惡犯禁而遇吉祥者。先世之餘福也。故善人行不擇日。至凶中得凶中之吉。入惡中得惡中之善。惡人行動擇時日。至吉中反得吉中之凶。入善中反得善中之惡。此皆自然之符也。

老子曰。謝天地父母法。常以辰巳日黃昏時。天晴日淨。掃宅中甲壬丙庚之地。燒香北向稽首三過。口勿語。但心中言耳。舉家皆利。謝嘿言。曾孫某乙數負黃天之氣。象上帝之始願。合家男女大小前後所犯罪過。請為削除凶惡。在後進善人某家大小身神安。生氣還。常以此道。大吉利。除禍殃。

老子曰。正月朔曉亦可於廷中向寅地再拜。呪曰。洪華。洪華。受大道之恩。太清玄門。願還某去歲之年。男女皆三過自呪。

常行此道。可以延年。

論曰。神仙之道難致。養性之術易崇。故善攝生者常須慎於忌諱。勤於服食。則百年之內不懼於夭傷也。所以具錄服餌方法以遺後嗣云。

養性服餌第二 方叁拾柒首

茯苓酥主除萬病。久服延年方。

取山之陽茯苓。其味甘美。山之陰茯苓。其味苦惡。揀得之勿去皮。去皮刀薄切。暴乾蒸。令氣溜。以湯淋之。其色赤味苦。淋之不已。候汁味甜便止。暴乾擣篩。得茯苓三斗。取好酒大斗一石。蜜一斗。和茯苓末。令相得。內壹石伍斗甕中。熟攪之百遍。密封之。勿令洩氣。冬月五十日。夏月二十一日。酥浮於酒上。接取酥。其味甘美如天甘露。可作餅大如手掌。空屋中陰乾。其色赤如棗。飢食一餅。終日不飢。此仙

人度荒世藥。取酒封閉。以下藥名茯苓酥。

杏人酥。主萬病。除諸風虛勞冷方。

取家杏仁。其味甜香。特忌用山杏仁。山杏仁慎勿用。大毒害人也。

家杏仁壹石。去尖皮兩人者。揀完全者。若微有缺壞。一顆不得用。微火炒。搗作細末。取美酒兩石。研杏仁。取汁壹石五斗。

右一味。以蜜壹斗。拌杏仁汁。煎極令濃。與乳相似。內兩碩甕中攪之。密封泥勿令洩氣。與上茯苓酥同法。三十日看之。酒上出酥也。接取酥內瓷器中封之。取酥下酒別封之。團其藥如梨大。置空屋中作閣安之。皆如飴餔狀。甚美。服之令人斷穀。

地黃酒酥。令人髮白更黑。齒落更生。髓腦滿實。還年却老。走及奔馬。久服有子方。

麄肥地黃拾石。切，擣取汁叁石。麻子壹石，擣作末。以地黃汁研取汁貳石柒㪷。杏仁壹石，去皮尖兩仁者，擣作末。以麻子汁研取汁貳石伍斗。　麴末叁㪷。

右四味，以地黃等汁浸麴七日，候沸，以米叁石分作叁分，投下饙一度，以藥汁伍㪷和饙釀酒，如家醞酒法。三日一投，九日三投，熟訖，密封三七日。酥在酒上，其酥色如金，以物接取，可得大升玖升酥。然後下篘取酒封之，其糟令服藥人食之，令人肥悅，百病除愈。食糟盡，乃服藥酒及酥。一服酒壹升，壹匙酥，溫酒和服之。惟得喫白飯蕪菁，忌生冷酢滑豬雞魚蒜。其地黃滓暴使乾，更以酒叁升和地黃滓擣之，暴乾，作餅服之。

造草酥方。

杏仁壹㪷。去皮尖兩人者。以水一斗研絞取汁。麄肥地黃拾斤。熟擣絞取汁壹斗

麻子（壹斗，末之，以水壹斗研，絞取汁）

右三味，汁九叁斗，著麴壹斤，米叁斗，釀如常酒，味是正熟出，以瓮盛之，即酥凝在上，每服取熱酒和之，令酥消盡，服之弥佳。

眞人服杏子丹，玄隱士學道斷穀以當米粮方。

上粳米（叁斗，淨淘沙，炊作飯，乾暴，磑，細篩下之） 杏仁（叁斗，去尖皮兩仁者，暴乾，擣，以水伍升研之，絞取汁，味盡止）

右二味，先煎杏仁汁，令如稀麵糊，置銅器中，内粳米粉如稀粥，以煻火煎，自旦至夕，攪勿停手，候其中水氣盡則出之，陰乾，紙貯，欲用以暖湯貳升，内藥如雞子大，置於湯中，停一炊久，取食，任意取足服之。

服天門冬丸方。

凡天門冬苗作蔓有鉤刺者是，採得，當以酢漿水煑之，濕去心皮，暴乾，擣篩，以水蜜中半和之，仍更暴乾，又擣末，水蜜中半和之，更暴乾，每取一丸含之，有津液輙咽之，常含

勿絶。行亦令之。久久自可絶穀。禁一切食。惟得喫大麥。

服黄精方。

凡採黄精。須去苗下節。去皮取一節。隔二日增一節。十日服四節。二十日服八節。空腹服之。服訖不得漱口。百日以上節食。二百日病除。二年四體調和。忌食酒肉五辛酥油。得食粳米糜粥淡食。除此之外。一物不得入口。山居無人之地法服時。卧食勿坐食。坐服即入頭。令人頭痛。服訖經一食須乃起。即無所畏。

凡服烏麻。忌棗栗胡桃。得食淡麪。餘悉忌。行道持誦作勞遠行。端坐三百日。一切病除。七日内宜數見穢惡。於後即不。畏損人矣

服蕪菁子主百疾方。

蕪菁子壹斗肆升　薤白拾兩

右二味。煮蕪菁子。暴乾。擣篩。切薤白和蒸半日。下擣一千

一百二十杵。捻作餅重八兩。欲絶穀。先食乃服。二日後食三餅以爲常式。盡更合。食勿使絶也。

華佗雲母圓子三人九方。

雲母粉　石鍾乳(鍊)　白石英　肉蓯蓉　石膏

天門冬(去心)　人參　續斷　昌蒲　菌桂

澤瀉　秦艽　紫芝　五加皮　鹿茸

地膚子　署預　石斛　杜仲(炙)　桑上寄生

細辛　乾地黃　荊花　柏葉　赤箭

酸棗仁　五味子　牛膝　菊花　遠志(去心)

萆解　茜根　巴戟天　赤石脂　地黃花

枸杞　桑螵蛸　菴藺子　茯苓　天雄(炮去皮)

山茱萸　白朮　菟絲子　松實　黃耆

麥門冬(去心)　柏子仁　薺子　冬瓜子　蛇牀子

決明子　菥蓂子　車前子

右伍拾叁味。皆用真新好者。並等分。隨人多少。擣下細篩。錬白蜜和為丸如梧子。先食服十丸。可至二十丸。日二。藥無所忌。當勤相續。不得廢闕。百日滿。愈疾。久服延年益壽。身體輕強。耳目聰明。流通榮衛。補養五藏。調和六腑。顏色充壯。不知衰老。茜根當洗去土。陰乾。地黃、荊花至時多採。暴乾。欲用時相接取二石許乃佳也。吾嘗服壹兩劑。大得力。皆家貧不濟。乃止。又時無藥足闕十五味。仍得服之。此藥大有氣力。常須預求。使足服而勿闕。又香美易服。不比諸藥。

周白水侯散　主心虛勞損。令人身輕目明。服之八十日。百骨間寒熱除。百日外無所苦。氣力日益。老人宜常服之。大驗方。

遠志伍分，去心　白朮柒分　桂心壹兩　人參叁分　乾薑壹兩

續斷伍分 杜仲伍分，炙 椒半兩，汗 天雄參分，炮 茯苓壹兩

蛇牀人參分 附子參分，炮，去皮 防風伍分 乾地黃伍分 石斛參分

肉蓯蓉參分 栝樓根參分 牡蠣參分，熬 石韋參分，去毛 鍾乳壹兩，鍊

赤石脂壹兩 桔梗壹兩 細辛壹兩 牛膝參分

右貳拾肆味，擣篩為散，酒服錢五匕，服後飲酒壹升，日二。不知，更增壹錢匕。三十日身輕目明。

濟神圓方。

茯神 茯苓 桂心 乾薑各肆兩 昌蒲

遠志去心 細辛 白朮 人參各參兩 甘草貳兩，炙

棗膏捌兩

右壹拾壹味，皆擣篩，鍊蜜和，更擣萬杵。每含壹丸如彈丸。有津咽之，盡更含之。若食生冷宿食不消，增一丸。積聚結氣嘔逆，心腹絞痛，口乾脹酢，咽吐嘔，皆含之。絕穀者服之

學仙道士含之。益心力。神驗。

彭祖松脂方。

松脂伍斤。灰汁煑三十遍。漿水煑三十遍。清水煑三十遍。　茯苓伍斤。灰汁煑十遍。漿水煑十遍。清水煑十遍。

生天門冬伍斤。去心皮。暴乾。擣作末。　眞牛酥叁斤。煉三十遍。

白蜜叁斤。煎令沫盡。　蠟叁斤。煉三十遍。

右陸味。擣篩。以銅器重湯上。先內酥。次下蠟。次下蜜。候消訖。次下諸藥。急攪之。勿住手。務令大勻。訖。內瓷器中密封。勿令洩氣。先一日不食。欲食須喫好美食。令大飽。然後絕食。即服貳兩。二十日後服四兩。又二十日服八兩。細丸之。以得咽中下爲度。第二度服四兩爲初。二十日又服八兩。又二十日服二兩。第三度服八兩爲初。以後二十日服二兩。又二十日服四兩。合二百八十日藥成。自餘服三丸。將補不服。亦得常以酥蜜消息。美酒一升爲佳。又合藥須取

四時王相特忌刑殺厭及四激休廢等日。大凶。

守中方。

白蠟（壹斤。煉之。凡貳升酒為度。煎却惡物。凡煎伍遍）一　丹砂（肆兩。細研）　蜜（壹斤。煉之極淨）

右叁味。合圓之如小棗大。初一日服三丸。二日服九丸。如此至九日止。

茅山仙人服質多羅方。（出益州導江縣并茂州山中）

此有三種。一者紫花根（八月採）二者黃花根亦黃（四月採）三者白花（九月採）

右三種功能一種。不別。依法採根。乾已。擣篩。旦暖一合酒和方寸匕。空腹服之。待藥消方食。日一服。不可過之。忌晝日眠睡。三十匕為一劑。一月服。

第二方

蜜半合　酥半合

右貳味。煖之和方寸匕服之。一法蜜多酥少。一方以三指撮爲定。主療諸風病。禁豬肉豉等。食之即失藥力。

第三方

取散五兩。生胡麻脂三升半。投之微火煖之。勿令熱。旦接取上油一合。煖空肚服之。日一服。油盡取滓服之。主偏風半身不遂。并諸百病。延年不老。

第四方

煖水一合。和三指撮。空腹日一服。主身羸瘦及惡瘡癬疥并諸風。

第五方

煖牛乳一升。和方寸匕服之。日一服。主女人絕產無子。髮白更黑。

第六方

煖濃酪漿一合。和方寸匕服之。日一服。主膈上熱飲水氣諸風。

第七方

以牛尿一合。煖和方寸匕服之。遣四人搦脚手。令氣息通流。主五種癩。若重者從少服漸加至一匕。若候身作金色。變爲少年。顔若桃李。延年益壽。

右件服藥時。皆須平旦空腹服之。以靜密室中。不得傷風及多語戲笑作務等事。所食桃李粳米及新春粟禁一切魚肉豉陳臭等物。得食乳酪油。其藥功説不能盡。久服神仙。八十老人狀如少年。若觸藥發時。身體脹滿。四肢強直俱赤。脱却衣裳。向火炙身。得汗出差。

服地黄方。

生地黄伍十斤

右壹味。擣之。以水三升。絞取汁。澄去滓。微火上煎減半。郎內好白蜜五升。棗脂壹升。攪令相得乃止。每服雞子大一枚。日三服。令人肥白美色。

又方

生地黃拾斤

右壹味。細切。以淳酒貳斗。浸經三宿。出暴令乾。又浸酒中。直令酒盡。又取甘草、巴戟天、厚朴、乾漆、覆盆子各一斤。各擣下篩。和之。飯後酒服方寸匕。日三服。加至二匕。使人老者還少。強力無病延年。千金無甘草

作熟乾地黃法。

別採地黃。去鬚葉及細根。擣絞取汁。以漬肥者。著甑中土及米無在以蓋其上。蒸之一時。出暴燥。更內汁中。又蒸之。一時出暴。以汁盡止。便乾之。亦可直切地黃蒸之半日數

數以酒灑之。使周匝。至夕出暴乾。可擣蜜丸服之。

種地黃法（八升造）。

先擇好肥地黃赤色虛軟者。選取好地深耕之。可於臘月預耕凍地彌佳。擇肥大地黃根切斷長三四分至一二寸許。一斛可種一畝。二月三月種之。作畦畤相去一尺。生後隨後鋤壅及數芸之。至九月十月視其葉小衰。乃掘取一畝得二十許斛。擇取大根水淨洗。其細根及翦頭尾輩亦洗之。日暴令極燥小皺。乃以刀切長寸餘。白茅覆甑下蒸之。密蓋上。亦可囊盛土填之。從旦至暮。當日不盡者。明日又擇取蒸之。先時已擣其細碎者。取汁於銅器中煎之。可如薄飴。將地黃內汁中。周匝出暴乾。又內之汁盡止。率百斤生者合得三十斤。取初八月九月中掘者。其根勿令太老。強蒸則不消盡有筋脉。初以地黃內甑中時。先用銅器

承其下。以好酒淋洒地黄上，令匝汁後下器中。取以併和煎汁最佳也。

王喬輕身方。

茯苓壹斤 桂心壹斤

右貳味，擣篩，鍊蜜和，酒服如雞子黄許大一服，三九日一服。

不老延年方。

雷丸 防風 柏子仁

右叁味，等分，擣篩為散，酒服方寸匕，日三。六十以上人亦可服二匕。久服延年益精補腦。年未六十，太盛勿服。

餌黄精法。

取黄精，以竹刀剔去皮，自仰臥生服之，盡飽為度，則不頭痛。若坐服，則必頭痛難忍。少食鹽及一切鹹物，佳。

餌术方。

取生朮削去皮。炭火急炙。令熱。空肚飽食之。全無藥氣。可以當食。不假山糧。得飲水神仙。祕之。勿傳。

服齊州長石法。主羸瘦不能食。療百病方。

馬牙石 一名乳石。一名牛腦石。本草名長石。

右取黃白明淨無瑕纇者。擣密絹下。勿令極篩。恐太麤。以壹石米合內一石水中。於銅器中極攪。令濁。澄少時。接取上汁。如清漿水色。置一大器中澄。如水色。去水。內滓於白練袋中盛。經一宿。瀝却水。如造烟脂法。出日中暴之。令乾。仍白練袋盛之。其袋每一如掌許大。厚薄亦可。於三斗斗米下蒸之。再遍暴乾。以手挼之。令衆手研之。即成。擘出。每以酒服一大匙。日三服。即覺患差。若覺觸。以米汁煑滓石一雞子大。煑三沸。去滓。頓服之。夏月不能服散者。服湯亦佳。石出齊州歷城縣。藥療氣痰。飲不下食。百病羸瘦皆差。

服杏仁法。主損心吐血。因即虛熱。心風健忘。無所記憶。不能食。食則嘔吐。身心戰掉。痿黃羸瘦。進服補藥。入腹嘔吐並盡。不服餘藥。還吐至死。乃得此方。服一劑即差。第二劑色即如初也。

杏仁壹升，去尖皮兩仁者，熬令色黃，末之　茯苓壹斤，末之　人參伍兩，末之

酥貳斤　蜜壹升半

右伍味。內銅器中。微火煎。先下蜜。次下杏仁。次下酥。次下茯苓。次下人參。調令均和。則內於瓷器中。空肚服之一合。稍稍加之。以利為度。日再服。忌魚肉。

有因讀誦思義坐禪及為外物驚恐狂走失心方。

酥貳兩　薤白壹握，切

右貳味。擣薤千杵。溫酥和攪。以酒一盞服之。至三七日。服之佳。得食枸杞菜羹薤白。亦得作羹。服訖而仰臥。至食時

乃可食也。忌麪。得力者非一。

鎮心圓 主損心不能言語。心下懸急苦痛。舉動不安。數數口中腥。妄熱。心中百病方。

防風伍分 人參伍分 龍齒伍分 芎藭壹兩 鐵精壹兩
當歸壹兩 乾地黃伍分 黃耆壹兩 麥門冬伍分去心
柏子仁壹兩 桂心壹兩 遠志伍分去心 白鮮皮叁分 白朮伍分
雄黃壹兩研 昌蒲壹兩 茯苓壹兩 桔梗壹兩 乾薑伍分
光明砂壹兩研 鍾乳半兩研

右貳拾壹味。擣篩。鍊蜜和。飲服梧子大五丸。漸加至十五丸。日貳服。稍加至三十丸。慎腥臭等。常宜小進食爲佳。宜喫酥乳。倍日將息。先須服湯。湯方如左。

玄參叁兩 乾地黃叁兩 黃耆叁兩 地骨皮叁兩 茯苓叁兩
丹參伍兩 牛膝叁兩 五味子叁兩 麥門冬叁兩去心

杏仁貳兩。去皮尖　細辛叁兩　磁石伍兩　生薑叁兩。

茯苓叁兩　橘皮貳兩　韭子半升　柴胡貳兩。去苗

右壹拾柒味。㕮咀。以水三斗。煑取三升九合。爲三服。後三日乃更進丸。時時食後服。服訖即仰臥少時。即左右臥及數轉動。須腰底安物令高。亦不得過久。斟酌得所。不得勞役身心氣力。服藥時乾食即且停一日。食訖用兩三口漿水飲壓之。服藥時有異狀貌起。勿怪之。服丸後二日。風動藥氣衝頭兩眼赤痛。久而不差者。依狀療之。法取棗根直入地二尺者。白皮一握。水一升。煑取半升。一服即愈。

五參圓主治心虛熱。不能飲食。食即嘔逆。不欲聞人語方。

人參壹兩　苦參壹兩半　沙參壹兩　丹參叁分

玄參半兩

右五味。擣篩。鍊蜜和爲丸。食訖飲服十丸。如梧子大。日二

漸加至二十丸。

治損心吐血方。

芎藭貳兩 葱白貳兩 生薑切貳兩。油伍合 椒汗貳合。

桂心壹兩 豉叁合 白粳米肆合

右捌味。㕮咀。芎桂貳味。以水四升。煑取二升。內米油又煎取一升。去滓。頓服。慎麪。

正禪方。

春桑耳 夏桑子 秋桑葉

右叁味。等分。擣篩。以水一斗。煑小豆一升。令大熟。以桑末一升和煑。微沸。著鹽豉服之。日三服。飽服無妨。三日外稍去小豆。身輕目明無眠睡。十日覺遠智通。初地禪服二十日到二禪定。百日得三禪定。累一年得四禪定。萬相皆見。壞欲界。觀境界。如視掌中。得見佛性。

服昌蒲方。

二月八日採取肥實白色節間可容指者。多取陰乾去毛。距擇吉日擣篩百日。一兩爲一劑。以藥四分蜜一分半酥和如稠糜柔弱。令極勻。內瓷器中密封口。埋穀聚中一百日。欲服此藥須先服瀉藥。吐利訖。取王相日旦空肚服一兩。含而咽之有力能消。漸加至三二兩。服藥至辰巳間藥消訖。可食粳米乳糜。更不得喫飲食。若渴惟得飲少許熟湯。每日止一服藥一頓食。若直治病差止。若欲延年益壽求聰明益智者。宜須勤久服之。修合服食須在靜室中。勿喜出入及晝睡。一生須忌羊肉熟葵。又主癥癖欬逆上氣痔漏病。最良。又令人膚體肥充。老者光澤。髮白更黑。面不皺。身輕目明。行疾如風。填骨髓。益精氣。服一劑壽百歲。天竺摩揭陀國王舍城邑陀寺三藏法師跋摩米帝以大業

八年與突厥使主至武德六年七月二十三日為洛州大德護法師淨土寺主矩師筆譯出。

養老大例第三 論三首

論曰。人之在生。多諸難遘。兼少年之時。樂遊馳騁。情敦放逸。不至於道。倏然白首。方悟虛生。終無所益。年至耳順之秋。乃希飡餌。然將欲頤性。莫測據依。追思服食者。於此二篇中求之。能庶幾於道。足以延齡矣。語云。人年老有疾者不療。斯言失矣。緬尋聖人之意。本為老人設方。何則。年少則陽氣猛盛。食者皆甘。不假醫藥。悉得肥壯。至於年邁。氣力稍微。非藥不救。譬之新宅之與故舍。斷可知矣。

論曰。人年五十以上。陽氣日衰。損與日至。心力漸退。忘前失後。興居怠惰。計授皆不稱心。視聽不穩。多退少進。日月不等。萬事零落。心無聊賴。健忘瞋怒。情性變異。食飲無味。寢處不

安。子孫不能識其情。惟云大人老來惡性不可諮諫。是以爲孝之道。常須慎護其事。每起速稱其所須。不得令其意負不快。故曰。爲人子者。不植見落之木。淮南子曰。木葉落。長年悲。夫栽植卉木。尚有避忌。況俯仰之間。安得輕脫乎。

論曰。人年五十以去。皆大便不利。或常苦下痢。有斯二疾。常須預防。若秘澀則宜數食葵菜等冷滑之物。如其下痢。宜與薑韭溫熱之菜。所以老人於四時之中。常宜溫食。不得輕之。老人之性。必恃其老。無有藉在。率多驕恣。不循軌度。忽有所好。即須稱情。既曉此術。當宜常預慎之。故養老之要。耳無妄聽。口無妄言。身無妄動。心無妄念。此皆有益老人也。又當愛情。每有誦念。無令耳聞。此爲要妙耳。又老人之道。常念善。無念惡。常念生。無念殺。常念信。無念欺。養老之道。無作博戲強用氣力。無舉重。無疾行。無喜怒。無極視。無極聽。無大用意。無

大思慮。無吁嗟。無叫喚。無吟吃。無歌嘯。無哼啼。無悲愁。無哀慟。無慶弔。無接對賓客。無預局席。無飲興。能如此者。可無病長壽。斯必不惑也。又常避大風大雨大寒大暑大露霜霰雪旋風惡氣。能不觸冒者。是大吉祥也。凡所居之室。必須大周密。無致風隙也。夫善養老者。非其書勿讀。非其聲勿聽。非其務勿行。非其食勿食。非其食者。所謂猪㹠雞魚蒜鱠生肉生菜白酒大酢大鹹也。常學淡食。至如黄米小豆。此等非老者所宜食。故必忌之。常宜輕清甜淡之物。大小麥麪粳米等爲佳。又忌強用力齩齧堅硬脯肉。反致折齒破斷之弊。人凡常不飢不飽不寒不熱。善行住坐臥言談語笑寢食造次之間能行不妄失者。則可延年益壽矣。

養老食療第四 方一十七首 論五首

論曰。衛汜稱扁鵲云。安身之本。必須於食。救疾之道。惟在於

藥。不知食宜者。不足以全生。不明藥性者。不能以除病。故食能排邪而安臟腑。藥能恬神養性以資四氣。故爲人子者。不可不知此二事。是故君父有疾。期先命食以療之。食療不愈。然後命藥。故孝子須深知食藥二性。其方在千金方。第二十六卷中

論曰。人子養老之道。雖有水陸百品珍羞。每食必忌於雜。雜則五味相撓。食之不已。爲人作患。是以食啖鮮肴。務令簡少。飲食當令節儉。若貪味傷多。老人腸胃皮薄。多則不消。彭亨短氣。必致霍亂。夏至已後。秋分已前。勿進肥濃羹臛酥油酪等。則無他矣。夫老人所以多疾者。皆由少時春夏取涼過多。飲食太冷。故其魚膾生菜生肉腥冷物多損於人。宜常斷之。惟乳酪酥蜜。常宜溫而食之。此大利益老年。雖然卒多食之。亦令人腹脹洩痢。漸漸食之。

論曰。非但老人須知服食將息節度。極須知調身按摩搖動

肢節。導引行氣。行氣之道。禮拜一日勿住。不得安於其處以致壅滯。故流水不腐。户樞不蠹。義在斯矣。能知此者。可得一二百年。故曰安者非安。能安在於慮亡。樂者非樂。能樂在於慮殃。所以老人不得殺生取肉以自養也。

耆婆湯。主大虛冷風羸弱無顏色方。一云酥蜜湯

酥（壹斤煉）。生薑（一合切）。薤白（三握炙令黄）。酒（貳升）

白蜜（壹斤煉）。油（壹升）。椒（壹合汗）。胡麻仁（壹升）

橙葉（壹握炙令黄）。豉（壹升）。糖（壹升）

右壹拾壹味。先以酒漬豉一宿。去滓。内糖蜜油酥於銅器中。煮令匀沸。次内薤薑。煮令熟。次下椒橙葉胡麻。煮沸。下貳升豉汁。又煮一沸。出。内瓷器中密封。空腹吞一合。如人行十里。更一服。冷者加椒。

服烏麻方。

純黑烏麻及旃檀色者。任多少與水拌令潤。勿使大濕。蒸令氣遍即下暴乾再蒸。往反九蒸九暴訖。擣去皮作末。空肚水若酒服二方寸匕。日二服。漸漸不飢絕穀。久服百病不生。常服延年不老。耐寒暑。

蜜餌主補虛羸瘦乏氣力方。

白蜜貳升　腊月猪肪脂壹升　胡麻油半升　乾地黄末壹升

右四味合和。以銅器重釜煎。令可丸下之。服如梧桐子三丸。日三。稍加。以知爲度。久服肥充益壽。

服牛乳補虛破氣方。

牛乳叁升　蓽撥半兩末之綿裹

右二味銅器中取叁升水和乳合煎。取叁升。空肚頓服之。日一。二七日除一切氣。慎猪魚雞蒜生冷。張澹云。波斯國及大秦甚重此法。謂之悖散湯。

猪肚補虚羸之氣力方。

肥大猪肚壹具洗如食法。 人參伍两 椒壹两。

乾薑壹两半 葱白柒两細切。 粳米半升熟煮。

右六味。下篩。合和相得。内猪肚中縫合勿令泄氣。以水壹㪷半。微火煑令爛熟。空腹食之。兼少與飲一頓令盡。可服四五劑極良。

論曰。牛乳性平。補血脉。益心。長肌肉。令人身體康強潤澤。面目光悅。志氣不衰。故爲人子者。須供之以爲常食。一日勿闕。常使恣意充足爲度也。此物勝肉遠矣。

服牛乳方。

鍾乳壹斤。上者。細研之如粉 人參叁两 甘草伍两炙。

乾地黄叁两 黄耆叁两 杜仲叁两炙。 蓯蓉陸两

茯苓伍两 麥門冬肆两去心。 薯蕷陸两 石斛貳两

右壹拾壹味，擣篩爲散，以水伍升，先煑粟米柒升爲粥，內散柒兩，攪令勻，和少冷水，牛渴飲之，令足，不足更飲水，日一，餘時患渴，可飲清水，平旦取牛乳服之，生熟任意，牛須三歲以上七歲以下，純黃色者爲上，餘色者爲下，其乳常令犢子飲之，若犢子不飲者，其乳動氣，不堪服也，其乳牛淨潔養之，洗刷飲飼須如法，用心看之，慎蒜猪魚生冷陳臭等物。

有人頻遭重病，虛羸不可平復，以此方補之甚效，其方如左。

生枸杞根（細切，一大斗，以水一大石，煑取六斗五升，澄清）　白羊骨壹具

右二味，合之，微火煎取伍大升，温酒服之，五日令盡，不是小小補益，一方單用枸杞根，慎生冷酢滑油膩七日。

補五勞七傷虛損方。

白羊頭蹄壹具（以草火燒令黃赤，以淨綿急塞鼻）　胡椒壹兩　蓽撥壹兩

乾薑壹兩　葱白切壹升　香豉貳升

右陸味，先以水煑羊頭蹄骨半熟，內藥更煑，令大爛，去骨。空腹適性食之，日食一具，滿柒具止。禁生冷、鉛丹、瓜果、肥膩，及諸雜肉、濕麪、白酒、粘食、大蒜、一切畜血，仍慎食大酢滑、五辛、陳臭、猪雞魚油等七日。

療大虛羸困極方。

取不中水猪肪一大升，內葱白壹莖，煎令葱黃止，候冷暖如人體，空腹平旦頓服之，令盡，暖蓋覆卧，至日晡後乃食白粥稠糜，過三日後服補藥，其方如左。

羊肝壹具，細切　羊脊骨膂肉壹條，細切　麴末半升

枸杞根十斤，切，以水三大斗，煑取一大斗，去滓。

右四味，合和，下葱白、豉汁調和，羹法煎之，如稠糖，空腹飽食之，三服，特慎食如上。

補虛勞方。

羊肝肚腎心肺壹具。以熱湯洗肚。餘細切之　胡椒壹兩　蓽撥壹兩

豉心半升　葱白兩握。去心切　犂牛酥壹兩

右陸味。合和。以水陸升緩火煎。取三升。去滓。和羊肝等并汁皆內羊肚中。以繩急繫肚口。更別作一絹袋稍小於羊肚。盛肚煮之。若熟乘熱出。以刀子并絹袋刺作孔瀝取汁。空肚頓服令盡。餘任意分作食之。若無羊五臟羊骨亦可用之。其方如左。

羊骨兩具。碎之。

右。以水一大石微火煎。取三斗。依食法任性作羹粥麪食。

不食肉人油麪補大虛勞方。

生胡麻油壹升　浙粳米泔清壹升

右貳味微火煎盡泔清乃止。出貯之。取三合。塩汁七合。先

以鹽汁和油令相得。溲麪一斤。如常法作餺飥。煮五六沸。出置冷水中。更漉出盤上令乾。乃更一葉葉擲沸湯中。煮取如常法。十度煮之。麪熟乃盡。以油作臛澆之。任飽食。

烏麻脂主百病虛勞。久服耐寒暑方。

烏麻油壹升 薤白叁升

右貳味。微火煎薤白令黃。去滓。酒服一合。百日充肥。二百日老者更少。三百日諸病悉愈。

服石英乳方。

白石英拾伍兩。擣石如米粒。以綿裹密帛盛

右壹味。取牛乳三升。水三升。煎取三升。頓服之。日一度。可二十遍煮乃一易之。擣篩。以酒三升。漬二七日。服之。常令酒氣相接。勿至於醉。以補人虛勞。更無以加也。有力能多服一二年彌益。◯凡老人舊患眼暗者。勿以酒服藥。當用

飲下之。目暗者。能終不與酒蒜。即無所畏耳。

論曰。上篇皆是食療而不愈。然後命藥。藥食兩攻。則病無逃矣。其服餌如左。

大黃耆圓主人虛勞百病。夫人體虛多受勞。黃耆至補勞。是以人常宜將服之方。

黃耆　柏子仁　天門冬去心　白朮　乾地黃
遠志去心　澤瀉　署預　甘草炙　人參
石斛　麥門冬去心　牛膝　杜仲炙　薏苡仁
防風
茯苓　五味子　茯神　乾姜　丹參
肉蓯蓉　枸杞子　車前子　山茱萸　狗脊
萆薢　阿膠炙　巴戟天　菟絲子　覆盆子

右三拾壹味。各壹兩。擣篩鍊蜜丸。酒服十丸。日稍加至四

十圓。性冷者加乾薑桂心細辛貳兩。去車前子麥門冬澤瀉。多忘者加遠志昌蒲二兩。患風者加獨活防風芎藭二兩。老人加牛膝杜仲萆薢狗脊石斛鹿茸白馬莖各二兩。無問長幼常服勿絕。百日以內。慎生冷酢滑豬雞魚蒜油膩陳宿鬱浥。百日後。惟慎豬魚蒜生菜冷食。五十以上。雖暑月三伏時亦忌冷飯。依此法可終身常得藥力不退。藥有三十一味。合時或少一味兩味亦得且服之。

彭祖延年柏子仁圓 久服強記不忘方。

柏子仁伍合　蛇牀子　菟絲子　覆盆子各半升
石斛　巴戟天各貳兩半　杜仲炙　茯苓
天門冬去心　遠志各叁兩去心。　天雄壹兩炮去皮。　續斷
桂心各壹兩半　昌蒲　澤瀉　署預
人參　乾地黃　山茱萸各貳兩　五味子伍兩

鍾乳叁兩。成鍊者　肉蓯蓉陸兩

右貳拾貳味。擣篩。鍊蜜和丸如梧子大。先食服二十丸。稍加至三十丸。先齋五日。乃服藥。服後二十日齒垢稍去。白如銀。四十二日面悅澤。六十日瞳子黑白分明。尿無遺瀝。八十日四肢偏潤。白髮更黑。腰脊不痛。一百五十日意氣如少年。藥盡一劑。藥力周至。乃入房。內忌豬魚生冷酢滑。

紫石英湯主心虛驚悸寒熱百病令人肥健方。

紫石英拾兩　白石英拾兩　白石脂叁拾兩　赤石脂叁拾兩

乾薑叁拾兩

右伍味。㕮咀。皆完用。二石英各取一兩。石脂等三味各取三兩。以水叁升。合以微火煎。宿勿食。分為四服。日三夜一。服後午時乃食。日日依前秤取。取日藥。乃置新藥中共煑。乃至藥盡。常然水數一準。新藥盡訖。常添水。去滓。服之滿

四十日止。忌酒肉。藥水皆用大升秤。取汁亦用大升。服湯訖即行。勿住坐卧。須令藥力遍身百脉中行。若大冷者。春秋各四十九日。服令疾退盡。極須澄清服之。

論曰。此湯補虚。除固冷。莫過於此。能用之有如反掌。恐李者謂是常方。輕易而侮之。若一劑得差。即止。若服多。令人大熱。即須服冷藥壓之。宜審而用之。

千金翼方卷第十二

千金翼方卷第十三

辟穀

服茯苓第一 方六首

服茯苓方

茯苓粉伍斤　白蜜叁斤　柏脂柒斤，鍊法在後

右叁味，合和圓如梧桐子，服拾圓，飢者增數服之，取不飢乃止。服吞壹圓，不復服穀及他果菜也，永至休粮，飲酒不得，但得飲水，即欲求升仙者，常取杏仁伍枚，㕮咀，以水煑之為湯，令沸去滓，以服藥，亦可和丹砂藥中，令赤服之。又若却欲去藥食穀者，取消石葵子等熟治之，以粥服方寸匕，日一，四日內日再服，藥去，稍稍食穀葵羹大良。

又方

茯苓叁斤　白蠟貳斤　大麻油三升　松脂叁斤

右肆味。微火先煎油三沸。內松脂令烊。次內蠟。蠟烊內茯苓。熟攪成圓乃止。服如李核大壹圓。日再。一年延年。千歲不飢。

又方

茯苓貳斤　雲母粉貳斤　天門冬粉貳斤　羊脂伍斤

麻油叁斤　蜜伍斤　白蠟叁斤　松脂白者拾斤。

右捌味。內銅器中。微火上煎。令相得。下火和令凝紫色乃止。欲絕穀。先作五肉稻粮食五日。乃少食。三日後圓此藥。大如彈圓。日三服。一日玖圓。不飢。飢則食此止。却百二十日復食九圓。却三歲復食九圓。却十二年復食九圓。如此壽無極。可兼食棗脯。飲水無苦。還下藥取消石壹升。葵子壹升。以水叁升。煮取壹升。日三服。八合。亦可壹升。藥下乃食一合米粥。日三。三日後。日中三合。

又方

茯苓去皮

右以淳酒漬令淹，密封十日，出之如餌，可食，甚美。服方寸匕，日三，令人肥白，除百病，不飢渴，延年。

又方

茯苓粉伍斤　白蜜叁升

右貳味，漬銅器中，甆器亦得，重釜煎之，數數攪不停，候蜜竭出，以鐵臼擣叁萬杵，日壹服三十圓，如梧子，百日病除，二百日可夜書，二年後役使鬼神，久服神仙。

辟穀延年千歲方

松脂　天門冬去心　茯苓　蠟　蜜各壹斤

右伍味，以酒伍升，先煎蜜蠟三沸，內羊脂三沸，內茯苓三沸，內天門冬相和，服三圓如李子，養色還白，以杏仁壹升

內之爲良。

服松柏脂第二 方貳拾首 論一首

採松脂法。

常立夏日。伐松橫枝指東南者。圍二三尺。長一尺許。即日便倒頓於地。以器其下承之。脂自流出三四過。使以和藥。此脂特與生雄黃相宜。若堅強者。更著酒中火上消之。汁出。著冷酒中引之。乃煖。和雄黃衡山松脂膏。常以春三月入衡山之陰。取不見日月之松脂。鍊而食之。即不召自來。服之百日。耐寒暑。二百日。五藏補益。服之五年。即王母見諸名山所生三百六十五山。其可食者獨滿谷陰懷中耳。其谷正從衡山嶺直東肆百八十里。當橫捷正石橫其嶺。東北行過其南入谷五十里。窮穴有石城白鶴。其東方有大石四十餘丈。狀如白松。松下二丈有小穴可入。山有丹

砂可食也。其南方陰中有大松大三十餘圍。有三十餘株。不見日月。皆可服也。

取破松脂法。

以日入時破其陰以取其膏。破其陽以取其脂。等分食之。可以通神靈。鑿其陰陽為孔。令方寸深五寸。還以皮掩其孔。無令風入。風入不可服也。以春夏時取之。取之訖。封塞勿洩。以泥塗之。東北行至丹砂穴下有陰泉水可飲之。此洪農車君以元封元年入此山食松脂。十六年復下。居長安東市。又在上谷牛頭谷。時往來至秦嶺上。年常如三十者。

取松脂法。

斫取老枯肥松。細擘長尺餘。置甑中蒸之。滿甑。脂下流入釜中。數數接取脂。置水中凝之。盡更為。一日可得數十斤。枯節益佳。

又法

取枯肥松細破。於釜中煑之。其脂自出。接取置冷水中凝之。引之則成。若以五月就木取脂者。對刻木之陰面爲二三刻。刻可得數升。秋冬則依煑法取。勿煑生松者。少脂。

鍊松脂法。

松脂貳拾斤爲一劑。以大釜中著水。加甑其上。塗際勿洩。加茅甑上爲藉。復加生土茅上厚一寸。乃加松脂於上。炊以桑薪。湯減添水。接取停於冷水中凝。更蒸之如前法。三蒸畢。止。脂色如白玉狀。乃用和藥。可以圓菊花茯苓服之。每更蒸易土如前法。以銅鑼承甑下脂。當入鑼中如膠狀。下置冷水中。凝更蒸。欲出銅器於釜中時。預置小繩於脂中。乃下停於水中凝之。復停於炭須臾乃四過皆解。乃可舉也。盡更添水。以意斟酌。其火勿太猛。常令不絶而已。

又方

治松脂以灰汁煮之。寫置盆水中。須臾凝斷。取復置灰中煮之。如此三反。皆易水成矣。

一法。錬松脂十二過易湯。不能者。五六過亦可服之。

錬松脂法。

薄淋桑灰汁。以煮脂一二沸。接取投冷水中引之。凝復更煮。凡十過脂則成。若強者復以酒中煮三四過則柔矣。先食服一兩。日三。十日不復飢。飢更服之。一年後夜如白日。久服去百病。禁一切肉鹹菜魚醬鹽等。

又方

松脂拾斤

右用桑薪灰汁貳石內釜中。加甑於上。甑中先鋪茅。次鋪黃砂土。可叁寸。蒸之。脂少間流入釜中。寒之凝。接取復蒸

如前。三上。更以清水代灰汁。復如前。三上。去水。更以陰深水壹石伍斗煑甘草叁斤。得壹石汁。去滓。内牛酥貳斤。加甑釜上。復炊如前。令脂入甘草汁中凝。接取復蒸。夕下如此。三上即成。苦味皆去。甘美如飴膏。服如彈丸。日三。久服神仙不死。

又方

好松脂壹石　石灰汁叁石

右貳味。於淨處為竈。加大釜。斬白茅為藉。令可單止。以脂内甑中炊之。令脂自下入釜。盡去甑。接取内冷水中。以扇扇之。兩人引之三十過。復蒸如前。滿三遍。三易灰汁。復以白酢漿三石鍊之三過。三易酢漿也。復以酒鍊之一過。亦如上法訖。以微火煎之。令如飴狀。服之無少長。

又方

松脂貳斤半，水伍升煎之，汁黃濁，出投冷水中，如是百二十上，不可以爲率，四十入湯輒一易湯，凡三易湯，且成軟如泥，其色白，乃可用，治下茯苓一斤，内藥中攪令相得，藥成置冷地，可圓，圓如杏核，日吞叁圓，拾日止，自不欲飲食，當鍊松脂，無令苦，乃用耳。

又方

松脂柒斤，以桑灰汁壹石，煮脂三沸，接置冷水中，凝復煮之，凡十徧，脂白矣，爲散，叁兩，分爲三服，十兩以上不飢，飢復服之，一年以後，夜視目明，久服不死。

論曰：鍊松脂，春夏可爲，秋冬不可爲，絶穀治癩第一，欲食即勿服，亦去三尸。

粉松脂法。

松脂拾斤

毋黍灰汁煑沸。接置冷水中二十過。即末矣。亦可雜雲母粉丸以蜜服之良。

服松脂法。

欲絶穀服叁兩。飢復更服。取飽而止。可至壹斤。不絶穀者服食壹兩。先食須藥力盡乃餘。食錯者即食不安而吐也。久服延年。百病除。

又方

松脂拾斤　松實叁斤　柏實叁斤　菊花伍升

右肆味。下篩。蜜和服如梧子叁拾圓。分爲叁服。一百日以上。不復飢。服之一年。百歲如三十四十者。久服壽同天地。

又方

桑寄生蒸之令熟。調和以鍊松脂大如彈丸。日一丸。即不飢。

服法。

以夏至日取松脂。日食壹升。無食他物。飲水自恣。令人不飢。長服可以終身不食。河南少室山有大松。取陰處斷之。置器中蒸之。膏自流出。鍊去苦氣。白蜜相和食之。日壹升。三日後服如彈丸。渴飲水。令人不老。取無時。

又方

松脂伍斤 羊脂叁斤

右貳味。先鍊松脂令消。内羊脂。日服博棊一枚。不飢。久服神仙。

守中方與前別

白松脂七斤叁徧鍊 白蠟伍斤 白蜜叁升 茯苓粉叁斤

右叁味。合蒸一石米頃。服如梧子拾圓。飢復取服。日一丸。不得食一切物。得飲酒。不過一合。齋戒。㕮咀五香。以水煑一沸。去滓。以藥投沸中。又欲致神女者。取茅根治取汁以和之。蒸服之。神女至矣。

又方

松脂桑灰汁鍊百遍。色正白。復内之飴蜜中。數反出之。服二圓。如梧子。百日身輕。一年玉女來侍。

取柏脂法。

五月六日刻其陽二十株。株可得半升。鍊服之。欲絕穀者。增之至六兩。不絕穀者。壹兩半。禁五辛魚肉菜鹽醬。治百病。久服。鍊形延年。鍊脂與鍊松脂法同。

服松柏實第三　方一十九首

凡採柏子。以八月。過此零落。又喜蠹蟲。頓取之。又易得也。當水中取沈者。八月取。并房暴乾。末服方寸匕。稍增至五合。或日壹升半。欲絕穀。恣口取飽。渴飲水。一方。柏子服不可過五合。

凡採松實。以七月未開時採之。纔開口。得風便落。不可見也。

松子宜陳者佳。

絶穀升仙不食法。

取松實末之，服三合，日三，則無飢渴，飲水，勿食他物，百日身輕，日行五百里，絶穀升仙。

服松子法。

治下篩，服方寸匕，日三四，或日壹升半升，能多為善，二百日以上，日行可五百里。一法：服松子不過三合。

松子圓 松子味甘酸，益精補腦，久服延年不老，百歲以上，顏色更少，令人身輕悦澤方。

松子、菊花等分，以松脂若蜜丸，服如梧子十丸，日三，可至二十丸，亦可散服二方寸匕，日三，功能與前同。

又方

松柏脂及實各等分，丸以松脂，服之良。

服松葉令人不老。身生毛皆緑色。長一尺。體輕氣香。還年變白。久服以絕穀不飢。渴飲水服松葉。亦可粥汁服之。初服如惡。久自便。亦可乾末。然不及生服。

服松葉法。

細切飡之。日三合。令人不飢。

又方

細切之如粟。使極細。日服三合。四時皆服生葉。治百病。輕身益氣。還白延年。

又方

四時採。春東。夏南。秋西。冬北方。至治輕身益氣。令人能風寒。不病痺。延年。

高子良服柏葉法。

採無時。以葉切。置甑中令滿。覆盆甑著釜上。蒸之三石米

頃以久益善。蒸訖水淋百餘過。訖陰乾。若不淋者。蒸訖便陰乾。服壹合。後食日三服。勢力少稍增。從壹合始至壹升。令人長生益氣。可辟穀不飢。以備厄還山隱無穀。昔龐伯寧、嚴君平、趙德鳳、唐公房等脩道佐時也。世遭飢運又避世隱峨眉山中。飢窮欲死。適與仙人高子良、五馬都相遭。以此告之。皆如其言。盡共服之。卒賴其力。皆度厄。後以告道士進同得其方。遂共記之。

又方

取大盆內柏葉著盆中。水漬之。一日一易水。易水者。狀甕出水也。如是七日。以上若二七日爲佳。訖。覆盆蒸之。令氣徹便止。暴乾下篩。末一石。以一斗棗膏溲。如作乾飯法。服方寸匕。日三。以水送。不飢。飢即服之。渴飲水。以山居讀誦。氣力不衰。亦可濟凶年。

仙人服柏葉減穀方。

柏葉取近上者，但取葉，勿雜枝也，三十斤爲一劑，常得好不津器，内柏葉於中，以東流水漬之，使上有三寸，以新盆覆上，泥封之，三七日出，陰乾，勿令塵入中，乾便治之，下篩，以三升小麥淨擇，内著柏葉汁中，須封五六日，乃出陰乾，燥復内之，封五六日出，陰乾，令燥，磨之，下篩，又取大豆三升，炒令熟，取黄，磨之，下篩，合三物，攪調相得，内韋囊中，盛之，一服五合，用酒水無在，日三，食飲無妨，治萬病，病自然消，冬不寒，顔色悦澤，齒脱更生，耳目聰明，腸實，服此，食不食無在。

又方

取柏葉三石，熟蒸，暴乾，下篩，大麥一升，熬令變色，細磨之，都合和，服多少自任，亦可作粥，服之，可稍稍飲酒。

又方

取柏葉二十斤著盆中。以東流水漬三七日。出暴乾。以小麥一斗。漬汁三四日。出暴乾。熬令香。柏葉亦然。鹽一升。亦熬之令黃。三味擣下篩。以不中水豬膏一斤。細切。著末中攪。復篩之。先食服方寸匕。日三七。不用食。良。亦可兼服之。

又方

取陰地柏葉。又取陰面皮。㕮咀。蒸之。以釜下湯灌之。如是至三。陰乾百日。下篩。大麥末。大豆末。三味各一斤。治服方寸匕。日三。以絕穀不食。除百病。延年。

又方

柏葉三石。熟煑之。出置牛筥中。以汰之。令水清乃止。暴乾。以白酒三升溲葉。微火蒸之。熟。一石米頃。息火。復暴乾。治大麥三升。熬令變色。細治暴擣葉下篩。合麥屑中。日服三

升。以水漿若酒送之。止穀療病。辟温癘惡鬼。久久可度世。

又方

柏葉拾斤。以水四斗漬之一宿。煮四五沸。漉出去汁。别以器閤之。乾。以小麥一升。漬柏葉汁中一宿。出暴燥。復內之。令汁盡。取鹽一升。柏葉一升。麥一升。熬令香。合三味末之。以脂肪一片合溲。酒服方寸匕。日三。病自消滅。十日以上。便絶穀。若乗騎。取一升半水飲之。可以涉道路不疲。

休粮散方

側柏壹斤生。　烏豆　麻子各壹升炒

右叁味。擣拌。空心冷水服方寸匕。

酒膏散第四 方六首　論一首

仙方凝靈膏。

茯苓叁拾六斤　松脂貳拾四斤　松仁拾貳斤　柏子仁拾貳斤

右肆味，鍊之，擣篩，以白蜜兩石四斗內銅器中，微火煎之，一日一夜，次第下藥，攪令相得，微微火之，七日七夕止，可取丸如小棗，服七丸，日三。若欲絕穀，頓服取飽，即不飢，身輕目明，老者還少，十二年仙矣。

初精散方

茯苓叁拾陸斤　松脂貳拾肆斤　鍾乳壹斤

右叁味，爲粉，以白蜜伍斗攪令相得，內垍器中，固其口，陰乾百日，出而粉之，一服三方寸匕，日三服，一劑大佳，不同餘藥。

論曰：凡欲服大藥，當先進此一膏一散，然後乃服大藥也。

五精酒主萬病，髮白反黑，齒落更生方。

黃精肆斤　天門冬叁斤　松葉陸斤　白朮肆斤　枸杞伍斤

右伍味，皆生者，內釜中，以水叁石煑之一日，去滓，以汁漬

麴如家醖法。酒熟取清。任性飲之。一劑長年。

白朮酒方

白朮 貳拾伍斤

右壹味。㕮咀。以東流水兩石伍斗不津器中漬之。二十日去滓。內汁大盆中。夜候流星過時。抄已姓名置盆中。如是五夜。汁當變如血。取以漬麴。如家醖法。酒熟取清。任性飲之。十日萬病除。百日白髮反黑。齒落更生。面有光澤。久服長年。

枸杞酒方

枸杞根 壹百斤

右壹味。切。以東流水肆石煮之。一日一夕。去滓。得一石。汁漬麴釀之。如家醖法。酒熟取清。置不津器中。取

乾地黃末 壹升　桂心末 壹升　乾薑末 壹升　商陸根末 壹升

澤瀉末壹升　椒末壹升

右陸味。盛以絹袋。內酒中。密封口。埋入地三尺。堅覆上二十日。沐浴整衣冠。向仙人再拜訖。開之。其酒當赤如金色。平旦空肚服半升為度。十日萬病皆愈。二十日瘢痕滅。惡疾人以一升水和半升酒。分五服。服之即愈。若欲食石者。取河中青白石如棗杏仁者貳升。以水叁升煑一沸。以此酒半合置中。須臾即熟可食。

靈飛散方

雲母粉壹斤　茯苓捌兩　鍾乳柒兩　柏仁柒兩　桂心柒兩

人參柒兩　白朮肆兩　續斷柒兩　菊花拾伍兩　乾地黃拾貳兩

右壹拾味。擣篩。以生天門冬拾玖斤。取汁溲藥。著銅器中。蒸之壹石貳斗黍米下。出暴乾。擣篩。先食服方寸匕。日壹服。三日力倍。五日血脉充盛。七日身輕。十日面色悅澤。十

五日行及奔馬。三十日夜視有光。七十日頭髮盡落。故齒皆去。更取二十匕。白蜜和擣二百杵。丸如梧子。作八十一丸。皆映徹如水精珠。欲令髮齒時生者。日服七丸。三日即生。若髮未白不落者。且可服散如前法。已白者。餌藥至七年乃落。入山日服七丸。則絶穀不飢。

服雲母第五　方三首　論一首

雲母粉法。

雲母取上上白澤者。細擘。以水淨淘。漉出蒸之。一日一夜下之。復更淨淘如前。去水令乾。率雲母壹斤。鹽三升。消石一斤。和雲母擣之。一日至暮。取少許掌上泯著。不見光明爲熟。出安盆甕中。以水漬之。令相得。經一炊久。澄去上清水。徐徐去之。盡更添水。如前。凡三十遍。易水。令淡如水味。即漉出。其法一如研粉。澄取淀。然後取雲母淀。徐徐坐絹袋中。濾著單上。

暴令乾即成矣。雲母味甘平無毒。主治死肌。中風寒熱。如在船車上。除邪氣。安五藏。益子精。明目。下氣。堅肌續絶。補中。五勞七傷。虛損少氣。止利。久服輕身延年。強筋脉。填髓。滿可以負重經山。不乏。落齒更生。瘢痕消滅。光澤人面。不老。耐寒暑。志高可至神仙。此非古法。近出東海賣鹽女子。其女子年三百歲。貌同笄女。常自負一籠鹽。重五百餘斤。如斯得効者。其數不一。可驗神功矣。

又方

雲母擘薄。淘淨去水餘濕。沙盆中研萬萬遍。以水淘澄取淀。見此法即自保愛。修而服之。勿泄之。勿泄之。

凡服雲母祕澀不通者。以蕪菁菹汁下之。即通祕之。

用雲母粉法。

熱風汗出心悶。水和雲母浴之。不過再差。

勞損汗出。以粉摩之即定。以粳米粥和三方寸匕。服之。

痔濕慝瘡月蝕。粳米粥和三方寸匕服之。以一錢匕內下部中取差。

上下脫。病粳米粥和三方寸匕。服之七日。慎血食五辛房室重作務。

赤白痢積年不差。服三方寸匕。不過一兩即差。寸白蟲者。服一方寸匕。不過四服。

帶下。服三方寸匕。三五服差。

金瘡。一切惡瘡。粉塗之至差止。

疽疥瘑亦然。

風癩者。服三方寸匕。取差。

痔病。服三方寸匕。慎房室血食油膩。

淋病服三方寸匕。

又一切惡瘡粉和猪脂塗之。

頭瘡禿癬酢酒洗去痂以粉塗之水服三方寸匕百日愼如前。

論曰凡服粉治百病皆用粳米粥和服之愼房室五辛油膩血食勞作若得雲母水服之壹升長年飛仙。

雲母水主除萬病久服長年神仙方。

雲母貳拾斤細擘 芒消拾斤 露水壹石 崖蜜貳斤

右肆味先取露水捌斗作沸湯分半洮汰雲母再再遍漉出以露水二斗溫之內芒消令消置木器中內雲母訖經三七日出之令燥以水漬之麤皮令軟作袋內雲母袋中急繫口兩人挼挻之從寅至午勿住出之密絹篩末餘不下者更內袋中挼挻如初篩下捴可得五斤以崖蜜和攪令如粥內薄削筩中漆固口理舍北陰中深六七尺築土令

平。一百二十日出之皆成水。旦温水一合。和雲母一合。向東服。日三。水寒温自任。服十日。小便當黄。此先除勞氣風疢也。二十日。腹中寒澼皆消。二十日。齲齒除者更生。四十日。不畏風寒。伍十日。諸病皆愈。顏色日少。久服不已。長年神仙。

服水第六　論一首　法七首

論曰。夫天生五行。水德最靈。浮天以載地。高下無不至。潤下爲澤。升而爲雲。集而爲霧。降而爲雨。故水之爲用。其利博哉。可以滌蕩滓穢。可以浸潤焦枯。尋之莫測其涯。望之莫覩其際。故含靈受氣。非水不生。萬物稟形。非水不育。大則包稟天地。細則隨氣方圓。聖人方之以爲上善。余嘗見真人有得水仙者。不覩其方。武德中龍齎此一卷服水經授余。乃披翫不捨。晝夜甘書。多有蠹壞。文字頗致殘缺。因暇隙尋其義理。集

成一篇。好道君子勤而脩之。神仙可致焉。

第一服水法。

凡服水之法。先發廣大心。仍救三塗大苦。普度法界含生。然後安心服之。

經曰。服水以死爲期。決得不疑。然後辦一瓦杯受一升。擇取四時王相甲子開除滿之日。并與身本命相生之日。候天地大時無一雲氣。日未出時。清淨沐浴。服鮮淨衣。燒香禮十方諸佛及一切聖賢仙人天眞。乞大鴻恩。乃向東方取水。以水置器中。候日出地。令水與日同時得三杯。杯各受一升。呪之三遍。向日以兩手捧水當心。面向正東方。並脚而立。先扣齒鳴天鼓三通。乃以口臨水上。密誦呪一三五七遍。極微微用力乃細細咽之。想三咽在左廂下。三咽在右廂下。三咽處中央下。周而復始。但是服即作此法。咽水服一杯。踟蹰消息。徐徐

行二十步。乃廻更服一杯訖。更徐徐行四十步。乃廻更飲一杯。復行八十步乃止。勿煩多飲。亦不得少也。常燒衆名香至心念佛。凡有所證悟境界一切狀貌。不得執著。乃眞事向人道說。此則是初起首服水法。杯用桑杯。瓦亦得。其呪曰。

乾元亨利正九種吾生。日月與吾并。吾復不飢。復不渴。賴得水以自活。金木水火土五星之氣。六甲之精。三眞天倉濁雲上盈黃父赤子。守中無傾。急急如律令。每服皆用此呪。呪之三杯。杯各三遍。乃細緩緩徐徐服之。

細服五色水法。

經曰。白黃黑水服法如前。唯有青水一法。服滿三七日。日中思食。鬼神遍在身中。從人索食。當如法與之。絕中五穀。多食棗栗。詐稱鬼親附。說人慎勿信之。但當以法調和。以時及節。

服赤水方。

赤向生氣所宜之方。三杯三呪。拱手心念口言誦偈曰。金木水火土五精六府。一切識藏。欲服之時。專心注下。初服之時。如似發氣。三七日如甘露味。亦當食棗栗一升。七日食蟲漸發三尸亦盛。思美飲食。遍緣一切世間。當發善念相續五七日。中二食棗栗水方漸強增長。顏色怡悅。氣力異常。更須加口水。當漸少。日月漸盈。膚體汗穢漸漸剥落。眼目精明。亦少睡眠。心閑意解。但如法慎護。心若不至誠。內連六識。外爲鬼神侵繞其心。念青帝神守護。水精五七日。脚弱心意不定。但當正念重加神司土父神后五藏君名。衆邪雜鬼如法而去。六七日後獨善解音樂。不得禮拜。省習誦養氣力。勿嗔怒嫉妬。勿調氣。省睡眠。

却鬼呪法。

呪曰。然摩然摩。波悉諦蘇。若摩竭状闍提。若夢若想。若聰明

易解。常用此呪法。去之。

服水禁忌法。

經曰。凡服水忌用銅鐵器。唯用堝器。初起手時。忌陰雲大雨大風大霧。天地不明。皆凶。

凡服水。禁陳米臭豉生冷酢滑椒薑。一切衆果。悉不得食。又不得至喪孝產乳之家。五辛之氣。亦不得聞。一切脂膩血食菜茹。悉不得食也。

凡服水四七日後。不聞琴聲歌嘯。悉不得容受。資身悅樂音聲博戲。皆不得執。漸漸通泰。以洪大道。五色水法。皆同於此也。世閒之法。音聲觸。五穀觸。喪孝觸。產婦觸。射利觸。善友觸。惡人名鬪觸。惡名觸。皆當謹愼之。

服水節度法。

經曰。凡服水七日中。漸止酢滑。亦漸省食。七日滿。取棗栗食。

經二日後。乃更服之。二七日後。食蟲漸發。更食棗栗一升。三七日後思食。更服栗棗貳升。四七日後。食蟲思食。欲死。脚弱不能行步。五七日水力漸盈。顏色更好。氣力異常。六七日中能步不止。隨意東西。七七日中。心解異義。耳聞異聲。必不得貪著義亦有悲欣慈旨。八七日中守尸。九七日中尸臭自然遠離。不樂世間。五藏諸病悉得除愈。十七日中。髓腦衆脉皮膚汗類一切悉愈。眼目精明。心想分別無事不知。千日後中表內外。以五藏漸縮漸小。衆毒不害人精。水神漸來附人。七年腸化為筋。髓化為骨。火不能燒。水不能漂。居在水中。與水同色。在水底與地無異。居山澤間。遠視之者。獨如山雷。此服黄黑水法。用水法。井泉清流。悉得用之。雷字疑

服水大例法。

經曰。凡服水以死為期。必得無疑。信因信果。正真其心。聞法

歡喜。不生疑惑。

又曰。凡服水訖。男先舉左足向陽左行。女先舉右足向陰右行。男奇女偶。

凡服水法。

立飲之。不得坐飲。欲細細而緩。不得麤麤而急。杯受壹升。每一服必三杯。服輒一迴。徐行三杯三迴。若少兼食者。杯受一升。如是三杯。

凡服水。上行一百三十步。中行一百二十步。下行六十步。水重難得氣力。善將其宜而不失其所者。一百日水定。周年水盈。四十年氣二百倍。遊形自在。高原陸地與水等無差異。顏色皎然。四十年腸化為筋。髓化為骨。

凡服水。八十以下十歲以上皆得服之。若小者。當加粟棗粟法。上根者從初七至四七止。中根者從初七至八七止。下

根者從初七至十七乃至十七十二七止。後有中下根者。一周晬將補乃始休息。

上利根之人。一服如甘露。中根之人。再服如甘露。下根之人。四服如甘露。極下根者。六服如甘露。上利根者。一服二七日。中根者。過七日乃至十日。下根者。服日再服七日。

又有上利根者延日三倍。中利根者延日一倍。下利根者纔不當日。

又有上品人脩戒定。過去業強。中品人見在脩業強。下品人以死爲期。必得無疑。信向三寶。

中根有三品。中上品。當聞知此寶法。欲長年服大升一石二石。即得不死。中中品脩習其行。比智殖業。當服此藥。實行誓願。中下品少有嫉妬。及以憍慢。亦具五蓋三毒。起冤心因國土荒亂。人民饑饉。刀兵劫起。思服此藥以免。

下根有三品。睡眠無覺想。不善音樂。亦乱博戲。又無聰惠瞪矒不了。須人教呵。中品人小復遠人。下品人居大深山乃得服耳。

千金翼方卷第十三

千金翼方卷第十四

退居

論曰。人生一世。甚於過隙。役役隨物。相視俱盡。不亦哀乎。就中養衞得理。必免夭橫之酷。若知進而不知退。知得而不知喪。嗜慾煎其內。權位牽其外。其於過分內熱之損。胡可勝言。況乎身滅覆宗之禍。不絕於世哉。今撰退居養志七篇。庶無禍敗夭橫之事。若延年長生。則存乎別錄。高人君子。宜審思之。

擇地第一

山林深遠。固是佳境。獨往則多阻。數人則喧雜。必在人野相近。心遠地偏。背山臨水。氣候高爽。土地良沃。泉水清美。如此得十畝平坦處。便可構居。若有人功可至二十畝。更不得廣。廣則營爲關心。或似產業。尤爲煩也。若得左右映帶崗阜形勝。最爲上地。地勢好。亦居者安。非他望也。

締剏第二

看地形向背擇取好處立一正屋三間內後牽其前梁稍長柱令稍高椽上著棧棧訖上著三四寸泥泥令平待乾即以瓦蓋之四面築牆不然塹壘務令厚密泥飾如法須斷風隙折縫門牕依常法開後門若無瓦草蓋令厚二尺則冬溫夏涼於簷前西間作一格子房以待客客至引坐勿令入寢室及見藥房恐外來者有穢氣損人壞藥故也若院外置一客位最佳堂後立屋兩間每間為一房修泥一準正堂門令牢固一房著藥藥房更造一立櫃高腳為之天陰霧氣櫃下安少火若江北則不須火也一房著藥器地上安厚板板上安之著地土氣恐損正屋東去屋十步造屋三間脩飾準上二間作廚北頭一間作庫庫內東牆施一棚兩層高八尺長一丈濶四尺以安食物必不近正屋近正屋則恐煙氣及人兼

慮火燭。尤宜防慎。於厨東作屋二間。弟子家人寢處。於正屋西北立屋二間通之。前作格子。充料理曬暴藥物。以籬院隔之。又於正屋後三十步外立屋二間。椽梁長壯柱高間闊。以安藥鑪。更以籬院隔之。外人不可至也。西屋之南立屋一間。引簷中隔著門。安功德。充念誦入靜之處。中門外水作一池。可半畝餘。深三尺。水常令滿。種芰荷菱芡。繞池岸種甘菊。既堪採食。兼可閱目怡閑也。

服藥第三

人非金石。況犯寒熱霧露。既不調理。必生疾癘。常宜服藥。辟外氣和藏府也。平居服五補七宣丸鍾乳丸。量其性冷熱虛實。自求好方常服。其紅雪三黃丸青木香丸理中丸神明膏陳元膏春初水解散天行茵蔯丸散。皆宜先貯之。以防疾發。忽有卒急。不備難求。臘日合一劑烏膏楸葉膏。以防癰疽等。

若能服食。尤是高人。世有偶學合鍊。又非眞好。或身嬰朝紱心迫名利。如此等輩。亦何足言。今退居之人。豈望不死羽化之事。但免外物逼切。庶幾全其天年。然小小金石事。又須閑解神精丹。防危救急。所不可闕耳。伏火丹砂。保精養魂。尤宜長服。伏火石硫黄。救脚氣。除冷癖。理腰膝。能食有力。小還丹愈疾去風。伏火磁石。明目堅骨。火鍊白石英紫石英。療結滯氣塊。強力堅骨。伏火水銀。壓熱鎭心。金銀膏。養精神。去邪氣。此等方藥。固宜留心功力。各依本草。其餘丹火。以冀裨助。非可卒致。有心者亦宜精懇。儻遇其眞。

飲食第四

身在田野。尤宜備贍。須識罪福之事。不可爲食損命。所有資身。在藥菜而已。料理如法。殊益於人。枸杞甘菊朮牛膝苜蓿商陸白蒿五加服石者不宜喫。商陸以上藥。三月已前苗嫩

時採食之。或虀。或蒸。或炒。或合。悉用土蘇鹹豉汁加米等色爲之。下飯甚良。蔓菁作虀最佳。不斷五辛者。春秋嫩兆。四時採薤。甚益。麴雖擁熱。甚益氣力。但不可多食。致令悶憒。料理有法。節而食之。百沸餺飥蒸餅及羊索餅起麪等法在食經中。白粳米白粱黃粱青粱米常須貯積支料一年。炊飯煮粥亦各有法。並在食經中。蒜豆紫蘇烏麻亦須宜貯。俱能下氣。其餘豉醬之徒。食之所要。皆須貯蓄。若肉食者。必不得害物命。但以錢買。猶愈於殺。第一戒慎勿殺。若得肉。必須新鮮。似有氣息。則不宜食。爛藏損氣。切須慎之。戒之。料理法在食經中。食後將息法。

平旦點心飯訖。即自以熱手摩腹。出門庭行五六十步。消息之。中食後。還以熱手摩腹。行一二百步。緩緩行。勿令氣急。行訖。還牀偃臥。四展手足。勿睡。頃之氣定。便起正坐。喫五六顆

蘇煎棗啜半升以下入參茯苓甘草等飲覺似少熱即麥門冬竹葉茅根等飲量性將理食飽不得急行及飢不得大語遠喚人嗔喜卧睡覺食散後隨其事業不得勞心勞力覺肚空即須索食不得忍飢必不得食生硬粘滑等物多致霍亂秋冬間暖裏腹腹中微似不安即服厚朴生薑等飲如此將息必無横疾

養性第五

雞鳴時起就卧中導引導引訖櫛漱即巾巾後正坐量時候寒温喫點心飯若粥等若服藥者先飯食服喫藥酒消息訖入靜燒香靜念不服氣者亦可念誦洗雪心源息其煩慮良久事訖即出徐徐步庭院間散氣地濕即勿行但屋下東西步令氣散家事付與兒子不得關心所營退居去家百里五十里但時知平安而已應緣居所要並令子弟支料頓送勿

令數數往來憒鬧也。一物不得。在意營之。平居不得嗔。不得大語大叫大用力飲酒至醉。並爲大忌。四時氣候和暢之日。量其時節寒溫。出門行三里二里及三百二百步爲佳。量力行。但勿令氣乏氣喘而已。親故鄰里來相訪問。携手出遊百步。或坐。量力。宜談笑簡約其趣。纔得歡適。不可過度耳。人性非合道者。焉能無悶。悶則何以遣之。還須蓄數百卷書。易老莊子等。悶來閱之。殊勝悶坐。衣服但麤縵可禦寒暑而已。第一勤洗浣。以香霑之。身數沐浴。務令潔淨。則神安道勝也。浴法具養生經中。所將左右供使之人。或得清淨弟子。精選小心少過謙謹者。自然事閑無物相惱。令人氣和心平也。凡人不能絕嗔。得無理之人易生嗔喜。妨人道性。

種造藥第六

種枸杞法。

揀好地。熟斸加糞訖。然後逐長開壠。深七八寸。令寬。乃取枸杞連莖剉長四寸許。以草爲索慢束。束如羹椀許大。於壠中立種之。每束相去一尺。下束訖。別調爛牛糞稀如麪糊。灌束子上。令滿。減則更灌。然後以肥土擁之。滿訖。土上更加熟牛糞。然後灌水。不久即生。乃如翦韭法。從一頭起首割之。得半畝。料理如法。可供數人。其割時與地面平。高留則無葉。深翦即傷根。割仍避熱及雨中。但早朝爲佳。

又法

但作束子作坑。方一尺。深於束子三寸。即下束子訖。著好糞滿坑填之。以水澆糞下。即更著糞填。以不減爲度。令糞上束子一二寸即得。生後極肥。數鋤擁。每月加一糞尤佳。

又法

但畦中種子。如種菜法。上糞下水。當年雖瘦。二年以後悉

肥。勿令長苗。即不堪食。如食不盡。即翦作乾菜。以備冬中常。使。如此從春及秋。其苗不絕。取甘州者爲眞。葉厚大者是。有刺葉小者是白棘。不堪服食。愼之。

又法

枸杞子於水盆挼令散訖。暴乾斸地作畦。畦中去却五寸土。勻作壟。縛草作稕。以臂長短。即以泥塗稕上。令遍。以安壟中。即以子布泥上。一面令稀稠得所。以細土蓋上。令遍又以爛牛糞蓋子上。令遍。又布土一重。令與畦平。待苗出。時時澆溉。及堪採。即如翦韭法。更不要煑鍊。每種用二月。初一年但五度翦。不可過此也。凡枸杞生西南郡谷中及甘州者。其子味過於蒲桃。今蘭州西去鄯城。靈州九原並多。根莖尤大。

種百合法。

上好肥地加糞熟斸訖。春中取根大者。擘取瓣於畦中。種如蒜法。五寸一瓣種之。直作行。又加糞灌水。苗出即鋤四邊。絕令無草。春後看稀稠得所。稠處更別移。亦得畦中乾即灌水。三年後甚大如芋。然取食之。又取子種亦得。或一年以後二年以來始生。甚遲。不如種瓣。

種牛膝法。

秋間收子。至春種。如種菜法。上加糞水溉。苗出堪採即如剪韭法。常須多留子。秋中種亦好。其收根者。別留子。取三畝肥地熟耕。更以長鍬深掘。取其土虛長也。土平訖。然下子。荒即芸草。旱則溉。至秋子成高。刈取莖。收其子。九月末間還用長鍬深掘取根。如法料理。

種合歡法　萱草也。

移根畦中稀種。一年自稠。春剪苗食如枸杞。夏秋不堪食。

種車前子法。

收子。春中取土地。加糞熟斸。水溉。翦取。如上法。此物宿根。

但芸灌而已。可數歲也。

種黃精法。

擇取葉參差者。是眞。取根擘破。稀種。一年以後極稠。種子

亦得。其苗甚香美。堪噉。

種牛蒡法。

取子畦中種。種時乘雨即生。若有水。不要候雨也。地須加

糞灼然肥者。旱即澆水。翦如上法。菜中之尤吉。但多種。食

苗及根。並益人。

種商陸法。

又取根紫色者。白色者良。赤及黃色者有毒。根擘破。畦中

作行種。種子亦得。根苗並堪食。色紫者味尤佳。更勝白者。

淨洗熟蒸。不用灰汁煑鍊。並無毒。尤下諸藥。服丹砂乳石等人不宜服。

種五加法。

取根深掘肥地二尺。埋一根令沒舊痕。甚易活。苗生從一頭剪取。每剪訖鋤土擁之。

種甘菊法。

移根最佳。若少時折取苗。乘雨中濕種便活。一年之後子落遍地。長服者及冬中收子。剪如韭法。

種苜蓿法。

老圃多解。但肥地令熟。作壠種之極益人。還須從一頭剪。每一剪加糞鋤土擁之。

種蓮子法。

又八月九月取堅黑子。瓦上磨尖頭直令皮薄。取墐土作

熟泥封。如三指大長二寸。使帶頭兼重令磨須尖。泥欲乾時擲置池中。重頭向下自能周正薄皮上易生。數日即出。不磨者卒不可生。

種藕法。

春初掘取根三節無損處。種入深泥。令到硬土。當年有花。

種青蘘法。即胡麻苗也。

取八稜者畦中如菜法種之。苗生採食。秋間依此法種之。甚滑美。

種地黃法。

十二月耕地。至正月可止三四遍。細杷訖。然後作溝。溝闊一尺。兩溝作一畦。畦闊四尺。其畦微高而平。硬甚不受雨水。苗未生間得水即爛。畦中又撥作溝。溝深三寸。取地黃切長二寸種於溝中。訖即以熟土蓋之。其土可厚三寸以

上。每種一畝用根五十斤。蓋土訖。即取經冬爛穰草覆之。候稍芽出。以火燒其草。令燒去其苗。再生者葉肥茂。根葉益壯。自春至秋凡五六遍芸。不得用鋤。八月堪採根。至冬尤佳。至時不採。其根大盛。春二月當宜出之。若秋採訖至春不須更種。其種生者猶得三四年。但採訖把之。明年耨芸而已。參驗古法。此為最良。按本草二月八月採。殊未窮物性也。八月殘葉猶在。葉中精氣未盡歸根。二月新葉已生。根中精氣已滋於葉。不如正月九月採。殊妙。又與蒸暴相宜。古人云二月八月非為種者。將謂野生。當須見苗耳。若食其葉。但霧露散後摘取傍葉。勿損中心正葉。甚益人。勝諸菜。

造牛膝法。

八月中長鍬掘取根。水中浸一宿。密置篩中。手挼去上皮齊頭。暴令稍乾。屈令直。即作束子。又暴令極乾。此看端正。

若自用者。不須去皮。但洗令淨便暴。殊有氣力。

造乾黄精法。

九月末掘取根。揀取肥大者。去目熟蒸。微暴乾又蒸。暴乾食之如蜜。可停。

造生乾地黄法。

地黄一百斤。揀擇肥好者六十斤。有鬚者去之。然後淨洗漉乾。暴三數日令微皺。乃取揀退四十斤者。淨洗漉乾。於柏木臼中熟擣。絞取汁。汁如盡。以酒投之更擣。絞即引得餘汁盡。用拌前六十斤。乾者於日中暴乾。如天陰即於通風處薄攤之。夜亦如此。以乾爲限。此法比市中者氣力數倍。頻取汁恐損。隨日擣絞用。令當日盡佳。

造熟乾地黄法。

斤數揀擇一準生法。浸訖。候好晴日便早蒸之。即暴於日

中。夜置汁中。以物蓋之。明朝又蒸。古法九遍止。今但看汁盡色黑。熟蒸三五遍亦得。每造皆須春秋二時。正月九月緣冷寒氣方可宿浸。二月八月拌而蒸之。不可宿浸也。地黄汁經宿恐醋。不如日日擣取汁用。凡暴藥皆須以牀架上置薄簟等。以通風氣。不然日氣微弱則地氣止津也。於漆盤中暴最好。簟多汗又損汁。

藕粉法。

取麤藕不限多少。灼然淨洗截斷浸三宿。數換水。看灼然淨訖漉出。碓中碎擣絞取汁。重擣絞取濃汁盡爲限。即以密布濾麤惡物。澄去清水。如稠難澄。以水攪之。然後澄看水清即瀉去。一如造米粉法。

雞頭粉取新熟者。去皮熟擣實如上法。

菱角粉去皮如上法。

葛根粉去皮如上法。開胃口止煩熱也。

蒺藜粉擣去上皮簸取實如上法。此粉去風輕身。

茯苓粉剉如彈子。以水浸去赤汁。如上法。

栝樓根粉去皮如上法。

種樹法須望前種。十五日後種少實。

種杏法。

杏熟時。并肉核埋糞中。凡薄地不生。生且不茂。至春生後即移實地栽之。不移即實小味苦。樹下一歲不須耕。耕之即肥而無實也。

種竹法。

欲移竹。先掘坑。令寬。下水。調細土作泥如稀煎餅泥。即掘竹須四面斵。勿斵大作土科連根。以繩周下抨舁之。勿令動著竹。動則損根。多不活。掘訖。舁入坑泥中。令泥周匝擁滿。

如泥少更添土著水，以物勻攪令實，其竹根入坑，不得埋過本根，若竹稍長者，以木深埋入土架縛之，恐風搖動即死。種樹亦如此，竹無時，樹須十二月以後二月以前，宜去根尺五寸，留栽來年便生筍，泥坑種動搖必不活。

種梔子法。

臘月折取枝長一尺五寸，以來先鑿坑一尺闊五寸，取枝屈下拗處如毬杖，卻向上，令有葉處坑向上，坑口出五寸，一邊約著土實，訖即下肥土實築，灼然堅訖，自然必活，二年間即有子。

作籬法。

於地四畔掘坑，深二尺闊二尺，坑中熟斸，酸棗熟時多收取子，坑中穊種之，生後護惜，勿令損，一年後高三尺，間去惡者，一尺以下留一莖，稀稠行伍端直，來春剔去橫枝，留

距不留距。恐瘡大至冬凍損。剝訖編作笆籬。隨宜夾縛。務令緩舒。明年更編高七尺。便定種榆柳並同法。木槿木芙蓉更堪看。

種枳法。

秋收取枳實破作四片。於陰地熟斸加糞。即稠種之。至春生。閤一冬高一尺。然後移栽每一尺種一。栽至高五尺以物編之。甚可觀也。

雜忌第七

屋宇宅院成後。不因崩損。輒有脩造。及妄動土二尺以下。即有土氣。慎之為佳。初造屋成。恐有土木氣。待泥乾後。於庭中醮祭。訖然後擇良日入居。居後明日燒香結界發願。願心不退。轉早悟道法成功德。藥無敗壞。結界如後。平旦以清水漱口。從東南方左轉誦言娑迦羅。又到西南角言你自受殃。

又從東南角言竪沙迦羅。又到西南角言你自受殃。一一如是滿七遍。盜賊皆便息心不能爲害矣。或入山野。亦宜作此法。或在道路逢小賊作障難。即定心作降伏之意。呪言竪沙迦羅。竪沙迦羅。一氣盡爲度。亦自壞散也。此法秘妙。是釋門深秘。可以救護衆生大慈悲。故不用令孝子弋獵魚捕之人入宅。不用輙大叫喚。每栽樹木量其便利。不須等閑漫種無益柴炭等並年支。不用每日令人出入門巷惟務寂然。論曰。看此論。豈惟極助生靈。亦足以誡於貪婪之士無敗禍之釁。庶忠義烈士味之而知止足矣。

千金翼方卷之十四

千金翼方卷之十五

補益

叙虛損論第一

論曰凡人不終眉壽或致夭殁者。皆由不自愛惜。竭情盡意。邀名射利。聚毒攻神。內傷骨髓。外敗筋肉。血氣將亡。經絡便壅。皮裏空疎。惟招蠹疾。正氣日衰。邪氣日盛。不異舉滄波以注爝火。頹華嶽而斷涓流。語其易也。又甚於此。然疾之所起。生自五勞。五勞既用。二藏先損。心腎受邪。腑藏俱病。故彭祖論別牀異被之戒。李耳陳黃精鈎吻之談。斯言至矣。洪濟實多。今具錄來由。并貫病狀。庶智者之察微。防未萌之疾也。五勞者。一曰志勞。二曰思勞。三曰心勞。四曰憂勞。五曰疲勞。即生六極。一曰氣極。氣極令人內虛。五藏不足。外受邪氣。多寒濕痺。煩滿吐逆。驚恐頭痛。二曰血極。血極令人無色澤。恍惚

喜忘。善驚少氣。舌強喉乾。寒熱。不嗜食。苦睡。眩冒喜瞋。三曰筋極。筋極令人不能久立。喜倦拘攣。腹脹。四肢筋骨疼痛。四曰骨極。骨極令人痠削。齒不堅牢。不能動作。厥逆。黄疸。消渴。癰腫疽發。膝重疼痛。浮腫如水狀。五曰精極。精極令人無髮。髮膚枯落。悲傷喜忘。意氣不行。六曰肉極。肉極令人發狂如得擊不復得言。甚者致死復生。七傷者。一曰陰寒。二曰陰痿。三曰裏急。四曰精連連而不絶。五曰精少囊下濕。六曰精清。七曰小便苦數臨事不卒。名曰七傷。七傷爲病。令人邪氣多正氣少。忽忽喜忘而悲傷不樂。奪色黧黑。飲食不生肌膚色無潤澤。髮白枯槁。牙齒不堅。目黄淚出。遠視𥉂𥉂。見風淚下。咽焦消渴。鼻衄唾血。喉中介介不利。胸中噎塞。食飲不下。身寒汗出。肌肉痠痟。四肢沉重。不欲動作。膝脛苦寒。不能遠行。上重下輕。久立腰背苦痛。難以俛仰。繞臍急痛。飢則心下虚

懸脣乾口燥腹裏雷鳴胸背相引痛或時嘔逆不食或時變吐小便赤熱乍數時難或時傷多或如針刺大便堅澀時泄下血身體瘙癢陰下常濕黃汗自出陰痿消小臨事不起精清而少連連獨泄陰端寒冷莖中疼痛小便餘瀝卵腫而大縮入腹中四肢浮腫虛熱煩疼乍熱乍寒臥不安席心如杵舂驚悸失脉呼吸乏短時時惡夢夢與死人共食入塚此由年少早娶用心過差接會汗出藏皆浮滿當風臥濕久醉不醒及墜車落馬僵仆所致也故變生七氣積聚堅牢如杯留在腹內心痛煩寃不能飲食時來時去發作無常寒氣爲病則吐逆心滿熱氣爲病則恍惚悶亂長如眩冒又復失精喜氣爲病則不能疾行不能久立怒氣爲病則上氣不可當熱痛上衝心短氣欲死不能喘息憂氣爲病則不能苦作臥不安席恚氣爲病則聚在心下不能飲食愁氣爲病則平居而

忘。置物還取。不記處所。四肢浮腫。不能舉止。五勞六極。力之氣畜。變成寒熱氣疰。發作有時。受邪爲病。凡有十二種風。風入頭。則耳聾。風入目。則遠視𥆧𥆧。風入肌膚。則身體癮瘮筋急。風入脉。則動上下無常。風入心。則心痛煩滿悸動喜腹䐜脹。風入肺。則欬逆短氣。風入肝。則眼視不明。目赤淚出。發作有時。風入脾。則脾不磨。腸鳴脇滿。風入腎。則耳鳴而聾。脚疼痛。腰尻不隨。甚者不能飲食。入膽。則眉間疼痛。大小便不利。令人疼痺。五勞六極七傷。七氣積聚。變爲病者。甚則令人得大風。緩急濕痺。不仁偏枯。筋縮。四肢拘攣。關節隔塞。經脉不通。便生百病。羸瘦短氣。令人無子。病欲及人。便即夭逝。勞傷血氣。心氣不足所致也。若或觸勞風氣。則令人角弓反張。舉身皆動。或眉鬚頻落。惡氣腫起。魂去不足。夢與鬼交通。或悲哀不止。恍惚恐懼。不能飲食。或進或退。痛無常處。至此爲療。

不亦難乎。十二種風元不足。

大補養第二論一首　方八首

論曰。病患已成。即須勤於藥餌。所以立補養之方。此方皆是五石三石大寒食丸散等藥。自非虛勞成就偏枯著牀。惟向死近無所控告者。乃可用之。斯誠可以起死人耳。平人無病不可造次著手。深宜慎忌。

張仲景紫石寒食散治傷寒已愈不復方。

紫石英　白石英　赤石脂　鍾乳鍊　栝樓根

防風　桔梗　文蛤　鬼臼　太一餘粮各貳兩半

人參　乾薑　附子炮去皮　桂心各壹兩

右壹拾肆味。擣篩為散。酒服三方寸匕。

損益草散　常用之佳。主男子女人老少虛損。及風寒毒冷。下痢癖飲欬嗽。消穀。助老人胃氣。可以延年。又主霍亂。酒服二一

方寸匕。愈。又主衆病休息下痢。垂命欲死服之便差。治人最爲神驗方。

人參　附子炮去皮。各叁分　乾薑　桂心各伍分

防風壹兩半　牡蠣熬　黄芩　細辛各叁分　桔梗

椒去目閉口者汗　茯苓　秦艽　白术各壹兩

右壹拾叁味。各擣篩爲散。更秤如分。乃合之。治千杵。旦以温酒服方寸匕。老人頻服三劑。良。兼主虛勞。

草實食散　治心腹脇下支滿。邪氣衝上。又心胷喘悸不得息。腹中漉漉雷鳴。吞酸噫。生食臭。食不消化。時洩時閉。心腹煩悶。不欲聞人聲。好獨卧。常欲得熱。恍惚喜忘。心中怵惕。如恐怖狀。短氣嘔逆。腹中防響。五藏不調。如此邪在於內。而作衆病。皆生於勞苦。若極意於爲樂。從風寒起。治之皆同。服此藥。旦未食時。以淳美酒服二方寸匕。不耐者。減之。去巾帽薄衣

力行方。

鍾乳（鍊） 附子（炮去皮） 栝樓根 茯苓 牡蠣（各壹分。熬）
桔梗 乾薑 人參 防風（各壹兩） 細辛
桂心（各伍分） 白朮（參兩半）

右壹拾貳味。各擣篩治千杵。以酒服之二匕。建日服之至破日止。周而復始。

又方 説狀所主同前。

鍾乳（鍊粉） 人參 茯苓 附子（炮，各叁分） 栝樓根
牡蠣（熬） 細辛（各半兩） 乾薑 桂心（各伍分） 白朮
防風 桔梗（各壹兩）

右壹拾貳味。擣篩爲散。服之一如前方。有冷加椒。有熱加黄芩各叁分。

大草烏頭圓 主寒冷虚損。五十年心腹積聚。百病。邪氣往來。

厥逆搶心，痺頑羸瘦，骨立不能食，破積聚方。

烏頭拾伍分，去皮，炮　人參伍分　生薑貳兩　前胡

蜀椒去目閉口者，汗　黃芩　白朮　半夏洗

黃連　吳茱萸　龍骨　白頭翁　乾薑

細辛　桔梗　紫菀　芎藭　厚朴炙

女萎　礬石燒　桂心　甘草炙，各壹兩

右貳拾貳味，擣篩為末，鍊蜜和圓，如梧子大，酒服拾圓，日三夜一，以知為度。

草烏頭圓 破積聚，治積結冷聚，陽道弱，大便有血，婦人產後出血不止方。

烏頭拾伍分，炮，去皮　大黃　乾薑　厚朴炙

吳茱萸　芍藥　前胡　芎藭　當歸

細辛　桂心各伍分　蜀椒叁分，去目閉口者，汗　白薇半兩

黄芩　白术　人參　紫菀　甘草炙各壹兩

右壹拾捌味。擣篩為末。鍊蜜和圓如梧子大。酒服拾圓。日參服。漸漸加之。

大理中露宿圓　主風勞四十年癖絕冷。并主欬逆上氣方。

人參　桂心　吴茱萸　烏頭炮去皮　礜石燒等分

右伍味。擣篩為末。鍊蜜和圓如梧子大。酒服三圓。日再。以知為度。

匈奴露宿圓　主毒冷方。

礜石燒　桔梗　皂莢炙去子　乾薑　附子炮去皮

吴茱萸等分

右陸味。擣篩為末。鍊蜜和丸如梧子大。飲服參圓。日再。稍加。以知為度。

解散發動第三　論一首　方二十五首　與第二十二卷通

論曰。既得藥力。諸痾併遣。石忽發動。須知解方。故次立解散方焉。一一依其診候而用之。萬不失一。夫脉或洪或實或斷絕不足。欲似死脉。或細數或弦駃。其所犯非一。故也。脉無常。投醫不能識也。熱多則弦駃。有癖則洪實。急痛則斷絕。凡寒食藥熱率常如是。自無所苦。非死候也。動從節度則不死矣。不從節度則死矣。欲服散者。宜診脉審正其候。爾乃畢愈。脉沈數者難發。難發當數下之。脉浮大者易發也。人有服散兩三劑不發者。此人脉沈難發。發不令人覺。藥勢已行。不出形於外。但以藥治於內。欲候知其力。人進食多。一候也。顏色和悅。二候也。頭面身體瘙癢。三候也。濇濇惡風。四候也。厭厭欲寐。五候也。諸有此證候者。皆藥內發五藏。但如方法服藥。宜數下之。內虛自當發也。

人參湯 主散發。諸氣逆。心腹絞痛。不得氣息。命在轉燭方。

人參　枳實炙　甘草炙各玖分　栝樓根　乾薑

白朮各壹兩半

右陸味，㕮咀，以水玖升，煮取三升，分三服。若短氣者，稍稍數服，無苦也。能如方者佳。冬月溫食，胷腹熱者，便冷食。夏月冷食，以水服藥。冷食過多，腹冷者，作湯即自解，便止。

鴨通湯 主散發熱，攻胷背，嘔逆煩悶，臥輙大睡，乘熱覺四肢不快，寒熱往來，大小便難方。

白鴨通新者　大黃貳兩　石膏碎　知母各壹兩　豉壹升

麻黃去節叁兩　葱白貳拾莖　梔子仁貳拾枚　黃芩壹兩半　甘草炙叁分

右壹拾味，㕮咀，以湯壹斗貳升淋鴨通，乃以汁煮藥，取三升半，去滓，然後內豉，更煮三沸，去豉，未食前服一升。

治氣湯 主散家患氣，不能食，若氣逆方。

人參　茯苓　桂心　厚朴炙　半夏洗

甘草炙各壹兩　麥門冬去心　生薑各叁兩切　大棗貳拾枚擘

右玖味。㕮咀。以水捌升。煮取貳升陸合。分服柒合。

主散發頭欲裂。眼疼欲出。惡寒。骨肉痛狀如傷寒。鼻中清涕出方。

以香豉五升。熬令煙出。以酒壹斗投之。濾取汁。任性飲多少。欲令小醉便解。更飲之。取解爲度。亦主時行寒食散發。或口噤不可開。腸滿脹急欲決。此久坐温衣生食所爲。皇甫云口不開。去齒下此酒五合。熱飲之。須臾開。能者多飲至醉益佳。不能者任性。腹脹滿不通。導之令下。

善服散家痰飲。心胷客熱悶者。吐之方。

甘草伍兩。生用

右壹味。㕮咀。以酒五升。煮取二升半。空腹分再服之。服別相去如行伍六里。快吐止。

主散發黃。胷中熱。氣悶方。

胡荽 壹把。切

右壹味。以水柒升。煑取貳升半。分再服。便愈。如不差。更作。亦主通身發黃者。濃煑大黃汁。令溫自洗漬尤良。并主熱毒及胷中毒氣相攻。若不盡復煩悶或痛飲如故。亦主新熱下痢。

解散主諸石熱毒方。

白鴨通 伍升。新者

右壹味。湯壹斗漬之。澄清候冷飲之。任性多少。以差為度。

三黃湯 主解散發。腹痛脹滿卒急方。

大黃　黃連　黃芩 各叁兩

右叁味。㕮咀。以水柒升。煑取三升。分為三服。一方作丸。

散發時行兼有客熱。下血痢不止而煩者。黃連湯方。

黃連　黃蘗各肆兩　梔子拾伍枚擘　阿膠壹兩炙　乾薑

芍藥　石榴皮各貳兩。壹方用枳實

右柒味，㕮咀。以水壹斗，煮取三升，分三服。一方以水六升煮之。

乳石發頭痛寒熱，胷中塞，日晡手足煩疼方。

生麥門冬肆兩去心。　葱白半斤切。　豉三升

右叁味，熟湯捌升，煮取三升。八分三服。

散發虛羸，不能食飲，大便不通，調藏腑方。

麥門冬去心　黃芩　人參各貳兩　竹茹壹升　大棗拾肆枚擘

茯神　半夏洗　生薑切　甘草各叁兩炙　桂心半兩

右壹拾味，㕮咀。以水壹斗，煮取叁升，分三服。

散發四肢腫方。

甘遂壹兩　木防已　茯苓　人參　白朮各叁兩

麻黃貳兩去節。　甘草壹兩半。炙

右柒味。㕮咀。以水柒升。煮取二升捌合。分三服。

散發口瘡方。

龍膽叁兩 子蘗肆兩 黃連貳兩 升麻壹兩

右肆味。㕮咀。以水四升。先煮龍膽黃連。取二升。別取子蘗冷水淹浸。投湯中。令相得。絞取汁。熱含冷吐。差止。

散發如淋熱方。

葵子叁升 茯苓 大黃 通草各叁兩 葱白柒莖

當歸 石韋去毛 芒消各貳兩 桂心壹兩

右玖味。㕮咀。以水壹斗。煮葵子。取六升。去滓。內藥。更煮取叁升。去滓。內芒消。更煮一沸。令消盡。分為四服。日三夜一。

散發大便秘澀不通方。

大黃肆兩 桃仁叁拾枚。去皮尖雙仁。碎

右貳味。切。以水陸升。煮取貳升。分再服。

又大便不通方。

生地黃汁五合　大黃　甘草炙。各半兩

右叁味。㕮咀。以水叁升。煮取壹升。下地黃汁。又煮二沸。分二服。

單服硫黃發爲瘡方。

以大醋和豉。研熟如膏。以塗瘡上。燥輒易之。甚良。

礜石發亦作瘡狀如癬子。紫石多發於腹背。或著四肢。宜以酥摩便差。仍用薺苨湯方。

薺苨　麥門冬各叁兩。去心　乾薑叁兩半　麻黃去節

人參　黃芩　桔梗　甘草炙。各貳兩

右捌味。㕮咀。以水玖升。煮取叁升。分三服。從旦至晡乃盡。日日合服。以差爲度。非但礜石。凡諸石發皆用此方。

散發衄血方

黄連　乾薑各叁兩　黄芩半兩　鹿茸貳兩　瓜子壹升

芍藥　芎藭　生竹皮　桂心　甘草炙各壹兩

右壹拾味，以水壹斗，煮竹皮取捌升，去滓，内藥，煮取貳升，分三服，一日盡。

靳邵大黄圓　主寒食散成痰飲澼水氣，心痛，白節俱腫方。一名細丸

大黄　葶藶熬　豉各壹兩　巴豆去心皮熬　杏仁去皮尖雙仁熬各叁拾枚

右伍味，各擣，大黄、豉為末，別擣巴豆、杏仁如脂，鍊蜜相和，令相得，又更擣壹阡杵，空腹以飲服如麻子一丸，日再。不知，增至貳圓。强人服丸如小豆大。

消石大圓　主男子女人驚厥口乾，心下堅，羸瘦不能食，喜卧，墜堕血瘀，欬逆上氣，胷痛，足脛不仁而冷，少腹滿而痛，身重目眩，百節疼痛，上虛下實。又主女人乳餘疾，帶下，五藏散癖伏熱大如椀，堅腫在心下，胷中津液内結，浮腫膝寒，蠱毒淫

躍苦瀉大虛等方。

消石拾貳兩熬之令乾　蜀椒壹升貳合去目閉口汗　水蛭壹百枚熬

䗪蟲貳兩半去翅足熬　大黃壹斤　茯苓陸兩　柴胡捌兩去苗

芎藭伍兩　蠐螬參拾枚熬

右玖味，擣篩爲末，鍊蜜和，更擣萬杵。圓如梧子大，空腹以飲服伍圓，日三服。五日進十丸，此皆不下，自此以後任意加之。一日可數十丸，與羊臛自補，若利當盆下之，勿於圊，尤慎風冷。若女人月經閉，加桃仁三十枚。去皮尖雙仁熬。一方以酒服十伍丸，日二，不知可稍增，當下如豆汁長蟲，腹中有病皆除。

解散雷氏千金丸方。

消石參分熬　大黃肆兩　巴豆壹分去心皮熬

右參味，擣篩爲末，鍊蜜和丸如小豆許，飲服一丸，日二，以利爲度。

細辛圓 主散發五藏六腑三焦。冷熱不調。痰結胷中強飲。百處不安。又服強氣方。

細辛 杏仁(去皮尖雙仁熬) 澤瀉 乾薑 白朮
茯苓 桂心 甘草(炙各貳兩) 附子(炮去皮) 蜀椒(去目閉口者汗)
附子(炮去皮) 大黃 木防己(各伍分) 芫花 甘遂(各壹兩)

右壹拾伍味。各擣篩為末。別治杏仁如脂。合擣百杵。鍊白蜜和更擣五千杵。丸如梧子大。以酒服貳丸。日再服。不能者如大豆二丸。以知為度。散家困於痰澼服藥患困者。參服此丸。壁相發助。又不令越逸。消飲去結澼。令胷膈無痰無逆寒之患。又令人不眩蒲迷悶。

大青圓 主積年不解。不能食。羸瘦欲死方。

大青 麥門冬(去心) 香豉(各肆兩) 石膏(研) 葶藶子(熬)
梔子 栝樓根 枳實(炙) 芍藥 知母

茯苓　大黄　黄耆　黄芩　甘草各貳兩

右壹拾伍味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如梧子大。以飲服五丸。日二九。五日不知。則更服之。以知爲度。

下藥法。

凡散數發熱無賴。當下去之。諸丹及金石等用此方下之。

黍米叁升。作糜。以成煎猪脂一斤合和之。使熟。宿不食。明旦早食之。令飽。晚當下藥。煎隨下出。神良。下藥盡者後不復發。若發更服之。

又方

肥猪肉伍斤　葱白　薤白各半斤

右叁味。合煑之。旦不食。噉之。一頓令盡爲度。

壓藥發動。數數患熱。用求下却之方。

取猪腎脂。勿令中水。盡取以火炙之。承取脂。適寒溫。一

服二三合。一日一夜可五六升。藥稍稍隨大便去。甚良。

又方

肥猪肉作臛一升。調和如常法。平旦空腹一頓食之。須臾間腹中雷鳴。鳴定便下藥隨下出。以器承取。以水淘汰。取石不盡。更作如前服之。

凡散發瘡腫膏方。

生胡粉 蕪青子熬別擣 杏仁去皮尖雙人別擣 黃連擣末

水銀 猪脂

右陸味。並等分。惟水銀倍之。以脂和研令相得。更以水銀治瘡上。日三。

有發赤腫者。當摩之以膏方。

生地黃伍兩 大黃壹兩 杏仁貳拾枚去皮尖兩仁 生商陸根貳兩

右肆味。切。以醋漬一宿。以猪脂一升煎商陸黑。去滓。膏成。

日三摩之。

散發有生細瘡著此藥主熟至捷方。

黃連　芒消各伍兩

右貳味。以水捌升。煑黃連取四升。去滓。內芒消。令烊。以布塗貼著上。多少皆著之。

洗瘡湯方。

黃連　黃芩　苦參各捌兩

右叁味。切。以水二斗。煑取一斗。去滓。極冷。乃洗瘡。日三。

治發瘡痛癢不可堪忍方。

取冷石。擣下篩。作散粉之。日五六度。乃燥瘡中自淨。無不差。良。

凡服散之後。身體浮腫。多是取冷所致。宜服檳榔湯方。

大檳榔叁拾五枚

右壹味。先出子擣作末。細篩。然後㕮咀其皮。以湯柒升煑取貳升。内子末。分爲再服。服盡當下。即愈。

解散大麥麨方。

取大麥。炒令汗出燥便止。勿令大焦。舂去皮。淨淘。蒸令熟。暴乾。熬令香。細末絹下。以冷水和服三方寸匕。日再。有赤腫者。當摩之。入蜜亦佳。

補五藏第四 方四十五首

補心湯 主心氣不足。驚悸汗出。心中煩悶短氣。喜怒悲憂悉不自知。咽喉痛。口唇黑。嘔吐。舌本強。水漿不通方。

紫石英　紫蘇　茯苓　人參　當歸
茯神　遠志去心　甘草炙，各貳兩　赤小豆五合　大棗叁拾枚，擘
麥門冬壹升，去心

右壹拾壹味。㕮咀。以水壹升。煑取叁升。分四服。日二夜一。

補心湯　主心氣不足。多汗。心煩。喜獨語。多夢。不自覺。喉咽痛。時吐血。舌本强。水漿不通方。

麥門冬（叁兩，去心）　茯苓　人參

桂心　大棗（叁拾枚，擘）　赤小豆（貳拾枚）　紫菀

甘草（炙，各壹兩）

右玖味。㕮咀。以水捌升。煑取貳升伍合。分爲三服。宜春夏服之。

遠志湯　主心氣虛。驚悸。喜忘。不進食。補心方。

遠志（去心）　黄耆　鐵精　乾薑　桂心（各叁兩）

人參　防風　當歸　芎藭　紫石英

茯苓　茯神　獨活　甘草（炙，各貳兩）　五味子（叁合）

半夏（洗）　麥門冬（各肆兩，去心）　大棗（拾貳枚，擘）

右壹拾捌味。㕮咀。以水壹斗叁升。煑取叁升伍合。分爲伍

服。日三夜二。

定志補心湯主心氣不足。心痛驚恐方。

遠志去心 菖蒲 人參 茯苓各肆兩

右肆味。㕮咀。以水壹斗。煑取叁升。分叁服。

傷心湯主心傷不足。腰脊腹背相引痛。不能俛仰方。

茯苓 遠志去心 大棗叁拾枚。擘

飴糖壹升 黄芩 半夏洗 生薑切

乾地黄各貳兩 附子炮去皮

桂心各貳兩 石膏碎 麥門冬去心各肆兩。 甘草炙

阿膠熬。各壹兩

右壹拾肆味。㕮咀。以水壹斗伍升。煑取三升半。去滓。内飴糖阿膠。更煎取三升二合。分三服。

鎮心圓主男子女人虛損。夢寐驚悸。失精。女人赤白注漏。或月水不通。風邪鬼疰。寒熱往來。腹中積聚。憂恚結氣。諸疾皆

悉主之方。

紫石英　茯苓　昌蒲　蓯蓉　遠志去心

麥門冬去心　當歸　細辛　卷柏　乾薑

大豆卷　防風　大黃各伍分　䗪蟲拾貳枚，熬　大棗伍拾枚，擘

乾地黃三兩　人參　澤瀉　丹參　秦艽各壹兩半

芍藥　石膏研　烏頭炮，去皮　柏子仁　桔梗

桂心各叁分　半夏洗　白朮各貳兩　鐵精　白斂

銀屑　前胡　牛黃各半兩　署預　甘草炙，各貳兩半

右叁拾伍味，擣篩為末，鍊蜜及棗膏和之，更擣五千杵，丸如梧子。飲服五丸，日三。稍稍加至貳拾圓，以差為度。

大鎮心圓 所主與前方同。凡是心病皆悉服之方。

乾地黃壹兩半　牛黃伍分　杏仁去皮尖兩仁，熬

蜀椒去目閉口者，汗。各三分　桑螵蛸拾貳枚　大棗三拾伍枚

白斂　當歸各半兩　澤瀉　大豆黄卷　黄耆
鐵精　柏子仁　前胡　茯苓各壹兩　獨活
秦艽　芎藭　桂心　人參　麥門冬去心
遠志去心　丹參　阿膠炙　防風　紫石英
乾薑　銀屑　甘草炙各壹兩
右貳拾玖味，擣篩爲末，鍊蜜及棗膏和，更擣五千杵，丸如梧子。酒服柒圓，日三，加至二十丸。千金有署預、茯神，爲三十一味。

補肝湯　主肝氣不足，兩脇滿，筋急不得太息，四肢厥寒，熱偏癩，淋溺石沙，腰尻少腹痛，婦人心腹四肢痛，乳癰，膝脛熱，轉筋遺溺，消渴，爪甲青枯，口噤面青，太息，疝瘕上搶心，腹中痛，兩眼不明，悉主之方。後面注內貳兩字疑。

蕤仁　柏子仁各壹兩　茯苓貳兩半　烏頭炮，四枚，去皮
大棗叁拾枚擘　牛黄　石膽　桂心各壹兩　細辛

防風　白朮　甘草各三兩，炙

右壹拾貳味，㕮咀，以水壹斗，煑取二升八合，分三服。一方用細辛二兩，茯苓二兩。強人大棗二十枚，無牛黃、白朮、石膽各壹兩。

補肝湯　主肝氣不足，兩脇下滿，筋急不得太息，四厥疝瘕，上搶心，腹痛，目不明方。

茯苓壹兩肆銖　烏頭肆枚，炮，去皮　大棗貳拾肆枚，擘

蕤仁　柏子仁　防風　細辛各貳兩　山茱萸

桂心各壹兩　甘草捌廿，炙，中者

右壹拾味，㕮咀，以水捌升，煑取二升，分三服，常用。

瀉肝湯　主肝氣不足，目暗，四肢沉重方。

人參　半夏洗　白朮各二兩　生薑陸兩　細辛壹兩

茯苓　黃芩　前胡　桂心　甘草各貳兩，炙

右壹拾味，㕮咀，以水捌升，煑取三升，分三服，三五日後次

服後湯方。

茯苓叄兩　吳茱萸壹兩　大棗叄拾枚擘　桃仁去皮尖及雙仁者

人參　防風　烏頭炮去皮　柏子仁　橘皮

桂心　甘草炙各貳兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗，煑取貳升半，分三服。千金方有細辛貳兩。

補肺湯　主肺氣不足，病苦氣逆，胷腹滿，欬逆上氣搶喉，喉中閉塞，欬逆短氣，氣從背起，有時而痛，惕然自驚，或笑或歌或怒無常，或乾嘔心煩，耳聞風雨聲，面色白，口中如含霜雪，言語無聲，劇者吐血方。

五味子叄兩　麥門冬肆兩去心　白石英貳兩玖銖

粳米叄合　紫菀　乾薑　款冬花各貳兩

桑根白皮　人參　鍾乳研　竹葉切各壹兩

大棗肆拾枚擘　桂心陸兩

右壹拾叁味，以水壹斗貳升，煑桑白皮及捌升，去滓，內藥煑取三升，分三服。

平肺湯　主肺氣虛竭，不足乏氣，胷中乾，口中辟辟乾方。

麻黃去節　橘皮各貳兩　小麥壹升

右叁味，㕮咀，以水伍升，煑取壹升半，分再服。

肺傷湯　主肺氣不足而短氣，欬唾膿血不得卧方。

人參　生薑切　桂心各貳兩　阿膠炙　紫菀各壹兩

乾地黃肆兩　桑根白皮　飴糖壹斤

右捌味，㕮咀，以水壹斗伍升，煑桑根白皮貳拾沸，去滓，內藥，煑取貳升伍合，次內飴糖，令烊，分三服。

傷中湯　主傷中肺氣不足，脇下痛，上氣，欬唾膿血，不欲食，惡風，目視䀮䀮，足脛腫方。

生地黃半斤　桑根白皮切叁升　生薑五累

白膠伍挺 麻子仁 芎藭各壹升 紫菀叁兩 麥種

飴糖各壹升 桂心貳尺 人參 甘草各壹兩炙

右壹拾貳味。㕮咀。以水貳斗。煑桑根白皮取柒升。去滓。內藥。煑取伍升。澄去滓。內飴糖煎取三升。分為三服。

温液湯 主肺痿涎唾多。心中温温液液方。

甘草叁兩

右壹味。㕮咀。以水叁升。煑取壹升半。分三服。

治肺癰欬。胷中滿而振寒。脉數咽乾不渴。時時出濁唾腥臭。久久吐膿如粳米粥者方。

桔梗叁兩 甘草貳兩

右貳味。㕮咀。以水三升。煑取一升服。不吐膿也。

補肺散 主肺氣不足。胷痛牽背。上氣失聲方。

白石英 五味子各伍分 桂心貳兩 大棗伍枚擘

麥門冬去心　款冬花　桑白皮　乾薑　甘草炙，各壹兩

右玖味，擣篩為散，以水壹升，煑棗取捌合，又熱投一方寸匕服，日三，亦可以酒煑，以知為度。

補肺圓　主肺氣不足，失聲，胷痛，上氣息鳴方。

麥門冬去心　款冬花　白石英　桑根白皮　桂心各貳兩

五味子叁合　鍾乳伍分，研為粉　乾薑壹兩　大棗壹伯枚

右玖味，擣篩為末，以棗膏和為圓，如梧子大，以飲下拾伍圓，日三。

瀉肺散　主醉酒勞窘，汗出當風，胷中少氣，口乾喘息，胷痛甚者吐逆，致吐血方。

款冬花　桂心　附子炮，去皮　蜀椒去目閉口者，汗

五味子　紫菀　蓯蓉　杏仁去皮尖雙仁，熬

桃仁去皮尖雙仁，熬，各五分　當歸　續斷　遠志去心

茯苓　石斛各壹兩　細辛　乾薑各壹兩　百部

甘草炙，各貳兩

右壹拾捌味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日三。

瀉脾湯　主脾藏氣實，胷中滿，不能食方。

茯苓肆兩　厚朴炙，肆兩　桂心伍兩　生薑切，捌兩　半夏壹升，洗去滑

人參　黄芩　甘草炙，各貳兩

右捌味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升，分三服。又主冷氣在脾藏，走在四肢，手足流腫，亦逐水氣。

治脾氣實，其人口中淡甘，卧憒憒痛無常處，及嘔吐反胃，並主之方。

大黄陸兩

右壹味，破，以水陸升，煑取壹升，分再服。又主食即吐，并大便不通者，加甘草貳兩，煑取貳升半，分三服。

瀉脾湯主脾氣不足。虛冷注下腹痛方。

當歸　乾薑　黃連　龍骨　赤石脂

人參各叁兩　橘皮　附子炮去皮　秦皮　大黃各貳兩

半夏伍兩。洗

右壹拾壹味。㕮咀。以水壹斗。煮取三升一合。分四服。

補脾湯主不欲食。留腹中。或上或下。煩悶得食輙嘔欲吐。已即脹滿不消。噫腥臭發熱。四肢腫而苦下。身重不能自勝方。

麻子仁叁合　禹餘粮貳兩　桑根白皮壹斤　大棗壹百枚擘

黃連　乾薑　白朮　甘草各叁兩炙

右捌味。㕮咀。以水壹斗。煮取半。去滓。得二升九合。日壹服。三日令盡。老小任意加減。

建脾湯主脾氣不調。使人身重如石。欲食即嘔。四肢酸削不收方。

生地黃　黃耆　芍藥　甘草各壹兩炙　生薑貳兩

白蜜壹升
右陸味。㕮咀。以水玖升。煮取叁升。去滓。內蜜攪令微沸。服捌合。日三夜一。

柔脾湯 主脾氣不足。下焦虛冷。胷中滿塞。汗出脇下支滿。或吐血及下血方。

乾地黃叁兩 黃耆 芍藥 甘草炙各壹兩

右肆味。切。以酒三升漬之。三斗米下蒸。以銅器承取汁。隨多少服之。

溫脾湯 主脾氣不足。虛弱下痢。上入下出方。

乾薑 大黃各叁兩 人參 附子炮去皮 甘草炙各貳兩

右伍味。㕮咀。以水捌升。煮取貳升半。分三服。

溫脾湯 主脾氣不足。水穀下痢。腹痛食不消方。

半夏洗肆兩 乾薑 赤石脂 白石脂 厚朴炙

桂心各叁兩 當歸 芎藭 附子炮去皮 人參

甘草各貳兩，炙

右壹拾壹味，㕮咀，以水玖升，煑取三升，分三服。

瀉脾圓 主脾氣不調，有熱，或下閉塞，調五藏，治嘔逆食飲方。

大黄陸兩 杏仁肆兩，去皮尖、雙仁，熬 蜀椒去目、閉口者，汗

半夏洗 玄參 茯苓 芍藥各叁兩 細辛

黄芩各半兩 人參 當歸 附子炮去皮 乾薑

桂心各壹兩

右壹拾肆味，擣篩為末，鍊蜜和丸如梧子，飲服六丸，日三，增至十圓。

瀉脾圓 主毒風在脾中，流腫腹滿短氣，食輙防響不消，時時微下方。

乾薑 當歸 桂心 葶藶各叁分，熬 狼毒

大黄　芎藭　蜀椒去目及閉口汗　白薇

附子炮去皮　甘遂　吴茱萸各半兩

右壹拾貳味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子。飲服三丸。日三。

大温脾圓　主脾中冷。水穀不化。脹滿。或時寒極方。

法麴　大麥蘖　吴茱萸各五合　枳實叁枚，炙。

乾薑叁兩　細辛叁兩　桂心五兩　桔梗叁兩　附子炮。去皮。貳兩

人參　甘草炙，各叁兩

右壹拾壹味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子。酒服柒圓。日三。

加至拾伍圓。

轉脾圓　主大病後至虚羸瘦。不能食。食不消化方。

小麥麴肆兩　蜀椒壹兩。去目及閉口汗　乾薑　吴茱萸

大黄各叁兩　附子炮。去皮　厚朴炙　當歸　桂心

甘草炙。各貳兩

右壹拾味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子。酒服十五圓。日三。

温脾圓 主胃氣弱。大腹冷則下痢。小腹熱即小便難。防響腹滿喘。氣虛乏乾嘔不得食。温中消穀。治脾益氣方。

法麴　小麥蘖各五合　吴茱萸叁合　枳實叁枚炙

人參　桔梗　麥門冬去心　乾薑　附子炮去皮

細辛各貳兩　桂心　厚朴炙　當歸　茯苓

甘草炙各叁兩

右壹拾伍味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子。空腹飲服七丸。日三。亦可加大黄二兩。

平胃湯 主胃中寒熱嘔逆。胷中微痛。吐如豆羹汁。或吐血方。

阿膠炙　芍藥各貳兩　乾地黄　乾薑　石膏碎

人參　黄芩　甘草炙各壹兩

右捌味。㕮咀。以水酒各叁升。煑取三升。分三服。

胃脹湯 主胃氣不足。心氣少。上奔胷中。憒悶。寒冷腹中絞痛。吐痢宿汁方。

人參壹兩 茯苓 橘皮 乾薑 甘草各貳兩炙

右伍味。擣篩為末。鍊蜜和。更擣五百杵。丸如梧子。以水二升銅器中火上煑二十丸一沸。不能飲者服一升。日三。可長將服。一名胃服丸。又名補藏湯。

和胃圓 主胃痛。悁煩噫逆。胷中氣滿。腹脇下邪氣寒壯積聚。大小便乍難。調六腑安五藏。導達腸胃。令人能食。并主女人絕産方。

大黃 細辛 黃連 蜀椒去目閉口者汗

皂莢去皮子炙 當歸 桂心各壹分 杏仁去皮尖雙仁熬

黃芩各壹兩半 葶藶熬 阿膠炙 芒消各半兩 厚朴貳分炙

甘遂壹兩 半夏伍分洗。

右壹拾伍味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如梧子。空腹酒服伍丸。日三。稍加至拾圓。

試和圓 主嘔逆。腰以上熱。惕惕驚恐。時悲淚出。時復喜怒妄語。夢寤洒洒淅淅。頭痛少氣。時如醉狀。不能食。噫聞食臭欲嘔。大小便不利。或寒熱。小便赤黃。惡風。目視䀮䀮。耳中兇兇方。

防風　澤瀉　白朮　蛇牀子　吳茱萸

細辛　昌蒲　烏頭炮去皮　五味子各壹分

當歸　遠志去心　桂心各半兩　乾薑叁分

右壹拾叁味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。空腹吞五圓。如梧子。日三。加至十丸。華佗方。

補腎湯 主腎氣不足。心中忙忙而悶。目視䀮䀮。心懸少氣。陽氣不足。耳聾目前如星火。消渴疽痔。一身悉癢。骨中疼痛。小弱。拘急乏氣。難咽咽乾。唾如膠。色黑。方。

磁石　生薑切　五味子　防風　牡丹皮

玄參　桂心　甘草炙各貳兩。附子壹兩炮去皮。大豆貳拾肆枚。

右壹拾味。㕮咀。以水壹斗貳升。銅器中揚之三百遍。内藥煑取六升。去滓。更煎得二升八合。分爲三服。

腎著湯主腰以下冷痛而重。如帶五千錢。小便不利方。

茯苓　白朮各肆兩　乾薑貳兩　甘草壹兩炙。

右肆味。㕮咀。以水六升。煑取三升。分三服。

治腎閉有水氣。腰脊疼痛。腹背拘急絞痛方。

茯苓　白朮　澤瀉　乾薑各肆兩

右肆味。㕮咀。以水捌升。煑取叁升。分三服。

又方

茯苓　白朮各肆兩　飴糖捌兩　乾薑　甘草炙各貳兩。

右伍味。㕮咀。以水壹斗。煑取三升。内飴糖煎之令烊。分爲

四服。

大補腎湯　主腎氣腰背疼重方。

磁石　石斛　橘皮　麥門冬去心

芍藥　牛膝　棘刺　桂心各參兩　地骨皮三升

人參　當歸　五味子　高良薑　杜仲各伍兩，炙

紫菀　乾薑各肆兩　遠志壹兩半，去心　乾地黃陸兩　甘草貳兩，炙。

右貳拾味，㕮咀，以水肆升。煮取壹斗。分十服。

腎氣圓　主五勞七傷。藏中虛竭。腎氣不足。陰下癢。小便餘瀝。忽忽喜忘。悲愁不樂。不嗜食飲方。

署預　石斛各參分　蓯蓉　黃耆各參兩　羊腎壹具

茯苓　五味子　遠志去心　當歸　澤瀉

人參　巴戟天　防風　附子炮，去皮　乾薑

天雄炮，去皮　乾地黃　獨活　桂心　棘刺

杜仲炙　菟絲子各貳兩

右貳拾貳味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如梧子。空腹酒服十丸。日三。稍加至貳拾圓。

腎瀝散 主五勞男子百病方。

防風　黄芩　山茱萸　白歛　厚朴炙

芍藥　署預。　麥門冬去心　天雄炮去皮　甘草炙各伍分

獨活　菊花　秦艽　細辛　白朮

枳實炙　柏子仁各壹兩　當歸　芎藭　菟絲子

蓯蓉　桂心各柒分　石斛　乾薑　人參各貳兩

鍾乳研　蜀椒汗去目閉口者　附子炮去皮　白石英各壹兩

烏頭參分炮去皮　羊腎壹具　黄耆貳兩半

右叁拾貳味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日二。加至二七。日三。

瀉腎散 主男女諸虚不足。腎氣乏方。

消石　礬石各捌分

右貳味，擣篩為散，以粳米粥汁一升，內一方寸匕，攪令和調，頓服之，日三。不知稍增。

五藏氣虛第五　方九首

五補湯　主五藏內虛竭，短氣欬逆，傷損鬱鬱不足，下氣復通津液方。

麥門冬去心　小麥各壹升　粳米參合　地骨皮　薤白各壹斤　人參　五味子　桂心　甘草炙，各貳兩　生薑捌兩，切

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗貳升，煮取三升，分三服。口乾先煮竹葉一把，減一升，去滓，內藥煮之。

人參湯　主男子五勞七傷，胸中逆滿，害食乏氣，嘔逆，兩脇下脹，少腹急痛，宛轉欲死，調中平藏氣，理傷絕方。

人參　茯苓　芍藥　當歸　白糖

桂心　甘草炙各貳兩　蜀椒去目及閉口汗　生薑
前胡　橘皮　五味子各壹兩　枳實炙各三分。
麥門冬去心各三合。　大棗拾伍枚擘
右壹拾伍味㕮咀。以東流水壹斗伍升。漬藥半日。以三歲陳蘆微微煮取四升。去滓。內糖令消。二十以上六十以下服一升。二十以下六十以上服柒捌合。久羸者服七合。日三夜一。

治手足厥寒。脉爲之細絕。其人有寒者。當歸茱萸四逆湯方。

當歸　芍藥　桂心各三兩　吳茱萸貳升　生薑半斤切
細辛　通草　甘草各貳兩炙　大棗貳拾伍枚擘
右玖味㕮咀。以酒水各四升。煮取三升。分四服。

治下痢清穀。內寒外熱。手足厥逆。脉微欲絕。身反惡寒。其人面赤。或腹痛乾嘔。或咽痛。或痢止。脉不出。通脉四逆湯方。

甘草壹兩炙　大附子壹枚生去皮破捌片　乾薑叁兩強人可肆兩

右叁味㕮咀貳味以水三升煮取一升二合分再服脉即出也面赤者加葱白九莖腹痛者去葱白加芍藥貳兩嘔者加生薑貳兩咽痛者去芍藥加桔梗壹兩痢止脉不出者去桔梗加人參貳兩

復脉湯主虛勞不足汗出而悶脉結心悸行動如常不出百日危急者二十一日死方

生地黃壹斤細切　生薑叁兩切　麥門冬去心　麻子仁各叁兩

阿膠叁兩炙　大棗叁拾枚擘　人參　桂心各貳兩　甘草肆兩炙

右玖味㕮咀以水壹斗煮取陸升去滓分陸服日三夜三若脉未復隔日又服一劑力弱者三日一劑乃至五劑十劑以脉復爲度宜取汗越公楊素因患失脉七日服五劑而復仲景名炙甘草湯一方以酒七升水八升煮取三升見傷寒中

大建中湯主五勞七傷，小腸急，臍下彭亨，兩脇脹滿，腰脊相引，鼻口乾燥，目暗䀮䀮，憒憒不樂，胸中氣逆，不下食飲，莖中策策然痛，小便赤黃，尿有餘瀝，夢與鬼神交通，失精，驚恐虛乏之方。

人參　龍骨　澤瀉　黃耆各叁兩　大棗貳拾枚

芍藥肆兩　遠志去心　甘草炙，各貳兩　生薑切　飴糖各捌兩

右壹拾味，㕮咀，以水一斗，煑取二升半，去滓，內飴糖令消，一服八合，相去如行十里久。千金有當歸叄兩。

小建中湯所主與前方同。

芍藥陸兩　桂心叄兩　生薑叄兩，切　飴糖壹升　甘草貳兩，炙

大棗拾貳枚，擘

右陸味，㕮咀，以水七升，煑取三升，去滓，內飴糖，一服一升，日三服。已載傷寒中，此再見之。

茯苓湯主虛損短氣，喉咽不利，唾如稠膠凝塞方。

茯苓 前胡 桂心各貳兩 麥門冬伍兩，去心

大棗肆拾枚，擘 人參 乾地黃 芍藥 甘草各壹兩，炙

右玖味，㕮咀，以水壹斗，煑麥門冬及捌升，除滓，內藥，煑取三升，分三服，三劑永差。一名凝唾湯。

黃耆湯 主虛勞不足，四肢煩疼，不欲食飲，食即汗出方。

黃耆 當歸 細辛 五味子 生薑切

人參 桂心 甘草各貳兩，炙 芍藥叁兩 前胡壹兩

茯苓肆兩 半夏捌兩，洗 麥門冬貳兩，去心 大棗貳拾枚，擘

右壹拾肆味，㕮咀，以水壹斗四升，煑取叁升，去滓，一服八合，日三。

補虛圓散第六 方二十二首

菴䕡散 主風勞濕痺，痿厥少氣，筋攣，關節疼痛，難以屈伸，或不能行履，精衰目瞑，陰陽不起，腹中不調，乍寒乍熱，大小便

或澀。此是腎虛所致主之方。

菴蕳子 酸棗仁 大豆卷 薏苡仁 車前子

蔓荊子 菥蓂子 冬瓜子 菊花 秦椒汗。子并閉口者。各壹升

阿膠壹斤。炒

右壹拾壹味。各擣絹下爲散。合和擣令相得。食後服三合。日再。若苦筋攣骨節痛。難以屈伸。倍酸棗仁菴蕳菥蓂瓜子各三升。久服不老。益氣輕身。耳目聰明。

大五補圓 主五藏勞氣。七傷虛損不足。冷熱不調。飲食無味。

署預 石龍芮 覆盆子 乾地黃 五味子各貳兩

石南 秦艽 五加皮 天雄炮。去皮 狗脊

人參 黃耆 防風 山茱萸 白朮

杜仲炙 桂心各壹兩 麥門冬去心 巴戟天各壹兩半

遠志貳兩半。去心 石斛 菟絲子 天門冬各十八分。去心

蛇牀子　萆薢各半兩　茯苓伍分　乾薑叁分　肉蓯蓉叁兩

右貳拾捌味。擣篩為末。錬蜜和圓如梧子。空腹以酒服十圓。日二。稍加至叁拾圓。

翟平署預圓　補諸虛勞損方。

署預　牛膝　菟絲子　澤瀉　乾地黃

茯苓　巴戟天　赤石脂　山茱萸　杜仲各貳兩

蓯蓉肆兩　五味子壹兩半

右壹拾貳味。擣篩為末。錬蜜和圓如梧子。酒服貳拾圓。日一夜一。瘦者加燉煌石膏貳兩。健忘加遠志貳兩。少津液加柏子仁貳兩。慎食蒜醋陳臭等物。

署預散　補虛風勞方。

署預　牛膝　續斷　巴戟天　菟絲子

茯苓　枸杞子　五味子　杜仲各壹兩炙　蛇牀子

山茱萸各叁　茯苓壹兩

右壹拾貳味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日二夜一。惟禁蒜醋。健忘加遠志、茯神；體澀加柏子仁，各貳兩。服三劑益肌肉。亦可爲圓。

署預散　主頭面有風，牽引眼睛疼痛，偏視不明方。

署預伍兩　細辛壹兩半　天雄炮，去皮　秦艽各貳兩　桂心

羌活　山茱萸各貳兩

右柒味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日二。

十味腎氣圓　主補虛方。

桂心　牡丹皮　澤瀉　署預　芍藥各肆兩

玄參　茯苓　山茱萸各伍兩　附子叁兩，炮，去皮

乾地黄捌兩

右壹拾味，擣篩爲末，鍊蜜和丸如梧子，以酒服二十丸，稍

加至三十丸。以知為度。

張仲景八味腎氣丸方。

乾地黃捌兩　澤瀉貳兩　桂心貳兩　署預肆兩

山茱萸肆兩　牡丹皮　茯苓各叁兩　附子貳兩，炮，去皮。

右捌味，擣篩為末，鍊蜜和丸，如梧子，以酒服七丸，日三，稍加至十丸，久長可服。

常服大補益散方。

肉蓯蓉　乾棗肉　石斛各捌兩　枸杞子壹斤　菟絲子

續斷　遠志各伍兩，去心　天雄叁兩，炮，去皮　乾地黃拾兩

右玖味，擣篩為散，酒服方寸匕，日二，無所忌。

補虛主陽氣斷絕不起方。

白石英　陽起石　磁石　蓯蓉　菟絲子

乾地黃各貳兩半　五味子　石斛　桔梗

白术各貳兩 巴戟天 防風各伍分 蛇牀子半兩 桂心

右壹拾肆味，擣篩爲末，鍊蜜和丸如梧子，酒服十五丸，日三，稍加至二十丸，以知爲度。

小秦艽散 主風虛疥瘙癢方。

秦艽叁兩 茯苓 牡蠣熬 附子炮去皮 黃芩各半兩 人參叁分 乾薑 細辛各伍分 白术叁兩半 蜀椒去目閉口者汗 桔梗 防風 桂心各壹兩

右壹拾叁味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日再。

治陽氣衰微，終日不起方。

蛇牀子叁分 菟絲子草汁貳合

右貳味，和如泥，塗上，日五遍，三日大驗。

又方

車前根葉

右壹味。暴乾。擣爲散。酒服方寸匕。日三服。

又方

原蠶蛾（未連者。壹升）

右壹味。陰乾。去頭足翅。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如梧子。夜臥服一丸。

又方

蛇床子　菟絲子　杜仲（各伍兩）　五味子（壹兩）　肉蓯蓉（貳兩）

右伍味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如梧子。酒服十四丸。日二夜一。

又方

陽起石

右壹味。以酒叁斗漬二七日。服三合。日三夜一。

又方

特生礜石火鍊一伏時

右壹味。擣末。酒漬二七日。服五合。日三夜一。

淮南八公石斛散 主風濕痹疼。腰脚不遂方。

石斛 防風 茯苓 乾薑 細辛

雲母 杜仲炙 遠志去心 菟絲子 天雄炮去皮

人參 蓯蓉 萆薢 桂心 乾地黄

牛膝 蛇牀 署預 巴戟天 續斷

山茱萸 白朮各壹兩 菊花 附子炮去皮 蜀椒去目閉口者汗

五味子各貳兩

右貳拾陸味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日再。

琥珀散 主虚勞百病。陰痿精清。力不足。大小便不利如淋。腦間寒氣結在關元。強行陰陽。精少餘瀝。治腰脊痛。四肢重。咽乾口燥。飲食無味。乏氣少力。遠視䀮䀮。驚悸不安。五藏氣虚。上氣悶滿方。

琥珀貳兩　石韋　乾薑　滑石　牡丹皮

茯苓　芎藭　石斛　續斷　當歸

人參　遠志去心　桂心各參兩　蓯蓉　千歲松脂

牡蒙　橘皮各肆兩　松子　柏子仁　荏子各參升

車前子　菟絲子　菴蕳子各壹升　枸杞子壹兩

牛膝參兩　通草拾肆兩　胡麻子　蕪菁子　蛇牀子

麥門冬各壹升去心。

右叁拾味，各異擣。合擣貳千杵。重絹下，合和，盛以韋囊。先食服方寸匕。日三夜一。用牛羊乳煎令熟。長服令人志性強。輕身益氣力。消穀能食。耐寒暑。百病除愈。久服老而更少。髮白更黑。齒落更生矣。

禿雞散方

蛇牀子　菟絲子　遠志去心　五味子　巴戟天

防風各半兩 茯苓叁八分 杜仲壹八分炙。

右捌味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日一服。

三人九子圓 主五勞七傷補益方。

酸棗仁 柏子仁 薏苡仁 蛇牀子 枸杞子

五味子 菟絲子 菊花子 菴䕡子 蔓荊子

地膚子 烏麻子 乾地黃 署預 桂心

右壹拾伍味。各貳兩。加茯苓貳兩。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子。酒服二十九。日二。大主腎虛勞。

療氣及虛方。千金方一云。治氣及補五勞七傷。無所不治。明目。利小便。

白石英拾兩。成鍊者 石斛 茯苓各壹兩半 菟絲子叁兩

茯苓 澤瀉 橘皮各壹兩

右柒味。先取白石英無多少。以鐵搥碪上細打。去闇者及惡物黳翳。惟取向日看明澈者。擣絹篩於銅盤中。水研之。

如米粉法。三度研訖澄之。漸漸却水。暴令浥浥然。看上有不淨之物去之。取中心好者。在下有惡物亦去之。所得好者。更研令熟。以帛練袋盛置甕合上。以參斗米下蒸之。飯熟。下懸袋日中乾之。取出更研。然後擣諸藥下篩。搃於瓷器中。研令相得。酒服方寸匕。日二。不得過之。忌猪魚鵝鴨蒜生冷酢滑。

治腰痛方。

鹿角末。酒服方寸匕。日二服。

千金翼方卷第十五

千金翼方卷第十六

中風上

諸酒第一 方二十首

獨活酒 主八風十二痺方。

獨活　石南各肆兩　防風參兩　茵芋

附子去皮　烏頭去皮　天雄去皮各貳兩

右柒味。切。以酒貳斗漬六日。先食服壹服半合。以知爲度。

牛膝酒 主八十三種風著人頭。面腫痒。眉髮墮落。手脚拘急不得行步。夢與鬼神交通。或心煩恐怖。百脉自驚。轉加羸瘦。略出要者。不能盡說方。

牛膝　石南　烏頭去皮　天雄去皮

茵芋各貳兩　細辛伍分

右陸味。切。以酒壹斗貳升漬之。春秋五日。夏三日。冬七日。

初服半合。治風癲宿澼。服之即吐下。強人日三。老小日一。不知稍加。惟禁房室及豬肉等。

茵芋酒 主新久風體不仁。或垂曳。或拘急腫。或枯焦施連方。

茵芋　狗脊　烏頭去皮　附子去皮各貳兩
躑躅　天雄去皮各壹兩

右陸味。切。以酒壹斗漬八九日。服半合。以知為度。

金牙酒 主積年八風五注。舉身嚲曳。不得轉側。行步跛躃。不能收攝。又暴口噤失音。言語不通利。四肢脊筋皆急。肉疽血脈曲攣。掣瘲瞤起。腫痛流走無常處。勞冷積聚。少氣。或寒或熱。三焦脾胃不磨。飲澼結實。逆害飲食。醋咽嘔吐。食不生肌。醫所不能治者。悉主之方。

金牙燒碎之如粳米大　細辛　地膚子若無子用莖代之
地黃　附子去皮　防風　蜀椒去目閉口者汗

茵芋　蒴藋根各肆兩　羌活壹斤

右壹拾味，切，以甕器中清酒四斗漬之，密泥封，勿泄。春夏三四宿，秋冬六七宿，去滓，服一合。此酒無毒，及可小醉，不盡一劑，病無不愈矣。又令人肥健。盡，自可加諸藥各叁兩，惟蜀椒五兩，用酒如法，勿加金牙也。此酒勝針灸治三十年諸風嚲曳，神驗。冷，加乾薑四兩。一方用升麻四兩，人參叁兩，石斛、牛膝伍兩。又一方用菝葜四兩，黃耆叁兩。又一方有續斷四兩。千金用莽草，無茵芋。

馬灌酒　主除風氣，通血脉，益精氣，定六腑，明耳目，悅澤顏色，頭白更黑，齒落更生。服藥二十日，力勢倍；六十日，志氣充強；八十日，能夜書；百日，致神明，房中盈壯如三十時，力能引弩。有人服藥，年七八十，有四男三女。隴西韓府君筋急，兩膝不得屈伸，手不得帶衣，起居增劇，惡風寒冷，通身流腫，生瘡。藍田府君背痛不能立，面目萎黃，服之二十日，身輕目明，房室

盈壯。病在腰膝藥悉主之。常山太守方。

天雄去皮　茵芋各叁两　蜀椒去目閉口者汗　躑躅各壹升

白斂叁两　烏頭去皮　附子去皮　乾薑各貳两

右捌味切。以酒叁斗漬之。春夏五日。秋冬七日。去滓。初服半合爲始。稍加至三合。暴滓爲散。服方寸匕。日三。以知爲度。夏日恐酒酸。以油單覆下垂井中。近水不酸也。千金有桂心商陸爲十味。

芫青酒 主百病風邪狂走。少腹腫癥瘕。霍亂中惡飛尸遁注。暴癥傷寒。中風濕冷。頭痛身重諸病。寒熱風虛及頭風。服酒當從少起。藥發當吐清汁一二升方。

芫青　巴豆去皮心熬　斑猫各叁拾枚去翅足熬　附子去皮

躑躅　細辛　烏頭去皮　乾薑　桂心

蜀椒去目閉口者汗　天雄去皮　黄芩各壹两

右壹拾貳味。切。以酒壹斗漬十日。每服半合。日貳。應苦煩悶。飲壹升水解之。以知爲度。

蠻夷酒 主久風枯攣三十年著牀。及諸惡風眉毛墮落方。

獨活 烏頭去皮 乾薑 地黃 礬石燒

丹參各壹兩 白芷貳兩 蕪荑 芫花 柏子仁各壹兩

人參 甘遂 狼毒 蓯蓉 蜀椒去目閉口者汗

防風 細辛 礬石燒汁盡 牛膝 寒水石

茯苓 金牙燒 麻黃去節 芍藥 當歸

柴胡 枸杞根千金作狗脊 天雄去皮 烏喙去皮各半兩

附子去皮貳兩。 署預 杜仲炙 石南 牡蠣熬

山茱萸 桔梗 牡荊子 款冬各叁兩 白朮叁分

石斛貳分 桂心壹分 蘇子壹升 赤石脂貳兩半

右肆拾叁味。切。以酒貳斗漬之。夏三日。春秋六日。冬九日。

壹服半合。當密室中合藥。勿令女人六畜見之。一日清齋。乃合藥。加麥門冬貳兩大棗四十枚更佳也。千金有芎藭。

又蠻夷酒 主八風十二痺。偏枯不隨。宿食虛冷。五勞七傷。及女人產後餘疾。月水不調方。

遠志去心　礬石燒汁盡。各貳兩　石膏貳兩半　蜈蚣炙貳枚。

狼毒　礜石燒　白朮　附子去皮　半夏洗

桂心　石南　白石脂　續斷　龍膽

芫花　玄參　白石英　代赭　藺茹

石韋去毛　天雄去皮　寒水石　防風　桔梗

藜蘆　卷柏　山茱萸　細辛　烏頭去皮

躑躅　蜀椒去目閉口者汗　秦艽　菖蒲　白芷各壹兩

右叁拾肆味。切。以酒貳斗漬四日。一服一合。日再。十日後瀝去滓。暴乾。擣篩為散。酒服方寸匕。日再。以知為度。

魯公酒主一百病風眩心亂。耳聾目瞑淚出。鼻不聞香臭。口爛生瘡。風齒瘰癧。喉下生瘡。煩熱厥逆上氣。胷脇肩髀痛。手不上頭。不自帶衣。腰脊不能俛仰。脚酸不仁。難以久立。八風十二痺。五緩六急。半身不遂。四肢偏枯。筋攣不可屈伸。賊風咽喉閉塞。哽哽不利。或如錐刀所刺。行人皮膚中無有常處。久久不治。入人五藏。或在心下。或在膏肓。遊行四肢偏有冷處。如風所吹。久寒積聚風濕。五勞七傷。虛損萬病方。

細辛半兩　茵芋　烏頭去皮　躑躅各伍分　木防已

天雄去皮　石斛各壹兩　柏子仁　牛膝　山茱萸

通草　秦艽　桂心　乾薑　乾地黃

黃芩一作黃耆　茵蔯　附子去皮　瞿麥　王蓀一作王不留行

杜仲炙　澤瀉　石南　防風　遠志各叁分去心

右貳拾伍味。切。以酒伍斗漬十日。一服一合。加至四五合。

以知爲度。一方加甘草三分

附子酒 主大風冷淡澼脹滿諸痺方。

大附子壹枚重貳兩者亦云貳枚去皮破

右壹味，用酒伍升漬之，春伍日，一服一合，以痺爲度，日再服。無所不治。勿用蛀者，陳者并者不差病。

紫石酒 主久風虛冷，心氣不足，或時驚怖方。

紫石英壹斤 鐘乳研 防風 遠志去心 桂心各肆兩

麻黃去節 茯苓 白朮 甘草炙各叁兩

右玖味，切，以酒叁斗漬，如上法，服肆合，日三，亦可至醉，常令有酒氣。

丹參酒 主惡風疼痺不仁，惡瘡不差，無痂，鬢眉禿落方。

丹參 前胡 細辛 卷柏 天雄去皮

秦艽 茵芋 乾薑 牛膝 芫花

白朮 附子去皮 代赭 續斷 防風
桔梗 藺茹 礬石燒汁盡 半夏洗 白石脂
石南 狼毒 桂心 菟絲子 芍藥
龍膽 石韋 恒山 黃連 黃芩
玄參 礜石燒 遠志去心 紫菀 山茱萸
乾地黃 蘇 甘草炙各壹兩 石膏貳兩 杏仁貳拾枚去皮尖雙人
麻黃去節 大黃各伍分 昌蒲壹兩半 白芷壹兩 蜈蚣貳枚赤頭者炙

右肆拾伍味，切，以酒肆斗漬五宿，一服半合，增至一二合，日二，以差為度。

杜仲酒 主腰脚疼痛不遂風虛方。

杜仲捌兩炙 羌活肆兩 石南貳兩 大附子叁枚去皮

右肆味，切，以酒壹斗漬三宿，服二合，日再。

杜仲酒 主腕傷腰痛方。

杜仲炙捌兩。乾地黄肆兩。當歸　烏頭去皮　芎藭各貳兩

右伍味。切。酒壹斗貳升漬。服之如上法。

枳茹酒　主諸藥不能差者方。

枳茹枳上青皮刮取其末。欲至心止。得茹五升。微火熬去濕氣。以酒壹斗漬。微火煖。令得藥味。隨性飲之。主口僻眼急。神驗。主緩風急風並佳。

杜仲酒　主風勞虛冷。腰脚疼屈弱方。

杜仲炙　乳床各八兩　當歸　芎藭　乾薑

附子去皮　秦艽　石斛　桂心各叁兩　蜀椒去目閉口者汗

細辛　茵芋　天雄去皮各貳兩　獨活　防風各五兩

右壹拾伍味。切。以酒叁斗漬伍宿。一服三合。日三。一方加紫石英五兩。

菊花酒　主男女風虛寒冷。腰背痛。食少羸瘦無色。噓吸少氣。去風冷。補不足方。

菊花　杜仲各壹斤炙　獨活　鍾乳研　萆薢各八兩
茯苓貳兩　紫石英伍兩　附子去皮　防風　黃耆
蓯蓉　當歸　石斛　桂心各肆兩

右壹拾肆味，切，以酒柒斗漬五宿，一服二合，稍漸加至五合，日三。千金有乾薑。

麻子酒 主虛勞百病，傷寒風濕，及女人帶下，月水往來不調，手足疼痺著牀方。

麻子壹石　法麴壹斗

右貳味，先擣麻子成末，以水兩石著釜中蒸麻子極熟，炊壹斛米，須出去滓，隨汁多少如家醞法，酒熟取清，任性飲之，令人肥健。

黃耆酒 主大風虛冷，淡澼偏枯，腳腫滿，百病方。

黃耆　獨活　山茱萸　桂心　蜀椒去目閉口者汗

白朮　牛膝　葛根　防風　芎藭
細辛　附子去皮　甘草炙各叁兩　大黃壹兩　乾薑貳兩半
秦艽　當歸　烏頭去皮各貳兩

右壹拾捌味，切，以酒叁斗漬拾日，一服一合，日三，稍加至五合，夜二服，無所忌。大虛加蓯蓉二兩，萎蕤貳兩，石斛貳兩。多忘加昌蒲貳兩，紫石英貳兩。心下水加茯苓貳兩，人參貳兩，署預叁兩。服盡，復更以酒叁斗漬滓，不爾可暴乾作散，酒服方寸匕，日三。

地黃酒

生地黃汁壹石，煎取伍斗，冷，漬麴發，先淘米暴乾，欲釀時，別煎地黃汁，如前法漬米一宿，漉乾炊釀，一如家醞法，拌饙亦以餘汁，酘酘皆然，其押出地黃乾滓，亦和米炊釀之。酒熟訖，封七日，押取溫服一盞，常令酒氣相接

愼豬魚。服之百日。肥白。疾愈。

諸散第二 方九首 論一首

九江太守散 主男女老少未有不苦風者。男子五勞七傷。婦人產後餘疾。五藏六腑諸風皆悉主之方。

知母 人參 茯苓各叁分 蜀椒半兩，汗去目閉口者
栝樓壹兩半 防風 白朮各叁兩 澤瀉貳兩 乾薑
附子炮去皮 桂心各壹兩 細辛壹兩

右壹拾貳味。擣篩爲散。以酒服方寸匕。日再。飲酒常令有酒色。勿令大醉也。禁房室、豬魚、生冷。無病常服益佳。延年益壽。輕身明目。强筋骨。愈折傷。

吳茱萸散 主風跛蹇偏枯。半身不遂。晝夜呻吟。醫所不能治方。

吳茱萸 乾薑 白斂 牡桂 附子炮去皮
署預 天雄炮去皮 乾漆熬 秦艽各半兩 狗脊壹分

防風壹兩

右壹拾壹味，擣篩爲散，以酒服方寸匕，日三服。

山茱萸散 主風跛痺，治法如前方。

山茱萸　附子炮去皮　署預　王蓀　牡桂
乾地黄　乾漆熬　秦艽　天雄炮去皮　白朮各半兩
狗脊

右壹拾壹味，擣篩爲散，先食酒服方寸匕，日二，藥走皮膚中淫淫，服之一月愈。

萬金散 主頭痛眩亂，耳聾，兩目淚出，鼻不聞香臭，口爛惡瘡，鼠漏瘰癧，喉咽生瘡，煩熱欬嗽，胷滿脚腫，半身偏枯不遂，手足筋急緩不能屈伸，賊風猥退，蛩尸蠱疰，江南惡氣在人心下，或在膏肓，遊走四肢，針灸不及，積聚僻戾，五緩六急，濕痺，女人帶下積聚，生産中風，男女五勞七傷，皆主之方。

石斛　防風　巴戟天　天雄炮去皮　乾地黃
石南　遠志去心　躑躅　烏頭炮去皮　乾薑
桂心各壹兩半　蜀椒半升汗去目閉口者　瞿麥　茵蔯
秦艽　茵芋　黃耆　薔薇　獨活
細辛　牛膝各壹兩　柏子　澤瀉　杜仲各半兩炙
山茱萸　通草　甘草各叁分

右貳拾柒味，擣篩爲散，雞未鳴時冷酒服伍分匕，日三，加至一匕。

人參散 主一切諸風方。

人參　當歸各伍分　天雄炮去皮　前胡　吳茱萸
白朮　秦艽　烏頭炮去皮　細辛各弍分　附子壹兩炮去皮
獨活壹分　防風　麻黃去節　莽草　蜀椒去目閉口者汗
莽草　桔梗　天門冬去心　五味子　白芷各叁兩

芎藭壹兩

右貳拾味擣篩爲散，酒服方寸匕，日三服。中熱者加減服之。若卒中風傷寒鼻塞者，服訖覆取汗即愈。

防風散主風所爲，卒起眩冒，不知人，四肢不知痛處，不能行步，或身體偏枯不遂，口吐涎沫出，手足拘急方。

防風　蜀椒去目閉口者汗　麥門冬去心，各壹兩　天雄炮去皮

附子炮去皮　人參　當歸各伍分　五味子　乾薑

烏頭炮去皮　細辛　白朮各叁兩　柴胡　山茱萸

莽草　麻黃去節　桔梗　白芷各半兩

右壹拾捌味擣篩爲散，酒服方寸匕，日三。不知，稍增之，以知爲度。

八風十二痺散主五勞七傷，風入五藏，手脚身體沈重，或如邪氣時悶汗出，又蜚尸遁注相染易，或少氣腹滿，或皮膚筋

痛。項骨相牽引無常處。或咽中有氣吞之不入。吐之不出。皆主之方。

細辛　巴戟　黄耆　礬石燒　厚朴炙

白歛　桂心　黄芩　牡荆　山茱萸

白朮　女萎　菊花　人參　天雄炮去皮

防風　萆薢　石斛　蜀椒各壹兩汗。去目閉口者

芎藭　龍膽　芍藥　蓯蓉各半兩　紫菀

秦艽　茯苓　昌蒲　烏頭炮去皮　乾薑各壹兩

附子炮去皮　署預　五味子各壹兩半　桔梗

遠志各貳兩半。去心

右叁拾肆味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日二。稍增至二匕。主萬病。

又八風十二痺散主風痺。嘔逆不能飲食者。心痺也。欬滿腹

痛。氣逆唾涕白者。脾痺也。津液唾血腥臭者肝痺也。陰蹇下濕者。蹇痺也。腹中雷鳴。食不消。食即氣滿。小便數起胃痺也。兩膝寒。不能行者濕痺也。手不能舉。腫痛而逆。骨痺也。煩滿短氣。涕唾青黑。腎痺也。並悉主之方。

遠志去心　黄耆　黄芩　白斂　附子炮去皮

龍膽　署預　厚朴炙　蜀椒各半兩去目及閉口者汗

牡荊子　天雄炮去皮　細辛　菊花　狗脊

山茱萸　防風　芎藭　桂心各叁分　五味子

巴戟天各壹分　茯苓　芍藥　秦艽

烏頭炮去皮　蕪荑　昌蒲　萎蕤各壹兩

右貳拾柒味。擣篩爲散。食後飲服方寸匕。日三。寧從少起。稍漸增之。

秦王續命大八風散　主諸風五緩六急或浮腫噓吸微痺風

虛不足。并補益藏氣最良。其說甚多。略取其要方。

秦艽貳兩。主風不仁。 防風貳兩。去風眩。除濕痺。 附子貳兩。炮。去皮。主風濕。堅肌骨。止痛。

昌蒲貳兩。主風濕痺。拘急。 茯苓貳兩。主安中。下氣。消水。 牛膝貳兩。去脛。虛損。煩疼。填骨髓。

桔梗貳兩。主驚悸。和腸胃。 細辛壹兩。主留飲。逐風邪。 烏頭貳兩半。炮。去皮。主逐風。下氣。除邪。

署預壹兩。主益氣。補五藏。 芎藭壹兩。主風寒。溫中。 遠志貳兩半。去心。主益氣力。定心志。

天雄壹兩。炮。主留飲。逐風邪。 石龍芮壹兩。主風。補氣。除滿。 蜀椒壹兩。去目及閉口者。汗。主溫中。逐風邪。

石斛貳兩。主風。益氣。嗜食。 白芷壹兩。主風邪。除虛滿。 龍膽壹兩。主風腫。除風熱。

白朮壹兩。主風腫。消水氣。 山茱萸壹兩。主風邪。湿氣。 桂心壹兩。主溫筋利血脈。除邪氣。

菊花壹兩。主風濕。補藏。益氣。 女萎壹兩。主溫中。逐風邪。 厚朴壹兩。炙。主溫中。除冷。益氣。除滿。

巴戟天壹兩。主下氣。堅肌膚。 萆薢壹兩。主風濕。止悸痛。 牡荊子壹兩。主風。益氣。無。用柏子仁。

乾漆壹兩。熬。主堅髓。和少腹。 肉蓯蓉壹兩。主虛。續傷。腰脊痛。 五味子壹兩半。主益氣。除寒熱。

芍藥壹兩。止痛。散血氣。 黃芩壹兩。主除虛熱。止痛。 白礬壹兩。燒汁盡。主除寒熱。破積。下氣。

續斷壹兩。主風虛傷絕。 白斂壹兩。主風。益氣力。 黃耆壹兩半。主虛羸。風邪。目黃。

右叁拾陸味。皆新好。以破除日合擣篩爲散。溫清酒和服方寸匕。日叁服。不知。稍增之。可至二三匕。以知爲度。若苦心悶者。飲少冷水。禁生魚猪肉菘菜。能斷房室百日。甚善。此方療風消脹滿。調和五藏。便利六腑。男女有患。悉可合服。常用甚良。患心氣不足。短氣。內人參甘草各壹兩。若腹痛。是腎氣不足。內杜仲羊腎各貳兩。隨病增減。

論曰。此等諸散。天下名藥。然熱人不可用。惟舊冷者大佳。

諸膏第三　方二首

蒼梧道士陳元膏　主風百病方。

當歸　丹砂各叁兩。研　細辛　芎藭各貳兩　附子去皮。貳拾貳銖

桂心壹兩貳銖　天雄去皮。叁兩貳銖　乾薑叁兩柒銖　烏頭去皮。叁兩柒銖　雄黃叁兩貳銖。研

松脂半斤　大醋貳升　白芷壹兩　猪肪脂拾斤　生地黃貳斤。取汁

右壹拾伍味。切。以地黃汁大醋漬藥一宿。猪肪中合煎之

十五沸。膏成去滓。內丹砂等末熟攪。無令小兒婦人及六畜見之。合藥切須禁之。

有人苦背脇背痛。服之七日。所出如雞子汁者貳升即愈。

有人脇下積氣如杯。摩藥十五日愈。

有人苦臍傍氣。如手摩之去如瓜中黃穰壹升許愈。

有人患腹切痛。時引脇痛數年。摩膏下如蟲三十枚愈。

有女人苦月經內塞。無子數年。膏摩少腹并服如杏子大一枚。十日下崩血貳升。愈其年有子。

有患風瘙腫起累累如大豆。摩之五日愈。

有患膝冷痛。摩之五日。亦愈。

有患頭項寒熱瘰癧。摩之皆愈。

有患面目黧黑消瘦。是心腹中疾。服藥下如酒糟者貳升愈。

丹參膏 主傷寒。時行賊風惡氣在外。肢節痛攣不得屈伸。項

頸咽喉痺塞噤閉。入腹則心急腹脹。胷中嘔逆。藥悉主之。病在腹內服之。在外摩之。緩風不遂。濕痺不仁。偏枯拘屈。口面喎斜。耳聾齒痛。風頸腫痺。腦中風痛。石癰結核。瘰癧堅腫未潰。傅之取消。及赤白癮疹。諸腫無頭作癰疽者。摩之令消。風結核在耳後。風水遊腫。疼痛瘡瘡。針之黄汁出。時行溫氣。服之如棗大一枚。小兒以意減之方。

丹參　蒴藋根各肆兩　秦艽參兩　羌活
蜀椒去目汗閉口者　牛膝　烏頭去皮　連翹
白朮各貳兩　躑躅　菊花　莽草各壹兩

右壹拾貳味。切。以苦酒伍升。麻油柒升。合煎。苦酒盡。去滓。用猪脂煎成膏。凡風冷者用酒服。熱毒單服。齒痛綿沾嚼之。

赤膏　主一切火瘡灸瘡金瘡木石傷損。不可差者。醫所不能療。令人憂懼。計無所出。以塗上一宿。生肌肉即差方。

生地黃汁貳升 生烏麻脂貳兩 薰陸香末 丁香末各貳錢匕

黃丹肆錢 蠟如雞子黃貳枚

右陸味，先極微火煎地黃汁、烏麻脂，叁分減一，乃下丁香、薰陸香，煎叁拾沸，乃下黃丹，次下蠟，煎之使消，以匙攪之數千迴，下之停凝，用之。

喎僻第四 方肆首

治心虛寒風，半身不遂，骨節離緩，弱不用，便利無度，口面喎斜，乾薑附子湯方。

乾薑 附子各八兩，炮，去皮 芎藭叁兩 麻黃去節 桂心各肆兩

右伍味，㕮咀，以水壹斗，煮取叁升，分三服，三日復進一劑。

治中風面目相引偏僻，牙車急，舌不轉方。

牡蠣熬 礬石燒 附子生，去皮 伏龍肝等分

右肆味，擣篩為散，以三歲雄雞血和藥，傅上，須乾看，勿令

太過。偏右塗左。偏左塗右。正則洗去之。

烏頭膏 主賊風身體不遂。偏枯口僻。及傷寒其身強直方。

烏頭伍兩去皮。 野葛 莽草各壹斤

右叁味。切。以好酒貳㪷伍升淹漬再宿。三日。以猪膏伍斤煎成膏。合藥。作東向露竈。以葦火煎之。三上三下。膏藥成。有病者向火摩三千過。汗出即愈。若觸寒霧露。鼻中塞。向火膏指頭摩入鼻孔中。即愈。勿令入口眼。

治風著人面。引口偏著耳。牙車急。舌不得轉方。

生地黃汁 竹瀝各壹升 獨活叁兩。

右叁味。合煎取壹升外。頓服之。即愈。

心風第五　方一十四首

茯神湯 主五邪氣入人體中。見鬼妄語。有所見聞。心悸跳動。恍惚不定方。

茯神　人參　茯苓　菖蒲各貳兩　赤小豆肆拾枚

右伍味，㕮咀，以水壹斗，煮取貳升半，分叁服。

人參湯主風邪鬼氣，往來發作，有時或無時節方。

人參　防風　烏頭炮，去皮　黃芩　附子炮，去皮

遠志去心　桔梗　秦艽　五味子　前胡

牡蠣熬　細辛　石膏碎　芎藭　蜀椒汗，去目、閉口者

牛膝　澤瀉　桂心　山茱萸　竹皮

橘皮　桑根白皮各叁兩　乾薑　澤蘭

狗脊　石南各半兩　白朮壹兩半　大棗拾陸枚，擘　麻黃壹兩，去節

茯苓　獨活　甘草炙，各伍分

右叁拾貳味，㕮咀，以水陸升，酒陸升，合煮取肆升，分伍服，日二夜二服。

補心湯主奄奄忽忽，朝差暮劇，驚悸，心中憧憧，胷滿不下食

飲。陰陽氣衰。脾胃不磨。不欲聞人聲。定志下氣方。

人參　茯苓　龍齒炙　當歸　遠志去心

甘草炙各叁兩　桂心　半夏洗各伍兩　生薑六兩　大棗貳拾枚擘

黃耆肆兩　枳實炙　枳梗　茯神各貳兩半

右壹拾肆味。㕮咀。以水壹斗貳升。先煑粳米伍合。令熟。去滓內藥。煑取肆升。每服八合。日三夜二服。

鎮心圓　主風虛勞冷。心氣不足。喜忘恐怖。神志不定方。

防風伍分　甘草貳兩半炙　乾薑半兩　當歸伍分　澤瀉壹兩

紫菀半兩　茯神貳分　大黃伍分　秦艽壹兩半　昌蒲叁兩

白朮貳兩半　桂心叁兩　白斂壹兩　遠志去心貳兩　附子貳兩炮去皮

桔梗叁分　大豆卷肆兩　署預貳兩　石膏叁兩研　茯苓壹兩

人參伍分　大棗伍拾枚擘　麥門冬去心伍兩

右貳拾叁味。末之。鍊蜜和為圓。酒服如梧子大拾圓。日叁

服加至貳拾圓。

續命湯治大風風邪入心心痛達背背痛達心前後痛去來上下或大腹脹滿微痛一寒一熱心中煩悶進退無常面或青或黃皆是房內太過虛損勞傷交會後汗出汗出未除或因把扇或出當風而成勞五俞大傷風因外入下有水因變成邪雖病如此然於飲食無退坐起無異至卒不知是五內受氣故也名曰行尸宜預備此方。

麻黃六分去節　大棗拾枚擘　桂心　防風　細辛

芎藭　甘草炙　芍藥　人參　秦艽

獨活　黃芩　防已　附子炮去皮　白朮各叁分

生薑伍分

右壹拾陸味切以水壹斗叁升先煮麻黃一沸去上沫內諸藥煮取伍升去滓內棗煎取叁升分爲三服老小久病

服五合。取汗。忌生葱海藻菘菜生菜豬肉冷水桃李雀肉等。

鎮心圓 治胃氣厥實風邪入藏。喜怒愁憂。心意不定。恍惚喜忘。夜不得寐。諸邪氣病悉主之方。

秦艽　柏實　當歸　乾漆熬　白歛
杏仁去皮尖雙仁熬　芎藭各叁分　澤瀉壹兩　乾地黄六分　防風
人參各肆分　甘草壹兩炙　白朮　署預　茯苓
乾薑各貳分　麥門冬弍兩去心　前胡肆分

右壹拾捌味。擣下篩。鍊蜜和爲圓。如桐子。先食飲服拾圓。日叁。不知。稍增之。忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉酢物等。

定志小圓 主心氣不定。五藏不足。憂悲不樂。忽忽遺忘。朝差暮極。狂眩方。

遠志去心　昌蒲各貳兩　茯苓　人參各叁兩

右肆味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子。飲服貳圓。日三。加茯

神爲茯神圓散服亦佳。

補心治遺忘方。

昌蒲　遠志（去心）　茯苓　人參　通草

石決明（各等分）

右六味。擣篩爲散。食後水服方寸匕。日一服。酒亦佳。

槐實益心智方。

以十月上辛日。令童子於東方採兩斛槐子。去不成者。新瓦盆貯之。以井華水漬之。令淹濊。合頭密封七日。去黃皮。更易新盆。仍以水漬之。密封二七日。去其黑肌。擇取色黃鮮者。以小盆隨藥多少。以密布次其黃。夏密布其上。以盆合頭密封。內暖馬糞中二七日。開視結成。擣圓如梧子。日服三圓。大月加三圓。小月減三圓。先齋二七日乃服。三十日有驗。百日日行三百里。目明視見表

裏。白髮更黑。齒落再生。白皺却展。日記千言。尋本知末。除六十四種風。去九漏冷癥瘕蟲毒魘魅。

開心肥健方。

人參伍兩　大豬肪捌枚

右貳味。擣人參為散。豬脂煎取凝。每服以人參一分豬脂十分。以酒半升和服之。一百日骨髓充溢。日記千言。身體潤澤。去熱風冷風頭心風等。月服二升半。即有大效。

孔子枕中散方。

龜甲炙　龍骨　昌蒲　遠志去心各等分

右肆味。為散。食後水服方寸匕。日三。常服不忘。

鎮心省睡益智方。

遠志伍拾兩去心　益智子　昌蒲各捌兩

右叁味。擣篩為散。以淳糯米酒服方寸匕。一百日有效。秘

不令人知。

止睡方

龍骨　虎骨炙　龜甲炙

右叁味。擣篩爲散。水服方寸匕。日二。以睡定即止。

治多睡。欲合眼。則先服以止睡方。

麻黄去節　白术各伍兩　甘草炙壹兩。

右叁味。以日中時南向擣篩爲散。食後以湯服方寸匕。日三服。

風眩第六　方二十七首

治風眩屋轉眼不得開。人參湯方。

人參　防風　芍藥　黄耆各貳兩　獨活

桂心　白术各叁兩　當歸　麥門冬各壹兩去心。

右玖味。㕮咀。以水壹斗煑取叁升伍合。分肆服。

治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲茯神湯方。

茯神肆兩　黃耆　生薑切　遠志去心各叁兩　附子壹枚炮去皮

防風伍兩　人參　獨活　當歸　牡蠣熬

蓯蓉　白朮　甘草炙各貳兩

右壹拾叁味㕮咀以水壹斗貳升煮取叁升分陸服毋服五合日三夜三。一方無白朮。

防風散主頭面風在眉間得熱如蟲蟻行或頭眩目中淚出。

防風伍兩　天雄炮去皮　細辛　乾薑　烏頭炮去皮

朱砂研　桂心各叁兩　莽草　茯苓壹兩　附子炮去皮

人參　當歸各貳兩

右壹拾貳味擣篩為散酒服方寸匕日三服。

防風散主頭眩惡風吐冷水心悶方。

防風　乾薑各貳兩　桂心壹兩半　澤蘭　附子炮去皮

茯苓　人參千金作天雄　細辛　署預　白朮各壹

右壹拾味，擣篩爲散，酒服方寸匕，常令有酒氣醺醺，則脫巾帽，解髮，前却梳頭一百遍，復投一升酒，便洗手足，須臾頭面熱，解髮以粉粉之，快卧便愈，可洗頭行步如服寒食散，十日愈。

治頭風方。

擣葶藶子末，以湯淋取汁，洗頭良。

治卒中惡風頭痛方。

擣生烏頭去皮，以醋和塗故布上，薄痛上，須臾痛止，日夜五六薄之。

防風散 主頭面身腫方。

防風貳兩　白芷壹兩　白朮叁兩

右叁味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日二服。

小三五七散 主頭面風。目眩耳聾。亦隨病所在兩攻方。

天雄（炮去皮。參兩） 山茱萸 署預（柒兩）

右叁味擣篩爲散。以酒服伍分匕。日三。不知稍增。以知爲度。

大三五七散 主口喎目斜耳聾。面骨疼風眩痛方。

天雄（炮去皮） 細辛（各叁兩） 山茱萸 乾薑（各伍兩）

署預 防風（各柒兩）

右陸味擣篩爲散。以酒服伍分匕。日再。不知稍增。以知爲度。

治頭面風眼瞤鼻塞眼暗冷淚方。

杏仁二升。擣末。水煑四五沸。洗頭。冷汗盡。三度差。

又方

熟煑大豆。内飯甕中作漿水。日日温洗頭面髮。不淨加少麪。勿用水濯。不過十洗。

治頭中白屑如麩糠方。

立藏楮木作枕。六日一易新者。

沐頭主頭風方。

五月五日取鹽壹升。水壹升。合煑。幷內三匕蛇牀。以陳蘆燒之三沸。以沐頭。訖急結密巾之。四五日以水沃之。良。神

又方

吳茱萸叄升

右壹味。以水伍升煑取叄升。以綿拭髮根。良。

入頂散主三十六種風偏枯不遂方。

天雄炮去皮 山茱萸各壹兩半 麻黃壹兩去節 署預貳兩

細辛 石南 牛膝 莽草各半兩 蜀椒去目閉口者汗

白朮 烏頭炮去皮 桔梗 防風 甘草炙各肆兩

右壹拾肆味。擣篩為散。以酒服方寸匕。日三。千金有芎藭獨活附子通草菖蒲為十九味。

治遍身風方。

石南叁兩。純青黑斑者佳

右壹味，擣篩爲散，酒服三大豆，日三。至食時當覺兩鬢如蟲行狀，亦如風吹，從頭項向壁脊腰脚至膝下骨中痛，痛遍即瘥。下頭風盡止。若風愈，即能飲酒肥健，忌如藥法。日一服。

風痺散 主三十年惡風濕痺，髮禿落，隱瘮生瘡，氣脉不通，抓搔不覺痛痒方。

附子炮，去皮　乾薑　白朮各肆兩　石斛半兩　蜀椒去目。壹分。汗。及閉口者

天雄炮，去皮　細辛　躑躅　白斂　烏頭炮，去皮

石南　桂心各叁分

右壹拾貳味，擣篩爲散，酒服五分匕，以少羊脯下藥，日再。勿大飽食，飢即更服。常令有酒勢。先服吐下藥後乃服之。以韋袋貯藥，勿洩。忌冷水房室一百日。

十六卷終

千金翼方卷第十七

中風下

中風第一 方三十五首 論四首 灸法二首

小續命湯方。

麻黃去節 防已 人參 桂心 黃芩

芍藥 芎藭 杏仁去尖皮兩仁 甘草炙各壹兩

附子炮去皮壹枚 防風壹兩半 生薑伍兩。

右壹拾貳味，㕮咀，以水壹斗，先煑麻黃去上沫，內諸藥煑取叁升，分叁服。有風預備壹拾劑。

大續命湯方。

麻黃捌兩去節 大杏仁肆拾枚去皮尖兩仁 桂心 芎藭各貳兩

石膏肆兩碎 黃芩 乾薑 當歸 甘草炙各壹兩

荊瀝壹升

右壹拾味。㕮咀。以水壹斗。先煮麻黃。去上沫。下藥煮取四升。下荊瀝煮取三升。分四服。能言未差。後服小續命湯。

又小續命湯方

麻黃（貳兩。去節） 生薑（伍兩。切） 防風（壹兩半） 芍藥 白朮 人參 芎藭（壹兩） 附子（炮。去皮） 黃芩 防已（各壹兩） 桂心 甘草（炙。各貳兩）

右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗。先煮麻黃。去上沫。內諸藥。煮取三升。分三服。

西州續命湯方

麻黃（陸兩。去節） 石膏（肆兩。碎） 桂心（貳兩） 杏仁（叁拾枚。去皮尖雙仁） 芎藭 乾薑 黃芩 當歸 甘草（炙。各壹兩）

右玖味。㕮咀。以水壹斗貳升。先煮麻黃。去上沫。下諸藥。煮取肆升。分四服。

續命湯 主久風臥在牀。起死人神方。

麻黃去節 人參 桂心 附子炮去皮 茯苓各壹兩

防己 防風 黃芩各壹兩半 生薑切陸兩。半夏洗伍兩。

枳實貳兩。炙。上氣悶者加之 甘草壹兩。炙

右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗。先煮麻黃取玖升。去上沫。停冷去滓。內藥煮取叁升。分三服。若不須半夏去之。加芍藥叁兩。

大續命散 主八風十二痺。偏枯不仁。手足拘急疼痛不得伸屈。頭眩不能自舉。起止顛倒。或臥忽驚。如墮樹狀。盜汗。臨事不興。婦人帶下無子。風入五藏。甚者恐怖。見鬼來收錄。或與鬼神交通。悲啼哭泣。忽忽欲走方。

烏頭炮去皮 防風 麻黃去節 人參 杏仁去皮尖兩仁熬

芍藥 石膏研 乾薑 芎藭 茯苓

黃芩 桂心 蜀椒去目閉口者汗 甘草炙各壹兩 當歸貳兩

右壹拾伍味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日二。稍增。以知爲度。

排風湯方。

白鮮皮　白朮　芍藥　芎藭　當歸

獨活　杏仁去皮尖及雙仁熬　防風　桂心

甘草炙各貳兩　茯神一作茯苓　麻黄去節各參兩　生薑肆兩切

右壹拾參味。㕮咀。以水壹斗。先煮麻黄去上沫。内諸藥煮取參升。分三服。取汗可服兩三劑。

大排風湯主半身不遂。口不能言。及諸偏枯方。

白鮮皮　附子炮去皮　麻黄去節　杏仁去皮尖熬　白朮

防風　葛根　獨活　防己　當歸

人參　茯神　甘草炙各參兩　石膏陸兩碎　桂心貳兩

白芷壹兩

右壹拾陸味。㕮咀。以水壹斗柒升。先煮麻黄取壹升半。去

沫。澄清。内藥煮取四升。分四服。日三夜一服。

又排風湯 主諸毒風邪氣所中。口噤悶絶。不識人。身體疼煩。面目暴腫。手足腫方。

犀角屑 羚羊角屑 貝子 升麻

右肆味。各壹兩。別擣成末。合和。以水二升半。内方寸匕。煮取壹升。去滓。服五合。殺藥者以意加之。若腫。和雞子傅上。日三。老小以意增減。神良。

大巖蜜湯 主賊風。腹中絞痛。并飛尸遁注。發作無時。發則搶心。腹脹滿。脇下如刀錐刺。并主少陰傷寒方。

梔子拾伍枚擘 乾地黄 乾薑 細辛 當歸

青羊脂 吳茱萸 茯苓 芍藥 桂心

甘草炙各壹兩

右壹拾壹味。㕮咀。以水捌升。煮取叁升。去滓。内羊脂令消。

分温三服。

小巖蜜湯主惡風。角弓反張。飛尸入腹。絞痛悶絕。往來有時。筋急。少陰傷寒。口噤不利方。

雄黃研　青羊脂各壹兩　大黃貳兩　吳茱萸叁兩

當歸　乾薑　芍藥　細辛　桂心

乾地黃　甘草炙，各壹兩

右壹拾壹味。㕮咀。以水貳斗。煮取陸升。分六服。重者加藥。用水三斗。煮取九升。分十服。

烏頭湯主八風五尸惡氣。遊走心胸。流出四肢。來往不住。短氣欲死方。

烏頭炮。去皮　芍藥　當歸　乾薑　桂心

細辛　乾地黃　吳茱萸　甘草炙，各壹兩

右玖味。㕮咀。以水柒升。煮取貳升半。分三服。

大八風湯主毒風頑痺嚲曳，或手脚不隨，身體偏枯，或毒弱不任，或風入五藏，恍恍惚惚，多語喜忘，有時恐怖，或肢節疼痛，頭眩煩悶，或腰脊強直，不得俛仰，腹滿不食，欬嗽，或始遇病時，卒倒悶絶，即不能語，便失瘖，半身不隨，不仁沉重，皆由體虛，恃少不避風冷所致方。

烏頭（炮，去皮） 黄芩 芍藥 遠志（去心） 獨活

防風 芎藭 麻黄（去節） 秦艽 石斛

人參 茯苓 石膏（碎） 黄耆 紫菀（各貳兩）

當歸（貳兩半） 升麻（壹兩半） 大豆（貳合） 五味子（伍分） 杏仁（肆拾枚，去皮尖雙仁）

乾薑 桂心 甘草（炙，各貳兩半）

右貳拾叁味，㕮咀，以水壹斗叁升，酒貳升，合煑取四升，強人分四服，少力人分五六服。（深師同）

芎藭湯主卒中風，四肢不仁，喜笑不息方。

芎藭壹兩半　杏仁貳拾枚，去皮及尖双仁　麻黃去節　黃芩

桂心　當歸　石膏碎　秦艽　乾薑

甘草各壹兩，炙

右壹拾味，㕮咀，以水九升，煑取三升，分三服。

倉公當歸湯　主賊風口噤，角弓反張，身體強直方。

當歸　細辛　防風各壹兩半　獨活參分　麻黃貳兩半，去節

附子壹枚，炮，去皮

右陸味，㕮咀，以酒八升，水四升，合煑取四升，分肆服。口不開者，挍口下湯，一服當開，二服小汗，三服大汗。

芎藭湯　主風癲引脇痛，發作則吐，耳中如蟬鳴方。

芎藭　藁本　䕡茹各伍兩

右參味，切，以淳酒五升，內藥煑取三升，頓服，羸者二服，取大汗。

治風癲狂及百病方。

大麻子肆升。上好者

右壹味。以水陸升。猛火煑令牙生。去滓。煎取柒升。旦空肚頓服。或不發。或多言語。勿怪之。但使人摩手足。須臾即定。凡進三劑無不愈。令人身輕。衆邪皆去。

防己湯 主風歷節。四肢痛如鎚鍛。不可忍者。

防己　茯苓　生薑切　桂心各肆兩　烏頭柒枚。去皮

人參參兩　白朮陸兩　甘草參兩。炙。

右捌味。㕮咀。以水壹斗。煑取貳升半。服捌合。日三。當熠熠微熱痺。勿怪。若不覺。復更合之。以覺乃止。凡用烏頭皆去皮熬令黑。乃堪用。無毒。

三黄湯 主中風。手足拘攣。百節疼痛。煩熱心亂。惡寒。經日不欲飲食方。

麻黄伍分，去節　獨活壹兩　黄芩叁分　黄耆半兩　細辛半兩

右伍味，㕮咀，以水伍升，煑取貳升，去滓，分貳服，一服小汗，兩服大汗。心中熱加大黄半兩，腹滿加枳實一枚，氣逆加人參三分，心悸加牡蠣三分，渴加栝樓三分，先有寒加八角附子一枚。此仲景方，神秘不傳。

黄耆湯 主八風十二痺，手脚疼痛，氣不和，不能食飲方。

黄耆　當歸　桂心　甘草炙，各叁兩　白朮

烏頭炮，去皮　芎藭　防風　乾地黄各貳兩

生薑肆兩，切　前胡壹兩半

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗壹升，煑取叁升半，分四服。此湯和而補，有氣者加半夏四兩。

白歛湯 主中風萎僻，拘攣不可屈伸方。

白歛　乾薑　薏苡仁　酸棗　牛膝

桂心　芍藥　車前子　甘草炙壹兩　附子參枚，炮，去皮

右壹拾味，㕮咀，以酒貳斗漬一復時，煑三沸，服壹升，日三服，扶杖而起，不能酒者，服五合。

防己湯

主風濕四肢疲痺攣急浮腫方。

木防己參兩　茯苓壹兩　桑白皮切，貳升　桂心參兩　芎藭參兩　甘草壹兩半，炙　大棗拾貳枚，擘　芍藥貳兩　麻黃貳兩，去節

右玖味，㕮咀，以水壹斗貳升，煑麻黃減壹升，內藥，煑取三升，分三服，漸汗出，令遍身，以粉粉之，慎風冷。一方，茯苓四兩，麻黃三兩。

治三十年風方。

松葉壹斤，切，以酒壹斗，煑取貳升，頓服，取汗出佳。

治一切風虛方。常患頭痛欲破者

杏仁玖升，去皮尖、兩仁者，暴乾

右壹味，擣作末，以水玖升研濾，如作粥法，緩火煎，令如麻

浮上。匙取和羹粥。酒內一匙服之。每食即服。不限多少。服七日後大汗出。二十日後汗止。慎風冷猪魚雞蒜大酷。一劑後諸風減。差。春夏恐酷。少作服之。秋九月後煎之。此法神妙。可深秘之。

治中風發熱方。

大戟　苦參等分

右貳味。擣篩藥半升。以醋漿水壹斗。煮三沸。洗之。從上至下。立差。寒乃止。小兒三指撮。醋漿水四升。煮如上法。

羌活飲 治風方。

羌活叁兩　茯神　薏苡仁用羌活去薏苡仁　防風各壹兩

右叁味。㕮咀。以水叁升。煮取壹升。內竹瀝三合。煮壹沸。分再服。

猪苓煮散 主下痢多。而小便澀方。

豬苓　茯苓　澤瀉　黄連　白朮各肆兩

防己　羌活　黄芩　人參　丹參

防風　牛膝　升麻　犀角屑　杏仁去皮尖雙仁熬

秦艽　穀皮　紫菀　石斛　生薑各叁兩

橘皮貳兩　附子伍兩炮去皮　桑根白皮陸兩

右貳拾叁味。擣篩為散。以水壹升半。煮五方寸匕。取壹升。頓服。日再。不能者壹服。十月後二月末以來可服之。

論曰。人不能用心謹慎。遂得風病。半身不隨。言語不正。庶事皆廢。此為猥退病。得者不出十年。宜用此方。差後仍須將慎。不得用未病之前。當須絶於思慮。省於言語。為於無事。乃可求愈。若還同俗類。名利是務。財色為心者。幸勿苦事醫藥。徒勞為療耳。宜於此善以意推之。凡人忽中生風。皆須依此次第用湯。即得愈也。學者子細尋思。明然可見。

凡初得風。四肢不收。心神惛日憒。眼不識人。言不出口。凡中風多由熱起。服藥當須慎酒麪羊肉生菜冷食猪魚雞牛馬肉蒜。乃可差。得患即服此竹瀝湯方。

竹瀝貳升　生薑汁叁合　生葛汁壹升

右叁味。相和温煖。分三服。平旦日晡夜各一服。服訖若覺四體有異。似好。以次進後方。

麻黄去節　防風各壹兩半　杏仁肆拾枚去皮尖及双仁　羚羊角貳兩屑

生薑切肆兩　生葛汁五合一云地黄汁　竹瀝壹升　石膏陸兩綿裹

芎藭　防己　附子炮去皮　芍藥　黄芩

人參　桂心　甘草炙各壹兩

右壹拾陸味。㕮咀。以水柒升。煮取壹升半。乃下瀝汁。煮取貳升柒合。分温三服。五日更服一劑。頻進三劑。慎如上法。漸覺稍損。次進後方。

麻黄去節 防風 升麻 桂心 芎藭

獨活 羚羊角屑，各貳兩 竹瀝貳升 防巳壹兩

右玖味，㕮咀，以水四升，并瀝煑取叁升，分三服，兩日進壹劑，頻進三劑。若手足冷者，加生薑五兩，白术貳兩。若未除，次進後方。

麻黄去節 芍藥 防風各壹兩半 羚羊角屑，貳兩

生薑切，貳兩 附子炮，去皮，各叁分 石膏碎，貳兩 防巳 黄芩

芎藭 白术 人參 獨活 升麻

桂心 甘草炙，各壹兩 竹瀝壹升

右壹拾柒味，㕮咀，以水捌升，煑減半，下瀝，煑取貳升半，分叁服，相去如人行十里再服。有氣加橘皮、牛膝、五加皮各壹兩。若除退訖，可常將服後煑散方。

防風 獨活 秦艽 黄耆 芍藥

人參　茯神　白朮　芎藭　山茱萸

署預　桂心　天門冬去心　麥門冬去心　厚朴炙

升麻　丹參　羚羊角屑　五加皮　防己

牛膝　石斛　地骨皮　甘草炙各肆兩　麻黄去節

附子炮去皮　遠志去心　橘皮各叁兩　生薑切貳兩　甘菊花

薏苡仁各貳升　石膏研　乾地黄各陸兩

右叁拾叁味，擣篩爲散，每煮以水叁升，内散三兩，煮取壹升，綿濾去滓，頓服之，日別壹服。若覺心下煩熱，以竹瀝代水煮之。千金有黄芩、檳榔、藁本、杜仲、犀角，無山茱萸、署預、甘菊、麥門冬、附子。

凡患風人多熱，宜服荊瀝方。

荊瀝　竹瀝　生薑汁各伍合

右叁味，相和，溫爲壹服，每日旦服煮散，午後當服此荊瀝，常作此將息。

論曰。夫得風之時。則依此次第療之。不可違越。若不依此。當失機要。性命必危。

防風湯 主偏風。甄權處治安平公方。

防風 芎藭 白朮 狗脊 萆薢 牛膝 白芷各壹兩 薏苡仁 葛根 杏仁去皮尖兩仁 人參 羌活各貳兩 麻黃去節肆兩 生薑切伍兩 桂心 石膏各叁兩碎

右壹拾陸味。㕮咀。以水壹斗貳升。煮取叁升。分三服。服一劑覺好。更服一劑。一劑一度針之。服九劑湯九度針之。針風池一穴肩髃一穴曲池一穴支溝一穴五樞一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴。合七穴即差。○仁壽宮備身患脚。奉勑針環跳陽陵泉巨虛下廉陽輔。即起行。○大理趙卿患風腰脚不隨。不得跪起。針上窌二穴環跳二穴陽陵泉

二穴巨虛下廉二穴。即得跪起。

治猥退風方。

蒼耳子伍升。苗亦得用　羊桃切　蒴藋切　赤小豆各貳升半

鹽貳升

右伍味。以水兩石伍斗。煮取伍斗。適寒溫內所患腳漬深至絕骨。勿過之。一度炊五斗米頃出之。慎風冷。汗從頭出。

論曰。聖人以風是百病之長。深為可憂。故避風如避矢。是以防禦風邪。以湯藥針灸蒸熨。隨用一法。皆能愈疾。至於火艾。特有奇能。雖曰針湯散皆所不及。灸為其最要。昔者華他為魏武帝針頭風。華他但針即差。華他死後數年。魏武帝頭風再發。佗當時針訖即灸。頭風豈可再發。只由不灸。其本不除。所以學者不得專恃於針及湯藥等。望病畢差。既不苦灸。安能拔本塞源。是以雖豐藥餌。諸療之要。在火艾為良。初得之

時。當急下火。火下即定。比煑湯熟已覺眼明。豈非大要。其灸法。先灸百會。次灸風池。次灸大椎。次灸肩井。次灸曲池。次灸間使。各三壯。次灸三里。五壯。其炷如蒼耳子大。必須大實作之。其艾又須大熟。從此以後。日別灸之。至隨年壯止。凡人稍覺心神不快。即須灸此諸穴各三壯。不得輕之。苟度朝夕。以致殞斃。戒之哉。戒之哉。

又論曰。學者凡將欲療病。先須灸前諸穴。莫問風與不風。皆先灸之。此之一法。醫之大術。宜深體之。要中之要。無過此術。是以常預收三月三日艾。擬救急危。其五月五日亦好。仍不及三月三日者。又有卒死之人。及中風不得語者。皆急灸之。夫卒死者。是風入五藏。為生平風發強忍。怕痛不灸。忽然卒死。謂是何病。所以皆必灸之。是大要也。

脚氣第二 論一首 方二十一首

論曰。治脚氣順四時。若春秋二時宜兼補瀉。夏則疾成專須汗利。十月以後少用補藥。雖小變不越此法。

治脚氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方。

取胡麻葉切擣蒸薄裹。日二易即消。若冬月取蒴藋根切擣和糟三分根一分合蒸令熱裹如前法。

遍身腫小便澀者用麻豆湯主之方。

大麻貳升熬研　烏豆壹斗以水四斗煮取汁壹斗半去豆　桑白皮切伍升

右叁味。以豆汁內藥煮取陸升。壹服壹升。日二服。三日令盡。

又方

烏牛尿壹升。日二。腫消止。羸瘦者二分尿一分牛乳。合煮乳浮結乃服之。

又方

生猪肝一具。細切以淡蒜虀食盡。不可盡者分再食之。

治腰脚疼方。

胡麻子(壹斗，新者)

右壹味，熬令香，擣篩，若不數篩，當脂出不下。日服壹小升，日叁服，盡藥計壹斗，即永差。酒飲羹汁蜜湯皆可服之。

大下之後，而四體虛寒，脚中羸弱，腰攣痛，食飲減少，皮肉虛疎，石斛酒方。

生石斛(壹斤) 秦艽 遠志(各伍兩，去心) 橘皮 白朮(各叁兩) 丹參 茯神 五加皮(各陸兩) 桂心(肆兩) 牛膝(捌兩)

右壹拾味，㕮咀，以酒叁斗漬七日。一服六合，稍加至七八合，以知為度。

調利之後，未平復間，為外風傷，脚中痛酸，轉為脚氣，補虛防風湯方。

防風 石斛 杜仲(炙) 前胡(各肆分) 薏苡仁(半斤)

秦艽　丹參　五加皮　附子炮去皮　橘皮

白朮　白前各叁分　防已貳分　麻仁壹升熬

右壹拾肆味，㕮咀，以水壹斗貳升，煮取叁升，分三服。

服湯已脚氣仍不止，防風圓方。

防風貳兩　秦艽貳兩　石斛貳兩　丹參壹兩　薏苡仁叁合

前胡　橘皮　杜仲炙　附子炮去皮　白朮各壹兩

桂心壹兩半　麻仁壹升熬取脂

右壹拾貳味，擣篩為末，鍊蜜和圓，如梧子，酒服貳拾圓，日貳服。

治脚氣常作，穀白皮粥防之法，即不發方。

穀白皮伍升，切，勿取斑者，有毒

右壹味，以水壹斗，煮取柒升，去滓，煑米粥常食之。

温腎湯 主腰脊膝脚浮腫不隨方。

茯苓 乾薑 澤瀉各貳兩 桂心叁兩

右肆味，㕮咀，以水陸升，煑取貳升，分三服。

竹瀝湯主兩脚痹弱，或轉筋，或皮肉脹起如腫，而按之不陷，心中惡，不欲食，或患冷氣方。

甘竹瀝伍升 葛根 防風各貳兩 麻黄去節，陸兩 升麻伍分

桂心壹兩 附子壹枚，炮，去皮 秦艽 細辛 木防已

黄芩 乾薑 白术 甘草炙，各壹兩

右壹拾肆味，㕮咀，以水柒升，内甘竹瀝五升，合煑取叁升，分四服，取汗。千金有茯苓、杏仁，無白术。

大竹瀝湯主卒中惡風，口噤不能言，四肢癉緩，偏攣急痛，風經五藏，恍惚喜怒無常，手足不隨，皆悉主之方。

甘竹瀝壹斗肆升 人參 細辛 石膏各壹兩，碎 生姜伍兩，切

烏頭叁枚，炮，去皮 防風 獨活 芍藥 黄芩

茵芋　麻黃去節　葛根　木防已　桂心
茯苓　甘草炙各貳兩　芎藭壹兩

右壹拾捌味。㕮咀。以竹瀝煮取四升。分三服。一方以水五升。千金有白朮。

又竹瀝湯 主風氣入腹。短氣。心下煩熱不痛。手足煩疼。四肢不舉。口噤不能言方。

竹瀝壹斗　當歸　秦艽　防風　葛根各貳兩
人參　芍藥　木防已　附子炮去皮　細辛
茯苓一作茯神　通草　桂心　白朮　甘草炙各壹兩

右壹拾伍味。㕮咀。以竹瀝漬半日。煮取四升。分三服。不能者四服。千金有芎藭、生薑、黃芩、升麻、蜀椒、麻黃。無芍藥、防已、通草。

大鼈甲湯 主脚弱風毒。攣痺氣上。皆主之方。

鼈甲炙　防風　麻黃去節　半夏洗　白朮
茯苓　芍藥　杏仁去皮尖雙仁　麥門冬去心　生薑切

人參　石膏碎　羚羊角屑　甘草炙各壹兩　犀角屑壹分。

雄黃研半兩。青木香貳兩　吳茱萸半升　大黃壹分半　麝香叁分

薤白肆拾枚切　烏梅　貝齒各柒枚　大棗貳拾枚擘　赤小豆貳拾肆枚

右貳拾伍味。㕮咀。以水貳㪷。煮取四升。分四服。日三夜一服。

大投杯湯 主脚弱。舉體腫滿。氣急。日夜不得眠方。

麻黃去節　杏仁去皮尖及雙仁　桂心　黃芩

橘皮　石膏各貳兩碎　生薑陸兩切　半夏洗　厚朴炙

枳實炙各叁兩　茯苓肆兩　秦艽壹兩半　大戟　細辛各壹兩

大棗貳拾枚擘　甘草貳兩炙。

右壹拾陸味。㕮咀。以水壹㪷貳升。煮取肆升。分五服。日三夜二。

獨活湯 主脚氣風痹不仁。脚中沈重。行止不隨。氣上方。

獨活　桂心　半夏洗各肆兩　麻黃去節　芎藭

人參　茯苓各貳兩　八角附子壹枚，炮，去皮。　大棗拾貳枚，擘

防風　芍藥　當歸　黃耆　乾薑

甘草各叁兩，炙

右壹拾伍味，㕮咀，以水壹斗伍升，酒貳升，煮取叁升，分爲五服。

硫黃煎 主腳弱連屈虛冷方。

硫黃伍兩　牛乳伍升

右貳味，以水伍升合煮及伍升，硫黃細篩内之，煎取三升，一服一合，不知，至三合。

硫黃散 主腳弱大補面熱風虛方。

硫黃研　鍾乳粉　防風各伍兩　乾薑壹兩　白朮

人參　蜀椒汗，去目及閉口者　細辛　附子炮，去皮　天雄炮，去皮

茯苓　石斛　桂心　山茱萸各叁分

右壹拾肆味。擣篩爲散。旦以熱酒服方寸匕。日二。加至二匕。

青圓 主脚風。皮肉身體諸風方。

烏頭壹兩。炮。去皮 附子參兩。炮。去皮 麻黄肆兩。去節

右參味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子大。酒服五圓。日三服。

硫黄圓 主膈淡滯澼。逐脚中風水方。

硫黄伍兩

右壹味。細粉。以牛乳參升。煑令可圓。如梧子大。暴令乾。酒服參拾圓。日三。不知。漸加至一百圓。

石硫黄圓 主脚風弱。背腹中冷結方。

石硫黄半兩 桂心肆兩 礜石燒 附子炮。去皮 天雄炮。去皮 烏頭各貳兩。炮。去皮

右陸味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子大。空腹酒服伍圓。日參服。

癮瘮第三 方一十六首 灸法一首

石南湯　主癮瘮方。

石南　乾薑　黃芩　細辛　人參各壹兩

桂心　當歸　芎藭各壹兩半　甘草貳兩　乾地黃叁分

食茱萸伍分　麻黃壹兩半。去節。

右壹拾貳味。㕮咀。以酒叁升。水陸升。煮取叁升。分叁服。取大汗。慎風冷。佳。

又方

酪和鹽熟煮。摩之。手下消。

又方

白芷根葉煎湯洗之。

治風瘙癮瘮煩心悶亂方。

天雄炮。去皮　牛膝　知母各壹兩　栝樓伍分　白朮貳兩

人參半兩　乾薑　細辛　桂心各叁分　防風壹兩半

右壹拾味。擣篩為散。酒服半錢匕。日再夜一。以知為度。稍

增至壹錢匕。

治大人小兒風瘮方。

白礬貳兩，末之

右壹味，以酒叄升，漬令消，拭上，愈。

又方

吳茱萸壹升

右壹味，以酒伍升，煑取壹升半，拭上。

治風瘙癮瘮方。

大豆叄升　酒陸升

右貳味，煑四五沸，服壹杯，日三。

治風瘙癮瘮洗湯方。

蛇牀子貳升　防風　生蒺蔾各貳斤

右叄味，切，以水壹斗，煑取伍升，以綿拭上，日四五度。

又洗湯方。

黃連　黃芩　白朮各貳兩　戎鹽　礬石各半兩

細辛貳兩　芎藭　茵芋各壹兩

右捌味，切。以水壹斗，煑取叁升。洗之，日三度。

又洗湯方。

馬蘭一作馬蘭子　蒴藋　茺蔚子　礬石

蒺藜　茵芋　羊桃根　萹蓄各貳兩

右捌味，切。以酢漿貳斗，煑取壹斗貳升。內礬石洗之，日三度。

治暴風氣在上，表皮作癮㾕瘡方。

煑槐枝葉以洗之，灸瘡、火瘡亦愈。

青羊脂膏　主風熱赤㾕瘙癢，搔之逐手作瘡方。

青羊脂四兩　芍藥　黃芩　黃耆

白芷　寒水石各壹兩　竹葉切，壹升　石膏碎，壹斤

白及　升麻　防風　甘草炙各參分

右壹拾貳味。切。先以水壹斗。煑石膏竹葉取伍升。合漬諸藥。以不中水猪脂貳升合煎。白芷黃。膏成。以傅之。

灸法。

以一條艾蒿長者。以兩手極意尋之著壁。立兩手并蒿竿拓著壁伸十指。當中指頭。以大艾炷灸蒿竿上。令蒿竿斷。即上灸十十。差。於後重發更依法灸。永差。

楓香湯主癮瘮方。

楓香壹斤　芎藭　大黃　黃芩　當歸
人參　射干　甘草炙各參兩　升麻肆兩　蛇牀仁貳兩

右壹拾味。切。以水貳斗。煑取柒升。適冷煖。分以洗病上。日三夜二。

地榆湯主癮瘮發瘡方。

地榆叁兩　苦參捌兩　大黃　黃芩各肆兩　黃連
芎藭各貳兩　甘草陸兩。炙

右柒味。切。以水陸斗。煮取叁斗。洗浴之良。

又方

大黃　當歸　升麻　防風　芍藥
青木香　黃芩　甘草炙。各貳兩　楓香伍兩　黃蘗
芒消各叁兩　地黃汁壹升

右壹拾貳味。切。以水壹斗。煮取叁升半。去滓。內芒消。令烊。帛搨病上。一炊久。日四五夜二三。主癮㾬瘑瘙良。

治癮㾬瘑瘙。搔之逐手腫方。

當歸　芎藭　大戟　細辛　芍藥
附子去皮　芫花　躑躅　椒各壹兩　莽草半兩

右壹拾味。切。以苦酒浸藥一宿。以猪膏貳升半煎。三上三

下。膏成去滓。傅病上。日三夜一。

癧瘍第四 方一十四首 灸法一首

治白癜白駮浸淫癧瘍著頸及胷前方。

大醋於甌底磨硫黄令如泥。又以八角附子截一頭使平。就甌底重磨硫黄使熟。夜臥先布拭病上。令熱。乃以藥傅之。重者三度。

又方

硫黄 水銀 礬石 竈墨

右肆味。等分。擣下篩。以葱涕和研之。臨卧以傅病上。

又方

石硫黄 叁兩 附子 去皮 鐵精 各壹兩

右叁味。並研擣。以三年醋和。內甕器中。密封七日。以醋泔淨洗。上拭乾塗之。乾即塗。壹兩日。慎風。

灸法。

五月五日午時。灸膝外屈脚當文頭。隨年壯。兩處灸一時下火。不得轉動。

治頭項及面上白駮。浸淫漸長。有似於癬。但無瘡方。

乾鰻鱺魚。灸脂塗之。先洗拭駮上。外把刮之。令小磣痛。拭燥。然後以魚脂塗之。一塗便愈。難者不過三塗之。佳。

又方

取生木空中水。洗之。食頃止。

又方

桂心末。唾和。傅駮上。日三。

又方

白及（一作白斂） 當歸 附子（炮，各壹兩，去皮） 天雄（炮，去皮） 黄芩（各壹兩） 乾薑（肆兩） 躑躅（壹升）

右柒味。擣篩為散。酒服伍分匕。日三服。

凡人身有赤疵方。

常以銀揩令熱。不久漸漸消滅瘢痕。

治疕贅疵痣方。

雄黄　硫黄　眞朱　礬石熬　䕡茹

巴豆去皮心　藜蘆各壹兩

右柒味。擣篩爲散。以漆和令如泥。塗貼病上。須成瘡。及去面上黑子。點之即去。

治皮中紫赤疵痣靨穢方。

乾漆熬　雌黄　礬石各叁兩　雄黄伍兩　巴豆伍拾枚去皮

炭皮壹斤

右陸味。爲散。以雞子白和塗故帛。貼病上。日二易之即除。

九江散　主白癜及二百六十種大風方。

當歸柒分　石南半兩　秦艽壹兩　躑躅　菊花

乾薑　防風　麝香　雄黄研　丹砂研

斑猫各壹兩　蜀椒去目及閉口者，汗　連翹　知母
鬼箭　石長生各貳兩　附子炮，去皮　王不留行
人參　鬼臼　莽草　木防己　石斛
烏頭炮　天雄炮，去皮　獨活各叁兩　地膽　䗪蟲各拾枚
蜈蚣叁枚　水蛭壹百枚

右叁拾味，諸蟲皆去足羽，熬，炙，合擣為散，酒服方寸匕，日再服。其白癜入頭，令髮白，服之百日，白髮還黑也。

芎藭湯 主面上及身體風瘙癢方。

芎藭　白朮　山茱萸　防風　羌活
枳實各叁兩，炙　麻黃貳兩半，去節　署預肆兩　蒺藜子
生薑各叁兩，切　烏喙炮　甘草炙，各貳兩

右壹拾貳味，㕮咀，以水玖升，煑取貳升柒合，分三服。

又洗方。

蒴藋根　蒺藜子　景天葉各貳兩，切。蛇床子伍兩

玉屑半兩

右伍味。切。以水壹斗半。煑取壹斗。稍稍洗身面上。日叁夜一。慎風。

大黃湯主風瘙腫癢在頭面方。

大黃　芒消各壹兩　莽草　黃芩各貳兩

蒺藜子半升

右伍味。切。以水柒升。煑取叁升半。去滓。内芒消。令烊。以帛搨腫上數百遍。日五夜三。勿令近眼。一方有黃連。

千金翼方卷第十七

千金翼方卷第十八

雜病上

霍亂第一 方二十七首

理中圓 主霍亂臨時方。

人參 白朮 乾薑 甘草炙各壹兩

右肆味，擣篩爲末，鍊蜜和圓如彈圓，取湯和一丸服之，日十服。吐多痢少者，取枳實三枚炙四破，水三升，煑取一升，和壹圓服之。吐少痢多者，加乾薑一累。吐痢乾嘔者，取半夏半兩洗去滑，水貳升，煑取壹升，和壹圓服之。若體疼痛，不可堪者，水三升，煑棗三枚，取一升，和一圓服之。若吐痢大極轉筋者，以韭汁洗腹腎，從胷至足踝，勿逆，即止。若體冷微汗，腹中寒，取附子一枚，炮去皮四破，以水貳升，煑一升，和一圓服。吐痢悉止，脉不出，體猶冷者，可服諸湯補之。

厚朴湯主霍亂面煩方。

厚朴炙　高良薑　桂心各叁兩

右叁味，㕮咀，以水陸升，煮取二升，分再服。

四順湯主霍亂吐下腹痛手足逆冷方。

大附子壹枚，去皮，破捌片　乾薑叁兩　人參　甘草炙，各壹兩

右肆味，㕮咀叁味，以水伍升，煮取壹升半，分三服。

治霍亂吐痢嘔逆龍骨湯方。

龍骨　黄連　乾薑　赤石脂　當歸各叁兩

枳實伍枚，炙　半夏一升，洗　附子炮，去皮，破　人參　桂心

甘草炙，各貳兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水玖升，煮取叁升，分三服。

治霍亂困篤不識人方。

雞蘇壹大把

右壹味，以水壹斗，煑取叁升，分再服。

治霍亂轉筋，兩臂及脚，胷脇諸轉筋，並主之方。

鹽壹升伍合，煑作湯，漬洗轉筋上，按炙良。

又方

大麻子壹升，擣，以水叁升，煑取壹升，盡服之。

又方

香薷壹把，水煑令極濃，服二三升，即差。青木香亦佳。

治霍亂止吐方。

丁香拾肆枚，以酒伍合，煑取貳合，頓服之。用水煑之亦佳。

治霍亂吐痢，心煩不止方。

猪糞如雞子大壹枚，爲末，以沸湯壹升和之，頓服，良。不差更作。

又方

粱米粉伍合。水壹升半和之如粥。頓服。須臾即止。

治霍亂轉筋入腹方。

雞屎白末以水六合。煑取湯服方寸匕。

治大便不通噦數口譫語方。

厚朴貳兩炙。大黄肆兩　枳實伍枚炙。

右叁味。㕮咀。以水肆升。煑取壹升貳合。分再服。當通。不通盡服之。

竹茹湯主噦方。

竹茹壹升　橘皮　半夏洗。各叁兩　生薑肆兩切。紫蘇壹兩

甘草壹兩炙。

右陸味。㕮咀。以水陸升。煑取貳升半。分叁服。

治中風客熱噦方。

竹茹肆兩　生米伍合

右貳味。以水陸升。煑米熟服之。

治嘔噦方。

蘆根伍兩

右壹味。切。以水伍升。煑取叁升。分三服。兼服小兒尿叁合。良。

又方

飲大豆汁壹升。止。

又方

常服白羊乳壹升。

治氣厥嘔噦不得息。又主霍亂大豉湯方。

香豉壹升　半夏洗　生薑各貳兩，切　前胡

桂心　人參　甘草炙，各壹兩

右柒味。㕮咀。以水伍升。煑取貳升。分三服。勿使冷。

傷寒噦而滿者。宜視其前後。知在何部。不利。利之愈。噦而不利。此湯主之方。

橘皮壹升　甘草壹尺

右貳味，㕮咀，以水伍升，煮取壹升，頓服之。

噦橘皮湯主之方

橘皮　通草　乾薑　桂心　甘草炙，各貳兩

人參壹兩

右陸味，㕮咀，以水陸升，煮取貳升，分三服。

小半夏湯主心下痞堅，不能飲食，胷中喘而嘔噦，微寒熱方。

生薑捌兩，切，以水叁升，煮取壹升　半夏伍合，洗，以水伍升，煮取壹升

右貳味，合煎，取壹升半，稍稍服之，即止。

又方

橘皮肆兩　生薑捌兩

右貳味，切，以水柒升，煮取貳升伍合，分三服，下喉即差，方差更合。

又方

羚羊角屑 前胡 人參 橘皮 甘草炙，各壹兩

右伍味，㕮咀，以水陸升，煮取貳升，分三服。

卒嗽，八胷頭亦可針。此主實嗽。實嗽者，醉飽得之；虛嗽者，吐下得之，又失血虛後亦得之方。

炭末，蜜和，細細咽少許，即差。

又方

男嗽，女入丁壯氣盛者，噓其肺俞；女子，男子噓之。

痎瘧第二 方二首 針灸法七首 禳法十二首

蜀漆圓 主痎瘧連年不差，服三七日定差方。

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬去心 升麻各伍分 恒山壹兩 石膏貳兩，研 香豉壹合 萎蕤 烏梅肉 鼈甲各壹兩，炙 甘草炙，叁分

右壹拾叁味，擣篩為末，鍊蜜和圓如梧子，空腹飲服拾圓。

日再，加至貳參拾圓。

陵鯉湯 主瘧疾江南瘴瘧方。

陵鯉甲 拾肆枚，炙　鼈甲 壹枚，炙　烏賊魚骨　附子 炮，各壹兩，去皮

恒山 參兩

右伍味，㕮咀，以酒參升漬壹宿，未發前稍稍啜之，勿絕吐之，并塗五心。一日斷食，過時久乃食。

肝瘧，令人色蒼蒼然，太息，其狀若死，刺足厥陰見血。

心瘧，令人心煩甚，欲得清水，寒多不甚熱，刺足少陰，是謂神門。

脾瘧，令人病寒，腹中痛，熱則腸中鳴，鳴已汗出，刺足太陰。

肺瘧，令人心寒，甚熱，間善驚，如有見者，刺手太陰陽明。

腎瘧，令人悽悽，腰脊痛宛轉，大便難，目眴眴然，手足寒，刺足太陽少陰。

胃瘧，令人且病寒，善飢而不能食，支滿腹大，刺足陽明太陰

橫脉出血。

黄帝問岐伯曰。瘧多方少。愈者何。岐伯對曰。瘧有十二種。

黄帝曰。瘧鬼字何。可得聞乎。岐伯對曰。但得瘧字便愈。不得其字。百方不愈。

黄帝曰。瘧鬼十二時。願聞之。岐伯對曰。

寅時發者。獄死鬼所爲。治之以瘧人著窑上灰火。一周不令火滅即差。

卯時發者。鞭死鬼所爲。治之用五白衣燒作灰三指撮。著酒中。無酒清水服之。

辰時發者。墮木死鬼所爲。治之令瘧人上木高危處。以棘塞木奇間即差。

巳時發者。燒死鬼所爲。治之令瘧人坐。師以周匝然火即差。

午時發者。餓死鬼所爲。治之令瘧人持脂火於田中無人處。

以火燒脂令香，假拾薪去即差。

未時發者，溺死鬼所爲。治之令瘧人臨發時三渡東流水即差。

申時發者，自刺死鬼所爲。治之令瘧人欲發時，以刀刺塚上，使得姓字，呪曰：若差，我與汝拔却，即差。

酉時發者，奴婢死鬼所爲。治之令瘧人碓梢上捧上卧，莫令人道姓字，即差。

戌時發者，自絞死鬼所爲。治之左索繩繫其手脚腰頭，即差。

亥時發者，盜死鬼所爲。治之以刀子一口、箭一隻、灰一周，刀安瘧人腹上，其箭橫著底下，即差。

子時發者，寡婦死鬼所爲。治之令瘧人脱衣東廂牀上卧，左手持刀，右手持杖打令聲不絶，瓦盆盛水著路邊，即差。

丑時發者，斬死鬼所爲。治之令瘧人當戶前卧，頭東向，血流頭下即差。

瘧醫並不能救者方。

以繩量病人脚圍，繞足跟及五指一匝訖，截斷繩，取所量得繩置項上，著反向背上，當繩頭處中脊骨上灸三十壯，即定。候看復惡寒，急灸三十壯，即定。比至過發一炊久候之，雖飢勿與食盡日。此法神驗，男左女右。

黃疸第三 論三首 方二十八首 針灸一十法

論曰：凡遇時行熱病，多必內瘀著黃，但用瓜丁散內鼻中，令黃汁出，乃愈，即於後不復病黃矣。常須用心警候病人四肢身面微似有黃氣，須用瓜丁散，不得令散漫失候，必大危矣。特忌酒麪，犯者死。

黃疸，目黃不除，瓜丁散方。

瓜丁細末，如壹大豆許，內鼻中，令病人深吸取入，鼻中黃水出，差。

凡人無故忽然振寒，便發黃，皮膚黃，麴塵出，小便赤少，大便時閉，氣力無異，食飲不妨，已服諸湯，餘熱不除，久黃者，苦參散主之方。

苦參　黃連　黃蘗　黃芩　大黃

瓜丁　葶藶熬，各壹兩

右柒味，擣篩為散，飲服方寸匕，當大吐，吐者日壹服，不吐者日再，亦得下，服藥五日，知，可消息，不知，可更服之。

小半夏湯 治黃疸，小便色不異，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦，噦者。

半夏壹升，洗，去滑　生薑半斤

右貳味，切，以水壹斗，煮取貳升，分再服。壹法，以水柒升，煮取壹升半。

黃疸，身目皆黃，皮肉麴塵出方。

茵陳壹把，切　梔子仁貳拾肆枚　石膏壹斤

右叄味，以水伍升，煮貳味，取貳升半，去滓，以猛火燒石膏令赤，投湯中，沸定，服壹升，覆取汗，周身以粉粉之，不汗更服。

黃疸腹滿，小便不利而赤，自汗出，此爲表和裏實，當下之，宜大黃湯方。

大黃　黃蘗　消石各肆兩　梔子拾伍枚，擘

右肆味，㕮咀，以水陸升，煮取貳升，去滓，下消石，煮取壹升，先食頓服之。

茵蔯湯　主時行黃疸，結熱，面目四肢通黃，乾嘔，大便不通，小便赤黃，以蘗汁，腹痛心煩方。

茵蔯　半夏洗，各貳兩　生薑肆兩，切　大黃貳兩半　芍藥　白术各壹兩半　梔子擘　前胡各叄兩　枳實炙　厚朴炙　黃芩　甘草炙，各壹兩

右壹拾貳味，㕮咀，以水四斗，煮取九升柒合，分十服。

又方　黄蒸汁叁升。頓服即差。

又方　蔓菁子伍升末。服方寸匕。日三。數日驗。

又方

黄蒸　麥麪　猪矢各壹升

右叁味。以水伍升漬一宿。旦絞去滓。服一升。覆取汗出。

大茵蔯湯主內實熱盛發黄。黄如金色。脉浮大滑實緊數者。夫發黄者多是酒客勞熱。食少。胃中熱。或濕毒內熱者。故黄如金色方。

茵蔯壹兩半　大黄　茯苓　前胡　白朮各三兩

黄蘗壹兩半　梔子仁貳拾枚　黄芩　栝樓

枳實炙　甘草炙各貳兩

右壹拾壹味。㕮咀。以水玖升。煮取叁升。分服一升。得快下。三四日愈。

治黃疸病。五年以上不差。但是湯藥。服之即差。差已還發者。

茵蔯（貳斤。淨擇去惡草。切之）

右壹味。以水貳斗。煮取五升。空腹一服二升。日三夜一。隔日更服之。取差止。神驗。

黃疸變成黑疸。醫所不能治方。

土瓜根（擣取汁壹升）

右壹味。頓服之。病當從小便出。

黃黑等疸方

當歸（叄兩） 桂心（陸兩） 乾棗（壹拾柒枚。去核） 麥門冬（壹升。去心）
大黃（壹兩） 茵蔯 黃芩 黃耆（壹本無） 乾薑
茯苓 芍藥 黃連 石膏（碎） 人參
甘草（炙。各貳兩）

右壹拾伍味。㕮咀。以水壹斗。煮取叄升半。分四服。

赤苓散主黑疸身皮大便皆黑方。

赤小豆參拾枚　茯苓陸銖　雄黃壹銖　瓜丁肆銖

女萎陸銖　甘草貳銖炙

右陸味以水參升煮豆茯苓取八合擣四味爲散和半錢匕服之須臾當吐吐則愈亦主一切黃。

茵陳圓主黑疸身體闇黑小便澀體重方。

茵陳壹兩　甘遂壹分　當歸　蜀椒汗各半兩去目閉口

杏仁去皮尖雙仁熬　大黃　半夏洗各參分　葶藶熬

茯苓　乾薑各壹兩　枳實㕮咀熬黃　白朮熬黃各伍分

右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大空腹以飲服參圓日參。

濕疸之爲病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如㹠肝狀其少腹滿者急下之亦

一身盡黃。目黃。腹滿。小便不利方。

礬石伍兩。燒　滑石伍兩。研如粉

右貳味。擣篩爲散。水服方寸匕。日三服。先食服之。便利如血已。當汗出愈。千金以麥粥汁服

風疸。小便數。或黃或白。洒洒惡寒。壯熱。好睡不欲動方。

生艾三月三日取一束。擣取汁。銅器中煎如漆。密封之。勿令洩。　大黃

黃連　凝水石　苦參　葶藶子　栝樓各等分。熬

右陸味。擣篩爲散。以艾煎和爲圓。如梧子。先食飲服伍圓。日三。可至貳拾圓。有熱加苦參。渴加栝樓。小便澀加葶藶。小便多加凝水石。小便黃白加黃連。大便難加大黃。

秦椒散 主膏疸。飲少溺多方。

秦椒壹分。汗　瓜丁半兩

右貳味。擣篩爲散。水服方寸匕。日三。

秦王九疸散方

胃疸食多喜飲梔子人主之

心疸煩心心中熱茜根主之

腎疸脣乾葶藶子主之熬

脾疸尿赤出少惕惕恐栝樓主之

膏疸飲少尿多秦椒瓜蔕主之椒汗膏一作肺

舌疸渴而數便鍾乳主之

肉疸小便白凝水石主之研

髓疸目眶深多嗜臥牡蠣澤瀉主之

肝疸胃熱飲多水激肝白朮主之

右壹拾壹味等分隨病所在加半兩擣篩爲散飲服伍分匕日三稍稍加至方寸匕

論曰夫酒疸其脉浮者先吐之沈弦者先下之酒疸者或無

熱，靖言了了。腹滿欲吐者，宜吐之。酒疸心中熱，欲嘔者，宜吐之。酒疸必小便不利，其候當心中熱，足下熱，是其候也。酒疸下之，久久爲黑疸，目青面黑，心中如啖蒜虀，大便正黑，皮革搔之不仁，其脉浮弱，雖黑微黄，故知之也。

寒水石散 主肉疸，飲少，小便多，白如泔色，此病得之從酒方。

寒水石　白石脂　栝樓各五分　知母　菟絲子

桂心各叁分

右陸味，擣篩爲散，麥粥服五分匕，日三，五日知，十日差。

酒疸，身黄，麴塵出，牛膽煎方。

牛膽壹枚　大黄捌兩　芫花壹升，熬　蕘花半升，熬　瓜丁叁兩

右伍味，以酒壹升，切肆味，漬之一宿，煑減半，去滓，内牛膽，微火煎，令可圓，丸如大豆，服壹丸，日移六七尺不知，更服壹丸，膈上吐，膈下利，或不吐利而瘥。

酒疸心中懊憹。或痛梔子湯方。

梔子拾肆枚擘 枳實參枚炙 大黃貳兩 豉半升

右肆味。㕮咀。以水陸升。煮取貳升。服柒合。日三。

茵蔯湯主黃疸酒疸身目悉黃方。

茵蔯參兩 大黃 黃芩 黃連各貳兩 人參半兩

梔子仁參柒枚 甘草壹兩炙

右柒味。㕮咀。以水壹斗。煮取參升五合。分四服。

半夏湯主酒癖蔭胸心脹滿。肌肉沈重。逆害飲食。小便赤黃。此根本虛勞風冷。飲食衝心。由脾胃客淡所致方。

半夏壹升洗 生薑拾兩切 黃芩壹兩 前胡 茯苓各參兩

當歸 茵蔯各壹兩 枳實炙 大戟 白朮

甘草各貳兩炙

右壹拾壹味。㕮咀。以水壹斗。煮取參升。分參服。

宛轉圓　凡患黃疸，足腫，小便赤，食少羸瘦方。

乾地黃　石斛　白朮各貳兩　牡蠣熬　芍藥

芎藭　大黃　小草　甘草炙，各叁兩

右玖味，擣篩爲散，鍊蜜和圓如梧子，飲服四圓，日三。

茯苓圓　主患黃，心下縱橫結堅，小便赤，是酒疸方。

茯苓　茵蔯　乾薑各壹兩　半夏洗　杏仁去皮尖雙人，熬，各叁分

商陸半兩　甘遂壹分　枳實伍分，炙　蜀椒貳合，汗，去目閉口　白朮伍分，切，熬令變色

右壹拾味，擣篩爲末，鍊蜜和圓如蜱豆，叁圓，以棗湯下之。夫患黃疸，常須服此，若渴欲飲水，即服伍苓散，若妨滿宛轉圓治之，五苓散見傷寒中。

治黃疸小便赤黃方。

前胡　茯苓各壹兩半　椒目壹兩，熬　附子半分，炮，去皮

茵蔯貳兩半　菖蒲貳兩半

右陸味擣篩爲散食以前服一錢匕日三服此劑更參服上二藥

黃疸之爲病日晡所發熱惡寒少腹急體黃額黑大便黑溏泄足下熱此爲女勞也腹滿者難療方

滑石 研　石膏 研各伍兩

右貳味爲散麥粥汁服方寸匕日三小便極利差

灸黃法 貳拾穴

第十一椎下俠脊兩邊各一寸半灸脾俞百壯

兩手小指端灸手少陰隨年壯

手心中灸七壯

胃管主身體痿黃灸百壯治十差忌針

耳中在耳門孔上横梁主黃疸

上腭入口裏邊在上縫赤白脉上是針三鍉

舌下俠舌兩邊針鋥。

頰裏從口吻邊入往對頰裏去口一寸鋥。

上腭裏正當人中及脣針三分鋥。

巨闕　上管

右二穴並七壯。狂言浪走者。灸之差。

寅門從鼻頭直入髮際度取通繩分爲三斷。繩取一分。入髮際當繩頭鋥。鋥字不詳未敢刋正。

脊中椎上七壯。

亟手大指節理各七壯。

中管　大陵　勞宮　三里　然谷　大谿

右八穴皆主黃疸。

論曰。黃疸之爲病若不急救多致於死。所以具述古今湯藥灸鋥方法。按據此無不差也。有人患之。皆昏昧不識好惡。與

茵蔯湯一劑不解。亦有惺惺如常。身形似金色。再服亦然。隔兩日一劑。其黃不變。於後與灸諸穴乃差。瘡上皆黃水出。然此大慎麪肉醋魚蒜韭熱食。犯之即死。

吐血第四　論三首　方三十首

論曰。凡吐血有三種。有內衄。有肺疽。有傷胃。內衄者。出血如鼻衄。但不從鼻孔出。是近心肺間津液出。還流入胃中。或如豆汁。或如衃血凝停胃中。滿悶便吐。或去數升乃至一斗。得之於勞倦飲食過常所為也。肺疽者。或飲酒之後悶吐。血從吐出。或一合半升。傷胃者。因飲食大飽之後。胃中冷則不能消化。便煩悶強嘔。吐之物與氣共上衝蹙傷裂胃口。血色鮮赤。腹中絞痛。白汗出。其脉緊而數者。為難治也。吐之後體中但奄奄然。心中不悶者。輙自愈。假令煩躁。心中悶亂紛紛欲吐。顛倒不安。醫者又與黃土湯阿膠散。益使悶亂。卒至不救。

如此悶者。當急吐之。

吐方

瓜蔕半兩 杜蘅 人參各壹分

右參味。擣篩爲散。服一錢匕。水漿無在。得下而已。羸者小減之。吐去青黃或血二三升。無苦。

生地黃湯 主憂恚嘔血。煩滿少氣。胷中痛方。

生地黃貳斤 大棗伍拾枚擘 阿膠炙 甘草炙各參兩

右肆味。㕮咀。以水陸升。煑取肆升。分爲肆服。日參夜壹。

堅中湯 主虛勞內傷。寒熱頻連。吐血方。

糖參斤 芍藥 半夏洗 生薑各參兩 大棗伍拾枚擘 生地黃壹斤

右陸味。㕮咀。以水貳斗。煑取柒升。分柒服。日三夜一。千金有甘草桂心無地黃。

治噫止唾血方。

石膏碎肆兩。　生薑切　麻黃去節　五味子各貳兩

小麥壹升　厚朴炙　半夏洗　杏仁去皮尖雙仁各參兩

右捌味，㕮咀，以水壹斗，煮麻黃去上沫，內諸藥，煮取貳升五合，分再服。

又方

伏龍肝如雞子大兩枚　乾薑　當歸　桂心

芍藥　白芷　阿膠須漬之　甘草炙。各貳兩　細辛半兩

芎藭壹兩　生地黃捌兩　吳茱萸貳升

右壹拾貳味，㕮咀，以清酒柒升，水參升，合煮取參升半，去滓，內膠煎取參升，分三服，亦治衄血。千金名黃土湯，主吐血。

當歸湯主吐血方

當歸　黃芩各參兩　乾薑　芍藥　阿膠炙。各貳兩

右伍味。㕮咀。以水陸升。煮取貳升。分三服。日二夜一。

伏龍肝湯 主吐血并衄血方。

伏龍肝半升　乾地黃　乾薑　牛膝各貳兩　阿膠炙

甘草炙，各叁兩

右陸味。㕮咀。以水壹斗。煮取叁升。去滓。內膠。分三服。

澤蘭湯 主傷中裏急。胸脇攣痛。頻嘔血。時寒時熱。小便赤黃。此傷於房者方。

澤蘭　糖各壹斤　桑白皮叁斤，根者　生薑伍兩

麻仁壹升　人參　桂心各叁兩　遠志貳兩，去心

右捌味。㕮咀。以淳酒壹斗伍升。煮取柒升。去滓。內糖。未食服壹升。日三夜一。勿勞動。

竹茹湯 主吐血汗血。大小便出血方。

淡竹茹貳升　當歸　黃芩　芎藭

甘草炙各半兩 人參 芍藥 桂心

白朮各壹兩

右玖味。㕮咀。以水壹斗。煑取三升。分四服。日三夜一。

治吐血唾血。或勞發。或因酒發方。

當歸 羚羊角屑 乾地黃 小薊根 柏枝炙

阿膠炙 乾薑各叁兩 白芍藥 白朮各肆兩 伏龍肝如雞子研

亂髮如雞子燒 竹茹壹升 蒲黃伍合 甘草貳兩炙。

右壹拾肆味。㕮咀。以水貳斗。煑取五升五合。去滓。下膠消盡。下髮灰蒲黃。分五服。

吐血百治不差。療十十差。神驗不傳方。

地黃汁半升 大黃生末一方寸七

右貳味。煎地黃汁三沸。內大黃末調和。空腹服之。日三。血即止。神良。

治吐血方。

服桂心末方寸匕。日夜可二十服。

治身體暴血鼻口耳目九孔皮膚中皆漏血方。

取新生犢子未食草者。有屎暴乾燒末。水服方寸匕。日四五服。立差。

生地黃湯 主衄血方。

生地黃 黃芩各壹兩 柏葉壹把 阿膠炙 甘草各貳兩，炙

右伍味。㕮咀。以水柒升。煮取叁升。去滓內膠煎取二升五合。分三服。

又方

生地黃叁斤，切 阿膠貳兩，炙 蒲黃陸合

右叁味。以水伍升。煮取叁升。分三服。

治鼻口瀝血三升。氣欲絕方。

龍骨細篩。一棗核許。微以氣吹入鼻中即斷。更出者。再吹之。取差止。

又方

細切葱白。擣絞取汁。瀝鼻中一棗許。即斷。慎酒肉五辛熱麪生冷等。

阿膠散主衄血不止方。

阿膠（炙）　龍骨　當歸　細辛　桂心（各壹兩）

蒲黃（伍合）　亂髮（叁兩燒灰）

右柒味。擣篩為散。先食飲服方寸匕。日三服。三劑差。亦可蜜圓酒服。

伏龍肝湯主鼻衄。五藏熱結。或吐血衄血方。

伏龍肝（雞子大壹枚）　生地黃（壹斤切）　生竹茹（壹升）

芍藥　當歸　黃芩　芎藭　桂心

甘草炙各貳兩

右玖味，㕮咀，以水壹斗叁升，煑竹茹減三升，內藥煑取三升，分三服。千金無桂心

乾地黃圓主失血虛勞，胸腹煩滿痛，血來藏虛，不受穀，嘔逆不用食，補中治血方。

乾地黃叁兩　厚朴炙　乾漆熬　枳實炙　乾薑

防風　大黃　細辛　白朮各壹兩　前胡壹兩半

人參　茯苓各伍分　蝱蟲去翅足熬　䗪蟲熬各拾伍枚　當歸

黃芩　麥門冬去心　甘草炙各貳兩

右壹拾捌味，擣羅爲末，鍊蜜和圓如梧子，先食酒服五丸，日二。

論曰：凡下血者，先見血後見便，此爲遠血，宜服黃土湯；先見便後見血，此爲近血，宜服赤小豆當歸散。人病雖一，得病之

始不同。血氣強弱。堪否次第。是以用藥制方。隨其淺深。取其能堪。爲方不一。各取所宜也。

黃土湯方

竈中黃土半斤　甘草炙　乾地黃　白朮
附子炮去皮　阿膠　黃芩各叁兩

右柒味。㕮咀。以水捌升。煑取貳升。分溫三服。亦主吐血。

赤小豆當歸散方

赤小豆叁升浸令芽出暴乾　當歸叁兩

右貳味。擣篩爲散。漿服一方寸匕。日三。

續斷止血湯 主先便後血。此爲近血方。

續斷　當歸　阿膠炙　桔梗　桂心各叁兩
芎藭　乾薑　乾地黃各肆兩　蒲黃壹升　甘草壹兩炙

右壹拾味。㕮咀。以水壹斗。煑取伍升伍合。去滓。下膠消盡。入蒲黃。分爲三服。

伏龍肝湯主先見血後便。轉此爲遠血方。

伏龍肝伍合。研 乾地黃伍兩 髮燒屑貳合 阿膠炙叁兩。

黃芩 乾薑 牛膝 槲脉炙

甘草各貳兩炙

右玖味。㕮咀。以水壹斗。煑取三升。去滓。下膠及髮屑消盡分三服。

下血方

牛角䚡炙 當歸 龍骨 乾薑 熟艾各叁兩

蜀椒壹兩。去閉口者。汗目 黃連伍合 升麻壹兩半 大棗貳拾枚擘

附子炮去皮。壹枚 黃蘗 芎藭 阿膠炙

厚朴炙 赤石脂 芍藥 石榴皮 甘草各貳兩炙

右壹拾捌味。㕮咀。以水壹斗伍升。煑取四升。去滓。內牛角䚡末阿膠消。以綿絞去滓。分七服。日四夜三。千金有橘皮。

治小便出血方

龍骨細粉末之。溫湯服方寸匕。日五六服。

又方　以酒叁升。煑當歸四兩。取壹升。頓服之。

治尿血方

車前葉切伍升。水壹斗。煑百沸。去滓。內米煑爲粥服之。

凡憂恚絶傷。吐血胷痛虛勞地黃煎方。

生地黃伍斤擣絞取汁

右壹味。微火煎三沸。內白蜜壹升。又煎三沸。服之。日三。

治亡血脫血。鼻頭白色。脣白。去血無力者方。

生地黃拾斤

右壹味。擣。以酒壹斗。絞取汁。令極盡。去滓。微火煎。減半。內白蜜伍升。棗膏壹升。以攪之。勿止。令可丸。下之。酒服如雞子壹圓。日叁。又服不已。老而更少。萬病除愈。

論曰：凡亡血、吐血、衄血愈後，必須用此二方補服三四劑，乃可平復。不爾，恐有大虛。及婦人崩中血，亦同此方。

胃中熱第五 方二十七首

寒水石湯 主身中大熱，胃心煩滿毒熱方。

寒水石伍兩　澤瀉　茯苓　前胡　黃芩各叁兩
柴胡　牛膝　白朮　甘草炙，各貳兩　杏仁貳拾枚，去皮尖雙仁

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗，煮取貳升，分叁服。

治熱氣上衝，不得息，欲死不得眠方。

白薇　檳榔　白石英研　枳實炙　白鮮皮
麥門冬去心　郁李仁去皮　貝母各貳兩　天門冬去心　桃仁伍拾枚，去皮尖雙仁，熬
車前子　茯神各貳兩　人參　前胡　杏仁去皮尖雙仁，熬
橘皮各壹兩半　桂心半兩

右壹拾柒味，擣篩為末，鍊蜜和圓如梧子大，竹葉飲下十

圓。日貳服，加至叁拾圓。

竹葉飲子方

竹葉切　紫蘇各壹升　紫菀　白前　甘草炙，各貳兩
百部貳兩　生薑切，叁兩。

右柒味，㕮咀，以水壹斗，煮取叁升，溫以下圓，盡更合。

龍膽圓

主身體有熱，羸瘦不能食方。

龍膽　苦參　黃連　黃芩各貳兩　大黃叁兩
黃蘗　李子仁去皮　栝樓　青葙子各壹兩

右玖味，擣篩為末，鍊蜜和圓如梧子大，先食飲服柒圓，日二，不知增之。

升麻湯

主強壯身有大熱，熱毒流四肢，骨節急痛，不可忍，腹中煩滿，大便秘澀，無聊賴方。

升麻　枳實炙　梔子仁　黃芩各叁兩　香豉壹升

大黃肆兩 杏仁壹升，去皮尖雙仁 生薑肆兩，切 生地黃拾兩

人參 甘草炙，各貳兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗貳升，煮取三沸，去滓，內藥煮取叄升半，分四服，日三夜一。又主歷節腫。

又方

升麻 大黃各肆兩 前胡 梔子各叄兩

右肆味，㕮咀，以水玖升，煮取叄升，分三服。

含消圓 主胷中熱，口乾方。

茯苓 五味子 甘草炙，各壹兩 烏梅去核 大棗去核，各貳柒枚

右伍味，擣篩爲散，別擣梅棗令熟，乃合餘藥，更和擣五百杵，圓如彈子大，含之，咽汁，日三夜二，任性分作小圓。

半夏湯 主胷中客熱，心下煩滿，氣上，大小便難方。

半夏洗 生薑各捌兩，切 前胡 茯苓各肆兩 白朮伍兩

黃芩壹兩　杏仁去皮尖雙仁熬　枳實炙各叁兩　人參　甘草炙各貳兩

右壹拾味。㕮咀。以水壹斗。煮取叁升。旦服。若胸中大煩熱者。冷服。大便難澀者。加大黃叁兩。

前胡湯主胸中逆氣痛徹背。少氣不食方。

前胡　半夏洗　芍藥　甘草炙各貳兩　桂心各壹兩

生薑切三兩　黃芩　人參　當歸各壹兩　大棗叁拾枚去核

竹葉切壹升

右壹拾壹味。㕮咀。以水壹斗。煮取三升。分三服。

又方

前胡　人參　生薑切　麥門冬去心　餳各叁兩

桂心　黃芩　當歸各壹兩　大棗叁拾枚去核

半夏洗　茯苓　芍藥　甘草炙各貳兩

右壹拾叁味。㕮咀。以水壹斗肆升。煮取叁升。分三服。

前胡湯主寒熱嘔逆，少氣，心下堅，彭亨滿，不得食，寒熱消渴，補不足方。

前胡　朴消　大黃　黃芩　甘草炙，各貳兩

茯苓　當歸　半夏洗　芍藥　滑石

石膏碎　栝樓　附子炮，去皮　麥門冬去心　人參各壹兩

生薑貳兩，切

右壹拾陸味，㕮咀，以水壹斗貳升，煑取陸升，分陸服。

前胡建中湯主大勞虛劣，寒熱嘔逆，下焦虛熱，小便赤痛，客熱上熏，頭痛目赤，骨內痛及口乾，皆悉主之方。

前胡叁兩　芍藥　當歸　茯苓　桂心各肆兩

人參　生薑切　白糖　半夏洗　黃耆各陸兩

甘草炙，壹兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗貳升，煑取四升，去滓，內糖，分

爲肆服。

厚朴湯主腹滿。發熱數十日方。

厚朴炙捌兩。　枳實炙伍枚。　大黃肆兩

右叁味。㕮咀。以水壹斗貳升。煮取伍升。內大黃煮取三升。分三服。主腹中熱。大便不利。

五石湯主骨間熱。熱痛。間不除。煩悶。口中乾渴方。

寒水石　滑石　龍骨　牡蠣熬　栝樓

赤石脂　黃芩　甘草炙各叁分　知母　桂心

石膏　大黃各叁分

右壹拾貳味。擣麤篩之。以水七升。煮取叁升。分四服。日三夜一。

竹葉湯主五心熱。手足煩疼。口乾脣乾。胸中熱方。

竹葉切　小麥壹升　人參壹兩半　石膏碎叁兩。　生薑切伍兩。

知母　黄芩　茯苓　麥門冬去心各貳兩。
括樓　半夏洗　甘草炙各壹兩
右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗貳升。煑竹葉小麥取捌升。去滓。内諸藥煑取叁升。分三服。

犀角湯 主熱毒流入四肢。歷節腫痛方。

犀角貳兩屑　羚羊角壹兩屑　豉壹升　前胡
梔子擘　黄芩　射干各叁兩　大黄　升麻各肆兩
右玖味。㕮咀。以水壹斗。煑取三升。分三服。

承氣湯 主氣結胸中。熱在胃管。飲食嘔逆方。

前胡　梔子炙　桂心　寒水石　大黄
知母　甘草炙各壹兩　消石　石膏　栝樓各貳兩
右壹拾味。擣篩爲散。以水貳升。煑藥五方寸匕。取壹升五合。分貳服。

半夏湯主逆氣，心煩滿，嘔吐氣方。

半夏洗　生薑斤各壹　茯苓　桂心各伍兩

右肆味，㕮咀，以水壹升，煑取叁升，分三服，日三服。若少氣加甘草貳兩。一名小茯苓湯。

療熱骨蒸羸瘦，煩悶短氣，喘息兩鼻孔張，日西即發方。

龍膽　黄連　括樓兩各壹　梔子枚貳拾　青葙子

苦參　大黄　黄芩　芍藥　芒消各半兩

右壹拾味，擣篩為末，鍊蜜和丸，如梧子大，飲服十丸，日二。以知為度。

療積年久患熱風方。

地骨皮　萎蕤　丹參　黄耆　澤瀉

麥門冬去心，各叁兩。　清蜜　薑汁合各壹　生地黄汁升貳

右玖味，㕮咀，以水陸升，煑藥減壹升，內蜜薑汁，煑兩沸，壹

服三合。日再。大驗。

又方

羚羊角屑伍兩 生葛 梔子各陸兩 豉綿裹壹升。

黃芩 乾薑 芍藥各叁兩 鼠尾草貳兩

右捌味。㕮咀。以水柒升。煑取二升半。分三服。

又方

枳實炙叁兩。 黃連貳兩 黃芩 芒消各叁兩

右肆味。擣篩爲末。錬蜜和圓。如梧子。飲服叁拾圓。日二。稍加至四十九。

生地黃煎主熱方。

生地黃汁肆升 生地骨皮 生天門冬去心

生麥門冬汁 白蜜各壹升 竹葉切 生薑汁各叁合

石膏捌兩碎。 栝樓伍兩 茯神 萎蕤 知母各肆兩

右壹拾貳味。㕮咀。以水一斗二升。先煮藥。取三升。去滓。內地黃麥門冬汁。微火煎五沸。次內蜜薑汁煎。取六升。下之。服四合。日二夜一。稍加至五六合。

治膈上熱方。

茯苓　麥門冬去心　甘草各壹斤炙　生地黃陸拾斤切

右肆味。擣三味為散。內地黃合擣。暴乾。擣篩為散。酒服方寸匕。日三。候食了服之。久服補益明目。

治腹中虛熱。舌本強直。頸兩邊痛。舌上有瘡。不得咽食方。

柴胡　升麻　梔子仁　芍藥　通草各肆兩

黃芩　大青　杏仁各參兩　生薑切　石膏各捌兩碎

右壹拾味。㕮咀。以水壹斗二升。煮取六升。分六服。

頭痛身熱及熱風方。

竹瀝　升麻各參升　防風　生薑切　杏人去皮尖雙仁各參兩

芍藥　柴胡各肆兩　石膏碎　生葛各捌兩

右玖味。㕮咀。以水壹斗。煑取四升。分四服。日三夜一服。以差爲度。

治膈上熱方。

苦參拾兩　玄參叁兩　麥門冬去心　車前子各叁兩

右肆味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子。以飲服十五圓。日二。食後服。

壓熱第六　方壹拾叁首　論壹首

金石凌主服金石熱發。醫所不制。服之立愈方。

上朴消壹斤　上芒消壹斤　石膏肆兩　凝水石貳兩

右肆味。熟沸水伍升。漬朴消芒消。令消澄一宿。旦取澄消。安銅器中。麤擣寒水石石膏。內其中。仍内金五兩。微火煎之。頻以筋頭柱看。著筋成凌雲。瀉置銅器中。留著水盆中。

凝一宿。皆成凌。停三日以上。皆乾也。若熱病及石發。皆以蜜水和服半雞子大。

七水凌主大熱及金石發動。金石凌不制者。服之方。

朴消伍斤　芒消叁斤。如雪者佳　滑石壹斤半　玉泉石壹斤

石膏壹斤　鹵鹹伍斤。如麥者　凝水石壹斤。如雪者

右柒味。各別擣麤篩。

凍凌水伍升　霜水壹升　雪水壹升　露水伍升半

寒泉水伍升　雨水壹升　東流水伍升半

右柒味。澄令清。銅器中內上件七味。散極微火煎取柒升。一宿澄清。內瓷坩中。淨處貯之。以重帛繫口。一百二十日。皆如凍凌狀。成如白石英。有八棱。成就或大如箸。有長一尺者。名曰七水凌。有人服金石發熱者。以井華水和五分匕服之。一。服極熱。即定。傷寒發熱服一刀圭。小兒發熱與

麻子許。不可多用。神驗。買藥不得爭價。皆上好者。合藥以臘月臘日爲上。合時以清淨處。先齋七日。不履穢汙喪孝産婦之家。及不得令雞犬六畜生婦六根不完具及多口饒言人見之。不信敬人勿與服之。服藥得熱退之後七日。乃愼酒肉五辛等物。勿復喜惡口刑罰。仍七日齋戒持心清淨。

紫雪主脚氣毒遍內外煩熱。口生瘡。狂叫走。及解諸石草熱藥毒發。卒熱黃等瘴疫毒最良方。

金壹斤　寒水石　石膏　磁石各參斤並碎

右肆味。以水壹石煮取肆斗。去滓。內後藥。

升麻壹升　玄參壹斤　羚羊角屑　青木香

犀角屑　沈香各伍兩　丁香肆兩　甘草捌兩炙。

右捌味。㕮咀。於汁中煮取一斗。去滓。內消石四升。朴消精

者四升。於汁中煎取柒升。投木器中。朱砂粉三兩。麝香粉半兩。攪令相得。寒之二日。成於霜雪紫色。強人服三分匕。服之。當利熱毒。老小以意增減用之。一劑可十年用之。

玄霜。主諸熱風熱氣熱瘴熱瘧惡瘡毒內入攻心熱悶。服諸石藥發動。天行時氣溫疫熱入腑藏。變成黃疸。蛇螫虎齧狐狼毒所咬。毒氣入腹內攻心熱。須利病出。用水三四合和一小兩。攪令消。服之兩炊久。當快利兩行即差。小兒熱病服棗許大即差方。

金伍拾兩　寒水石陸斤。研如粉　磁石叁斤。碎　石膏伍斤。碎

右肆味。以兩斛水煮取六斗。澄清。

升麻　玄參各壹斤　羚羊角捌兩　犀角肆兩

青木香肆兩　沈香伍兩

右陸味。切。內上件汁中。煮取二斗。澄清。

朴消末　芒消各陸升　麝香當門子壹兩，後入。

右叁味，內汁中漬一宿，澄取清銅器中微微火煎，取壹斗二升，以匙抄看，凝即成，下經一宿，當凝為雪，色黑耳。若猶濕者，安布上日乾之。其下水更煎，水凝即可停之。如初畢，密器貯之。此藥無毒，又主毒風、脚氣、熱悶赤熱腫，身上熱瘡，水漬少許綿貼取點上，即差。煩與兩服，病膈上熱，食後服；膈下熱，空腹服之。卒熱淋，大小便不通，服一兩，凡有患熱者，皆宜服之。

論曰：凡諸霜雪等方，皆據曾服金石大藥，藥發猛熱，非諸草藥所能制者，則用之。若非金石發者，則用草藥等湯散方制之，不得雷同用霜雪方。若用之，則傷於太冷，於後腰脚疼痛，乃更後為所患，宜消息之。

虛煩心悶方

竹葉湯：主胃虛陽氣外蒸，洩津液，口乾體吸吸，苦渴，氣喘嘔

逆涎沫相連方。

竹葉伍升，切　小麥壹升　麥門冬一升，去心　知母

茯苓各叁兩　石膏四兩，碎　芍藥　栝樓

澤瀉　人參　甘草各二兩，炙

右壹拾壹味，㕮咀，以水二斗，煮竹葉小麥取一斗，去滓，內藥煮取肆升，八分四服。

厚朴湯　主久積痰冷，胸脇痞滿，不受食飲，渾渾欲吐，血室空虛，受客陽，通之令脉緊數，重熱水蒸，汗漏如珠，四肢煩痛，脣口乾燥，渴，升水漿方。

厚朴炙　半夏洗　茯苓　白术各四兩　枳實四枚，炙

芍藥　黃耆各二兩　生薑八兩，切　麥門冬一升，去心

桂心伍合　人參　甘草各二兩，炙

右壹拾貳味，㕮咀，以水一斗伍升，煮取五升，八分四服。

竹葉湯主下氣，胸中煩悶，悶亂氣逆，補不足方。

竹葉壹把　粳米　麥門冬去心　半夏洗，各一升　人參

當歸各二兩　生薑壹斤，切

右柒味，㕮咀，以水壹斗伍升，煮竹葉生薑取一斗，內諸藥，煮取八升，分十服，日三夜二。一云水八升，煮取二升半，服八合。

烏梅湯主下氣，消渴，止悶方。

烏梅二柒枚，大者　香豉壹升

右貳味，以水壹斗，煮烏梅取五升，去滓，內豉煮取二升，分三服，可常用之。

大酸棗湯主虛勞煩悸，奔氣在胸中，不得眠方。

酸棗仁伍升　人參　茯苓　生薑切

芎藭　桂心各二兩　甘草炙，一兩半

右七味，㕮咀，以水一斗二升，煮棗仁取七升，去滓，內諸藥，

煑取叁升。分三服。

大棗湯主虛煩。短氣。氣逆。上熱下冷。胷滿方。

大棗叁拾枚擘　石膏叁兩碎　白薇　前胡
人參　防風各二兩　桂心　甘草各壹尺炙

右捌味。㕮咀。以水柒升。煑取三升。分三服。

竹根湯主短氣。氣欲絕。不足以息。煩擾。益氣止煩方。

竹根一斤　小麥　粳米　麥門冬各壹升去心
大棗拾枚擘。　甘草二兩炙。

右陸味。㕮咀。以水壹斗。煑米麥令熟。去之。內諸藥。煑取二升七合。分三服。日三。不能服者。以綿瀝口中。

酸棗湯主傷寒及吐下後。心煩乏氣。不得眠方。

酸棗仁四升　麥門冬壹升去心　乾薑　芎藭
茯苓　知母　甘草各貳兩炙

右柒味。㕮咀。以水壹斗貳升。煮棗仁取壹斗。去之。内諸藥。煮取叁升。分三服。

白薇散 主虛煩方

白薇　乾薑　甘草各壹兩　栝樓貳兩

消石叁兩

右伍味。各別擣。先内甘草臼中。次内白薇。次内乾薑。次内栝樓。次内消石。擣三千杵。篩。和冷水服方寸匕。日三。

千金翼方卷之十八

千金翼方卷第十九

雜病中

消渴第一　方二十二首

葵根湯主一年渴飲一石以上，小便利。若飲酒渴，傷寒渴，皆悉主之方。

霜下葵根皮壹握長肆寸

右一味，以水一斗，煮取三升，分三服，取差止。

又方

栝樓根　甘草炙各貳兩　黃連壹升

右三味，㕮咀，以水五升，煮取二升五合，分三服。

茯苓湯主胃反吐而渴方。

茯苓捌兩　澤瀉肆兩　生薑切　桂心

白朮各叁兩　甘草壹兩炙。

右六味，㕮咀，以水一斗，煮小麥三升，減二升，去麥，內諸藥，煮取二升五合，服八合，日再。

消渴師所不能治之方。

生栝樓（玖斤，去皮，細切，搗絞汁令盡）　上好黃連（玖兩，搗絹羅為末）

右二味，以上件汁溲黃連如硬麪，細擘，日暴令乾，搗之絹篩，更溲如前，日暴，搗一依前法，往反汁盡，暴乾搗篩，鍊蜜和，飲服如梧子十丸，日三，加至三十丸，病愈止，百日慎生冷、醋滑、酒、五辛、肉、麪、油膩，永差。無生者，乾者九斤，切，以水二斗煎取一斗，和之如生者法。

桑根湯　主日飲一石水方。

桑根白皮（切伍升，入地叁尺者良，炙令黃黑）

右一味，以水與根，亦不限多少，煮以味濃為度，適寒溫飲之，任性多少，切慎鹽。

猪肚圓治消渴方。

猪肚壹枚。治如食法 黄連伍兩 栝樓肆兩 麥門冬肆兩。去心

知母肆兩。無以茯神代

右伍味。爲散。内猪肚中。線縫。安置甑中。蒸之極爛熟。接熱木臼中擣可丸。若硬加少蜜和丸。如梧子。飲服叁拾丸。日再。漸加至肆拾伍拾圓。渴即服之。

葛根圓主消渴方。

葛根 栝樓各叁兩 鉛丹貳兩 附子壹兩。去皮

右四味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子。飲服十圓。日三服。治日飲壹石水者。春夏減附子。

大黄圓主消渴小便多。大便秘方。

大黄壹斤 栝樓 土瓜根各捌兩 杏人五合。去皮尖雙人。熬

右肆味。破大黄如碁子。冷水漬一宿。蒸暴乾。擣篩爲末。鍊

蜜和圓如梧子大。以飲服伍圓。日叁。以知為度。

酥蜜煎 主消渴方。

酥壹升　白蜜叁升　芒消貳兩

右三味。合煎。欲渴即啜之。日六七。益氣力。神效。

羊髓煎 主消渴。口乾濡咽方。

羊髓貳合。無即以酥代之　白蜜貳合　甘草壹兩炙切

右叁味。以水叁升。煮甘草取壹升。去滓。內蜜髓煎。令如飴。含之。盡復含。

酥蜜煎 主諸渴方。

酥壹升　蜜壹升

右貳味。合煎。令調和。一服貳升。當令下利。藥出。明日更服壹升。後日更服壹升。即瘥。慎酒及諸鹹等。

茯苓煎 主諸消渴方。

茯苓貳斤　白蜜肆升

右貳味。於銅器中。重釜煎。以兩莖薤白爲候。黃即煎熟。先食服如雞子大。日三。

防己散　主消渴。肌膚羸瘦。或乃轉筋。不能自止。小便不禁。悉主之方。

木防己壹兩　栝樓　鈆丹　黃連各貳兩

右肆味。擣篩爲散。先食。以苦酒壹升。以水貳升合。爲漿服方寸匕。日三服。訖。當強飲。極令盈溢。一日再服。則憎水。當不欲飲也。

大渴百方療之不差方。

鈆丹　胡粉各半兩　栝樓　甘草炙各貳兩半

澤瀉　石膏　赤石脂　白石脂各伍分

右捌味。擣篩爲散。水服方寸匕。日三。壯人壹匕半。壹年病

一日愈。二年病二日愈。渴甚者夜兩服。腹痛者減之。圓服亦佳。一服十圓。傷多則腹痛也。

治口乾燥方。

酸棗壹升半去核　酸石榴子伍合末　烏梅伍拾枚去核
麥門冬肆兩去心　茯苓叄兩半　覆盆子　葛根各叄兩
石蜜肆兩　桂心壹兩陸銖　栝樓叄兩

右壹拾味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如酸棗大。含之。不限時節。以口有津液爲度。忌如藥治。

三黃圓　王男子五勞七傷。消渴。不生肌肉。婦人帶下。手足寒熱方。巴郡太守奏

春三月　黃芩肆兩　大黃叄兩　黃連肆兩
夏三月　黃芩陸兩　大黃壹兩　黃連柒兩
秋三月　黃芩陸兩　大黃貳兩　黃連叄兩

冬三月 黃芩 叁兩 大黃 伍兩 黃連 貳兩

右叁味，隨時合擣爲末，鍊蜜和如大豆，飲服伍圓，日叁，不知稍增至柒圓，服一月病愈，久服行及奔馬，嘗試有驗。

鉛丹散 主消渴方。

鉛丹 貳兩 栝樓 捌兩 茯苓 甘草 炙，各壹兩半 麥門冬 捌兩，去心。

右伍味，擣篩爲散，旦以漿服方寸匕，日貳。

膀胱冷，小便數多，每至夜偏甚方。

雞腸 伍具，治如食法 羊腎 壹具，去脂，並乾爲末 赤石脂 陸兩

龍骨 叁兩 蓯蓉 肆兩 黃連 伍兩 桂心 貳兩

右柒味，擣篩爲散，酒服方寸匕，半日再服，伍日中可作羊湯炙一劑，十日外可作羊肉臛，香味如常，食飽與之。

尿煮牡蠣，主內消，小便數方。

牡蠣 熬，伍兩。

右壹味。以患人尿叁升。煮取貳升。分再服。

治渴利方。

豆壹升。醋拌蒸。暴乾。叁拌叁暴叁蒸。熬　黃連壹斤。如金色者

右貳味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子。飲服叁拾圓。日貳。稍加至肆拾圓。神驗。

大病後虛羸不足成渴方。

取柒歲以上。伍歲以下。黃牛新者乳壹升。以水肆升。煎取壹升。適寒温。稍稍飲之。不得過多。拾日服之不任佳。一云渴即飲。不限多少。

又方

取自死雞大者壹枚。以叁升半白湯捉脚。到細細淋之。叁柒遍。拔毛。置於湯中。毛盡去毛。取汁澄清湯。即任性飲之。飲盡即愈。其雞故殺作藥不過柒日。其病倍發。以後百藥

不可差。慎之慎之。

栝樓散主消渴。延年益壽方。

栝樓　枸杞根　赤石脂　茯苓各壹兩半　天門冬貳兩半，去心。

牛膝　乾地黃各叁兩　桂心　菊花

麥門冬去心　菖蒲　雲母粉　澤瀉　卷柏

山茱萸　遠志去心　五加皮　杜仲炙　瞿麥

續斷　石斛　黃連　柏人　石韋去毛

忍冬各壹兩　菟絲　車前子　蛇牀子　巴戟天

鍾乳研　署預　甘草炙，各伍分

右叁拾貳味。擣篩為散。酒服方寸匕。日叁。亦可圓服。拾圓。日叁。

淋病第二　方二十首

治血淋熱淋方。

以韭菜莖燒令熱。以手熟挼熱掩尿處。冷即易之。可六七度差。

治熱淋方。

白茆根肆斤

右壹味。切。以水壹斗伍升。煮取伍升。每服壹升。日參夜貳。

治石淋方。

車前子貳升。絹袋貯。以水捌升。煮取參升。頓服之。須臾當下石子。宿勿食。服之良。

又方

常煮冬葵根作飲服之。石出。

關格不通方。

芒消伍兩　芍藥肆兩　杏仁肆兩。去皮尖雙人

麻子仁參兩　枳實炙壹兩。　大黃半斤　乾地黃貳兩

右柒味。㕮咀。以水柒升。煮取叁升。分叁服。一方用烏梅榆白皮各伍兩。無枳實地黃。

治淋方。

車前子壹把　榆白皮壹握　亂髮如雞子大。燒之取灰。

右叁味。以水陸升。煮取叁升。分再服。

又方

黃芩肆兩

右壹味。㕮咀。以水伍升。煮取貳升。分叁服。亦主下血。

治淋方。

榆白皮切。壹升　車前子切。伍升　葵子壹升　滑石捌兩

通草捌兩　赤蜜壹升

右六味。㕮咀。以水叁斗。煮取柒升。去滓。下蜜更煎取叁升。分叁服。

治尿白稠方。

露蜂房燒灰。服方寸匕。煑汁服。亦佳。

治小便不通方。

滑石貳兩　葵子壹兩　榆白皮壹兩

右參味。爲散。濃煑麻子汁壹升半。取壹升。以貳方寸匕和服。兩服即通。

治小便不通方。

內薑黃末如豆許大小便孔中即通。

又方

通草　豬苓去皮　桑白皮略

右參味。㕮咀。以水陸升。煑取貳升。分貳服。

治丈夫女人胞轉。不得小便八九日方

滑石壹斤　寒水石碎壹兩　葵子壹升

右參味。以水壹斗。煑取伍升。盡服即利。

又房散主小便多或不禁方。

菟絲子貳兩　蒲黃叁兩　黃連叁兩　消石壹兩　肉蓯蓉貳兩

右五味，并雞肶胵中黃皮叁兩為散，服方寸匕，日叁，行叁肆里又服。壹方用五味子叁兩。

治小便不利，膀胱脹，水氣流腫方。

水上浮萍乾末，服方寸匕，日三。

治小便不禁，多日便壹貳斗，或如血方。

麥門冬捌兩，去心　蒺藜子貳兩　甘草壹兩，炙　乾薑肆兩

桂心貳兩　乾地黃捌兩　續斷貳兩

右柒味，㕮咀，以水壹斗，煑取貳升伍合，分叁服。

又方

鹿茸長叁寸，炙　躑躅壹升　桂心壹尺　韭子壹升

附子叁枚，炮，去皮　澤瀉叁兩

右陸味。爲散。服伍分匕。日二。稍加至壹寸匕。漿水服之。差。

治大小便不通。

當歸叁斤　大戟壹斤　牛膝叁斤

右叁味。切。以水伍升。煑取貳升。以大豆伍升。煎令汁盡。豆乾。初服叁枚。以通爲度。

濡藏湯　主大小便不通六七日。腹中有燥屎。寒熱煩迫短氣。汗出腹滿方。

生葛根貳斤　猪膏貳升　大黃壹兩

右叁味。㕮咀。以水柒升。煑取伍升。去滓。內膏煎取三升。澄。強人頓服。羸人再服。

霹靂煎方。

好濃酒壹盞　鹽壹大戔

右貳味。和於鐺內。文火煎。攪勿住手。可圓。得就鐺圓如小

蘸大肉肛腸中。不過叁。必通。如不通者。數盡也。神效。酒當作窨。

水腫第三 方二十六首 并五不治證

凡水腫有五不治。

一面腫蒼黑。是肝敗不治。　二掌腫無文理。是心敗不治。

三腹腫無文理。是肺敗不治。　四陰腫不起。是腎敗不治。

五臍滿腫反者。是脾敗不治。

猪苓散 主虛滿。通身腫。利三焦。通水道方。

猪苓去皮　茯苓　葶藶熬　人參　五味子

防風　澤瀉　狼毒　玄參　乾薑

白朮　桂心　椒目　大戟　遠志去心

甘草炙各半兩　女麴叁合熬　小豆貳合　蓯蓉貳分半

右壹拾玖味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日叁。夜壹。老小服壹錢匕。日叁。以小便利爲度。

治百病諸荒邪狂走，氣痞冷病，歷年黃黑，大腹水腫，小兒丁奚瘧疾經年，霍亂中惡蛊尸及暴疾，皆悉主之方。

芫青　巴豆去心皮熬　斑猫各參拾枚去翅足熬　天雄炮去皮

乾薑各半兩　烏頭炮去皮　細辛　蜀椒汗去目閉口者

附子炮去皮　躑躅　黃芩　桂心各壹兩

右壹拾貳味，細切，以絹袋中盛，酒壹斗漬拾日，去滓，服半合，日參，以知為度。暴滓作散，酒服半錢匕，日參，强人壹錢。傷寒冬中溫濕冷，頭痛拘急，寒熱瘧發，頭風，皆消，服壹錢匕。厚覆取汗，初服當吐清汁三四升許，又主心疝，婦人無子。服之煩悶不堪者，飲冷水壹升即解。

蒲黃酒，主通身腫，此風虛水氣，亦主暴腫方。

蒲黃　小豆　大豆各壹升

右參味，以酒壹斗，煑取參升，分參服。

商陸酒主風水腫方。

取商陸切壹升。以酒貳升。漬參宿。服壹升。當下。下者減之。從半升起。日參盞。更合服。

又方

取大豆壹升。以水肆升。煑取貳升。去滓。内上酒壹升。合煎取壹升。隨能杯飲之。日參服。常令有酒勢。

茯苓圓 主水脹。大甄主簿與庾公處得效方。

茯苓　白朮　椒目各壹兩　葶藶子壹兩半。熬

桂心參分　芒消　澤瀉　木防已各伍分

甘遂參分　赤小豆　前胡　蕘花各半兩。熬。千金作芫花

右壹拾貳味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子。蜜湯服伍圓。日壹。稍加。以知爲度。

漢防已煑散 主水腫上氣方。褚澄秘之

漢防已　澤漆葉　石韋去毛　桑白皮
澤瀉　丹參　茯苓　橘皮
白朮各叁兩　生薑拾兩切　郁李仁伍兩　通草壹兩

右壹拾貳味，擣篩爲散，以水壹升，煑取捌合，內肆方寸匕，煑取捌合，頓服，日貳，小便利爲度。

第一之水，先從面目腫遍一身，名曰青水，其根在肝，大戟主之。

第二之水，先從心腫，名曰赤水，其根在心，葶藶主之。

第三之水，先從腹腫，名曰黃水，其根在脾，甘遂主之。

第四之水，先從脚腫，上氣而欬，名曰白水，其根在肺，藁本主之。

第五之水，先從足趺腫，名曰赤水，其根在腎，連翹主之。

第六之水，先從面至足腫，名曰玄水，其根在膽，芫花主之。

第七之水，先從四肢起，腹滿大，身盡腫，名曰風水，其根在胃，澤漆主之。

第八之水，先四肢小，其腹腫獨大，名曰石水，其根在膀胱，桑根白皮主之。
第九之水，先從小腸滿，名曰果水，其根在小腸，巴豆主之。
第十之水，乍盛乍虛，乍來乍去，名曰氣水，其根在大腸，赤小豆主之。
右十病，皆藥等分，與病狀同者則倍之，白蜜和，先食服壹圓如小豆，日叁，欲下病者，服叁圓，弱者當以意節之。
治宿食流飲寒熱溫病水腫。
郁李仁拾枚，熟研 粳米叁合，研令中斷
右貳味，以水肆升合煮，取貳升，頓服此粥，日叁度，作服之，人強用十五枚，羸者五六枚，不知者稍加之，以知為度。
炙鯉魚主腫滿方。
取鯉魚長壹尺伍寸，以尿漬令沒宿，平旦以木從口貫之

至尾。炙令黄熟。去皮。宿勿食。頓服之。不能者再服。令盡。神方。

男女新久腫。得惡暴風入腹。婦人新産上圂。清風入藏。腹中如馬鞭者。噓吸短氣欬嗽。一味大豆煎方。

大豆壹斗。擇令淨。

右以水五斗。煑之得壹斗叁升。澄清去下濁者。内釜中。以壹斗半美酒内汁中。煎取玖升。宿勿食。旦服叁升。温覆取汗。兩食頃。當下去風氣腫減。慎風冷。十日平復如故。除日服之。若急不可待除日。逐急令服。合時於清淨無人處。令童子壹人視之。不用六畜婦人見之。自度身中腫未盡。更服叁升。差了了者。勿服也。神驗。千金不傳。

又方

楮皮葉壹大束

右壹味。切。以水壹斗。煑取伍升。去滓。服之不過叁。面腫乃

減雜得瘥。常可服之。（千金楮枝皮葉壹大束，切，煮取汁，隨多少釀酒，日服，醉為佳。後同。）

葶藶圓　治水氣腫鼓脹，小便不利。山連治韋司業得差。司業姪雲表所送，云數用神驗。

葶藶子（壹升）　羖羊肺（壹具，青羊亦佳）

右貳味，湯微煠肺，即薄切之，暴乾擣末，以三年大醋浸葶藶子一伏時，出之熬令變色，熟擣如泥，和肺末蜜和擣作圓。食後一食久服如梧子肆圓，麥門冬飲服之，以喉中乾口粘浪語為候，數日小便大利，即瘥。

麥門冬飲法。

麥門冬（貳拾伍枚，去心）　粳米（貳拾伍粒）

右貳味，以大合叁合半水煮之，米大熟去滓，以下圓藥，每服常作。

有人虛肌積年，氣上似水病，眼似腫，而脚不腫方。

穀楮葉捌兩

右壹味，以水壹斗煮取陸升，去滓，內米煮粥，亦以當水煮羹等皆用之。秋時多收以擬經冬用，其水多少濃淡任人勿拘。此方慎蒜、麪、豬、雞、魚、油膩，重者叁年服之永瘥，輕者壹年瘥。

治水腫方。

葶藶子陸兩，生用　桂心貳兩

右貳味，擣篩為末，鍊蜜和圓如梧子，飲服拾圓，日二，慎如前法忌口味。

麻豆煎　主大腹水腫方。

大麻壹石，末入窨，不鬱浥者　赤小豆壹石，不得壹粒雜

右貳味，取新精者，仍淨揀擇，以水淘，暴令乾，蒸麻子使熟，暴令乾，貯淨器中。欲服，取伍升麻子熬之，令黃香，惟須緩

火。勿令焦。細擣取末。以水五升。研取汁令盡。淨器貯之。以明旦欲服。今夜以小豆壹升淨淘漬之。至曉乾漉去水。以新水煮未及好熟。即漉出令乾。內麻子汁中煮令大爛熟爲佳。空腹恣意食。日叁。其陳鬱麻子。益增其病。愼勿用之。一切水腫。皆忌飽食。常須少飢。後有灸三里絕骨作魚羹法。見千金中。

苦瓠圓 主大水。頭面遍身大腫滿方。

苦瓠白穰實。捻如大豆粒。

右壹味。以麪裹煮一沸。空腹吞七枚。午後出水壹升。叁肆日水自出不止。大瘦即差。叁年愼口味。苦瓠須好無黶翳者。不爾有毒。不堪用。

檳榔圓 主水腫方。

檳榔 桂心 栝樓 麻黃去節 杏仁去皮尖雙仁熬

茯苓　椒目　白朮各參兩　附子炮去皮　吳茱萸伍合

厚朴炙　乾薑　黃耆　海藻一本無　木防己

葶藶熬　甘草炙各貳兩

右壹拾柒味，擣篩為末，鍊白蜜和圓，如梧子，飲服貳圓，日參，加至肆圓，不知，又加貳圓，可至拾貳圓。此主老小水腫虛腫大病客腫，作喘者用之佳。一云忌海藻，以恐無此一味。

風水通身腫欲裂，利小便方。

防風　豬苓去皮　澤瀉去節　茯苓各肆兩　黃耆參兩

澤漆　白朮各伍兩　杏仁去皮尖雙仁　大戟各壹升　獨活捌兩

酒壹斗　大豆貳升，以水柒升，煑壹升

右壹拾參味，㕮咀，以豆汁及酒合煑取柒升，分陸柒服，日壹夜令盡，當小便極利為度。

澤漆根湯　主水通身洪腫，四肢無堪，或從消渴，或從黃疸支

飲。內虛不足。榮衛不通。血氣不化。氣實皮膚中。喘息不安。腹中響響脹滿。眼不得視方。

澤漆根拾兩　赤小豆貳升　茯苓叁兩　鯉魚壹枚，重伍斤者，淨去腸胃

生薑捌兩。　人參　麥門冬去心　甘草炙，各貳兩

右八味。以水壹斗柒升。煮鯉魚豆減柒升。去之。內藥煮取肆升伍合。去滓。壹服三合。日三。弱人二合。日再服。氣下喘止可至肆合。晬時小便利。腫氣減。或小溏下。若小便大利。還從壹合始。大利止。若無鯉魚。鮦魚亦可。若水甚。不得臥。臥不得轉側。加澤漆壹斤。渴加栝樓貳兩。欬加紫菀貳兩。細辛壹兩。款冬壹兩。桂心叁兩。增魚汁貳升。

大豆湯主風水通身大腫。眼不得開。短氣欲絕。或欬嗽方。

大豆壹斗　烏頭炮，去皮　黃耆　澤瀉各叁兩

杏仁壹升，去皮尖雙仁　半夏陸兩，洗　茯苓　白朮各伍兩

生薑柒兩切。　麻黃去節　豬苓去皮　防風

木防己各肆兩　甘遂　甘草炙。各貳兩　酒壹升

右壹拾陸味。以水肆斗。先煑豆取壹斗。去豆。內藥及酒。合煑取柒升。日肆夜叁。得快利小便爲度。腫減便任。不必盡劑。若不得利小便者。加生大戟壹升。葶藶貳兩半。無不快也。萬不失一。

麻黃湯主風濕。水疾。身體面目腫。不仁而重方。

麻黃肆兩。去節。　甘草貳兩。炙

右貳味。㕮咀。以水伍升。煑取叁升。分叁服。重覆日移貳丈。汗出不出。更合服之。愼護風寒。皮水用之良。

治水腫方。

以苦瓠穰壹枚。以水壹石。煑壹炊久。去滓。煎令可圓。服如大豆。小便利後。作小豆羹。乃飲食之。

又方

葶藶伍兩熬　牽牛子　澤瀉　昆布洗

海藻洗　猪苓去皮各叁兩

右陸味，末之，鍊蜜和圓如梧子大，飲服拾伍圓，日叁。

石膽圓主足脛腫，小便黃，肖痛頰車，骨筋解閉痛方。

石膽研　吴茱萸　天雄炮去皮　芫花熬

柏仁各壹分　防風　蕘花熬　杜仲炙各叁分

菖蒲　葶藶熬各壹兩　菟絲子叁合

右壹拾壹味，擣篩為末，鍊蜜和為圓如蜱豆，以飲服叁圓，日貳。

淡飲第四　方一十四首

治淡飲頭痛，往來寒熱方。

常山壹兩　雲母粉貳兩

右貳味，擣篩爲散，熱湯服壹方寸匕，吐之止，吐不盡，更服。

杜蘅湯　主吐百病方。

杜蘅　松蘿各叁兩　瓜蔕貳柒枚

右叁味，切，以水酒各壹升貳合，漬貳宿，去滓，分再服，若服已即吐者止，不吐者更服之，每服相去如人行十里，欲令藥力盡，飲壹升稀粥便定，老小用之亦佳。千金云：酒壹升，漬貳宿。貳合。

蜜煎　主寒熱方。

赤蜜伍合　常山肆兩　甘草半兩，炙。壹法貳兩

右叁味，㕮咀，以水壹斗，煮取貳升，去滓，內蜜，溫服柒合，吐則止，不吐更服柒合，勿飲冷水。

又方

蜜貳合　醋捌合

右貳味，調和，旦頓服，須臾猥猥然欲吐，擿之，若意中不盡，

明旦更服。無毒。不大嘔吐。其藥安穩。

葱白湯主冷熱膈淡。發時頭痛悶亂。欲吐不得方。

葱白貳拾莖　桃葉壹把　烏頭炮去皮　真珠

常山　甘草各半兩炙

右陸味。㕮咀。以酒肆升。水肆升。合煮取叁升。去滓。內真珠。服壹升。得吐止。

松蘿湯主胸中淡積熱。皆除之方。

松蘿貳兩　烏梅貳拾枚　常山叁兩　梔子貳拾枚擘　甘草伍兩炙一云壹兩

右伍味。㕮咀。以酒叁升。漬壹宿。旦以水叁升。合煮取貳升伍合。分再服。得快吐便止。不要頓盡貳服也。

又方

松蘿壹兩　烏梅叁拾枚　常山　甘草各貳兩炙

右肆味。㕮咀。以酒叁升。漬壹宿。煮取貳升。服壹升。取吐止。

大五飲圓　主五種飲。壹曰留飲。停水在心下。貳曰澼飲。水澼在兩脇下。叁曰淡飲。水在胃中。肆曰溢飲。水溢在膈上五藏間。五曰流飲。水在腸間。動揺有聲。夫伍飲者。皆由飲後傷寒。飲冷水過多所致方。

遠志去心　苦參　藜蘆　白朮　烏賊骨

甘遂　大黄　石膏　半夏洗　紫菀

桔梗　前胡　芒消　栝樓　五味子

蓯蓉　貝母　桂心　芫花熬　當歸

人參　茯苓　芍藥　大戟　葶藶熬

黄芩各一兩　附子炮去皮　常山　厚朴炙　細辛

署預　甘草炙。各參分　巴豆叁拾枚。去心皮。熬

右叁拾叁味。擣篩為末。鍊蜜和圓如梧桐子大。酒服叁圓。日叁。稍加之。

前胡湯主胸中久寒，澼實宿痰，膈塞，胸痛，氣不通利，三焦冷熱不調，食飲減少無味，或寒熱體重，臥不欲起方。

前胡　人參　大黄　當歸

甘草（炙，各貳兩）　黄芩　防風　麥門冬（去心）

吴茱萸（各壹兩）　半夏（洗，各參兩）　生薑（切，肆兩）　杏仁（參拾枚，去皮尖兩仁）

右壹拾貳味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升，分叁服，日叁。

白术茯苓湯主胸中結痰飲，澼結臍下，弦滿嘔逆，不得食，亦主風水方。

白术　茯苓　橘皮　當歸（各參兩）

附子（炮，去皮，貳兩）　半夏（洗）　生薑（切）　桂心（各肆兩）

右捌味，㕮咀，以水壹斗貳升，煑取叁升，分爲叁服，日叁服。參劑佳。（深師方有細辛壹味。一作人參。）

薑椒湯主胸中積聚痰飲，飲食減少，胃氣不足，欬逆嘔吐方。

生薑汁陸合 蜀椒叁合，汗，去目閉口者 半夏叁兩，洗 橘皮貳兩

茯苓 桔梗 桂心 附子炮，去皮 甘草炙，各壹兩

右玖味，㕮咀，以水柒升，煮取貳升伍合，去滓，內薑汁，煎取貳升，八分叁服，服兩劑佳。若欲服大散諸五石圓，必先服此方，乃進黃耆圓輩，必佳。

半夏湯 主淡飲澼氣吞酸方。

半夏叁兩，洗 生薑陸兩，切 附子壹枚，炮，去皮 吳茱萸叁兩，熬

右肆味，㕮咀，以水伍升，煮取壹升伍合，分叁服，日叁，老小服半合。

薑附湯 主淡澼氣方。

生薑捌兩，切 附子肆兩，生，去皮，肆破

右貳味，以水捌升，煮取貳升，分肆服，日貳，亦主卒風，大良。

論曰：凡淡飲盛，吐水無時節，其源為冷飲過度，遂令痼冷脾

胃氣羸。不能消於食飲。食飲入胃皆變成冷水。反吐不停者。

赤石脂散主之方。

赤石脂 叁斤

右壹味。擣篩爲散。服方寸匕。日叁。酒飲並可下之。稍稍漸加至叁匕。服盡叁斤。則終身不吐水。又不下利。補五藏。令肥健。有人淡飲。服諸藥不瘥。惟服此壹斤。即愈。

癖積第五　方壹拾肆首

大五明狼毒圓主堅癖。或在人脅。或在心腹方。

狼毒　乾地黄 熬，各肆兩　杏仁 叁拾枚，去皮尖雙仁
巴豆 貳拾枚，去皮心，熬　乾薑　桂心 各壹兩半　旋復花
芫花 熬　莽草 各半兩　細辛　五味子　蜀椒 汗，去目閉口者
漆頭蔺茹 各壹兩　人參　附子 炮，去皮　大黄
厚朴 炙　木防已　茯苓　當歸　半夏 洗，各貳兩

右貳拾壹味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如梧子大。以飲服貳圓。日貳夜壹。以知爲度。

小狼毒圓 主病與前方同。

狼毒叁兩　附子炮去皮　半夏洗　白附子各壹兩　漆頭蔄茹　旋復花各貳兩

右陸味。擣爲末。鍊蜜和。更杵伍千杵。圓如梧子。飲服叁圓。日貳。稍加至拾圓。

礜石圓 主積聚癥堅。不能食方。

礜石伍兩鍊　雄黃研　人參各壹兩　杜蘅　桂心各壹兩半　前胡　藜蘆各叁分　大黃貳兩　乾薑貳兩　皂莢半兩炙去皮子　丹參各貳兩　半夏洗　附子炮去皮　巴豆去皮　烏頭炮去皮。各陸銖

右壹拾伍味。擣篩爲末。鍊蜜和圓。如小豆。服貳圓。日貳。可至肆圓。

治癥癖，乃至鼓脹方。

取烏牛尿壹升，微火煎如稠糖，空腹服大棗許壹枚，當鳴轉病出，隔日更服，忌口味。

又方　人尿叁升，煎取壹升，空腹服，如牛尿法。

芒消湯　主暴癥堅結方。

木防己　白朮　鬼臼（各壹兩半）　芒消　芍藥　當歸（各貳兩）　大黃（叁兩）　蜈蚣（炙）　蜥蜴（各貳枚，炙）　甘草（壹兩，炙）。

右壹拾壹味，㕮咀，以水柒升，煮取貳升，去滓，下芒消，分為叁服，日叁。

治卒暴癥方。

蒜（拾片，五月五日戶上者，去皮）　桂心（壹尺貳寸）　伏龍肝（鴨卵大壹枚）

右叁味，合擣，以淳苦酒和之如泥，塗著布上，掩病處，叁日消。（千金云。凡蒜或無蒜亦得用也。）

又方

取商陸根擣蒸之。以新布藉腹上。以藥鋪布上。以衣覆上。冷即易。取差止。數日之中。晨夕勿息爲之妙。

三稜草煎　主癥癖方。

三稜草切取壹石

右壹味。以水伍石煑取壹石。去滓。更煎取叁斗。於銅器中重釜煎如稠糖。出內密器中。旦以酒壹盞服壹匕。日貳服。每服常令酒氣相續。

療十年痃癖方。

桃仁去皮尖雙仁熬　豉乾暴去皮熬。擣篩。各壹升　蜀椒去目閉口者。生擣篩　乾薑擣篩。各叁兩

右肆味。先擣桃仁如膏。合擣千杵。如乾可入少蜜和擣。令可圓如酸棗大。空腹酒服三圓。日叁。仍用熨法。○取新盆壹口。受壹斗者。鑽底上作叁拾餘孔。孔上布椒叁合。椒上

布盆。鹽上安紙兩重。上布冷灰壹升。冷灰上安熱灰壹升。熱灰上安熟炭火如雞子大。常令盆大口熱。底安薄甎。其口以板蓋上。以手捉勿令落。仰卧安盆於腹上。逐病上及痛處。自捉遣移。熨之。冷氣及癥結皆從下部中作氣出。七日壹易鹽。滿三七日。百病皆瘥乃止。

江寧衍法師破癖方。

白朮　枳實炙　柴胡各叁兩

右叁味。㕮咀。以水伍升。煑取貳升。分叁服。日叁。可至叁拾劑永瘥。

陷胷湯　主胷中心下結堅。食飲不消方。

大黃壹兩　栝樓貳兩　甘草貳兩　甘遂壹兩　黃連陸兩

右伍味。㕮咀。以水伍升。煑取貳升伍合。分叁服。

三台圓　主五藏寒熱。積聚。臚脹腸鳴而噫。食不作肌膚。甚者

嘔逆。若傷寒瘧已愈。令不復發。食後服伍圓。飲多者吞拾圓。

長服令人大小便調和。長肌肉方。

大黃貳兩。熬　消石　葶藶各壹升。熬　茯苓半兩　厚朴炙

前胡　附子炮。去皮　半夏洗　細辛各壹兩　杏仁壹升。去皮尖雙仁熬

右壹拾味。擣篩為末。別擣杏仁如脂。次內藥末。鍊蜜相和令得所。更擣伍千杵。圓如梧子大。酒服伍圓。稍加。以知為度。

大桂湯主虛羸胸膈滿方。

桂心壹斤　半夏壹升。洗　黃耆肆兩　生薑壹兩。切

右肆味。㕮咀。以水壹斗肆升。煑取伍升。分伍服。日三夜貳。

寒冷第六　方九首

鹿骨湯主虛勞風冷。補諸不足。乏惙少氣方。

鹿骨壹具。剉　茯苓壹兩　防風　橘皮　芍藥

人參　當歸　龍骨　黃耆各貳兩　桂心

厚朴炙　乾薑　獨活　甘草炙，各叁兩

右壹拾肆味。㕮咀。以水叁斗。先煮骨取壹斗。澄取清。内藥煮取叁升伍合。分肆服。日再。

大桂皮湯 主氣逆。又背寒熱往來。吸吸短氣。惡聞人聲。諸煩酸疼。欬逆不能飮食。飮食不生肌肉。溺黄。裏急絞痛。氣上衝發欬。胃管有熱。雷鳴相逐。寒冷厥逆。傷損五藏。語言難。喜直視。大便難方。

桂心陸兩　當歸　細辛　黄芩各貳兩　人參伍兩

厚朴炙　枳實炙　芍藥　芎藭各二兩　黄耆肆兩

麥門冬去心　吴茱萸　半夏洗，各壹升　蜜伍合　附子壹枚，炮，去皮

生薑貳斤　五味子　飴各半斤　甘草陸兩，炙。

右壹拾玖味。㕮咀。以生薑取汁叁升。以水貳斗。煮藥取陸升。去滓。微火上煎。内薑汁蜜飴攪相得。煮取陸升。壹服壹

升。日二。

大半夏湯主胷中虛冷。滿塞下氣方。

半夏壹升。洗　生薑捌兩。切　桂心伍兩　蜀椒叁百粒。去目閉口。汗

茯苓　枳實炙。各貳兩　大棗貳拾枚。擘　附子炮。去皮。破

當歸　人參　厚朴炙　甘草炙。各壹兩

右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗。煮取叁升。分叁服。

茱萸湯主風冷氣。腹中虛冷。急痛。飲食不消。心滿。少腹裏急引痛。手足逆冷。胃中響響。乾噫欲吐。吐逆短氣方。

吳茱萸貳升　小麥　半夏洗。各壹升　生薑拾伍兩　大棗伍拾枚。擘

桂心三兩　人參　黃芩　甘草炙。各貳兩

右玖味。㕮咀。以水壹斗貳升。煮取肆升。分為肆服。壹服壹升。日再。

茱萸湯主男子虛熱寒冷。婦人寒勞氣逆。及胷腹苦滿而

急。繞臍痛。寒心。吞酸。手足逆冷。臍四邊堅。悸氣踊起。胃中虛冷。口中多唾。或自口乾。手足煩。苦渴濕痺。風氣動作。頭痺不仁。骨節盡痛。腰背如折。惡寒大呼。即驚。多夢。夢見鬼神。此皆五藏虛方。

吳茱萸（貳升） 半夏（壹升洗） 生薑（壹斤切） 芍藥 桂心（各叁兩）

大棗（拾貳枚擘） 人參 黃芩 甘草（各貳兩炙）

右玖味。㕮咀。以水壹斗貳升。先煮棗極沸。乃內諸藥。煮取肆升。服捌合。日叁。

烏頭當歸湯 主虛勞損。胷滿痛。攣急。短氣。面黃失色。頭眩。心煩。夢寤失精。寒氣支節疼。又兩脇不得喘息。喘息輒牽痛。逆害飲食。悉主之方。

烏頭（去皮炮） 獨活 芍藥 蜀椒（去目閉口者汗） 白朮

人參（各貳兩） 厚朴（肆兩炙） 桂心（伍兩） 麥門冬（去心） 細辛（各壹兩）

吴茱萸壹升　當歸　生薑切　甘草炙各貳兩

右壹拾肆味，㕮咀，以水壹㪷叁升，煮取肆升，壹服柒合，日叁。烏頭炮令黃，乃用之。

澤蘭子湯　主傷中裏急，兩脇攣痛，久致欬嗽，四肢寒熱，小便赤黃，飲酒困卧，長風百脉開張，血痺不仁，夢寤失精，脣口乾燥，奄然短氣方。

澤蘭子　半夏洗　麻仁各壹升　大棗貳拾枚擘

糖壹斤　人參　茯苓　細辛各貳兩

遠志去心　桂心　龍骨　甘草炙各壹兩

右壹拾貳味，㕮咀，以水壹㪷貳升，煮取四升，分肆服，日叁夜壹。

瀉腎湯　主胃心逆滿，牽引腰背疼痛，食飲減少方。

桂心　乾薑　枳實炙　甘草炙各肆兩

芫花熬，壹分。 茯苓貳兩 大黃半兩 半夏洗

人參 桔梗 麥門冬去心，各伍分。

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升，分叁服。

人參湯 主養神補益，長肌肉，能食，安利五藏，通血脉，調氣方。

人參 乾薑 黃耆 芍藥 細辛 甘草炙，各貳兩

右陸味，㕮咀，以水肆升，煑取壹升捌合，壹服叁合。

飲食不消第十 方一十七首 論一首

太一白圓 主八瘕，兩脇積聚，有若盤盂，胷痛徹背，奄奄惻惻，裏急氣滿，噫，項強痛極者，耳聾，消渴，洩痢，手足煩，或有流腫，小便苦數，淋瀝不盡，不能飲食，少氣流飲，時復悶寒，少腹寒，大腸熱，恍惚喜忘，意有不定，五緩六急，食不生肌肉，面目黧黑方。

狼毒 桂心各半兩 烏頭炮，去皮 附子炮，去皮 芍藥各壹兩

右伍味。擣篩爲末。鍊蜜和更擣叁千杵。圓如梧子大。旦以酒服貳圓。暮叁圓。知熱止。令人消穀。長肌強中。久服大佳。

淮南五柔圓 主補虛寒。調五藏。和營衛。通飲食。消穀長肌肉。緩中利竅方。

茯苓　細辛　芍藥　半夏洗　當歸各壹兩

蓯蓉　葶藶熬，各貳兩　柴胡叁兩　大黃壹斤，蒸

右玖味。擣篩爲末。鍊蜜和更擣萬杵。圓如梧子大。以飲服伍圓。稍漸加至拾伍圓。以調爲度。有憂氣者。加松子仁壹兩。千金用前胡

凡身重不能食。心下虛滿。時時欲下。喜臥者。皆先針胃管太倉。服建中湯及服此平胃圓。必差方。

杏仁伍拾枚，去皮尖雙仁者，熬　大黃肆兩　葶藶熬　麥門冬去心

玄參　苦參　丹參各貳兩　沙參壹兩半　人參

當歸　芎藭　五味子　桂心各壹兩

右壹拾叁味，擣篩為末，鍊蜜和圓如梧子，空腹酒服伍圓，日貳，以知為度。

崔文行平胃圓 主百病消穀，五勞七傷，平胃氣，令人能食，小兒亦患冷者，減大黃，倍乾薑，小便利者，生用葶藶。方：

菖蒲　大黃　葶藶熬　小草　芍藥

當歸　桂心　乾薑　茯苓　麥門冬去心

芎藭　細辛各貳兩　甘草貳兩半，炙

右壹拾叁味，擣篩為末，鍊蜜和圓如梧子，空腹以酒服伍圓，日再。千金一方七味

調中五參圓 主十年嘔，手足煩，羸瘦，面黃，食不生肌膚，傷飽食不消化。方：

人參　丹參　沙參　苦參　玄參

防風　蜀椒去目閉口者。各壹兩。汗　附子炮去皮　乾薑各半兩

葶藶一合。熬　大黃肆兩　巴豆去皮心。熬　䗪蟲熬。各伍拾枚

右壹拾叁味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如小豆大。空腹飲服貳圓。日叁服。熬大黃於伍升米下。及熱切之。日暴乾。

消穀圓 主數年不能飲食方。

小麥蘖　七月七日麴各壹升　乾薑　烏梅各肆兩

右肆味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子大。空腹消服拾丸。日再。稍加至叁拾圓。其寒在胷中。及反胃番心。皆瘥。

三部茯苓圓 主三焦上中下焦。合爲三部。三焦道閉塞不通。留水在膈上。不消化。名曰淡水。積年不去。雖服藥下之。不能便去。雖得小去。隨復如故。其病面目黧黑。手足逆冷。身體枯燥。肌膚甲錯。身無潤澤。吸吸羸瘦。或已嘔吐。或大便澀。或復重下。起止甚難。久或絞痛雷鳴。時時下痢者。悉主之方。

茯苓柒分　大黃　白朮各壹兩半　芎藭　桔梗各伍分

前胡　乾地黃　神麴各貳兩半　乾薑　桂心各壹兩

人參　芍藥　黃芩　菖蒲各叁分

右壹拾肆味，擣篩爲末，鍊蜜和圓，如梧子，食後飲服拾圓，日再。

大桂枝圓　主叄焦受寒，寒在中焦，即滿噫氣吞酸，或咽中不下，中冷胃不可下食，食已或滿不消，痛上搶心，結食拘痛，時時洩痢，不食，溫溫如醉方。

桂心　附子炮去皮，各貳兩半　芍藥柒分　當歸　蜀椒去目閉口者，汗，各壹兩半

人參壹兩　乾薑　前胡各貳分　特生礜石鍊，壹分。

右玖味，擣篩爲末，鍊蜜和圓，如梧子大，空腹飲服拾圓，日二。

小桂枝圓　主胃中冷，虛滿，醋咽，婦人產後寒，中腹內雷鳴，吞醋，飲食不消方。

桂心半(貳兩)　乾薑(玖分)　蜀椒(去目閉口者汗貳兩半)　烏頭(去皮七分炮)　附子(壹兩半炮去皮)

前胡(伍分)　芎藭　白薇(各壹兩)　防葵(半兩)　吳茱萸(壹兩半)

右壹拾味，擣篩為末，煉蜜和圓如梧子，酒飲任性服叁圓，日叁。

大黄甘草圓　主久寒宿脇支滿，憂思傷損，奔氣膈氣，腸中虛冷，呼吸短氣，不得飲食，淡氣腫聚，輒轉上下，眩冒厥絕，顏色恍惚，夢寤不定，羸瘦萎黄，經年不起方。

大黄　甘草(炙)　桂心　桔梗(各貳兩)　白歛

茯苓(各半兩)　附子(炮去皮)　芎藭　阿膠(炙)　澤瀉

防風　署預　石斛　芍藥　乾薑

紫菀　黄芩　蜀椒(汗去目閉口者)　白朮(各壹兩)　當歸

人參　蓯蓉　乾地黄　山茱萸　麥門冬(去心各壹兩半)

右貳拾伍味，擣篩為末，煉蜜和圓，空腹酒下如梧子大拾

圓。日參。稍加至參拾圓。

附子圓 主心腹中寒溫不和。心下宛宛痛。逆害飲食。氣滿噓吸。乾噫吞酸。背中冷。兩脅急痛。腹中有冷水。抑抑作聲。繞臍痛。頭眩滿悶。身體羸瘦方。

附子（炮去皮） 人參（各貳兩） 芎藭（半兩） 乾薑（貳兩半） 礜石（壹兩鍊）。
皂莢（炙去皮子） 半夏（洗） 桂心 礬石（各伍分燒） 吳茱萸
茯苓 黃芩（各二分） 當歸 細辛 蜀椒（汗去目閉口者）
芍藥（各壹兩） 麥門冬（去心） 甘草（炙各壹兩半）

右壹拾捌味。擣篩為末。鍊蜜和圓如梧子。未食酒服貳圓。日三。

人參圓 主百病二蟲。疝瘕成魚鱉蝦蟇。令人面目枯。無潤澤。精寒勞瘦方。

人參 龍膽 杏仁（去皮尖及雙仁熬） 礜石（各貳兩鍊）

曾青叁分　黃石脂壹兩

右陸味。擣篩為末。餳和為圓如梧子。飲服貳圓。日三。亦可作散服一刀圭。服藥二日白蟲下。十日長蟲下。有蟲皆相隨下。耐藥者二十日乃下。

乾薑圓 主胃中冷。不能食。或食已不消方。

乾薑拾兩　赤石脂陸兩

右貳味。擣篩為末。鍊蜜和圓如梧子。服拾圓。日三。稍加至叁拾圓。服不限食前食後。

八等散 主消穀下氣。神驗方。

白朮　厚朴炙　人參　茯苓

吳茱萸　陳麴　麥蘗　芎藭各叁兩

右捌味。擣篩為散。食後酒服方寸匕。日三。

治虛勞冷。飲食不消。勞倦噫氣脹滿。憂恚不解。人參散方。

人參　茯苓　陳麴　厚朴炙

麥蘖　白朮　吳茱萸各貳兩　檳榔捌枚

右捌味。擣篩爲散。食後酒服方寸匕。日貳服。

麻豆散 主脾氣弱。不下食。服此以當食方。

大麻子叁升熬　大豆黃末壹升

右貳味和。飲服壹合。日四五。任性多少。

乾薑散 主不食。心意冥然。不憶食方。

乾薑　乾豉　神麴　蜀椒汗去目閉口者　大麥蘖

右伍味。各壹升。擣篩爲散。食後酒服方寸匕。日三。以食爲度。

論曰。凡人食生冷雜物。或寒時衣薄。當風食不消化。或夜食冷臥。心腹脹滿煩急。或連日不差者。燒地令熱。以席布上。厚覆取汗。便愈。其地沃水去大熱。又坐臥於上一月日永差。凡食過飽煩悶。但欲臥。腹脹。熬麴末令香。酒服一方寸匕。日五

六服大麥蘗益佳。

雜療第八　方法一百二十首

鐵屑炒使極熱投酒中飲之療賊風痙又裹以熨腋療胡臭有驗。

石灰療金瘡止血大效若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳青蒿葉合擣石灰爲團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗。

桑薪灰療黑子肬贅用煑小豆大下水腫。

青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作之並堪蝕惡肉東壁土摩乾濕癬極有效。

茺蔚莖擣傅丁腫服汁使丁腫毒內消又下子死腹中主產後血脹悶諸毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主聤耳中虫蛇毒傅之良。

莎草根名香附子。大下氣。除胷腹中熱。
艾主下血。衂血膿血痢。水煑及圓散任用。
草蒿生挼付金瘡。大止血。生肉。止疼痛良。
羊桃取根煑以洗風痒及諸瘡腫。
羊蹄主赤白雜痢。又療蠱毒。
蚤休醋磨。療癰腫蛇毒。
苧根安胎。貼熱丹毒腫。漚苧汁主消渴。
蓖麻葉油塗炙熱熨顖上。止衂尤驗。
甘蕉根擣汁服。主產後血脹悶傳腫去熱毒。
松花名松黃。拂取酒服。輕身療病勝皮葉及脂。松取枝燒其上下承取汁名䓢。主牛馬瘡疥。柏枝節煑以釀酒主風痺歷節。燒取䓢療瘑疥及癩瘡良。
牡荆葉主久痢霍亂轉筋血淋。下部瘡濕䘌薄脚。主脚氣腫

滿。其根水煮服。主心風頭風肢體諸風。解肌發汗。
槐。八月斷大枝使生嫩蘖。煮汁釀酒。療大風痿痺。
槐耳主五痔。心痛。婦人陰中瘡痛。枝炮熨止蝎毒。
檳榔人主腹脹。生擣末服。利水穀道。傅瘡生肌肉止痛。燒為
灰主口吻白瘡。
桑椹主消渴。葉水煎取濃汁。除脚氣水腫。利大小腸。
鼠李木皮。主諸瘡寒熱毒痺。子採取日乾。圓蒸酒漬服貳合。
日再。能下血及碎肉。除疝瘕積冷氣。大良。
杉材水煮汁。浸捋脚氣滿。服之療心腹脹痛。出惡氣。
欅皮煮汁。以療水及斷痢。取嫩葉挼貼火爛瘡。有效。
莢蒾煮枝汁和作粥。甚美。以飼小兒殺蚘蟲。藥子主破血止
痢。消腫。除蠱疰蛇毒。
柳木枝及木中蟲屑。枝皮主痰熱淋。可為吐湯。煮洗風腫痒。

煑含主齒痛。木中蟲屑可爲浴湯。主風瘙痒癮胗大效。

梓口皮主吐逆胃反。去三蟲。小兒熱瘡。身頭熱煩。蝕瘡。湯洗之并封傅。嫩葉主爛瘡。

枳椇苗藤。切以酒浸服。或以釀酒。去風冷癥癖。亂髮灰療轉胞。小便不通。赤白痢。哽噎。鼻衄。癰腫。狐尿刺。尸疰。下腫。骨疽雜瘡。

人乳取首生男乳。療目赤痛多淚。解獨肝牛肉毒。合豉濃汁服之神效。又和雀屎去目赤努肉。

人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者。新者最效。須與水和服之。其乾者燒之煙絶。水漬飲汁。傷寒熱毒水漬飲彌善。破丁腫開。以新者封之。一日根爛。

尿主卒血攻心。被打內有瘀血。煎服壹升。又主癥積滿腹。諸藥不瘥者。服之皆下血片塊。二十日即出也。亦主久嗽上

氣失声。溺近白燒。研末。主堅脣瘡。溺坑中竹木主小兒齒不生。正旦刮塗之即生。

熊膽療時氣熱盛。亦爲黃疸。暑月久痢。甘䘌心痛。注忤。腦療諸聾。血療小兒客忤。脂長髮令黑。悦澤人面。酒鍊服之差風痺。

羊膽療疳濕時行熱熛瘡。和醋服之良。

羊肺療渴。止小便數。并小豆葉煑食之。

羊腎合脂爲羹。療勞利甚效。蒜虀食脂壹升。療癥瘕。

羊屎煑湯下灌。療大人小兒腹中諸疾。疳濕。大小便不通。燒之熏鼻。主中惡心腹刺痛。熏瘡療諸瘡中毒痔瘻等。骨蒸彌良。

羊肝療肝風虛熱。目赤暗無所見。生子肝七枚神效。療頭風眩瘦疾。小兒驚癇。骨療同血。主女人中風。血虛悶。產後血

運悶欲絕者。生飲壹升即活。牛鼻中木卷。療小兒癇。草卷燒之爲屑。主小兒鼻下瘡。耳中垢主蛇傷惡毒。臍中毛主小兒久不行。白牛懸蹄主婦人崩中漏下赤白。屎主霍亂。屎中豆主小兒癇婦人產難。特牛莖主婦人漏下赤白無子。烏牛膽主明目及甘濕。以釀槐子服之。腦主消渴風眩。齒主小兒驚癇。尿主消渴黃疸水腫脚氣小便不通。馬毛主小兒驚癇。白馬眼主小兒鬾母帶之。屎中粟主金瘡。小兒客忤。寒熱不能食。絆繩主小兒癇。並煮洗之。

狗骨灰主下痢。生肌。傅馬瘡。烏狗血主產難橫生血上搶心。下頷骨主小兒諸癇。陰卵主婦人十二疾。爲灰服之。毛主產難。白狗屎主丁瘡。水絞汁服主諸毒不可入口者。

鹿頭主消渴。筋主勞損續絕。骨主虛勞可爲酒主風補虛。髓脂主癰腫死肌。溫中。四肢不隨。風頭通腠理。角主貓鬼中

惡心腹疰痛。血主狂犬傷。鼻衄折傷。陰痿。補虛。止腰痛。齒
主留血氣。鼠瘻。心腹痛。
虎屎主惡瘡。眼睛主癲。屎中骨爲屑。主火瘡。牙主丈夫陰瘡
及疽瘻。鼻主癲疾。小兒驚癇。
貍屎灰主寒熱。鬼瘧發無期度者極驗。家貍亦好。一名猫也。
兔皮毛合燒爲灰。酒服主産難後衣不出。及餘血搶心欲死
者。頭皮主鬼疰毒氣在皮中如針刺者。又主鼠瘻。膏主耳聾。
駱駝毛蹄甲。主婦人赤白帶下。最善。
豬耳中垢主蛇傷。豬腦主風眩腦鳴及凍瘡。血主奔豚暴氣
中風頭眩淋瀝。乳汁主小兒驚癇病。乳頭亦同發汗。十二
月上亥日取肪脂內新瓦器中。埋亥地百日。主癰疽。膃脂
一升著雞子拾肆枚更良。
獺四足皮。主手足腫瘃。

狐肉及腸作臛食之。主疥瘡久不差者。腸主牛疫。燒灰和水灌之。

白雞距及腦主產難。燒灰酒服之。腦主小兒驚癇。

鵝毛主小兒驚癇極者。又燒灰主噎。

鴨肪主水腫。血主解諸毒。肉主小兒驚癇。頭主水腫。通利小便。

鴈喉下白毛療小兒癇。有效。

鷹屎灰酒服方寸匕。主惡酒。勿使飲人知。

雀屎以蜜和爲圓。飲服主癥癖。久痼冷病。或和少乾薑服之。大肥悅人。

胡鷰卵主水浮腫。肉出痔蟲。越鷰屎亦療痔。殺蟲。去目瞖。

蝙蝠屎灰酒服方寸匕。主子死腹中。腦主女子面皰。服之令人不忘也。

龜取以釀酒。主大風緩急。四肢拘攣。或久癱緩不收攝。皆差。

鯉魚骨主陰蝕。哽不出。血主小兒丹腫及瘡。皮主丹癮疹。腦主諸癇。腸主小兒肌瘡。

蠡魚腸及肝。主久敗瘡中蟲。諸魚灰並主哽噎。

乾鱓頭主消渴。食不消。去冷氣。除痞疹。其穿魚繩主竹木屑入目不出。穿鮑魚繩。亦主眯目。去刺。煑汁洗之。

露蜂房亂髮蛇皮三味合燒灰。酒服方寸匕。日貳。主諸惡疽。附骨癰。根在藏腑。歷節腫出。丁腫惡脉。諸毒皆差。又水煑露蜂房一服五合汁。下乳石熱毒壅悶。服之小便中即下石末。大效。水煑洗狐刺療服之瘡上氣。赤白痢。尿失禁。

蟬殼主小兒癇。女人生子不出。灰服之主久痢。

蚱蟬主小兒癇。絕不能言。

白殭蠶末之。封丁腫。根當自出。極效。

鼈頭燒灰。主小兒諸疾。又主產後陰脫下墜。尸疰心腹痛。

鰻鱺魚膏療耳中有蟲痛者。

蝦蟇腦主明目療青盲。

蛇蜕療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨疽蜣皮主身痒瘑疥癬等。

蜘蛛療小兒大腹丁奚三年不能行者。又主蛇毒溫瘧霍亂止嘔逆。

蚯蚓鹽霑爲汁療耳聾屎封狂犬傷毒出犬毛神効。

蠐螬擣爲圓塞下部引痔蟲出盡永差。

蜆殻陳久者。療反胃及失精。

田中螺殻療口瘡心腹痛又主失精水漬飲汁止渴。

棗葉揩熱痱瘡良。

藕主熱渴散血生肌久服令人心懽。

栗嚼生者塗瘡上療筋骨斷碎疼痛腫瘀血。其皮名扶擣爲

散。蜜和。塗肉令急縮。毛殼療火丹毒腫。飼孩兒令齒不生。木白皮水煑汁。主溪毒。

櫻桃葉擣付蛇毒。絞取汁服。防蛇毒內攻。

梅根療風痺。出土者殺人。梅實利筋脉去痺。

枇杷葉主欬逆不下食。

火柿主殺毒。療金瘡火瘡。生肉止痛。軟柹熟柹解酒熱毒。止口乾。壓胸間熱。

烏芋一名茨菰。主百毒。產後血悶。攻心欲死。產難。衣不出。擣汁服一升。

桃膠主下石淋。破血中惡疰忤。花主下惡氣。消腫滿。利大小腸。

梨削貼湯火瘡。不爛止痛易差。又主熱嗽。止渴。葉主霍亂吐痢不止。煑汁服之。

赤莧主赤痢。又主射工沙虱。馬莧一名馬齒草。主諸腫瘻。疣

目。擣搯之。飲汁主反胃諸淋。金瘡血流。破血癥癖。小兒尢良。
用汁洗緊脣面皰馬汗射工毒。塗之差。

蔓菁子療黃疸。利小便。水煮五升。取濃汁服。主癥瘕積聚。少
飲汁主霍亂心腹脹。末服主目暗。

白芥子主射工及疰氣。發無常處。丸服之。或擣爲末。醋和塗
之。隨手有驗。

苜蓿莖葉。平。根寒。主熱病煩滿目黃赤。小便黃。酒疸。擣取汁
服一升。令吐利即愈。

水蓼主被蛇傷。擣傅之。絞取汁服止。蛇毒入腹心悶者。又水
煑漬脚捋之。消脚氣腫。

胡葱主諸惡。蛓弧尿刺毒。山溪中沙蝨。射工等毒。煑汁浸或
擣付大效。

白蘘荷根主諸惡瘡。殺蠱毒。根心三稻麥芒入目中不出者。

以汁注目中即出。

雞蘇主吐血衄血。下氣消穀大效。

苦瓠瓤主水腫石淋吐呀嗽囊結疰蠱痰飲。或服之過分令人吐利不止。宜以黍穰灰汁解之。又煑汁漬陰療小便不通。

胡麻生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大效。

小豆葉名藿。止小便數。去煩熱。

大麥麪平胃止渴。消食療脹。

小麥麴止痢平胃。主小兒癇。消食痔。又有女麴黃蒸。女麴完小麥爲之。一名麩子。黃蒸磨小麥爲之。一名黃衣。並消食止洩痢。下胎破冷血。

粟米泔汁主霍亂卒熱。心煩渴飲數升立差。臭泔止消渴良。

米麥粆主寒中。除熱渴。解煩消石氣。蒸米麥熬磨作之。一名糗也。

皁莢鬼目草也。蔓生葉似王瓜。小長而五椏。實圓若龍葵子。生青熟紫黑。煑汁飲解勞。地膚子擣絞取汁。主赤白痢。洗眼去熱暗。雀盲澀痛。其苗灰主痢亦善。

防風叉頭者令人發狂。叉尾者發痼疾。子似胡荽子而大。調調食用之香。而療風更佳。

石龍芮主療蚘蟲及不消食。

絡石生陰濕處。蔓延繞木石側。冬夏常青。十一月子黑而圓。名石龍藤。療產後血結。又主蝮蛇瘡。絞汁洗之。服汁亦去蛇毒心悶。金瘡封之立差。

千歲虆莖大如椀。汁味甘。子味甘酸。似葡萄。其莖主噦逆。大善。傷寒後嘔噦更良。

天名精鹿活草也。主破血生肌。止渴利小便。殺三蟲。除諸毒。丁瘡瘻痔。金瘡內射。身痒癮胗不止者。揩之立已。

葛根末主狂犬傷人。并飲其汁。燒葛燒灰。水服方寸匕。止喉痺。

苦參十月採子服。如槐子法。久服輕身不老。明目有效。

蒼耳三月以後。七月以前刈取。日乾為散。夏月水服。冬酒服。主大風癲癇。頭風濕痺。毒在骨髓。日貳服。圓服貳叁拾圓。散服壹貳匕。服滿百日。病當出如瘑疥。或痒汁出。或斑駁甲錯。皮起。後乃皮落。肌如凝脂。令人省睡。除諸毒螫。殺甘濕䘌。久服益氣。耳目聰明。輕身強志。主腰膝中風毒。尤良。亦主猘狗毒。

萱花主衄血吐血。灸瘡。

王蓀主金瘡。破血。生肌肉。止痛。赤白痢。補虛益氣。除脚氣。

爵牀療血脹下氣。又主杖瘡。汁塗立瘥。

蜀羊泉。俗名漆姑葉。主小兒驚。

惡實根主牙齒疼痛。勞瘧。脚緩弱。風毒癰疽。欬嗽傷肺。肺壅。疝瘕積血。又主諸風癥瘕。冷氣。子吞壹枚。出癰疽頭。

榆人醬。利大小便。蕪荑醬殺三蟲。

凡山中石上草中多有蛭。食人血入肉中。浸淫起方。

用灸斷其道。即差。

又方

常以臘月豬脂和鹽。塗脚及足指間。足趺上并鞋上。則不著人。

用術法。

薑黃生蜀中者真。土蕃詐中國人云。療萬病一箇一段價買之不可得。後人知是薑黃更不敢將入來。凡薑黃不得爵嚼之損齒。療一切腫。初覺刮取末。和水塗之數度差。難產刮取一箇作末。和水服之即生。酒亦得。產後腹中不淨。刮取末水和服之愈。

馬胞轉剖取末筒吹半大豆許。耳鼻中即通。此藥末滿月孕

婦勿令見。好落娠。慎之。

貯薑黄法。

以袋盛。置白米大小麥中。袋中著少許米。懸乾燥處。勿令雞犬女人見之。

造麋鹿二角膠法。

二月九月爲上時。取新角連臺骨者上。細剉。大盆中浸一宿。即淘汰使極淨。待澄去下惡濁汁。取上清水還浸一宿。又淘汰如前。澄去下惡濁。取汁浸三宿。澄取清水并所漬骨角。微微火煑。大率角屑一石。水三石。去角。澄取清汁煎。水盡至五升許。出貯銅器中。湯上煎之三日三夜。如糖。出置盤上。待凝。以竹刀割爲薄片。於淨布上暴乾成也。其煑角者更細剉之。加水一倍。煑成至三四升。内銅器中。重湯煎如前法。

服法。

炙膠使極黃沸。擣篩爲散。每膠一斤。末。以大附子二兩炮。

又一法取惟大者。去皮細切炙令黃。勝炮。日空腹酒服方寸匕。日再。稍稍加至二匕。不可過二匕。補五藏六腑虛羸瘦極。瘦者爲上。

殺烏頭三建法。

烏頭二月採。天雄附子側子並八月採。春宜早。秋宜晚採得淨去鬚毛。莖留二分。先以大木桶內酢泔三斛酒糟七升攪之。經三日後用次法。一如次第。遂至法畢。

右以粟米一升。淨淘擣作粉。以烏頭安桶中厚三寸。布令平即糝米粉令遍。復加烏頭如前法。又加米粉如次第。遂至滿桶。去口三寸即止。然後取糟汁去桶中一畔下。又沒烏頭二寸。以物蓋之。九月即八九日。若十月即經十日。候桶中汁上頭衣作紫色遍。即出烏頭以刀刮截看裏許白

黃脉斷即熟。但看衣紫色即熟。不須致疑。即取白茅暴一日得蔫即得。不得太乾。於廠屋底乾地上布茅厚五寸。漉出烏頭令乾。以布茅上。勿令相重。其上令布茅厚五寸四邊閉塞。以茅令密。經再宿三日。從一邊却茅看之。若衣勻斑斑然即好。若著白斑。又更覆一宿。以衣足爲限。即徐徐去上茅。更經一宿。安徐取於廠下。溥上布。勿令相重。經二十一日後捻出。日中暴之三日即成也。

又法。

烏頭四月收　天雄　附子　側子八月收

右先煎水作生熟湯。治附子如前方法。內著湯中。密封勿洩。經半日出取。白灰裛數易灰。使乾。日暴之。其米粥及糟麴等法。並不及此法。

服鹽藥法。無藥州土則須服之大益。

成州鹽官第一。　次綿州封井。

次鹽州富因井。　次益州貴平井。

上四井鹽可服之。

右法服。先以大豆許鹽置口中。勿咽之。須臾津液滿口令近齒。以方寸匕鹽內口中。和津液一時咽之。日一服。

凡瘧新患者。一服得快利即愈。百日以上者。五服差。若一月服之。終身不發。

諸下痢初患。一兩服即差。赤白久痢經年者。一七二七服差。

諸心腹痛。癥結宿澼積聚吐逆。食不化者。一年以上二三十年。不過三月服之。其痢及諸病。初服時痢益極者。勿怪之也。

諸氣滿喘逆。不能食者。一服即散。日服之則根本皆除。天氣熱疾頭痛目眩。四肢煩熱者。一服得吐利差。

諸頭面皮膚百節皆風。一月服之差。若初服十日內眉間益

悶。勿怪。

諸淡飲欬逆不能食息者。一服差。

諸虛勞傷損骨節疼痛起止失聲者。二七日服之。少氣乏力。面無顏色。十日服之。能三十日服佳也。常以平旦空腹服之。率以三匕爲節。須得吐利者。須一度多服三匕以上。令人大吐利。終不傷人。若覺煩熱。數數飲冷水。若至他方異域。不伏水土。到即服之。得一升。百事不懼。鹽能補虛。去冷熱。若有宿食不消。變成霍亂。一服即差。

千金翼方卷第十九

千金翼方卷第二十

雜病下

備急第一 方二十七首 論一首

阿魏藥主一切尸疰。惡氣。療人有親近死屍。惡氣入腹。終身不愈。遂至死亡。醫所不療。亦主一切疰神效方。

阿魏藥叁兩，碎之如麻子大

右壹味。以餺飥麪裹半兩。熟煮吞之。日三服之。服滿二七日永差。忌五辛油麪生冷酢滑。以酒服之即差。

玉壺圓 主萬病皆用之。

雄黃貳兩　八角附子貳兩，炮　藜蘆貳兩

丹砂貳兩　礜石貳兩，燒。　巴豆仁貳兩，去皮

右陸味。以王相日。童子齋戒天晴明時合。先擣巴豆三千杵。次內礜石又三千杵。次內藜蘆又三千杵。次內雄黃又

三千杵。次內丹砂又三千杵。次內附子又三千杵。次內白蜜又三千杵。訖更治萬杵佳。無丹砂用眞朱肆兩代之。每內藥即下少蜜。恐藥飛揚。盛蜜器中封之。勿洩氣。安清淨處。大人圓如小豆許。服藥下病者宿勿食。旦服二圓。不知者煖粥飲發之。在膈上者吐。膈下者利。或但噫氣而已。即愈。一切萬病量之不過壹圓二圓。莫不悉愈。必以王相天晴明日合之。大有神驗。若非此日合之。極不中用。徒事耳。

倉公散 主萬病方。

礬石燒　皂莢炙去皮子　雄黃研　藜蘆熬

右肆味等分為散。主卒鬼打鬼排鬼刺心腹痛吐下血便死不知人及臥魘齧腳踵不覺者諸惡毒氣病。取藥如大豆內竹管中吹鼻得嚏則氣通便活。未嚏更吹之以嚏為度。

備急圓 主暴病脹滿方。

大黃　乾薑　巴豆去皮心熬

右叁味等分先擣大黃乾薑下篩研巴豆如脂內散中合擣一千杵即用之蜜和為圓亦佳密器貯之勿令歇主心腹暴病若中惡客忤心腹脹滿刺痛口噤氣急停屍卒死者以水若酒服大豆許三四枚捧頭起令得下喉須臾不差更服三枚腹中轉鳴得吐利即差

千金圓主百鬼病風注夢與神交通邪病腹脹惡腫氣卒中忤方

礜石貳兩燒　附子貳兩炮去皮　雄黃貳兩　真朱貳兩　巴豆仁貳兩

藜蘆貳兩　蜈蚣貳枚炙　麝香半兩　犀角叁分

右玖味擣叁千杵每一服二圓如小豆不知至叁圓五更一點服至日中解解乃食白米粥忌熱食酒肉五辛一切皆忌之

眞珠附著散 主諸風鬼注，毒氣，猫鬼所著方。

眞珠　雄黃　丹砂各半兩　乾薑壹兩　蜈蚣壹枚，炙

桂心壹兩　天雄半兩，炮　莽草半兩　細辛壹兩　蜀椒半兩，汗，去目閉口者

右壹拾味，爲散，酒服方寸匕，日再。

大附著散 主一切蜚尸鬼注，風痺，百處痛如針刀刺痛，嘔逆澼飲，五勞七傷，萬病方。

附子柒分，炮，去皮　烏頭柒分，炮，去皮　蜈蚣貳枚，炙　芫青八分

雄黃柒分　朱砂柒分　乾薑柒分　細辛柒分

蜥蜴貳枚　人參柒分　莽草柒分　鬼臼柒分

右壹拾貳味，擣散，酒服半錢匕，日再。

太一神明陷冰圓 主諸病，破積聚，心下脹滿，寒熱鬼疰，長病欬逆唾噫，辟除衆惡，殺鬼逐邪氣，鬼擊客忤，中惡，胷中結氣，咽中閉塞，有進有退，繞臍絞痛，惻惻隨上下，按之挑手，心中

慍慍如有蟲狀，毒痒相染滅門方。

雄黃貳兩 芫青五枚 桂心貳兩 真珠壹兩 麝香壹兩

附子壹兩半，炮，去皮 烏頭八枚，炮，去皮 犀角壹兩 鬼臼壹兩 巴豆仁壹分

蜈蚣壹枚，炙 人參壹兩 杏仁叁拾枚，去皮尖 射罔壹兩

丹砂貳兩 蜥蜴壹枚 斑猫叁拾枚，去翅足，熬 當歸貳兩 藜蘆壹兩

大黃貳兩 礜石貳兩，燒 樗雞叁拾枚 地膽叁拾枚 牛黃壹兩

右貳拾肆味，擣末，蜜為圓，擣三萬杵，圓如小豆，先食服二圓，日再服。不知，稍稍加。以藥二圓著門上，令眾惡不近，傷寒服之無不即愈，若至病家及視病人，夜行獨宿，服二圓，眾邪不近，亦可佩之。

蜥蜴圓 主癥堅水腫，蜚尸遁尸，寒尸喪尸，尸注骨血相注，惡氣鬼忤，蠱毒邪氣往來，夢寤存亡，流飲結積，虎狼所嚙，猘犬所咬，鴆毒入人五藏，服藥殺其毒，即消，婦人邪鬼忤之，亦能

遣之方。

蜥蜴貳枚　蜈蚣貳枚炙　地膽五十枚　䗪蟲叁拾枚熬　杏仁叁拾枚去尖皮双仁

蟯蜋拾肆枚炙　虻蟲叁拾枚去翅足熬　朴消柒分　澤瀉半兩

芍藥伍分　虎骨壹兩半炙　甘草壹兩炙　桃奴半兩　犀角半兩

巴豆仁柒分　鬼督郵半兩　赤桑雞半兩　乾薑壹兩　款冬花叁分

甘遂五分

右貳拾味，治巴豆杏仁如膏，內藥末研調，下簁擣二萬杵，圓如麻子，未食服三圓，日壹。不下加之，不取吐下者，壹圓日壹。有人風冷注癖堅二十年，亦得愈。

金牙散 主鬼注風邪，鬼語尸注，或在腰脊胸脇，流無常處，不喜見人，意志不定，面目脫色，目赤鼻張，脣乾甲黃等，並治之方。

蜈蚣壹枚炙　人參壹兩　蜣蜋柒枚炙　雄黃壹分　徐長卿拾肆枚

蜥蜴壹枚　桔梗叁分　鐵精叁分　桂心壹兩　鬼臼半兩

金牙燒，壹分　野葛壹分　附子壹枚，炮，去皮　毒公叁枚　芎藭半兩

石長生半兩　椒目半兩　大黃壹分　甘草壹分，炙　芫菁拾肆枚

鬼督郵半兩　蜂房壹分，熬　曾青壹分　真珠壹　蛇脫皮壹分，熬

丹砂壹分　烏頭半兩，炮，去皮　狼毒半兩　斑貓肆枚，熬　石膏伍分

藺茹壹分　蕪荑半兩　鬼箭半兩　藜蘆半兩　貍骨壹分

雷丸半兩　狼牙壹兩　乾漆壹分，熬　亭長　貝母壹分

凝水石伍分　牛黃壹兩　胡燕屎壹兩　鼈甲半兩，炙　滑石半兩

右肆拾伍味，為散，酒服一刀圭，日再，稍加，如有蟲，皆隨大小便出矣。

大金牙散　主南方百毒，瘴氣疫毒，脚弱腫痛，濕痺風邪鬼疰。

金牙燒　雄黃　丹砂　龍膽　防風

玉支　大黃　曾青　茯苓　桂心

松脂　乾薑　烏頭（炮去皮）　斑猫（去翅足熬）　亭長
細辛　消石　野葛　大戟　商陸
蛇脫（熬）　芫青　鸛骨　芫花　附子（炮去皮）
寒水石　人參　貫衆　龍骨　蜀椒（汗去目閉口者）
露蜂房（熬）　巴豆（去心皮）　蜥蜴　蜈蚣（炙）　礜石（燒）
天雄　狸骨（炙）　石膽　莽草

右叁拾玖味。各等分為散。以絳囊佩帶之。男左女右。未食以漿水或酒隨意服一刀圭。以知為度。

小金牙散 主南方瘴氣。疫毒脚弱。風邪鬼注方。

金牙（伍分燒）。　女萎（叁分）　莽草（叁分）　乾薑　桂心
天雄（炮。去皮）　細辛　萆解（各叁分）　犀角屑　烏頭（炮去皮）
麝香　虎杖　黃芩　雄黃　朱砂
蜀椒（半兩。汗。去目閉口者）　黃連（壹兩）　牛黃（壹分）　蜈蚣（一枚柒寸者。炙）

右壹拾玖味。爲散。訖。内牛黄麝香。更擣三千杵。温酒服壹錢匕。日三夜二。以知爲度。帶之辟不祥。弔喪問病。皆塞鼻良。一方用由跋。無虎骨。

又大金牙散方。所主與前方同。傳尸骨蒸病家合佳。

金牙貳兩。燒　大黄壹兩。　鼈甲炙壹兩。　梔子仁壹兩　鬼督郵壹兩

鼉甲壹兩。炙。一作龜甲　桃白皮壹兩　銅鏡鼻壹兩　乾漆熬壹兩。

桂心半兩　芍藥半兩　射干半兩　升麻半兩　徐長卿參分

鳶尾半兩　由跋參分　蜂房半兩炙　細辛半兩　乾薑半兩

芒消半兩　莽草半兩　龍膽　狼牙　雄黄

真珠各參分　白朮一兩半　射罔壹分　羚羊角半兩屑

馬目毒公半兩　犀角半兩屑　甘草半兩炙　狼毒半兩

蜣蜋拾枚炙。　地膽拾枚　樗雞拾枚　芫青拾枚　雷丸柒分

龍牙壹兩半　杏仁壹兩半。去尖皮雙人熬　巴豆拾肆枚。去皮心

桃奴拾肆枚　鐵精壹合　赤小豆壹合　烏梅柒枚　胡鷰屎一兩半

鸛骨貳兩　石膏貳兩　蛇脫壹尺熬。　斑猫柒分　活草子壹兩半

右伍拾味。爲散。酒服壹刀圭。加至兩刀圭。日三夜一。以知爲度。絳囊盛帶之。男左女右。一方寸匕。省病問孝。夜行塗中。晨昏霧露亦如此。密封勿洩氣。清齋七日合之。一一如法。童子沐浴寂靜。無人處合。勿令人知之。買藥勿爭價。

太一神明圓　主腹中癥瘕積聚支滿寒熱。鬼疰長病。欬逆吐血。殺鬼邪氣。蠱注胷中結氣。咽中如有物。宿食久寒方。

雄黃肆兩　眞珠貳兩　丹砂貳兩　藜蘆壹兩半　附子壹兩半。去皮炮

斑猫貳拾枚。熬　杏仁八十枚。去尖皮双人。熬　地膽貳柒枚　礬石一兩。燒

赤足蜈蚣貳枚。炙　巴豆柒拾枚。去皮心　鬼臼叁兩　特生礜石五兩。燒

右壹拾叁味。下篩。㕮咀。礜石令如麥大。桑白皮如錢大。拾肆枚。令於鐵器中熬。桑白皮焦黑。止。擣二千杵。內丹砂雄

黃諸藥。合擣四千杵。白蜜和爲圓。服如小豆大。縱不知病進退。遶臍相逐上下不定。按之挑手。心中温温。如有蟲者。病走皮中。相次即取壹圓摩病上。急按手下皮青。不青當白黑。若有赤。病死皮中也。右爲蜂蛇所中。中惡服壹圓。一圓著瘡中。若不知。更加至叁圓。卒得飛尸。腹中切痛。服三圓。破壹圓傅瘡上。即愈。夜夢寤驚恐悶病臨喪。服一圓。潰壹圓塗之。止惡邪氣。不敢近人。卒中鬼魅。狂言妄語。一圓塗其脉上。壹圓塗人中。即愈。鬼魅逐人。以壹圓塗門戶上。鬼不敢前。蠱毒病一宿勿食。明旦服一圓。不知增至二圓至三圓。以知爲度。癥結宿物。勿食服四圓。但欲癥消。服一圓。日三。病下如雞子白。或下蛇蟲。下後以肥肉精作羹補之。狐鳴。以壹圓向擲之。狐即於其處死。神秘不妄傳。

桔梗圓 主諸注萬病。毒注鬼注食注冷注淡飲宿食不消。并

酒澼方。

藜蘆貳兩熬。皂莢貳兩炙去皮子。巴豆仁貳兩熬。桔梗貳兩　附子貳兩炮去皮。

右五味末之。蜜和擣萬杵。欲服。宿勿食。旦服兩圓如梧子。仰卧勿眠。至食時若膈上吐。膈下利。去惡物如科斗蝦蟇子。或長壹尺貳尺。下後大虛。作羹補之。三四日將養。病不盡更服如初。

十疰圓　主十種注。氣注。勞注。鬼注。冷注。生人注。死注。尸注。水注。食注。土注等方。

雄黄壹兩　人參壹兩　甘草壹兩炙。藁本壹兩　巴豆一兩去皮心熬。

桔梗壹兩　附子壹兩炮去皮　皂莢壹兩炙去皮子。蜀椒壹兩汗。麥門冬一兩去心。

右壹拾味。末之。蜜和。空腹服壹圓如小豆大。日貳。稍加以知為度。極效。

大麝香圓　主鬼注飛尸萬病方。

生麝香半兩 牛黃半兩 蜈蚣壹枚，炙 丹砂半兩 雄黃壹兩

巴豆仁伍拾枚，去心，熬 杏仁伍拾枚，去尖皮、雙仁，熬 桂心半兩

地膽柒枚 芫青柒枚 亭長柒枚 蜥蜴壹枚 獺肝半兩，炙

大黃半兩 犀角屑半兩 礜石半兩，燒 細辛半兩 藜蘆半兩

斑猫柒枚，去翅足，熬 鬼臼 礬石燒 附子炮，去皮 眞珠各半兩

右貳拾叁味，擣爲末，蜜和，擣三千杵，飲服如小豆壹圓，日二。蛇蜂蝎所中，以摩之愈。一方地膽作蚺蛇膽

蜈蚣湯 主惡注邪氣，往來心痛徹背，或走入皮膚，移動不定，苦熱，四肢煩疼，羸乏短氣方。

蜈蚣壹枚，炙 牛黃壹分 大黃叁分 丹砂叁分 細辛壹兩

鬼臼壹兩 黃芩半兩 當歸壹兩 桂心壹兩 人參叁分

麝香壹分 附子一兩，炮，去皮 乾薑壹兩

右壹拾叁味，㕮咀，以水壹斗，煮拾壹味，取叁升，去滓，下牛

黃麝香末。攪令均。分三服。

鸛骨圓主遁尸飛尸。積聚脇下痛連背。走無常處。或在藏。或在腹中。或奄然而痛方。

鸛脛骨叁分 雄黃一兩 藜蘆半兩 野葛半兩

莽草壹兩 芫青拾肆枚 斑猫拾肆枚。熬 巴豆肆拾枚。去皮心。熬

丹砂貳分 牡蠣壹兩。熬 桂心半兩 蜈蚣壹枚。炙

右壹拾貳味。擣篩。蜜圓。服如小豆大貳圓。一方丹砂作丹參

江南度世圓主萬病。癥堅積聚。伏尸長病。寒熱注氣流行皮中。久病著牀。肌肉枯盡。四肢煩熱。嘔逆不食。傷寒時氣惡注忤。口噤不開。心痛方。

麝香壹兩 細辛貳兩 大黃壹兩 甘草貳兩。炙 蜀椒叁兩。汗。去目閉口者

紫菀壹兩半 人參貳兩 乾薑壹兩 茯苓貳兩 附子壹兩半。炮。去皮

真珠壹兩 丹砂壹兩 烏頭半兩。炮。去皮 野葛壹兩 牛黃半兩

桂心壹兩 蜈蚣貳枚炙 雄黃壹兩 鬼臼壹兩 巴豆陸拾枚去皮心熬

右貳拾味，擣末，蜜圓。飲服如小豆大貳圓，稍加至肆圓，日貳加。獺肝壹兩，大良。

大度世圓 主萬病與前同方。

牛黃壹兩 大黃壹兩 雄黃壹兩 細辛壹兩 附子壹兩炮去皮

真珠壹兩 甘草壹兩炙 人參壹兩 射罔壹兩 丹砂壹兩

鬼臼壹兩 莽草壹兩 鬼箭貳兩 桂心貳兩 蜀椒壹兩汗去目閉口者

紫菀貳兩 巴豆仁八拾枚去心熬 乾薑貳兩 野葛壹尺

蜥蜴壹枚 蜈蚣壹枚炙 地膽拾伍枚 芫青貳拾枚 樗雞叁拾枚

茯苓壹兩 麝香貳兩

右貳拾陸味，擣末，蜜圓。飲服貳圓如小豆，日貳圓，先食後服之。

細辛散 主風入五藏，悶絕，常自燥痛，或風注入身，冷注鬼注

飛尸惡氣腫起。或左或右。或前或後。或內或外。針灸流移。無有常處。驚悸腹脹。氣滿。叉心頭痛。或恍惚悲懼。不能飲食。或進或退。陰下濕癢。或大便有血。小便赤黃。房中勞極方。

附子貳分，炮，去皮　秦艽叁分　人參叁分　牡蠣叁分，熬　蜀椒叁分，汗，去目、閉口者

乾薑五分　桂心伍分　茯苓壹兩　桔梗壹兩　防風壹兩半

白朮壹兩　當歸壹兩　獨活壹兩　柴胡伍分　黃芩叁分

烏頭半兩，炮，去皮　甘草叁分，炙　麻黃叁分，去節　芎藭三分　石南半兩

莽草半兩　牛膝半兩　天雄半兩，炮，去皮　栝樓半兩　杜仲半兩，炙

細辛貳分

右貳拾陸味。擣篩為散。仍別秤之合和也。旦以清酒服伍分匕。訖。如行十里勢欲歇。更飲酒五合佳。

芥子薄。主遁尸飛尸。又主暴風毒腫流入四肢頭面諸風方。

芥子壹升，蒸熟

右壹味。擣下篩。以黃丹貳兩攪之。分作兩處。疎布袋盛之。更蒸使熱。以薄痛處。當更迭蒸袋。常使熱。薄之如此三五度即定。

太一備急散 主卒中惡客忤。五尸入腹。鬼刺鬼排。及中蠱毒注。吐血下血。及心腹卒痛。腹滿寒熱毒病六七日方。

雄黃（貳兩） 丹砂（壹兩） 桂心（壹分） 藜蘆（柒銖） 附子（伍分。炮。去皮）

蜀椒（半兩。汗。去目閉口者） 野葛（貳十壹銖） 芫花（拾銖） 巴豆仁（叁拾五枚。去心。熬）

右玖味。惟巴豆別治如脂。餘下篩。以巴豆合和。更擣之。令和調。甕器中貯之。密封。勿洩氣。有急疾。水服錢五匕。可加至半錢匕。老小半之。病在頭。當鼻衄。在膈上吐。在膈下利。在四肢當汗出。此所謂如湯沃雪。手下皆驗。秘之千金。非賢勿傳也。

治暴心痛。面無色欲死方。

以布裹鹽如彈子。燒令赤。置酒中消。服之即愈。

還魂湯 主卒忤鬼擊飛尸。諸奄忽氣無復覺。或已死口噤拗口不開。去齒下湯。湯入口活。不下者。分病人髮左右捉踏肩引之藥下。復增取盡壹升。須臾立蘇方。

麻黃肆兩。去節　桂心貳兩　甘草壹兩。炙　杏仁柒拾枚。去尖皮雙仁

右肆味。㕮咀。以水捌升。煮取三升。分叁服。

治卒中鬼擊。及刀兵所傷。血漏腹中不出。煩滿欲絕方。

雄黃粉以酒服壹刀圭。日叁。血化爲水。

論曰。凡諸大備急丸散等藥。合和時。日天晴明。四時王相日合之。又須清齋。不得汙穢。於清淨處。不令一切雜人貓犬六畜及諸不完具人女人等見。則藥無靈驗。不可具言。若不能如法。則必不須合之。徒棄財力。用之與朽木不殊。余以武德中合玉壺丸。時值天陰。其藥成訖。後卒不中用。終棄之。此等

多是上古仙聖。愍苦厄人。遂造此方。以救之。皆云買藥不可爭價。當知其深意云爾。

蠱毒第二　論一首　方七首　灸法一首

論曰。亦有以蠱涎合作蠱藥。著食飲中與人者。惟此一種令人積年乃死。

治人中蠱。人有行蠱毒以病人者。若服藥知蠱主姓名。當使呼喚將去方。

凡中蠱之狀。令人心腹切痛。如物嚙。或吐血下血。不急治食人五藏盡則死。驗之法。唾至水中沈者是也。取敗鼓皮燒作末。水服方寸匕。須臾自呼蠱主姓名。可語令知則愈矣。

治人有中蠱毒。腹內堅如石。面目青黃。小便淋瀝。變狀無常方。

牡羊皮方廣伍寸　犀角壹兩屑　芍藥壹兩　黃連壹兩

梔子柒枚擘　蘘荷肆兩半　牡丹皮一兩

右柒味，㕮咀，以水五升，煮取一升半，分三服。

治蠱毒方。

槲木北陰白皮一大握，長五寸，以水叁升，煮取一升，空腹服之，即吐出。

又方　燒蝟皮灰，以水服方寸匕，差。

又方

槲木北陰白皮　桃根　蝟皮灰　亂髮灰

生麻子汁

右伍味，先以水濃煮槲皮、桃根，取汁壹升，和麻子汁，著灰等一方寸匕，令病人少食，訖，服一大升，行百步，須臾著盆，吐出水中，以雞翎擿吐，水盆中當有如牛涎犢胎及諸蠱形，並出，即愈。

治猫鬼方。

燒臘月死猫兒頭作灰末。以井華水服一錢匕。日一。立差大驗。

治猫鬼方。

相思子壹枚　巴豆壹枚去皮　草麻子壹枚　朱砂半兩　峭粉叁分

右伍味。擣作末。以蜜蠟和爲圓。帶之。即不著人。先著者。消服麻子大一枚。良。

又方　多炙所痛處千壯。自然走去。甚妙。

藥毒第三　方一十二首

野葛毒方。

雞子一枚。打破。併吞之。須臾吐野葛。

又方　煑甘草汁。冷飲之。

又方　服雞屎汁。

解諸藥毒雞腸散方。

雞腸草叁分　薺苨　升麻各壹兩　藍子壹合

坌土壹分　芍藥　當歸　甘草各貳分炙

右捌味。擣篩爲散。水服方寸匕。多飲水爲佳。若蜂蛇等衆毒蟲所螫。上血出著藥如小豆許於瘡中。藥箭所中。削竹如釵股長一尺五寸。以綿纏繞水沾令濕。取藥內瘡中。趂瘡深淺令至底。止。有好血出即休也。若服藥有毒。水服方寸匕。毒解病愈。

野葛毒口噤方。

取青竹去兩節。注臍上。內冷水注中。暖即易之。立活。忌酒。數易水。

一切諸毒方。

甘草三兩　粱米粉合　蜜半兩

右叁味。以水伍升煑取貳升。內粉一合。更煎。又內蜜半兩。

服七合。須臾更服之。

鈎吻衆毒困欲死。面青口噤。逆冷身痺方。

薺苨八兩

右壹味。以水陸升。煮取叁升。冷如人肌。服伍合。日叁服。夜伍服。

又方　煮桂汁飲之。

又方　煮藍汁飲之。

凡六畜五藏著草自動搖。得諸醋鹽不變色。及墮地不汙。又與犬不食者。皆有毒。殺人。

凡食飲有毒者。澆地地墳起者。殺人。

凡肉汁在器中蓋密氣不洩者。皆殺人。

凡脯肉熟肉皆不用深藏。密不洩氣殺人。

若中此毒者。皆大糞灰水服方寸匕。良。

治惡毒藥方。

狗舌草（壹兩，去頭）

右壹味，以水伍升，銅器中煑取汁，溲麪作粥食之。

藥毒不止解煩方。

甘草（貳兩）　粱米粉（壹升）　蜜（肆兩）

右叁味，以水叁升，煑甘草取貳升，去滓，歇大熱，内粉湯中攪令調，内白蜜煎，令熟如薄粥，適寒溫飲壹升。

從高墮下第四（方一十一首）

膠艾湯　主男子絶傷，或從高墮下，傷損五藏，微者唾血，甚者吐血，及金瘡傷經内絶者方。

阿膠（炙）　艾葉（熬）　芍藥　乾地黄（各叁兩）

當歸　乾薑　芎藭　甘草（炙，各貳兩）

右捌味，㕮咀，以水捌升，煑取三升，去滓，内膠令洋，分再服

羸人三服。此湯正主婦人產後及崩中。傷下血多。虛喘欲死。腹痛下血不止者。服之良。千金一方只四味

墜馬及樹崩血。腹滿短氣方。

大豆伍升

右壹味。以水一斗。煑取二升半。一服令盡。劇者不過三作之。千金云。治人墜落車馬。心腹積血。唾吐血無數。

治落馬墮車及諸踠折臂脚痛不止方。

芎藭壹兩半熬　澤蘭壹分　蜀椒去目及閉口者汗　當歸

桂心　附子炮去皮。各半兩　甘草炙。叁兩。

右柒味。微熬令香。擣篩為散。酒服方寸匕。日三。凡是傷至骨。皆服之。十日愈。小兒傷損亦同。

又方

黃耆　芍藥各叁兩　蜀椒壹合。去目及閉口者。汗

烏頭半兩去皮炮　大黃壹兩　當歸　附子炮去皮

乾薑　桂心　續斷　乾地黃

通草各貳兩

右壹拾貳味。擣篩為散。先食訖。溫酒服一方寸匕。日三。

生地黃湯主因損小便血出方。

生地黃八兩　柏葉壹把　黃芩　阿膠炙　甘草炙各壹兩

右伍味。㕮咀。以水七升。煮取三升。去滓。內膠取二升五合。分三服。

治瘀血腹中。奧瘀不出。滿痛短氣。大小便不通方。

荊芥半兩　大黃　芎藭各叁兩　䗪蟲叁拾枚熬　桂心

當歸　甘草炙各貳兩　蒲黃伍兩　桃仁肆拾枚去皮尖及雙仁者

右玖味。㕮咀。以水一斗。煮取三升。分三服。

治折踠瘀血蒲黃散方。

蒲黃壹升 當歸貳兩

右貳味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日三。先食訖服之。

又方

蝱蟲去翅足熬 牡丹皮等分

右貳味。擣篩爲散。酒服方寸匕。血化爲水。

又方 菴藺草汁服之。亦可散服之。日三。

又方

大麻根若葉。

右壹味。擣取汁。數升。飲之。即下氣通。蘇息。無青者。乾者煑汁亦得。千金云。治踠折骨痛不可忍。并主瘀血。心腹脹滿。短氣。

又方 茅根切擣絞取汁。溫和酒服一升。日三。良。

金瘡第五 方六十二首

金瘡止血散方。

釣樟根叁兩　當歸　芎藭　乾地黄

續斷各壹兩　鹿茸半兩，炙　龍骨貳兩

右柒味，擣篩爲散，以傳血即止。酒服一錢匕，日伍夜三。

治金瘡箭在肉中不出方。

白斂　半夏洗去滑，各叁兩

右貳味，擣篩爲散，水服方寸匕，日三。淺者十日出，深者二十日出，終不住肉中，效。

金瘡腸出令入方。

磁石燒　滑石各叁兩

右貳味，擣細篩爲散，白飲服方寸匕，日五夜二，三日當入。

治刀斧所傷及冷瘡牛領馬鞍瘡方。

續斷　松脂各壹兩　鹿角　牛骨腐者　亂髮燒，各貳兩

右伍味，擣篩細爲散，以猪脂半斤并松脂合煎，令和，下鐺

於地內藥攪令冷凝用之。瘡有汁散傅之。

金瘡煩悶方。

白芷　芎藭　甘草炙各貳兩

右叁味，熬令變色，擣篩爲散。水服方寸匕，日五夜二。

消石散 主金瘡先有石發煩悶欲死，大小便不通方。

消石　寒水石　栝樓　澤瀉　白斂

芍藥各壹兩

右陸味，擣篩爲散。水服方寸匕，日三夜一。稍加之，以通爲度。

琥珀散 主弓弩所中，悶絕無所識方。

琥珀

右壹味，隨多少擣篩爲散，以童男小便服之。不過三服差。

弩筋散 主弓弩所中，筋急不得屈伸方。

故敗弩筋五分，燒作灰　秦膠伍分　杜仲半兩，炙　大棗叁枚

乾地黄貳兩半　附子炮去皮　當歸各壹兩

右柒味擣篩爲散，以溫酒服一方寸匕，日三，稍加至二匕，以知爲度。

續斷散 主大金瘡筋骨續絶方。

續斷叁兩半　芎藭　蓯蓉　當歸各壹兩半　細辛半兩

附子炮去皮　乾薑　蜀椒汗去目閉口者　桂心各叁分　蛇銜草

乾地黄各貳兩　芍藥　人參　甘草炙各壹兩

右壹拾肆味擣篩爲散，酒服方寸匕，日三夜一。千金有地榆，古今錄驗又有杜衡。

藍子散 主大金瘡中藥箭解毒方。

藍子伍合　升麻八兩　甘草炙各肆兩　王不留行各肆兩

右肆味擣篩爲散，水服二方寸匕，日三夜二，水和方寸匕如泥塗瘡上，乾易，毒即解。

澤蘭散 主金瘡内塞方。

澤蘭　防風　石膏　乾薑　蜀椒（去目閉口者汗）
附子（炮去皮）　細辛　辛夷　芎藭　當歸（各半兩）
甘草（壹兩。炙）

右壹拾壹味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日三夜一。膿多倍甘草。渴加栝樓半兩。煩熱加黄芩半兩。腹滿短氣加厚朴三分。瘡中瘀血更加辛夷半兩。

蒲黄散 主被打腹中有瘀血方。

蒲黄（壹升）　當歸　桂心（各貳兩）

右叁味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日三夜一。

甘菊膏 主金瘡癰疽。止痛生肉方。

甘菊花　防風　大戟　黄芩　芎藭
甘草（各壹兩）　芍藥　細辛　黄耆　蜀椒（去目閉口者。汗）
大黄　杜仲（各半兩。炙）　生地黄（肆兩）

右壹拾叁味，擣篩，以臘月猪膏肆升煎，五上五下，芍藥色黄，膏成，綿布絞去滓，傅瘡上，日三。

桃仁湯 主金瘡瘀血方。

桃仁五拾枚，去皮尖及双仁　䖟蟲去翅足，熬　水蛭熬，各叁拾枚

大黄五兩　桂心半兩

右伍味，切，以酒水各伍升，煑取貳升，服一合，日三服，明日五更壹服。

馬蹄散 主被打腹中瘀血方。

白馬蹄燒令烟盡

右壹味，擣篩爲散，酒服方寸匕，日三夜一。亦主女人病血，消之爲水。

金瘡内漏方。

還自取瘡中血，著杯中，水和盡服，愈。

金瘡腹中有瘀血二物湯方。

大麻仁叁升　葱白貳拾枚

右藥使數人各擣令熟。著玖升水中煑取半升。頓服之。若血去不盡。腹中有膿血。更令服之。當吐膿血耳。

金瘡內漏血不出方。

牡丹

右壹味。爲散。服三指撮。五日尿出血。

治金瘡因房驚瘡方。

燒婦人褌襠作灰。傅之。

金瘡方。

取馬鞭草擣篩。薄瘡一宿。都差。冬用乾葉末。

麥門冬散 主金瘡乳癰。諸腫煩滿方。

麥門冬去心　石膏研　柏子仁　甘草炙，各半兩　桂心壹分

右伍味。擣篩爲散。酸漿和服方寸匕。日三夜一。煩滿氣上脹逆。長服之佳。

治金瘡出血。多虛竭。內補散方。

蓯蓉　芍藥　當歸　芎藭　乾薑

人參　黃芩　厚朴炙　桑白皮　吳茱萸

黃耆　桂心　甘草炙各壹兩　蜀椒叁分去目及閉口汗者

右壹拾肆味。擣篩爲散。飲服方寸匕。日三。

治金瘡煩滿方。

赤小豆壹升。以苦酒浸之。熬燥復漬之。滿三度。色黑。治服方寸匕。日三。

治金瘡苦不差方。

白楊木白皮。熬令燥。末服方寸匕。日三服。又以末傳瘡中。即愈。

治金瘡刺痛不可忍百方不差方。

葱一把水三升煑數沸漬瘡即止。

治金瘡煩痛大便不利方。

大黄　黄芩 等分

右貳味擣篩爲末鍊蜜和圓先食飲服如梧子七圓日三。

金瘡以桑白皮裹令汁入瘡中或石灰封並妙。

凡金瘡出血必渴當忍噉燥食不得飲粥及漿犯即血出殺人凡白血不止粉龍骨末於瘡上立止。

又方　割取人見著鞋上有斷乳十枚布瘡上立止。

又方　末雄黄傅瘡當沸汁出即差。

又方　刮貝子末服壹錢匕。

又方　煑葛根食之如食法務令多。

兵瘡方擣車前汁傅之血即止。

又方　以人精塗之差。

又方　以柳絮裹傳之血便止。

又方　以熟艾急裹數日乃解。

又方　以人尿屎相和絞取汁飲三升頓服令盡。

金瘡驚而堅腫劇若殺人方。

擣生地黃蠐螬蟲傳之燒瓦熨其外令温地黃燥則易瓦冷則易。

凡刺在肉中不出方。

牛膝根莖擣傳之即出雖已合猶出也。

正觀中有功臣遠征被流矢中其背胎上矢入四寸舉天下名手出之不得遂留在肉中不妨行坐而常有膿出不止永徽元年秋令余診看余為處之瞿麥丸方。

瞿麥貳兩　雄黃壹兩半研　乾地黃　王不留行各伍分

麻黄去節　茅根　敗醬　防風　雀李根皮
牛膝　大黄　藍實　石龍芮　薔薇根皮各兩
右壹拾肆味。擣篩爲末，鍊蜜和圓。如梧子。酒服十圓，日貳。
稍稍加至貳拾圓，以知爲度。忌猪魚生冷等。可直斷口味。
凡箭鏃及折刺入身中。四體皆急。當合此藥服之。令四體
皆緩。緩則其鏃必自跳出。余常教服此藥與斷肉。遂日日
漸瘦。其鏃遂跳出壹寸。戴衣不得行。因即錯却乃得行動。
已覺四體大緩。不比尋常。終冬至春。其鏃不拔自然而落。
取而量之。猶得三寸半。是以身必須斷口味，令瘦肉緩。刺
則自出矣。故以記之。
又方　磁石末傅之止痛斷血。
凡金瘡深。不用早合。若合則以滑石末粉則不合。治凡竹木
刺在肉中方。

以羊矢和猪脂塗之出矣。

又方　鹿角末。水和塗之即出。

治因風水腫方。

卒刺涉水成腫取韭并塩擣置上以火炙藥上熱徹即愈

火燒瘡方。　取新牛矢承熱塗之。

又方　燒桃葉。塩和煮作湯洗之。

又方　以醬汁塗立愈。

又方　桑灰水傅。乾則易。

又方　井底青泥塗之佳。

又方　青羊髓塗之佳。無青羊白黑羊亦得。

治灸瘡及湯火所損晝夜啼呼不止兼滅瘢方。

羊脂半兩　猪脂壹分　松脂半兩　蠟壹分

右肆味。於松明上以小銚火燒猪脂等皆消。以盃承取汁

傅之。松明是服松木節也。

治灸瘡膿壞不差方。

臘月豬脂壹斤　薤白拾枚　胡粉壹兩

右叁味。先煎薤令黄。去之。綿裹石灰壹兩煎去之。入胡粉膏中。令調塗故帛上貼之。日三度。

又方

白蜜壹兩　烏賊魚骨

右貳味。擣末相和。塗上三五度差。

治火瘡方。

柏白皮半兩　竹葉壹兩　甘草貳兩

右叁味。以豬膏壹斤煎三沸。三上三下。藥成去滓。待冷塗之。集驗有地黄肆兩

治漆瘡方。

湯漬芒消伍兩令濃。塗乾即爲，勿住。

又方　取市上磨刀石槽中泥津塗之。

又方　取礬石内湯中洗之。

又方　羊乳汁塗之。

又方　漆姑草挼傅之。

又方　末貫衆塗之。

沙蝨第六　方三十一首

治沙蝨毒方。

以麝香大蒜合擣，以羊脂和著小筒中帶之。

又方

雄黃　朱砂　常山等分

右叁味，五月五日午時，童子合之。

又治水毒方。

凡水毒中人似射工。初得之惡寒。頭微痛。目眶疼。心中煩懊。四肢振焮。腰背百節皆强。筋急。兩膝疼。或吸吸而熱。但欲睡。旦醒暮劇。手足逆冷。二三日則腹中生蟲。食人下部。肚中有瘡。不痛不癢。令人不覺。急治之。過六七日。下部出膿潰。蟲上食五藏。熱盛煩毒。下痢不禁。八九日名工不能醫救矣。覺得之。當早視。若瘡正赤如截者。爲陽毒。若瘡如鱧魚齒者。爲陰毒。猶小緩。不過二十日殺人。欲知是中水毒。當作五六斗湯。以小蒜五升。㕮咀。投湯中。消息勿令大熱。去滓以浴。若身體發赤斑文者。則非他病也。

水毒方。

擣蒼耳取汁。服一升。以綿沾汁滓。導下部中。日三。

又方　取蓼一把。擣取汁。服一升。不過三服。

又方　取藍一把。擣水解。以洗面目身。令遍。

又方

取大莓根末飲之。并導下部。生蟲者用汁。夏月常多賫此藥屑入水浴。以方寸匕投水上流。無所畏。又辟射工。凡洗浴以少許投水盆中。即無復毒也。

蠼螋尿瘡方。

取茱萸東引根土以醋和塗。

又方

燒鹿角末和醋傅上。已有瘡汁出者。燒道邊故蒲席傅之。瘡表裏相當一名浸淫。取猪牙車骨年久者。搥破燒令脂出。熱塗之。

蠼螋瘡方。

取小豆末醋和塗之。乾即易。小兒以水和。

取楝木枝若皮燒灰傅上。乾者膏和。亦治小兒禿及諸惡瘡。

又方

取槐白皮半斤切。醋浸半日去痂洗之。日五六。

狐尿刺方。

凡諸螗蜋之類。盛暑之時多有孕育。著諸物上。必有精汁。其汁乾久則有毒。人手觸之不王相之間則成其疾。名曰狐尿刺。日夜磣痛。不識眠睡。百方治之不差。但取僕公英莖葉根中斷之。取白汁塗之。令厚壹分。塗即差。神驗。

凡熱傷瘡。及狐尿刺腫痛不可忍。并風寒者。皆馬屎若生桑木趣得煙多熏之。汁出即愈。

惡刺方。

五月蔓菁子擣末。和烏牛乳封之。無。即凡牛乳亦得。

又方

取野狐矢燒灰。臘月豬膏和封孔上。

又方　取桑灰汁熱漬，冷即易。

又方　以針砂和膠清塗之。

又方

取故鞋網如棗大，婦人中衣有血者如手掌大，到勾棘針二七枚，三味合燒作灰，以臘月豬膏和塗之，蟲出。

又方

蔓青子伍升

右壹味，微熬末研，小兒尿壹升合，内瓷口中，周回厚一寸，以糖火燒一升，投内瘡於中漬之，立愈。

又方　煮槐白皮取湯漬之。

又方　以苦瓠煮作湯漬之。

又方　取五月五日蛇皮燒灰，臘月豬膏和傅之。

又方　取故鞍韉氊燒灰，臘月豬膏和封之，蟲出。

又方　取獼根白皮切一升。泔漬煮三沸。內孔中。亦可漬之。

肉刺方。　割頭令血出。內鉛丹如米許。暴之。

又方　以刀割却。以好墨塗遍差。

狗齩方。　即以冷水洗瘡。任血出勿止之。水下血斷。以帛裹即愈。

蛇嚙方　以人屎厚塗。以帛裹縛。登時毒消。

蛇毒方。　重臺末唾和封。差。大驗。

蛇蜂毒方。　取瓦子摩其上唾二七訖。然後拋瓦子却安舊處。

癭病第七　方九首

治五癭方。　取鹿厭酒漬令沒。火炙乾。內於酒中。更炙令香。含咽汁。味盡更易。盡十具即愈。

又方

小麥麪壹斤 特生礜石燒十兩。海藻壹斤

右叁味。取三年酢一升漬小麥麪，暴乾，更浸令酢盡，各擣爲散。每服兩方寸匕。日四五服。與含乃咽之。忌薑、辛、豬魚、生菜、辛菜、吹火、讀誦及大語用氣。

又方

昆布叁兩 海蛤貳兩 松蘿貳兩 海藻叁兩 白斂貳兩

通草貳兩 桂心貳兩

右柒味。擣爲散。每以酒服方寸匕。日三服。

又方

小麥壹升。醋壹升。夜浸晝暴 昆布洗 海藻洗，各貳兩

右叁味。擣爲散。食後飲服方寸匕。日三。以差爲度。

又方

昆布壹兩 海藻壹兩 海蛤貳兩 半夏洗，壹兩 細辛壹兩
土瓜壹兩 松蘿壹兩 通草貳兩 白斂貳兩 龍膽貳兩
右壹拾味，擣篩，酒服方寸匕，日再。不得作生活勞動也。

又方

昆布貳兩

右壹味，切如指大，酢漬，含咽汁，盡愈。

又方

海藻壹斤 小麥麪壹升

右貳味，以三年酢一升，以溲麪末，暴乾，往反令酢盡，合擣散，酒服方寸匕，日三。忌怒。

陷脉散主二十三十年瘻瘤及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤，或大如杯盂，十年不差，致有漏潰，令人骨消肉盡，或堅或軟或潰，令人驚惕，寐卧不安，體中掣縮，愈而復發，治之方。千金云。陷脈散。

烏賊魚骨壹分　白石英半兩　石硫黃壹分　紫石英半兩

鍾乳半兩研　乾薑壹兩　丹參叁分　琥珀壹兩

大黃壹兩　蜀附子壹兩炮去皮

右壹拾味，擣為散，貯以韋囊，勿令泄氣。若瘡濕即傅，無汁者以豬膏和傅之，日三四。以乾為度，若汁不盡者，至五劑十劑止，勿惜意不作也。著藥令人不疼痛，若不消，加芒消二兩，益佳。千金有馬蹄壹兩

治癭方。

昌蒲貳兩　海蛤壹兩　白斂壹兩　續斷壹兩　海藻壹兩

松蘿壹兩　桂心壹兩　蜀椒壹兩汗去目閉口者　羊靨貳百枚炙

神麴叁兩　半夏壹兩洗　倒掛草壹兩

右壹拾貳味，各擣下篩，以豬清牛羊髓脂丸之，一服三丸如梧子，日一服。

陰病第八 方一十四首

治丈夫陰下癢濕方。

以甘草一尺，水五升，煮洗之。生用

又方

以蒲黃粉之，不過三。

治丈夫陰腫大如斗，核中痛方。

雄黃壹兩，研粉 礬石貳兩，研 甘草壹尺，生用

右叁味，以水壹斗，煮取二升，洗之，神良。

治丈夫陰頭癰腫，師所不能醫方。

鱉甲壹枚

右壹味，燒焦，末之，以雞子白和傅之。

治丈夫陰頭生瘡如石堅大者方。

刀刮虎牙及猪牙末，猪脂煎，令變色，去滓，日三塗之。

又方

烏賊魚骨末粉之，良。

治妬精瘡方。

丈夫在陰頭節下。女人在玉門內。似甘瘡作臼蝕之大痛。其甘即不痛。以銀釵綿纏臘月猪脂。熏黄火上煖。以釵烙瘡上令熟。取乾槐枝濇塗之。以麝香傳瘡上令香。黄礬青礬末傳之。小便後即傳之。不過三度。

治男女卒陰中生瘡癢濕方。

黄連 梔子貳兩 甘草壹兩 蛇牀子二分 黄蘗壹兩

右伍味下篩粉之。乾者以猪脂和塗上。深者綿裹內中日三。

治下部痛癢生瘡槐皮膏方。

槐白皮伍兩 赤小豆一小合 白芷貳兩 楝實伍拾枚

桃仁伍拾枚。去皮尖双仁 甘草生貳兩。 當歸貳兩

右柒味。切以苦酒漬一宿。旦以猪膏一升。微火煎白芷黄即成。去滓。摩上日再。并內下部中三寸。差。

治陰莖頭瘡方。

當歸叁分 黄連半兩 桃仁貳兩，去雙仁 小豆壹分

槐子半兩

右伍味，作末，粉瘡上，日三。

治陰頭生瘡方。

蜜煎甘草塗之，即差，大良效。

治陰瘡黄汁出方。

熟黄蘗汁，冷漬，傳蛇牀黄連末，極效。

又方

桃仁二七枚，熬令黄，去皮尖雙仁，末之，酒服，良。

又方

生地黄一把，并葉擣取汁，飲之，良。

千金翼方卷第二十

萬病

總療萬病第一

論曰後生志學者少但知愛富不知愛學臨事之日方知學爲可貴自恨孤陋寡聞所以悠其如此忘寢與食討幽探微緝綴成部以貽未悟有能善斯一卷足爲大醫凡膈上冷少腹滿腸鳴膀胱有氣冷利者當加利藥服訖當利出泔澱青黃水青泥輕者一兩度加利藥去病即止重者五六度加利藥得日三頻大利方得盡其根源病乃永愈其利法至巳時以來兩行三行即定亦自如舊終不成利病也凡病在上膈久冷淡癊積聚疝瘕癥結宿食堅塊欬逆上氣等固病終日吐唾逆氣上衝胷脅及咽喉者此皆胃口積冷所致當吐盡乃差輕者一二度重者五六度方愈其吐狀初唾冷沫酸水

次黃汁。重者出赤紫汁。若先患注。人當出黑血。下吐藥大吐。吐時令人大悶。須臾自定。不令人虛惙。得冷飲食已。耳不虛聾。手足不痺。亦有人當吐時。咽中有一塊物塞喉。不能得出者。飲一二合藥酒。須臾即吐出一物。如拳許大。似段雞子中黃。重者十塊。輕者五六枚。

右件等疾狀病之根本。若今日不出比根本之疾。雖得名醫與一二劑湯藥押定。於後食觸。其病還發。善醫者當服此藥。一出根本。即終身無疾矣。

吐利出疾法。

凡長病人。　虛羸人。　老人。　貴人。

此等人當少服。積日不已。病當內消也。不須加吐利藥。

凡加吐利藥傷多。吐利若不止者。水服大豆屑方寸匕即定卒無豆屑。嚼藍葉及烏豆葉亦得定。丈夫五勞七傷陽氣衰

消羸瘦骨立者。服之即差。旬月之間。肌膚充悅。腦滿精溢。仍加補藥。加法在後章中。

療風方 用藥多少法。

歷節風（貳拾兩。酒伍斗） 賊風 熱風 大風（用藥与歷節同）

偏風 猥退 癱緩風（拾貳兩。酒叄斗）

右以上風。皆帶熱。須加冷藥。仍須利藥。得利佳也。

賊風掣縱（捌兩。酒貳斗） 濕風周痺（捌兩。酒貳斗）

脚腰攣痛（拾貳兩。酒叄斗） 筋節拘急（捌兩。酒貳斗）

食熱如針刺（捌兩。酒貳斗） 熱病後汗不出（初覺叄服。壹服壹盞。年久服壹斗）

口喎面戾一目不合（肆兩。酒壹斗。年久拾貳兩。酒叄斗）

起即頭旋（肆兩。酒壹斗） 頭面風似蟲行（捌兩。酒貳斗）

心悶欲嘔吐項強欲陰雨即發者（捌兩。酒貳斗）

因瘡得風口噤脊背反張如角弓（伍服。壹服壹盞）

療冷病方。

積冷淡癊 痩者肆兩。酒壹斗。強者陸兩。酒壹斗半。　淡飲疝瘕 六兩。酒壹斗半

宿食吐逆 肆兩。酒壹斗　癥癖腸鳴噫 捌兩。酒貳斗

癲癇癖塊欬嗽上氣 貳拾兩。酒五斗　奔肫冷氣 六兩。酒壹斗半

噎噦嘔痢 陸兩。酒壹斗半　久疰 捌兩。酒貳斗

卒中惡忤心腹脹滿氣急垂死 叁服。當大吐。壹服。吐出血。壹盞

瘴氣 叁服　蠱毒 五服　温瘧 五服　痎瘧 五服

冷痢 六兩。酒壹斗半　久勞 捌兩。酒貳斗

療婦人方 其風冷等準前。

帶下 拾貳兩。酒三斗　崩中 六兩。酒壹斗半　月水不通 六兩。酒壹斗半

冷病絶產 六兩。酒壹斗半　斷緒 捌兩。酒貳斗　產後諸疾 八兩。酒貳斗

月水不調月前月後乍多乍少 四兩。酒壹斗

落身後病 六兩。酒壹斗半　重者子宮下垂 拾貳兩。酒叁斗

大排風散主一切風冷等萬病方。

芫花　狼毒　欒荊　天雄去皮　五加皮

麻花　白芷　紫菀　烏頭去皮　附子去皮

莽草　茵芋　栝樓　荊芥　躑躅

蕘花　大戟　王不留行　赤車使者

麻黃各貳拾分　石斛　半夏　石南　署預

長生各拾肆分　藜蘆柒分　狗脊　人參　牛膝

蓯蓉　蛇床子　菟絲子　萆薢　車前子

秦艽各柒分　薏苡　五味子　獨活　藁本

柴胡　牡丹　柏子人　芎藭　芍藥

吳茱萸　桔梗　杜仲　桂心　橘皮

續斷　茯苓　細辛　乾薑　厚朴

茯神　山茱萸　防己　黃耆　蜀椒

巴戟天　高良薑　紫葳　黃芩　當歸

昌蒲　乾地黃　通草各肆分

右六十七味。勿熬鍊。直置振去塵土。即擣。麤篩下。藥三兩。黍米三升。麴末二升。上酒壹斗伍升。淨洮米。以水伍升煑米極熟。停如人肌。下麴末熟搦。次下散。搦如前。次下酒攪之百遍。貯不津器中。以布片蓋之一宿。旦以一淨杖子攪三十匝。空腹五更溫一盞服之。以四肢頭面習習爲度。勿輒加減。非理造次。必大吐利。欲服散者。以絹篩下之。一服方寸匕。只一服。勿再也。水飲漿酒皆得服之。丸服者。蜜和服如梧子七丸。惟不得湯服也。須補者。藥少服。令內消。即是補也。千金方有白朮、食茱萸。無麻花、半夏、赤車使者、高良薑、紫葳。止六十四味。名芫花散。一名登仙酒。又名三建散。按後加減法中有遠志。而此方中無。疑此脫遠志也。

○凡服此藥。法先多服。令人大吐下利三五度後。乃少服。

方可得益也。其加增藥法如左。

麻花　烏頭　王不留行　赤車使者

麻黃　躑躅　茵芋　芫花　五加皮

白芷　莽草　附子　栝樓　荆芥

天雄　芎藭　藁本　署預　巴戟天

細辛　獨活　當歸　黃耆　乾薑

厚朴　防巳　山茱萸　大戟　萆薢

桔梗　牡丹　柏子人　狗脊　薏苡

秦艽　菖蒲

右三十六味。並主風多者。患之者準冷熱加減之。

茯苓　芎藭　續斷　蛇床子　王不留行

桔梗　芫花　天雄　附子　躑躅

茵芋　當歸　秦艽　芍藥　乾薑

狗脊　萆薢　石南　蜀椒　乾地黄
菖蒲　署預　石斛　牛膝　細辛
柴胡　車前子　桂心　柏子人　五加皮
杜仲　薏苡
右三十二味。主濕痺腰脊。患之者準冷熱加減之。
秦艽　槀本　狗脊　萆薢　通草
石南　芎藭　續斷　牛膝　乾地黄
石斛　薏苡　菟絲子　杜仲　天雄去皮
附子去皮
右十六味。主攣急軃曳。患之者準冷熱加減之。
莽草　防己　藜蘆
右三味。主身痒疥瘙。患之者準冷熱加減之。
紫菀　牡丹　茯苓　茯神　柏子人

蕘花　人參　遠志　細辛

右玖味。主驚癇患之者準冷熱加減之。

蜀椒　長生　躑躅

右叁味。主鬼魅患之者準冷熱加減之。

紫菀　芫花　藜蘆

右叁味。主蠱毒患之者準冷熱加減之。

高良薑　桔梗　芫花　山茱萸　茯苓

人參　柴胡　牡丹　蕘花　蓯蓉

巴戟天　芍藥　乾薑　附子　烏頭去皮

麻黃　莽草

右壹拾柒味。主痼冷積聚腹痛堅實患之者準冷熱加減之。

厚朴　橘皮　桔梗　大戟　藜蘆

半夏　乾薑　藁本　人參　吳茱萸

右壹拾味。主腹痛脹滿吐逆。患之者準冷熱加減之。

茯苓　厚朴　芫花　半夏　細辛

烏頭　黃芩　柴胡　山茱萸

右玖味。主淡實。患之者準冷熱加減之。

厚朴　乾薑　紫菀　茯苓　桔梗

蕘花　烏頭　人參　細辛　柴胡

右壹拾味。主胷滿痛。患之者準冷熱加減之。

紫菀　署預　石斛　細辛　巴戟天

牡丹　當歸　人參　菖蒲　五味子

桔梗　柏子人　吳茱萸　山茱萸　乾地黃

右壹拾伍味。主補五藏虛損。患之者準冷熱加減之。

柏子　續斷　黃耆　署預　芍藥

巴戟天　五味子

右七味。主益氣。患之者準冷熱加減之。

肉蓯蓉　蛇床子　五味子　附子　天雄

萆薢　栝樓　署預　遠志　巴戟天

菟絲子　牛膝　柴胡　車前子　細辛

茯苓　杜仲　五加皮　石斛

右壹拾玖味。主益精髓。患之者準冷熱加減之。

乾地黄　菟絲子　天雄　附子

右肆味。主補骨髓。患之者準冷熱加減之。

當歸　蘽本　白芷　乾地黄　五加皮

石斛　菟絲子　署預　五味子　厚朴

五加皮　杜仲　續斷

右壹拾味。主長肌肉。患之者準冷熱加減之。

右叁味。主陰下濕痒。患之者準冷熱加減之。

茯苓　人參　栝樓

右叁味。主消渴患之者。准冷熱加減之。

栝樓　茯苓　芍藥　橘皮　秦艽

山茱萸　車前子

右柒味。主利小便。患之者。准冷熱加減之。

菖蒲　栝樓　山茱萸

右叁味。止小便利。患之者。准冷熱加減之。

人參　細辛　菟絲子　狗脊

右肆味。主明目。患之者。准冷熱加減之。

芎藭　白芷

右貳味。主止淚。患之者。准冷熱加減之。

細辛益肝氣　遠志　人參補心氣

右叁味。補益氣。患之者。准冷熱加減之。

石南　萆薢　狗脊　車前子　石斛

右伍味，補養腎氣，患之者，準冷熱加減之。

蜀椒　當歸　麻黄　桂心　吴茱萸

紫菀　蕘花　藜蘆　附子　半夏

烏頭　菖蒲　遠志　細辛　芫花

五味子

右壹拾陸味，主欬嗽上氣，患之者，準冷熱加減之。

蛇床子　石斛　細辛　署預　橘皮

右伍味，主下氣，患之者，準冷熱加減之。

附子　乾薑　人參　桂心　橘皮

厚朴

右陸味，主霍亂，患之者，準冷熱加減之。

黄耆　通草主漏　厚朴　山茱萸　莽草主三蟲

紫菀　當歸　白芷主崩中帶下　黃芩　蛇床子主寒熱漏

芎藭　牛膝　栝樓　紫葳

右壹拾肆味。主月閉。患之者準冷熱加減之。

麻黃　栝樓　柴胡　桂心　芍藥主傷寒

通草　菖蒲　遠志　人參主健忘　附子

黃芩　乾薑　蜀椒主下　紫菀　伏苓

芎藭

右壹拾陸味。主唾稠如膠。患之者準冷熱加減之。

論曰。所加之藥非但此方所須。普通諸方。學者詳而用之。

阿伽陀圓主萬病第二

阿加陀藥主諸種病及將息服法。久服益人神色無諸病方。

紫檀　小蘗　茜根　鬱金　胡椒各伍

右伍味。擣篩爲末。水和內臼中更擣一萬杵。圓如小麥大

陰乾。用時以水磨而用之。

諸咽喉口中熱瘡者。以水煮升麻。取汁半合。研壹圓如梧子大。日服之貳服。忌酒肉五辛。宜冷將息。

諸下部及隱處有腫。以水煮牛膝乾薑等。取汁半合。研壹圓如梧子。大日服之四服。忌酒肉五辛生冷醋滑。

諸面腫心悶因風起者。以水煮防風。取汁半合。研壹圓如梧子。日服之貳服止。不須隔日。禁酒五辛醋肉。

諸四體酸疼或寒或熱。以水煮麻黃。取汁半合。研壹圓如梧子。日服止。禁酒肉及猪五辛。

諸蠱下部有瘡。吞壹圓如梧子大。又煮艾槐白皮。取汁半合。研壹圓灌下部。二度。禁酒肉。

諸卒死服者多活。看其人手脚頭面腹腫觀顏色無定。若有此色而加痢者。並不堪治。以冷水弱半合。研貳圓如小豆灌

口。一服不差。更與一服。若損。唯得食白粥醬醋。禁酒肉五辛。
諸被魘禱。當心常帶壹圓。又以水一酸棗許研壹圓如小豆。
服之。叁服止。無所禁忌。
諸被蛇及惡獸等毒。若未被其毒。直須辟除。隨身帶行。便即
遠離入草。已被毒者。以麝香壹相思子大。又以水壹酸棗許。
共藥壹圓如小豆。於水內研服。并以紫檀以水研取汁。用研
藥。涂其瘡毒處。禁酒肉五辛。
諸被一切鬼神及龍毒氣者。其人飢渴寒熱。時來時去。不知
痛處。或恍惚。龍毒者其人昏昏似醉。膚體斑駁。或青。取藥壹
圓如梧子。以水酸棗許共藥研灌鼻。及服貳圓。服止。無所禁。
諸被鬼繞糺失心癲狂。莫問年月遠近。以艾汁壹酸棗許研
藥貳圓如小豆服之。若無青艾。取乾艾水浸搦取汁用亦得。
肆服止。并帶壹圓。常可隨身。口味無所禁忌。

諸傳尸復連夢想顛倒。身體瘦損。不知病所。乍起乍卧。先以水研雄黃一梧子。大取汁酸棗許。研貳圓如小豆大服之。貳服止。并挂壹圓著病者房門上。及帶壹圓隨身。口味無忌。

諸消渴者。以朴消少許。以水攪消取汁半合許。研貳圓如小豆。服之。柒服止。禁五辛酒肉麪。

諸患淋不問遠近。以芒消少許。以水攪取壹酸棗許汁研藥貳圓如小豆大。服之便止。禁酒肉。

諸患丁腫。以水壹升。煮玄参取汁。研藥服。叁服止。又以水半合。研玄参根取汁。和藥塗上。叁遍。不須隔日。惟食白粥飯。自外鹽以上皆不食。

諸卒肓膈熱。眼暗口臭。以水煮苦竹葉取汁半合。研藥壹圓如梧子。貳服止。禁酒肉。

諸難產。以蓀蔣二七。水煮取汁半合。研藥壹圓服之。若無蓀

蔣。研薑黃取汁研藥吞壹圓。空吞亦得。將息如産時。

諸熱瘡無問遠近。以水煮大黃取汁半合。研藥壹圓如梧子服之。貳服止。又水研大黃取汁。以藥壹圓研塗瘡上。日叁遍。禁房麪五辛。宜令將息。

諸吐血若因熱吐者不問遠近服之。並差。冷吐者不治。以葛蒲汁壹豆酸棗許研藥貳圓如小豆服之。肆服止。須微暖將息。忌酒肉五辛。

諸鼻中血不止。以刺薊汁壹酸棗許研貳圓如小豆服之。并研灌鼻貳服。灌止。若無刺薊之時。取乾者水煮取汁依前法服。禁酒肉五辛。

諸噎病。以水研栝樓取汁壹雞子大。研藥壹圓如小豆服之。肆服止。忌生冷。

諸赤白帶下。以牡丹皮刺薊根各貳分。以水貳升煮取壹升。

分伍服。研藥壹圓如梧子服之。伍服止。禁生冷五辛酒肉。

後補法。

地榆貳分　桑螵蛸貳分。壹云桑耳

右貳味。水貳升。煮取汁壹大合。分作貳服。取汁壹大合。研藥壹圓服之。

諸得藥毒。以冷水半合。研藥壹圓如梧子服之。貳服止。禁酒肉五辛。宜五日冷將息。

諸卒得惡忤。以人乳汁半合。研藥壹圓如梧子大。灌鼻。以水半合研藥壹圓如梧子。灌口。二日禁食。

諸寒瘧。以水一升。煮恒山壹兩。取汁半合。研藥壹圓如梧子大。服之。貳服止。先取藥如麻子大。以冷水研灌鼻中。三四嚏。病者垂頭臥。便得痛痒。又更灌一邊。令相續。然後服藥。七日少食。禁如前。

諸䘌甘濕。以生犀角白檀香。以水煮取汁壹雞子殼許。研藥貳圓如小豆并蚺蛇膽壹圓共研服之。叁服止。若甘濕藥及蚺蛇膽各圓之。以綿裹内於下部中。叁度止。

諸大益神色。除諸病辟惡氣。每日以白蜜如棗核大。研藥壹圓如小豆服。長帶少許。亦禁如前。

諸草藥毒迷悶。以泥裹冬瓜燒絞取汁半合。研壹圓如梧子服之。若無冬瓜用水服之。三日慎食。

諸眠驚恐。常帶藥壹圓如梧子。夜卧安頭邊。不得著身。每夜欲卧服壹圓如梧子。以水一升煮牡蒙貳分取汁半升。分叁服。七日慎食。

諸心勞虛弱。以水煮茯神人參取汁半合。研壹圓服之。拾服以上止。慎生冷。

諸心風虛熱。以竹瀝清漬防風擣絞取汁半合。研壹圓如梧子

服之。柒服止。愼酒肉五辛醋麪。

諸心驚戰悸。以水壹升。切茯苓牡蒙遠志各貳分。煑取汁半升。分叁服。壹服研壹圓服之。伍服止。

諸多忘恍惚。以水煑人參取汁半合。研壹圓服之。伍服止。亦可柒服。愼如前。

諸溫疫時氣。以水煑玄參取汁壹合。研壹圓如小豆服之。肆服止。量冝緩急。惟得食粥及冷食。餘皆禁。

若患勞。家遞相染。煑服時幷取艾作炷。長叁寸。門閫當心炙柒壯。即解。

諸嘔吐。水煑白檀生薑取汁半合。研壹圓如梧子服。叁服止。七日愼食如前。

諸噦病。水壹升。煑通草橘皮各半兩。取汁叁合。分再服。研貳圓如小豆服之。貳服止。愼生冷。

諸小兒驚啼。以水煮牡蒙。取汁半合。研壹圓如梧子塗乳上。令兒飲乳。毋慎酒肉五辛。

諸産後血結。以生地黄汁半合。研壹圓如梧子服之。貳服止。血便消下。忌食酒肉。

諸熱風痺風氣相擊。令皮膚厚澀。關節不通。以防風牡荆子各壹分。畢撥壹分。以水壹升煮取汁叁合。分叁服。每日壹服。研壹圓如梧子大服之。拾服止。慎酒肉五辛。

諸熱風上衝。頭面上痒。鼻中痒。兼時行寒熱若食嘔吐。以人參壹分。防風生薑各貳分。以水壹升伍合煮取汁叁合。分叁服。取汁壹合。研壹圓如梧子服之。柒服止。慎如上法。

諸黄疸病。以黄芩苦參各貳分。以水壹升煮取伍合。分叁服。壹服研壹圓如梧子服之。若渴内茯苓栝樓各貳分。依前以水煮服。惟得與粥。

諸卒失瘖不語。以防風壹兩。和竹瀝擣絞取汁半合。研壹圓如梧子。貳服止。即語重者。不過伍服。禁酒肉醋麪生冷等。

諸懷孕三月以上。至臨産不問月日多少。忽染種種疾。或好傷落及至水腫天行時氣。此醫人不許服藥。惟得此藥。叁服以上。重者不過拾服。即瘥。母子不損。平安分解。前件諸病可作湯研藥服之。甚良。

諸産後先痢鮮血。後雜膿及腹中絞痛。橘皮桔梗各貳分。生薑壹兩。水壹升。煮取半升。分叁服。壹服研壹圓如梧子服之。七日慎生冷油膩醋麪。

諸小兒新得風癇。以竹瀝半合研壹圓如梧子服之。貳服止。慎如前。

諸女子數傷胎。帶壹圓如酸棗大。夜即解安頭邊。不得著身。每日服壹圓如梧子。三日止。無忌。

諸卒腹脹。水煮當歸取汁半合。日服壹圓如梧子。貳服止。慎生冷。

諸臍下絞痛。以水煮芎藭取汁半合。研壹圓如梧子。叁服止。七日慎飲食生冷。

諸蛇蠍蜈蚣毒。以水磨鬱金取汁半合。研壹圓如梧子服之。貳服止。并研壹圓如小豆。遍塗瘡上。忌如前。

諸霍亂因宿食及冷者。吐逆腹中絞痛吐痢若冷者。以桔梗乾薑以水煮取汁壹酸棗研貳圓如小豆貳服止。因熱者用梔子仁以水煮取汁。依前法服。皆慎生冷。

諸注病。以水煮細辛取汁壹酸棗許。研貳丸如小豆服之。五服止。冷者溫將息。

諸中惡。以水煮甲香取汁壹酸棗許。研貳圓如小豆服之。

耆婆治惡病第三 方壹拾壹首 論柒首

論曰。疾風有四百四種。總而言之。不出五種。即是五風所攝。云何名五風。一曰黃風。二曰青風。三曰白風。四曰赤風。五曰黑風。其風合五藏。故曰五風。五風生五種蟲。黃風生黃蟲。青風生青蟲。白風生白蟲。赤風生赤蟲。黑風生黑蟲。此五種蟲食人五藏。若食人脾。語變聲散。若食人肝。眉睫墮落。若食人心。遍身生瘡。若食人肺。鼻柱崩倒。鼻中生息肉。若食人腎。耳鳴啾啾。或如車行雷鼓之聲。若食人皮。皮膚頑痺。若食人筋。肢節墮落。五風合五藏。蟲生至多。入於骨髓。來去無礙。壞於人身。名曰疾風。疾風者。是癩病之根本也。病之初起。或如針錐所刺。名曰刺風。如蟲走。名曰遊風。遍身掣動。名曰瞤風。不覺痛癢。名曰頑風。肉起如桃李小棗核。從頭面起者。名曰順風。從兩脚起者。名曰逆風。如連錢團圓。赤白青黑斑駁。名曰癗風。或遍體生瘡。或如疥癬。或如魚鱗。或如榆莢。或如錢孔。

或痒或痛。黄汁流出。肢節壞爛。悉爲膿血。或不痒不痛。或起或滅。青黄赤白黑。變易不定。病起之由。皆因冷熱交通。流入五藏。通徹骨髓。用力過度。飲食相違。房室不節。虚動勞極。汗流遍體。因茲積熱。風熱徹五藏。飲食雜穢。蟲生至多。食人五藏骨髓皮肉筋節。久久壞散。名曰癩風。是故論曰。若欲療之。先服阿魏雷圓散。出蟲。看其形狀青黄赤白黑。然後與藥療。千萬無有不差。胡云迦摩羅病。世醫拱手無方對治。名曰正報。非也。得此病者。多致神仙。往往人得此疾。弃家室財物入山。遂得疾愈。而爲神仙。今人患者。但離妻妾。無有不瘥。

阿魏雷丸散方。

阿魏　紫雷丸　雄黄　紫石英各叁兩

朱砂　滑石　石膽　丹砂　雚蘆

白斂　犀角各半兩　斑貓去足　芫青去足翅，各肆拾枚

牛黃伍分　紫鉚壹兩

右壹拾伍味擣篩爲散空腹服壹錢匕清酒貳合和藥飲盡大飢即食小豆羹飲爲良莫多食但食半腹許即上若食多飽則蟲出即遲日西南空腹更壹服多少如前若覺小便似淋時不問早晚即更服藥多少亦如前大飢即食若覺小便時就盆子中出看之蟲從小便出當日即出或二日三日乃出或四日五日出或殺藥人七日始出其蟲大者如人指小者大如小麥或出三四枚或五六枚或七八枚或十枚或三二十枚黃蟲似地黃色赤蟲似碎肉凝血色白蟲似人涕唾或似魚腦或似薑豉汁青蟲似綠或似元青色黑蟲似墨色或似爛椹又似黑豆豉其蟲得藥者死死者即從小便中出大便中亦有出者不浮不可得見若出黑色蟲即是黑風不可理之無方可對若出黃蟲即

是黃風。當用小便七八升。大瓮盛之。如竈法安瓮。不津者盛小便中。常令使暖。入中浸身一日再三度。一入中坐浸如炊二三斗米頃。若心悶。即出湯。數食臭。令飢虛則於人無力。七七四十九日即爲一徹。以差爲度。或一年二年。忌房室。房室脉通。其蟲得便病。即更加。其患冰冷熱風。治如此。此是橫病。冰正報也。若出青蟲。即是青風。患起由冷風至多。其蟲皆青。即是東方木中毒風青蟲。宜服自身小便。亦名花水。亦名清湯。亦名還中水。服法。空腹服一七日。一服六合。旦起日初出即服。服不過一升。飢即食。不得食五辛猪肉雞犬穢食臭惡之食。大嗔怒房室。皆忌之。服法第一忌之。至二七日。一日再服。服別四合。服小便常取空腹服之。則不過一升。三七日。一日三服。至四七日。小便出即服。乃至周年。以差爲度。服之不過一升。百日外。小便至少一日之中止可一度二度服之。服

大香美好如羹如漿。忌法三年。犯則難差。不犯永愈。青蟲如此是橫病非正報也。出白蟲者。即是白風。赤蟲者。即是赤風。同為一等療。二風由熱為根。蟲皆赤白乃是南風西風入五藏通徹骨髓成患為疾。此之二風與苦參消石酒飲之。除患最疾。熱去其患即愈。

苦參消石酒方。浸酒法在後。

苦參　消石　好清酒

右三味。先與清酒下消石浸之二七日。或三七日然後與苦參同入酒瓮中。盛浸之七日。漸漸服之。飲法。空腹服之。一日三服。初七日中一服如半雞子許。七日後可飲一升。任情飲之。多則為善。患去則速。風動亦多。勿使醉吐。寧漸少飲。不用多飲。赤白二風。此藥至日無有不愈。餘非難治。何以故。熱為根本。故苦參能治熱。消石除熱消蟲。赤白二蟲但聞消石氣

皆變為水。能去熱根本。若患赤白二風。不問年月。多者五年以外。加黄消石。加酒苦參乃至三四兩。無有不愈。乃至三十年無鼻柱。肢節墮落者。但非黑蟲。皆悉永愈。第一忌房室。大瞋怒。大熱。食禁。粘食。五辛。生冷。大醋。酪。白酒。猪魚。雞犬驢馬牛羊等肉。皆為大忌。自餘不禁。此為對治。非正報也。若人頑痺不覺痛痒處者。當作大白膏藥摩之。一日三四度。七日徹。或二三七日徹。乃至七七日。四十九日。名曰一大徹。頑痺即覺痒。平復如本。即止摩。若不平復。但使摩之。以差為限。不過兩大徹。三大徹。無有不愈。針刺灸燒割劫。亦不及摩之為良。乃至身上多有瘡痕。生摩之悉愈。

大白膏方

白芷　白朮　前胡　吳茱萸各一

芎藭各二　蜀椒　細辛各三　當歸

桂心各二兩　苦酒四升

右壹拾味，以苦酒浸藥經一宿，取不中水猪脂十斤，銅器中煎令三沸，三上三下，候白芷色黃膏成，貯以瓶中，隨病摩之即愈。若遍體生瘡膿血潰壞，當作大黑膏摩之。

大黑膏方。

烏頭　芎藭　雄黃　胡粉

木防己　升麻　黃連　雌黃

藜蘆　礬石各半兩　杏仁去皮尖　巴豆各四十枚

黃蘗一分　松脂　亂髮各如雞子大

右一十五味，擣篩為末，以猪脂二升合藥煎，亂髮消盡膏成，用塗瘡上，日三傅。先以鹽湯洗，然後塗之。勿令婦女小兒雞犬見。若患人眉睫墮落不生者，服藥後經一百日外，即以鐵漿洗其眉睫處所，一日三度洗之，生毛則速出。一大徹眉睫

如本與不患時同也。

浸酒法。

苦參去上黃皮薄切暴乾擣令散莫使作末秤取三十斤。取不津瓮受兩斛者。瓮底鑽作孔。瓮中底頭著二三十青石子。如桃李雞子許大。過底孔上二三寸。然後下苦參下消石末酒。一時著瓮中。遣童子小兒年十三四者和合調停。然後即與五六重故紙繫瓮口。用小瓮口合上。泥之。莫使漏氣。取酒服時法孔中出酒服之。一日一服或再服亦得。還如法密塞孔勿漏洩。不得開瓮口取酒。酒欲盡時開瓮口取苦參滓急絞取酒。其滓去却。其酒密處盛之。莫使漏氣。服酒法一一如前。無有不愈。若患不得差除者。皆由年多十年者更作此藥酒至兩劑。無有不愈。依法如前。雖用良醫治之。亦須好酒。須行忠直。不得不孝不義。患除則

速矣。

論曰：苦參處處有之，至神良。黄消石出龍窟，其狀有三種：一者黄消石，二者青消石，三者白消石。其形如鹽雪體濡，燒之融似曲蟮，見鹽爲水。消石真者燒鍊皆融，真僞可知。三種消石，黄者爲上，青者爲中，白者爲下。用之殺蟲，皆不如黄者最良。黄消石立殺人身中横蟲，去蟲至速。除大風大强藥，青消石者至神。大藥出在烏場國石孔中，自然流出，氣至惡，大臭，蜂蛇飛蟲皆共宗之。其氣殺蟲。消石與苦參酒相入，治熱至良，去風至速，方稀有用時，乃勝於白消石。此青消石體狀也，如似世間膠漆，成時亦如陳蜜，亦如錫餔，少必枯體澤，又似塵汙脂蜜，氣味至惡。此藥道士貴服，則去人身中横蟲，不能得用時，先與三升酒浸之二十日，多日爲佳，其勢倍效，皆大驗。然後與苦參同浸。

論曰：黄青白消石等，是百藥之王，能殺諸蟲，可以長生，出自烏

埸國。採無時。此方出耆婆醫方論治疾風品法中。黃力三藏譯後演七卷。治疾風品法云。服藥時先令服長壽延年符大驗。湯除身中五藏六腑游滯惡氣皆出盡。然後服藥得力。其疾速驗無疑。符力亦是不思議神力。先服藥者。無有不效。又生造藥入甕中時。令童子小兒和合訖。即告符書鎮藥。符鎮在甕腹令藥不壞。久久爲好。一切神鬼不可近之矣。

論曰。疑師不治病。疑藥不服之。服之即不得力。決意不疑者必大神驗。一切藥有從人意即神。疑人必失。及久多必損。不疑久者有益。治病當有愈。醫論如此說。是以令知服藥先服藥符大驗。遣諸惡氣藥勢。必當有效。朱書空腹服之訖。即服藥如前說。



朱書此符

先服此符。然後服藥。一服之後。更不須再服晝符。用六合日。勿令小兒女子六畜雞犬等見之。符成不忌。

論曰。病起從上者。名爲順。病則易治。治則病疾愈。從下起者。名爲逆。病難治。倍藥可差。

論曰。患在五藏骨髓者。非湯藥不愈。患在皮膚肉脉中者。針刺可差。湯藥益人精神。久有益。患易除愈。盡其根源。針灸雖得目下解急。於人神濁。養性延年。要是湯藥。非針灸之所及也。湯丸散酒延年益壽。燒灸針刺。於身不利。

論云。疾有多種。所患不同。有蟲癩疥癩風癩金癩木癩水癩火癩土癩酒癩蟨癩。此皆作癩。

蟲癩者。得即生瘡膿血潰爛。眉鬢墮落。三年爛壞。蟲如馬尾。此患難治。加藥乃愈。

疥癩者。狀如癬瘙。身體狂痒。十年成大患。加藥乃愈。

風癩者。風從體入。或手足刺痛。風冷痺癡。不療。二十年後成大患。加藥乃愈。

金癩者。是天所爲。負功德祟。初得眉落。三年食鼻。鼻柱崩倒。難治。加藥乃愈。

木癩者。初得先落眉睫。面目痒如復生瘡。三年成大患。宜急治之。加藥乃愈。

水癩者。先得水病。因却留停。風觸發動。落人眉鬚。宜急治之。經年病成。加藥乃愈。

火癩者。先於身體生瘡。如火燒瘡。或斷人肢節。七年落眉睫。八年成大患。難治。加藥乃愈。

土癩者。身體瘖瘰如雞子彈丸許。宜急治之。六年成大患。加藥乃愈。

酒癩者。飲酒大醉。不覺臥黍穰中。經夜方起。遂即成疾。眉鬚墮

落。速治可差。

㢡癩者。遍身有瘡生蟲。其蟲形如㢡。舉體艾白。此病難治。加藥乃愈。

凡三十九種病。或面疱起身體頑痺。不覺痛痒。或目圓失光。或言音麤鹿。或眼掌多睡。或從腰從足腫。種種不同。莫能識者。病兆一般。或所得各異。若眉鬢墮落。皆由風冷因濕得之。或因汗入水。冷氣太過。或飲酒大醉。濕地而卧。或立當風衝樹下露坐。或房室過度流汗。極體取冷。風入五藏。遂成斯患。是故論出患之所根本藥之分劑。未來病者按而用之。無有不愈。

浸湯方

桃柳各十斤　莨菪　藜蘆　烏頭去皮

茵芋　丹參　楮葉　白羊羶

柏葉　藜皮　大黄　鬼扇

桑甲　藁本　棗葉　松葉
食茱萸一升　鹽五升

右一十八味，細剉，內大釜中，以水七斛，煎取汁四斛，去滓，內槽中。令病者臥浸，旦至食時便出，日中時復入，日西復出，其湯常欲得煖，以自消息，出湯即用十種粉粉之，不得使風入，被覆溫臥，使身汗流，病即差，若風多，可加藥如左。

蒴藋　艾葉　瓜根　虎掌各三斤
兔絲　木防己　狐骨各五兩　礬石二兩
大鹽一升　馬牙消三兩

右壹拾味，擣篩為散，出湯用粉粉身，使風不入，諸癩病生瘡，一切諸惡瘡，止用粉粉之，立差矣。

又作酒法。

茵芋　烏頭去皮　天雄去皮　附子去皮

蜀椒　防風　石南　乾薑

桂心　躑躅花　莽草　甘草各一兩

右壹拾貳味，㕮咀，絹袋盛之，清酒壹斗漬之，春秋七日，夏五日，冬十日，一服三合，日三服，以知為度，不知漸增，禁如藥法。

仙人黃靈先生用天真百畏丸治一切癩病方。

淳酒二斗，以銅器中煮之減半，然後內藥　丹砂　水銀

桂心　乾薑　藜蘆　烏頭炮去皮

蜀椒汗　菖蒲　柏子人各壹兩

右壹拾味，擣篩為散，內酒中，訖，復下淳漆二升，攪令相得，可丸如梧子，作丸百丸，日服一丸，日三，十日眉鬚生，三十日復本也。

九霄君治十種大癩不可名狀者，服之病無不愈方。

用三月庚寅日取蔓菁花四斤，陰乾末之，五月辛酉日取

兩井水一斗，內銅器中煎之，令濃，然後內。

桂心末　附子末（炮，去皮）　藜蘆末（各壹兩）　乾漆末（四合）

石榴末（一升）

右五味，藥末攪使相和，煎令成丸，如彈丸大，服一丸即愈。若不差者，不過三四丸即愈，大驗。此方出九霄君守朴經。

仙人治癩病神驗方。

取松葉不問多少，煮三五遍，令苦味盡，暴乾，擣末如麪。先食服二方寸匕，日三，漸增之，或可至四兩，隨人多少，至壹斤。飢即服之，能愈萬病，又益壽延年，殺三蟲，食人五藏，動發若病難忍，四肢重，不仁，婦人產後餘疾，月水往來不得續，男女少者，藥悉主之。

礬石釀酒方。

礬石（燒）　石膏　代赭　恒山

蜀椒去目閉口者汗　遠志去皮　狼毒　半夏洗

芒消　礬石鍊　玄參　麻黃去節

防風　桔梗　秦艽　石南

石韋去毛　黃連　莽草　乾地黃

凝水石　菟絲子　甘草炙各壹兩　白石英壹兩半

杏人貳拾枚去皮尖熬

右二十五味，擣篩，盛以韋囊中，以時麴三斤，米三斗，作酒，酒熟合藥封之，冬十日，春七日，夏三日，秋五日，出藥去滓，服酒如一雞子，酒勢盡復進之，所治無有不愈，日再，十日知，三十日愈，百日面白如桃李花色，耳目聰明，邪氣蕩除，去魂還復，服藥當齋戒，有效驗矣。

蹋麴療冷第四　方六首

鹽麴主一切風冷氣等萬病方。

麴末五升　鹽末五升一合

右二味熟擣。分作五袋。旦取二袋。炒令熱。以薄袋各受一升。内藥於中。更遞盛之。於室内卧。以脚蹋袋。以被覆之。取汗。其藥冷即易。初一日一夜限以十度炒之。於後連日連夜數炒頻蹋。不得暫停。其藥既易多無力。即棄之。别取新者。惟候遍體汗盡。其病方差。特須細心。多日乆候汗盡乃止。未盡時間數有悶亂。惟食香漿粥飯。特忌生冷。所卧床上數白熟羊皮刺風汗並盡。然後乃補之。三部脉微弱者勿用之。

補酒方。

石韋十兩去毛　石南三兩炙　仙靈脾十四兩　細辛五兩

右四味切。和以水一斗。煎取二升。去滓。經宿澄。杏仁一升。去皮尖及雙人。擣以水八升。研取汁。煎取二升半。經一宿。以二汁合之。計得四升半。以乾麴一斗五升。先以五加皮汁浸麴。

停一宿。其次下石韋等汁。一時合和。以上黍米七升八分爲七酘。三日下酘。凡三十九日即熟。取麻子一升。淨擇炒令香熟。擣作末。以絹袋盛內酒中。經三日。量力稍稍服之。以知爲度。其補日與蹋麴日等。盡補以來。大小便不得出屋。忌房室喜怒。若犯忌後發。難差。其無酒可補者。別補方如左。

羊肚肝腎心肺一具。以熱湯淨洗肚。白餘藏皆生細切　犛牛酥

胡椒　蓽撥各一兩　豉心半升　葱白三握。去鬚。細切

右五味。合和。以水六升。緩火煎取三升。絞去滓。和藏等并餘汁並內肚中。以繩急繫口。更別作絹袋一口。稍小於羊肚。煑之。若熟乘熱出。以刀子并絹袋刺作孔。瀝取汁。空腹服令盡。餘者任意分作羹粥食之。其無五藏。可得用羊骨以補之。其方如左。

生羊膏擣碾。

右以水一石。微火煎取三升。依食法任意作羹粥食之。其不食肉者。以油麪補之方如左。

生烏麻油一升　折粳米泔清汁一升

右二味。合和。微火煎盡泔清汁。惟有油在即止。停冷以用作食補法如左。

以上油三合　醯汁七合

右二味。先以醯汁和油攪令鹹淡得所。即用以溲麪一升。依常法作餺飥。煮五六沸。漉出置冷水中。更漉出置盤上令乾。後更一葉葉擲釜中。又煮如常法。十度煮之。麪毒乃盡。以油隨意多少和豉令味足。以澆食大好。

內釀法主婦人絕產及冷結氣宿食不消男子五勞方。

生地黃五升。細切，以水洗漉乾擣取汁　麴末二升

右二味。合和。內小甕子中。密塞口勿泄。春夏秋三十日。冬埋

入地三尺四十九日出之。暴乾。擣篩。以糯米作粥一升。以散二方寸匕和服之。日三。任意服之。不限時節。使以爲常食。取飽足而已。更不得餘食也。服盡以來。其病並差。七日後任如常食。

千金翼方卷第二十一

千金翼方 卷二十一

千金翼方卷第二十二

（飛鍊）

飛鍊研煮鍊乳及和草藥服療第一 論六首 方

鍊鍾乳法

鍾乳無問厚薄。但令顏色明淨光澤者，即堪入鍊。惟黃赤二色不堪用。一斤置金銀器中，可鎮心益氣，無者用瓷器亦得。大鐺中著水，置乳器於水，令沒。煮之，常令如魚眼沸。水減更添。若薄乳三日三夜，若雁齒及厚肥乳管者七日七夜。候乳色變黃白即熟。如疑生，更煮滿十日爲佳。煮訖出金銀器。其鐺內水盡黃濁，棄之，勿令人服。若服此水，便戟人咽喉，傷人肝肺，令人頭痛，又令人下利。有犯者，噉猪肉即止。棄此黃汁，更著清水，還內上件乳器，煮之半日許出之。其水猶清不變，即止。乳無毒矣。

研鍾乳法。

取所鍊鍾乳於瓷器中用玉鎚擣令碎。著水研之水盡更添。常令如稀泔狀乳細者皆浮在上麤者沉在下復繞鎚研之易碎滿五日狀如乳汁至七八日其乳放白光非常可愛取少許置臂上拭之狀如捻書中白魚滑自然白光出便以水澆之不隨水落便熟若得水而落者即生更須研之以不落爲度熟已澄取暴乾丸散任意服之。

崔尚書乳煎鍾乳主治積冷上氣坐臥不得并療風虛勞損腰脚弱補益充悅強氣力方。

鍾乳參兩

右壹味研如麪以夾帛練袋盛稍寬容緊繫頭内牛乳壹大升中煎之三分減一分即好去袋空飲乳汁不能頓服分爲再服亦得若再服即取晩間食消時服之如能頓服即平旦

盡之。不吐不利。若稍虛冷人。即微下少鴨湯亦無所苦。明旦又以一大升牛乳准前煎之依法餌之其袋子每煎訖即以少許冷水濯之。不然。氣不通洩。如此三十度以上四十度以下即力盡。其袋中滓和麪飼母雞。取其生子食亦好。不然用浸藥酒亦得。若有欲服白石英並依此法。若患冷人即用酒煎。患熱人即用水煎之。若用水及酒例須減半乃好。若用牛乳三分減一分。補益虛損無以加之。永不發動。忌食陳久敗物。不可噉熱麪猪魚蒜等。

服鍾乳酒方。

鍾乳（三兩。取成鍊上者）

右一味。以無灰新熟清美酒一斗。於不津器中相和密封閉。冬七日夏三日。空腹溫服三合。日再。漸加之以知為度。十五六日可盡。將息節食忌如前法。

草鍾乳丸方。

曹公方主五勞七傷損肺氣急。主療丈夫衰老。陽氣絶。手足冷。心中少氣。髓虚腰疼脚痺。身煩口乾不能食服之安五藏補腸胃能息萬病下氣消食長肌和中方。

鍾乳貳兩別研令細　菟絲子壹兩酒浸宿別擣

石斛壹兩　吴茱萸半兩

右四味別擣篩爲末。鍊蜜丸如梧子。空腹服七丸。日再服之。訖。行數百步。温清酒三合飲之。復行二三百步。口胷内熱。熱如定。即食乾飯豆醬。過一日。食如常暖將息。不得聞見尸穢等氣。亦不用食麤臭陳惡食。初服七日不可爲房事。過七日後任性。然亦不宜傷多。服過半劑覺有效。即相續服三劑。終身更無所患。多房者加雄蛾三十枚。若失精者加蓯蓉叁兩。

服軟生乳方。此乳名爲甲乳

此乳力減者倍服之，永不發。其乳長半寸，以水浮著上研

依法令極細，即於舍米飯下蒸之，飯熟即止，任意服多少。一無

禁忌。服乳者更石得服餘石，當令人却致不和。

飛鍊研煮五石及和草藥服療第二 論一首 方一十一首

服白石英方。

白石英（罰上者。無多少）

右壹味，先以生絹袋盛，於七升米飯下甑中蒸四五遍，然後

細擣，以密絹篩之，用玉搥研令細，入肉者澄取清水飛，取更

以白練袋盛，急縫，麪裹飯中蒸三遍，取猪脂壹斤，水浸十日，

日兩度易水，赤脉盡則休，剥去薄膜，微火鍊出，以白石英末

和之，攪令相入，和酒服一匙，日二服。其飛石水，收取用煑粳

米粥，任性喫酒多少，每須覺有酒氣爲佳。

燒白石英方。

白石英醴大

右以坩土鍋子盛石蓋頭。炭火燒之。先取一瓷器貯二升無灰酒。燒石令赤。即投酒中。待冷。任酒性多少飲之。好石可二兩。度乃棄之。安庭中。即云。喫十兩。令人年七十氣力可共二二十時無別。

白石英和金銀人參煑服方。

白石英伍兩大　金拾大兩上熟者生者有毒

銀四兩大　人參貳大兩全用

右四味。取壹鐵釜。淨洗。即下前藥於釜中。先下水參大升。立壹杖入釜中。令至底。水所浸著處即刻記。至更下水貳大斗柒升。水通前計參大斗。煎之如魚眼沸。漸減之杖所刻處即停火。急取濕土置釜底。取其汁。貯以不津器中。金銀石等漉出。收取其人參。隨藥汁細細喫之。其汁每朝空腹服參大合。

至暮服貳大合。每服之後。隨性飲多少酒。使藥氣行。欲作食餌亦任。忌倉米停滯陳臭之食。自外百無所忌。

石英和磁石浸酒服方。

白石英伍大兩。澤州者 磁石伍大兩。無毛連針多者。拾兩亦得

右貳味。各別擣令碎。各用兩重帛練袋盛之。以好酒壹斗置不津器中。挂藥浸經六七日。以後每日飲三兩盃。常令體中微有酒氣。欲加牛膝丹參杜仲生地黃吴茱萸黄耆等藥者。各自量冷熱及所患。并隨所有者加之。仍隨所加有忌者即禁之。餘百無忌。中年以後則鬚髮變黑。腰疼耳聾悉差。其酒三五日後即漸添一二升。常令瓶滿。所加草藥疑力盡者。任换之。經三四箇月。疑石力稍微者。即更出擣碎。還以袋盛經半年後即棄之。準前更合。

煮石英服方。

石英（伍大兩，澤州者。）

右壹味。打碎如小豆蕎麥許大。去細末。更於水中淘洗令淨。重帛練袋盛之。以繩繫頭取五大升清水。於不津鐵鐺中煮之。煮時石袋不用著鐺底。恐沙石煎壞。先以一杖橫鐺口。挂石袋著杖上。去底二三分許。煮取一升。汁置椀中。經宿澄取清。平旦空腹頓服之。若以此汁煮稀粥服之亦佳。每服後可行三五百步。并飲三兩盞清酒。又依前煮經二十度者。石即無力。可以布裹之。埋於南墻下深三尺。滿百日又堪用。依前服之。然終不如新者。

服地黃石英酒作丸補益方。神秘

生地黃（拾大斤，十月採者，細切）　石英（伍大兩）　無灰清酒（貳斗）

右以坩土鍋盛石英。燒令極赤。內著酒中。去石。以地黃內酒中浸之。經二三日出之。暴乾。復內酒中。以酒盡為度。惟留壹升

許汁。擣地黃爲末。以壹升殘酒和末作丸。熟擣爲佳。日二服。任食。以意消息。極押熱補益。百無禁忌。亦不發動。秘之。心腑矣。地黃取肥大者佳。

牛乳煑石英服方。

石英二大兩。澤州者。　牛乳壹大升　水叄大斗

右先下牛乳於鐺中。即以生密絹四重作袋。盛石英。繫頭下著乳中。即勿令袋著底。以杖則之爲記。訖然後下水。以炭火消消煎之。水盡乳在還。以前杖則之。至刻即休。出石袋。以水濯之。其乳以綿濾之。令煖調適。每朝空腹細細服之。若患冷氣。宜加八顆畢撥和煎之。大善。或以乳煑粥喫。亦佳。如是經二十日。服即停。大補益身心。服者乃自知之。

紫石湯主心虛驚悸寒熱。百病令人肥健方。

紫石英　白石英各拾兩　乾薑　赤石脂

白石脂各叁兩

右伍味皆完用。石英等各取壹兩。石脂等三味各取叁兩。以水三十升。微火煎取二升。宿物食。分為四服。日三夜一服。至午時乃可食。日日依前秤取。以昨日滓仍置新藥中。其煑乃至藥盡。常然水數一准新藥。水藥皆盡訖。常添水煑滓服之。滿四十日止。忌酒肉。藥水皆大秤斗。取汁亦大升。服湯訖。即行住坐臥。令藥力遍身百脉中行。若患大冷者。春秋各四十九日服之。冷疾退盡。極須澄清服之。

論曰。此湯補虛除固冷。莫過於此。但能用之。有如反掌。恐後學者謂是常方。輕而侮之。若一劑得差則止。若傷多者。令人大熱。復須冷藥押之。宜審用之。未可輕也。

石英汁作薑豉服方。

白石英碎大　肥猪肉叁斤

右以水捌升，煑石英取五升，下量煑猪肉，得爛熟爲度，取猪肉汁下葱豉，切肉作薑豉食之。一劑可六七日喫令盡。一兩石英三度煑之，第一度全用，第二度中破，第三度擣碎煑之。每煑皆用帛練袋盛之，石經三煑即换新者。一月以前、八月以後皆可作之。

猪肚煑石英服方

白石英末，以絹袋重盛縫却口　生地黄切　生薑細切

人參末各貳大兩　猪肚一具，洗料理如食法　豉壹升

羊肉半斤，細切　葱白七莖，細切　新粳米壹合

蜀椒四十九顆，去目閉口者

右壹拾味藥，并石英袋内著猪肚中，急繫口，勿使洩氣及水入。以水二斗煑取八升，即停，以藥肚著盤上使冷，然後破之，如熱破恐汁流出。先出石袋訖，取煑肚汁將作羮服之。每年

三度服每服石英依舊餘藥換之分數一依初法每服隔一兩日不用食木耳竹笋又人年四十以下服二大兩年四十五十乃至六十以上加二兩常用四月以後服之者以石性重服經兩月後石力若發即接入秋氣石力下入五藏腰腎得力終無發理也

石英飼牸牛取乳服方

白石英大二斤以上亦得

右壹味擣篩細研經三兩日研了取壹牸牛十歲以上養犢者惟瘦甚佳每日秤一大兩石末和剉豆與服經七日即得取乳每日空腹熱服一升餘者作粥任意食之百無所忌以五月上旬起服大良如急要亦不待時節終無發也其牛糞糞地隨意種菜還供服乳人喫之亦佳

石英糞地種菜食方

白石英伍大斤。以下亦可

右壹味。擣研末。如前取糞地種枸杞牛膝豆菜等。食之大益久。

鍊白石英方。

白石英伍小兩為一劑。取上黨無瑕者佳

右壹味。擣石英使碎。著研藥鉢中。以水浸石濕遍。不須多著水。即研令細如粉。訖更著水使石上厚半寸許。攪之使渾。澄定瀉澄水於一淨器中。餘麁者乃更細研之。還以水如前法。以細為限。最下者即是惡石。不堪用。棄之。搃了又更一遍飛之了。可著日中及物藉之安熱灰上即乾。每以酒服二匕許。酒能使石不用和餘藥。

服白石英粉方。

白石英任多少。瑩淨者

右研飛石如前成粉訖嘗之不磣搗之入肉者為細不然不堪服以四兩為一劑取好白蜜和之分為二十一丸暴乾帛練袋盛之每先食三五匙粳米粥即含咽一丸令消細末以漱口咽之服訖須倍二十日將息不得食臭穢在長安日依此法服至春初頭痛額角如裂即服兩棗許紫雪立止

耆婆大士治人五藏六腑內萬病及補益長年不老方

紫石英研壹兩日　白茯苓　麥門冬去心　防風

芍藥　甘草炙各叁兩

右六味冶擇擣篩為散麥門冬擣令如飴和散更擣千杵又內少許蜜更擣一千杵令可丸如梧子酒服七丸日二服服之一年萬病皆愈二年骨髓滿實三年筋化為骨肉變為筋身輕目明除風去冷辟鬼神良服之不絕則壽年千歲不老不衰而致神仙然服忌慎須持五戒十善行慈悲心救護一

切乃可長生。此等六藥應六時。合陽養陰。常須服之。已有疾病者。依檢六味之藥即合服之。檢勘諸經。此六味之藥相生如母子和也。服之。久久在人腹耳。

五石腎氣丸治諸虛勞亦與前同治方。

白石英　紫石英　鍾乳各拾大分　赤石脂
禹餘粮各貳兩半　署預　遠志去心　細辛
茯苓　菟絲子酒浸一宿　蓯蓉　附子炮去皮
乾地黃　乾薑　桂心各五分　海蛤
白朮各七分　石斛壹兩半　五味子　山茱萸
人參　續斷　杜仲炙　澤瀉
蛇床子　桔梗　牛膝　天門冬去心
鹿耳酒浸。炙　當歸各二分　甘草半兩。炙

右三十一味。擣篩為末。鍊蜜和丸如梧子大。服五丸。日二服。

稍加至三十丸。以酒下佳。

五石烏頭丸治男子五勞七傷諸積冷。十二風痹骨節沉重四肢不舉食飲減少羸瘦骨立面目焦黑時時或腹內雷鳴膀胱常滿或下青黃經時不止。婦人產後惡血不盡腹內堅強諸勞少氣百病悶發或時陰腫或即脫肛及下出疼痛方。

鍾乳研鍊　紫石英研鍊　白石英研鍊　石硫黃研各貳兩半
黃芩　白薇　白朮各三分　礬石貳兩燒
乾地黃七分　芍藥　附子炮去皮各壹兩　烏頭十五枚炮去皮
吳茱萸貳兩半　蜀椒去目閉口者汗　人參　細辛
白石脂　赤石脂　山茱萸　天雄炮去皮
芎藭　麥門冬去心　前胡　半夏洗
龍骨　桂心各五分　遠志拾伍枚去心　茯苓
黃連　當歸　紫菀　禹餘粮

雲母粉　甘草炙。各壹兩半

右叁拾肆味。擣篩爲末。鍊蜜和丸。如梧子大。酒服十丸。日三。不知。增之可至二十丸。以心熱爲知力也。

三石腎氣丸。

鍾乳　白石英　赤石脂　禹餘粮

海蛤並研鍊。各貳兩半　乾地黄　石斛　白术各壹兩半

桔梗　五味子　寄生　山茱萸

杜仲炙　牛膝　澤瀉　天門冬去心

蛇床子　當歸各叁兩　人參　署預

遠志去心　細辛　菟絲子酒浸　茯苓

蓯蓉　附子炮。各壹兩。去皮　乾薑　桂心各伍兩

甘草炙。半兩。　鹿茸炙。貳兩。

右叁拾味。擣篩爲末。鍊蜜和更擣二千杵。丸如梧子。酒服

十五丸，稍加至三十丸，日二，忌如藥法。

五石更生散 治男子五勞七傷，虛羸著床，醫不能治，服此無不愈，惟久病者服之，其年少不識事，不可妄服之，明於治理能得藥適可服之，年三十勿服，或腎冷脫肛陰腫，服之尤妙。

方

紫石英　白石英　赤石脂　鍾乳
石硫黃　海蛤（並研）　防風　栝樓（各貳兩半）
白朮（柒分）　人參（參兩）　桔梗　細辛
乾薑　桂心（各伍分）　附子（炮，參分，去皮）

右壹拾伍味，擣篩為散，酒服方寸匕，日二，中間節量，以意裁之，萬無不起。熱煩悶，可冷水洗面及手足，身體亦可渾身洗。若熱，欲去石硫黃、赤石脂，即名三石更生。一方言是寒食散，方出何侯，壹兩分作三薄，日移一丈再服，二丈又服。

五石護命散 治虛勞百病，羸瘦，欬逆短氣，骨間有熱，四肢煩

疼。或腸鳴腹中絞痛。大小便不利。尿色赤黄。積時繞臍切痛急。眼眩冒悶惡寒風痺。食飲不消。消渴嘔逆。胸中脅下滿氣不得息。周體浮腫。痺重不得屈伸。唇口青。手足逆。齒牙疼。產婦中風及大腸寒。年老目暗。惡風頭著巾帽。厚衣對火。腰脊痛。百病皆治。不可悉記。甚良。能久服則氣力強壯。延年益壽。

方

紫石英（取紫色。頭如樗蒲者上） 白石英（取如箭鏃者上）

鍾乳（極白乳色者上） 石硫黄（取乾黄色。無有灰者） 赤石脂

海蛤 栝樓（各貳兩半） 乾薑 白朮（各壹兩半）

人參 桔梗 細辛（各伍分） 防風

黑附子（炮。去皮） 桂心（各叁分）

右壹拾伍味。皆取真新好者。各異擣篩。已乃出散。重三兩為一劑。分三薄。淨温淳酒服一薄。日移一丈再服一薄。如此三薄盡。須臾以寒水洗手足。藥力行者痺便自脫衣冷

水極浴。藥力盡行。周體涼了。心意開明。所患即差。羸困著床。皆不終日愈矣。人有強弱。有耐藥。若人羸弱者。可先小食乃服藥。若人強不須食也。有至三劑藥不行者。若病人有宿澼。宜先服消石大黃丸下之。乃可服散。服藥之後。宜牽勞。若羸著床不能行者。扶起行之。常當寒食寒臥寒衣。能極寒益善。若寒藥未發者。不可浴也。浴則矜寒。使藥噤不發。令人戰掉。當溫酒飲之。起跳踴舂磨出力。溫乃浴解則止。勿過多也。又當數令食。無晝夜。一日可六七食。若失食飲。亦令人寒。從食則溫矣。若老小上氣及產婦臥不能起。頭不去巾帽。厚衣對火者。服藥之後。便去衣巾。將冷如法。勿疑。虛人易治。與此藥相宜。實人勿服也。此藥雖良。令人氣力兼倍。然其難將適。大要在善將息節度。專心候按。不可失意。當絕人事。惟久病著床。醫所不治。患厭病精意

者。乃可服耳。小病不能自勞者。必廢失節度。愼勿服之。若傷寒大下後。乃可服之。便極飲冷水。若産婦中風身體強痛。不得動搖者。便溫酒服一劑。因以冷水浴。取差已。浴之後。身有小痺。便以寒水浴。使周遍。初得小冷。當小惡。得水之後。自當快之。當數食飲酒於意。復悄悄不可快者。當復冷水浴。以病甚者水略不去。體也。若病偏在一處。偏煩偏熱偏冷偏痺及眩。心腹滿者。便以冷水逐洗於水下。即可矣。如此盡晝夜洗。藥力盡乃止。凡服此藥。不令人吐也。病痛皆自冷。若膈上滿欲吐者。便餔少冷食。即安矣。服藥之後。大便當變於常。或小青黑色。此藥功耳。勿怪之。若大溫欲吐不可禁者。當吐。不可令人極也。明旦當更服。若洗浴晚者。藥必失勢。不行。則冷不可強也。凡洗浴大早則藥噤寒。大晚則吐亂。不可失適。寒則出力乃溫洗。吐則速令洗

冷。食若以飢爲寒者食自温。常當將冷不可熱向火若誤更衣卧即爲逆。凡服此藥。食皆須冷。惟酒令熱。自從或一月而解。或二十日而解之。當飲酒令體中薰薰不絶。當以淳酒。若飲薄酒及白酒。令人變亂若病癖瘕者。要當先下。乃可服藥耳。

三石散 主風勞毒冷補益諸病悉治之方。

紫石英 鍾乳 白石英並研。各參分 白朮參兩半

防風 桂心各壹兩半 牡蠣熬。半兩。 桔梗壹兩

細辛 茯苓 人參 附子去皮

栝樓 蜀椒汗。去目 杜仲炙 乾薑各參兩

右壹拾陸味。擣伍千杵。酒服方寸匕。日三。行百步。

更生散 治男子女人宿寒虛羸。胸脅逆滿。手足煩熱。四肢不仁。食飲損少。身體疾病。乍寒乍熱。極者著床四五十年。服衆

藥不差。此治萬病。無不愈者。悉主之方。

鍾乳　白石英　海蛤各兩　赤石脂

防風　栝樓各貳兩半　乾薑　白朮各壹兩半

桔梗　細辛各伍分　人參　附子炮，去皮

桂心各叁分

右壹拾叁味，皆須新好州土者，擣篩為散，囊盛四兩，為八薄。溫酒和服一薄，須臾起行，隨力所往，還欲坐臥，隨意著衣乃臥，適體中所便，食時乃冷，不得熱食，只得大冷。忌食豬肉、羹、臛、湯、麪，不得房室，諸禁忌之物，皆不得食。服藥後二十日，復飲熱食及房室，可漸隨意，惟服藥時不得耳。若頭面中憒憒者，散髮風中梳百餘遍，一日三飲五合酒訖，日下晡渴，便飲酒噉脯飯，常令體中薰薰有酒勢，手足煩熱，可冷水洗之。加硫黃，即邵靳散也。

服諸石藥及寒食散已違失節度發病療之法合四十五條第三　論三首

論曰。服石丸散及酒。亦有單服異石者。既見未即有效。謂不得藥力。至後發動之日。都不自疑是石。不肯作石法將息。乃作異治。多致其患。略述將息節度法如後。

一或頭痛欲裂者。由熱食作澼故也。急下之即差。

二或惡食臭如死物氣。由溫食作澼故也。急下之。下不差。仍速冷食強行差。

三或兩目欲脫者。由犯熱在肝故也。急下之自止。

四或咽中痛鼻塞清涕出者。由衣厚近火故也。但脫衣當風取冷石熨咽額即止。不須洗之。

五或腰痛欲折者。由衣厚體溫故也。宜水洗石熨。

六或大便難腹中堅如盤蛇。由犯溫積久有乾糞不去故也。

宜消酥蜜膏適寒溫調服一二升。津潤腹中即下。若不可更下。乃止。

七或頭眩瞢欲蹶者。由衣厚犯熱故也。宜針頭。冷水洗即止。

八或淋下不得小便者。由坐久下溫乘騎下熱入膀胱故也。但冷食飲冷水洗熨以冷石三兩度即止。若不止。可下之。不下。殺人。

九或脚疼欲折者。由久坐下溫故也。宜卧單床行役冷水洗止。

十或患寒頭掉不自支任者。由食少藥氣行於肌膚五藏失守百脉摇動與正氣競故也。乃強飲熱酒以和其脉強食冷飯以定其藏強行動以調其關節強洗以宣其壅滯酒行衝遍關機調柔則了了心明也。

十一或腹脹欲死者。由久坐下熱衣溫失食失洗不行故也。

宜冷水洗。當風取冷。即差。亦宜冷食。

十二或失氣不可禁止者。由祀熱不時洗故也。但冷洗之即差。

十三或心痛如刺者。由應食而不食。應洗而不洗。寒熱相擊。氣結不通。聚在心中故也。宜任性。但飲熱酒。令酒勢得行。氣息通達。氣得已行。以冷水淹布手巾。著所苦處。溫復易之。須臾自解。仍速冷食。能多為善。諸痛之中。心痛最惡。急宜速救之。惟熱酒為善。起沈滯於血脉之中。故當任力自溫。更以冷水洗。即差。

十四或遺糞不自覺者。由下溫熱氣上入胃腹故也。冷水洗即止。

十五或氣絕口噤不得開者。由冷熱交競故也。病者不自知。當須傍人救之。要以熱酒灌之。咽中寒盛。酒入必還出。但

頻灌出復內。乃至半日許。得酒下。差。不下必死。
十六或食便吐出不得安住者。由癖故也。急下之。不下殺人。
十七或小便稠數者。由熱食及啖諸熱物餅果肉之屬故也。宜以冷水洗浴。少服梔子湯差。
十八或下部臭爛者。由坐薦厚下熱故也。坐冷水中即止。
十九或耳鳴如風聲。又有汁出者。由自勞出力過度房室不節。氣上奔耳故也。但數數冷食禁房室即差。
二十或目痛如刺者。由熱入胃肝奔眼故也。但數數冷食清旦以小便洗之。三日即止。
二十一或口中傷爛舌強而燥不得食味者。由食少穀氣不足藥氣積在胃管中故也。以梔子湯三劑即止。
二十二或脚指間生瘡者。由著履襪太温故也。當履冷地冷水洗之。即止。

二十三或手足偏痛。諸骨節解。身體發癰及瘡結核者。由寢處久不自移徙暴熱偏併聚在一處故也。若堅結極痛甚者。癰發如覺便以冷水洗之。冷石熨之。飲熱酒散極熱數日以冷水洗不絕乃差。洗之無限要差爲期。若乃不差。取磨刀石如手許大燒令赤。以投苦酒中。石自裂。細擣以冷水和塗之。日二三止。

二十四或嗜卧不能自覺者。由久坐熱悶故也。急起冷水洗。冷食自差。

二十五或夜不得眠者。由食少熱在內故也。服梔子湯冷食。止。

二十六或飲酒不解。食不得下。乍寒乍熱。不洗便熱洗之復寒。甚者數十日。輕者數日。晝夜不得寢息。愁悲恚怒驚悚恐懼恍惚忘誤者。由犯温積久寢處失節食熱作癖內

實使熱與藥併行寒熱交競故也雖以法救之終不解也
昔皇甫氏曾如此對食垂涕援刀欲自刎未及得施賴叔
親見迫事不得行退而自思乃努力強食飲冷水洗即止
禍不成矣當困時舉家親知莫能救解賴三兄士元披方
得三黃湯令服大便下即差自此常以救以急也

二十七或脫衣便寒著衣便熱者由脫著之間無適故也當
小寒便著小熱便脫又洗之則醒勿忍不依此者便發病
也

二十八或兩腋下爛由兩臂相近故也以物隔之冷水洗之
冷石熨之止

二十九或嘔逆咽中傷損清血出者由臥溫食熱故也飲冷
水冷石熨咽即止

三十或鼻中有氣如斷雞子臭者由熱衣溫食故也但脫衣

冷食冷水洗即止。

三十一或齒斷腫脣爛牙疼頰噤者由犯熱不時解故也但當對風張口使冷水入咽頰冷水漱口三度叩齒三十六通止。

三十二或遍體患腫痛不能自轉徙者由久停久息久不飲酒藥氣沈在皮膚之內血脉不通故也但飲熱酒冷水洗自勞行差若極不能自行使人扶強行令肢節調柔乃止。雖行又不得令過過則失度熱復洗之要者酒為佳。

三十三或目暗無所見者由飲食熱居處太溫故也但冷食冷水洗脫衣目自明也。

三十四或下痢如寒中者由食飲犯熱所致故也人多疑是卒疾又滯澼作者皆由犯熱所為慎勿疑也速脫衣冷食飲熱酒即差。

三十五或百節酸疼者。由厚衣被溫故也。但臥單床薄被著單故衣差雖冬寒常須散髮受風冷。石熨若犯此悶者。但緩衣帶冷浴。勿忍病而畏浴也。

三十六或兢戰惡寒。或發熱如溫瘧者。由失食忍飢失洗不行。又由食臭穢故也。急冷食冷水洗之數行止。

三十七或關節強直不可屈伸者。由厚衣坐久停息不煩勞藥氣不散漸侵筋血故也。當任力自溫便以冷水洗飲熱酒。差。令行動出力。使勞發熱非厚衣近火。又仍不遍則失度熱復洗之。

三十八或患食冷不可下者。由久食冷。口中不知味故也。當作白麻酒和酥。熱食一兩度若熱悶者。還冷食飲止。

三十九或傷寒溫瘧者。由犯熱故也。亦可以常藥治之無咎。但勿服熱藥傷寒瘧藥皆除熱破癖。不與寒食相妨。可通

服也。

四十、或藥發輒尸臥不識人者。由熱氣盛食少不充邪忤正性故也。但飲熱酒冷食冷水洗自勤勞以水淹布巾蓋頭。溫易之仍自勞差。

四十一、或肌肉堅如木石。不可屈伸者。由食熱臥溫作癖久而不下。五藏隔閉血脉不通故也。但下。須冷食冷飲冷水洗自勞行差。

四十二、或四肢面目皆浮腫者。由食溫久不自勞藥與正氣相隔故也。但飲熱酒冷飲自勞行洗浴止。

四十三、或身肉痛楚移轉不在一處如似遊風者。由犯熱故也。非是風。宜冷水洗冷石熨即止。

四十四、或寒熱累日張口吐舌眼視高睛不與人相當日用水百餘石洗澆不解者。由不能自勞行飲冷酒食熱故也。

譬如暍人心下更寒以冷水救之愈劇者氣結成冰得熱熨飲則冰消氣通暍人乃解藥氣聚心乃更寒戰宜急飲熱酒令四肢通暢然後以冷食冷水洗之即止

四十五或臂腳偏急痛由久坐臥溫處不移徙熱入腹附骨故也當以冷水淹布巾以摶之溫即易之不過三日止

右凡服石之人有病要先以解石法消息之若不效者始可用餘方救之前所列凡四十五條元是服石丸散違失節度發病由狀亦有消息得差者今之世人多有單服鍾乳礜石桃花石紫石亦有兼和草藥服之此等雖非五石亦是五石之例至於將息慎忌禁發動病由消息損益亦同例人既見單石而不稱意乃便輕之惟以大散及至發動乃致困危其服單石者理宜將息若違犯禁忌但看病狀與上微同者依前法消息必定痊

除。

論曰。服石發動將息。事雖衆多。指的而言者。要當違人理反常性。可依易者將息。所謂六反七急八不可三無疑。

言六反者。

重衣更寒一反。　飢則生臭二反。　極則自勞三反。

溫則滯痢四反。　飲食欲寒五反。　腫瘡水洗六反。

言七急者。

當洗勿失時一急。　當食勿飢二急。　酒必清淳熱三急。

衣溫便脫四急。　食必須冷五急。　食不患多六急。

臥必底薄七急。

言八不可者。

冬寒欲火一不可。　飲食欲熱二不可。

當疹自疑三不可。　畏避風濕四不可。

極不欲行五不可。飲食畏多六不可。
居貪厚席七不可。所欲從意八不可。
言二無疑者。
務違常理一無疑。委心棄本二無疑。
寢處必寒三無疑。
右凡服石之人。若能依此六反七急八不可三無疑者。雖
不得終蠲此疾。復常無病。可以清旦暮之暴也。

解石及寒食散并下石第四 論一首 方六十九首

論曰。凡是五石散先名寒食散者。言此散宜寒食冷水洗取
寒。惟酒欲清。熱飲之。不爾即百病生焉。服寒食散但冷將息。
即是解藥。熱實大盛熱服三黃湯也。

治石發動上氣熱實不解。心腹滿。小便赤。大便不利。
痞逆衝胷。口中焦燥目赤方。

大黄壹兩　黄連　黄芩　芒消　甘草炙各貳兩

右伍味㕮咀，以水伍升，煮取二升半，再服，乃用大黄、芒消，臨湯熟内之。

治石發熱，舊小三黄湯殺石熱勝前方，除實不及前方。

大黄貳兩，一方壹兩　黄芩貳兩，一方壹兩　梔子拾肆枚，擘　豉叁升，綿裹

右肆味㕮咀，以水六升，先煎藥數沸，後内豉，煮取二升，分二服，取差止。

治熱殺石氣，下去實，兼發汗解肌中風熱氣湯方

大黄叁兩　黄芩貳兩　梔子拾肆枚，擘　豉壹升，綿裹

麻黄去節　甘草炙各貳兩

右陸味㕮咀，以水九升，煮麻黄，去上沫，内諸藥，煮取四升，内豉三沸，分三服，得下止。

治虚石發，内有客熱，胷中痞，外有風濕不解，肌中急攣，黄芩

湯方。

黃芩貳兩　梔子拾肆枚擘　葱白壹握　豉壹升綿裹。

右肆味，㕮咀，以水柒升，煮豉三沸，去滓，内諸藥，煮取三升，分二服，不止更為之。

治虛勞下焦有熱，骨節疼痛，肌急内痞，小便不利，大便數而少，吸吸口燥，少氣，折石熱湯方。

大麻子伍合去皮　豉貳升綿裹。

右貳味，研麻子碎，以水四升，合煮取一升五合，分三服，服三劑即止。

大黃湯 治石發煩熱脹滿，身生瘡，年月深久，治不差者。石虛熱生瘡方。

大黃叁兩　麥門冬壹兩去心　梔子拾肆枚擘　黃芩

芒消　甘草各貳兩炙

右陸味。㕮咀。以水七升。煮取二升五合。分爲五服。得下止。

治石發熱。熱結生腫堅起。始作腫。宜下之。升麻湯方。

升麻　枳實炙　芍藥　大黃各貳兩

當歸　黃芩各壹兩

右陸味。㕮咀。以水捌升。煮取二升。分三服。得下腫消止。熱甚。倍加黃芩一方有甘草一兩。

治石發熱盛變作癰腫。初欲成急治之方。

石燕子柒枚

右壹味。以水三大升。煮取二升。數用淋洗之。以差爲度。

治石發頭痛胷脹滿。或寒或熱。手足冷。或口噤。或口爛生瘡。乾燥惡聞食氣。前胡湯方。

前胡　芍藥　黃芩　大黃

甘草炙各貳兩　大棗貳拾枚擘

右陸味，㕮咀，以水八升，煮取二升五合，分三服。若心脅堅滿，加茯苓三兩；胷滿塞，加枳實一大兩；炙逆吐，胷中冷不飲食，加生薑三兩；胃虛口燥，加麥門冬三兩，去心；尻欲加藥者，則加水一升。

治石發身如火燒，靳邵黃芩湯方。

黃芩　枳實貳兩，炙　梔子拾肆枚，擘　栝樓

厚朴炙　芍藥　甘草壹兩，炙

右柒味，㕮咀，以水七升，煮取二升五合，分三服。

治石毒或十年、二十年、三十年而發者，或慓慓如寒，或飲食，或不欲食，若服紫石英發毒者，熱悶昏昏喜卧，起止無氣力，或寒，皆腑氣所生，藏氣不和，礜石發熱者，燥而戰，石硫黃發熱者，鬱鬱如熱，極者身並破裂，華佗薺苨湯方。

薺苨肆兩　茯苓壹兩　蔓菁子壹升　芍藥

人參　藍子　黃芩　甘草炙，各壹兩

右捌味，㕮咀，以水壹升，煮蔓菁子，取八升，去滓，內諸藥，煮取二升五合，分三服。若虛弱者，倍人參，減黃芩；若氣上，倍茯苓，加蘇葉一兩。外臺秘要，黃芩、芍藥各貳兩，無人參。

治桃花石發，即心噤，身壯熱，頭痛，覺者溫清酒飲之，隨多少，酒熱行即差。亦可服大麥麨，不解，服此麥奴湯方。大麥麨見第十七卷中

大麥奴葉是，陰乾　麥門冬去心，各肆兩　桂心叁兩
葱白捌莖，勿使葉　人參壹兩　甘草炙，貳兩

右陸味，㕮咀，以水八升，煮取三升，去滓，分溫三服。若無麥奴，以麥三升淨淘洗，先煮使熟，去滓，添水滿八升，然後內諸藥，煮取三升，分三服。

治一切雜石發動方。

麥門冬去心　人參各叁兩　甘草炙，壹兩。

右叁味。擣篩爲末。鍊蜜和丸如彈丸一。服三丸。忌如前法。

治心肖肝熱方。

人參　黄芩各貳兩　梔子拾枚。擘　麥門冬去心

桂心　甘草炙。各壹兩

右陸味。切。以水六升。煑取二升。分三服。

治熱折石皇甫梔子湯方。

梔子拾肆枚。擘　黄芩貳兩半　豉壹升。綿裹

右叁味。㕮咀。以水六升。煑取三升。去滓。内豉。煑取二升。分二服。

治石發煩熱脹滿。身體生瘡。年月久遠者。兼治諸藥乳石發動方。

麻黄去節　甘草炙。各壹兩

右貳味。㕮咀。以水二升。煑取半升。内清酒五合。煎取軟一

升。其患者先須火邊炙令熱徹欲汗。因即熱服之。令盡溫覆卧。須臾大汗出。即差。

治一切石熱發方。

但飲淳美熱清酒。冷食自勞。冷洗差。

治乳石痢。及常服壓石方。

取好豉炒令黄香。待冷擣篩。心未熟更炒。待冷還擣若心熟皮即焦苦。所以須再炒。日別空腹再服二大匙。以冷水服之佳。

治石痢方。

淡煮真好茶汁。服二三升。重者三服。輕者一二服。即差。

解散石發動諸藥不治單服酒豉方。

清美酒壹升　好豉伍合。綿裹

右貳味。和煮三五沸。熱飲壹升。使盡大良。

治一切石發單方。

擣生冬瓜汁三升。分為三服。

治雜石發單方。

煮葱白汁服亦解。

單煮枸杞白皮汁服亦解。

單煮胡荽汁服亦解。冬煮根飲之。

單煮薺苨汁飲亦解。

解散熱渴最良方。

葱白不過一斤。 胡荽 薺苨 枸杞

不越半斤。皆單煮取汁飲之。

又單煮犬肉汁服解大散良。

猪膏湯 解大散方。

猪膏壹兩。烊之 豉壹升。綿裹

右貳味以水三升煑豉取汁一升内豬膏服七合日三服

石人飲冝清冷不冝熱熱即氣擁痞石惟酒一種須熱也

若爲食倉米臭肉動乳者必須葱豉湯細細服之可立五六度即差

若食飲損者於葱豉湯中内當歸一兩煑之去滓分温三服便差仍未除者可作後蘆根湯服之方

蘆根　地榆　五加皮各壹兩

右叁味㕮咀以水三升煑取一升去滓一服即差此湯力快小可者不須服之

若得四時節氣冷熱不調動乳者皆是寒熱所致其狀似瘧久久不療令人隕命縱服諸藥必終不差必須作生熟湯以浴之方

以大器盛湯若大熱投少冷水即入湯中坐勿動須更

百節開。實熱之氣皆從毛孔中出。變作流汗。若心中熱悶者。還服少許熱湯即定。良久乃出湯。便厚衣覆蓋臥。豁然覺醒。平復如患大重者。不過三二度即差。

人參湯 解散數發動煩悶嘔逆。

人參 白朮 栝樓 甘草炙各貳兩 黃芩壹兩

右五味。㕮咀。以水七升。煮取二升。去滓。分爲三服。溫溫服。

治服石及散發背癰疽方。

取烏豆二升。水六升。煮令稀稠如薄餳。量減取三大合。匙抄細細內患人口中。審聽腹中作聲。如欲利即停。須臾必利。利後即差。忌熱食陳臭等。

治石氣發身體微腫面上瘡出方。

紫雪湯成下 黃芩各貳兩 萎蕤 升麻各壹兩半

梔子拾枚擘 犀角屑 甘草炙各壹兩

右三味，㕮咀，以水五升，煮取一升八合，絞去滓，內紫雪八分，温三服，每服如人行六七里，又服，利三行為度，仍用後方塗瘡。忌熱麪、猪肉、海藻等。

治石熱面上生瘡方。

取寒水石，以冷水於白瓷銚中研令汁濃，將塗瘡，乾即點之，勿令停。

治諸石發動，口乾寒熱似鬼神病方。

麥門冬伍兩，去心　大黃　苦參各等八分　萎蕤
梔子擘　五加皮　黃芩　生犀屑
芍藥　升麻各壹兩　大青　甘草炙，各叄分

右壹拾貳味，擣篩為末，錬蜜和丸如梧子，每食訖少時，以蜜水服十四丸，漸稍加至二十丸，以意加減。忌諸熱食及海藻、猪魚、炙肉、蒜、麪等。

治石等毒發熱困苦方。

猪脂成鍊　葱白切，各伍合　芒消壹兩　豉壹兩半

右肆味，以水二升，煮葱豉取一升五合，絞去滓，下猪脂芒消，分溫三服，每服如人行三四里進一服，快利爲度。忌熱麪及炙肉蒜粘食陳臭等物。

麻黃湯　治石發困不可解者方。

麻黃貳兩，去節　梔子拾肆枚，擘　香豉壹升　甘草壹兩，炙

右肆味，㕮咀，以酒伍升漬一宿，加水二升，煮取三升一合，分三服。忌如藥法。

又方

大黃別浸　黃芩　甘草各貳兩，炙

右叁味，㕮咀，以水五升，煮取二升，分溫三服。

治金石發熱及諸熱朴消丸方。

朴消成鍊者。壹斤

右一味。研令成粉。以白蜜和調作丸如梧子。每食訖。以蜜水服三十丸。服金石經年以來。覺身中少熱。即以丸壓之。每至夜欲卧時。服三十丸或至四十丸。取胷膈凉冷爲度。此用之極有効。若有時患及發者。即取一大匙。粉和水服之。空腹服之得一兩行利即差。如不利加服之。以利爲度。凡朴消取不著風者。黄者殺人。赤者傷人。白者爲佳。

又方是藥冷熱俱治押石。主大秘澀。

凡朴消煑葵子汁和服一大兩半。有芒鋭者亦療暴赤眼。用水服。孩子量之。

治女子先因月經不通。研生石服。即今見患胷脅熱衝頭面。腰胯冷極宜服此方。

茯苓　萎蕤　大黄別浸　生薑各貳兩。切　大棗柒枚。擘

石膏六兩，碎，綿裹　芍藥　黄芩　人參
芒消　甘草各貳兩，炙
右壹拾壹味，切，以水一斗，煑取二升八合，去滓，分三服，每服相去如人行十里，又進之，快利五行以來，病即差，忌生冷熱麪猪魚蒜等。

治石發動心胷熱毒萎蕤湯方。
萎蕤　黄芩　乾薑　生薑各貳兩，切
豉壹大合，綿裹　芍藥　升麻　黄連
柴胡各貳兩　梔子拾枚，擘　石膏捌兩，碎　芒消肆兩
右一十二味，㕮咀，以水一斗五升，先煑石膏，減一升，次下諸藥，煑取二升八合，去滓，下芒消攪令散，分溫三服，每服相去如人行十里，進之，利五六行，當自止，忌如前。

治石發熱困苦宜下石方。

露蜂房炙壹升。

右壹味。切。以水三升。煮取一升。一服五六合。日二服。石從小便下如細沙。盡。停。無所忌。

又下石方。

萎蕤　升麻　薺苨　人參各柒兩

大黃叁兩　黃芩　葛根　紫草各捌兩

犀角拾壹兩。屑　梔子貳七枚。擘　芒消貳兩　銀屑肆兩。研

猪脂拾叁兩。臘月者　露蜂房拾兩　玄參　甘草炙。各肆兩

右壹拾陸味。切。以無灰酒八斗漬經十日。其猪脂用酒一升煎鍊取三兩。脂與銀屑和研。內藥中。每日空腹服之量力多少。忌熱麵炙肉海藻菘等。

治發背竹葉黃耆湯方。

淡竹葉　黃芩　前胡　生薑各四兩。切　芍藥叁兩

小麥叁升 黃耆 茯苓 枳實炙 麥門冬去心
梔子各叁兩。擘 大棗拾肆枚。擘 芎藭 知母 乾地黃
人參 石膏碎 升麻 甘草炙各二兩
右壹拾玖味。㕮咀。以水一斗六升。先煮竹葉小麥取一斗二升。去竹葉麥。內諸藥煮取四升。一服一升。日三夜一。

治男子癰。始欲發背。不甚往來寒熱。竹葉黃耆湯方。

淡竹葉 小麥各叁升 黃耆 升麻 乾地黃
芍藥 當歸 通草 知母各叁兩 大棗拾捌枚。擘
黃芩壹兩半 生薑伍兩。切 茯苓 芎藭 前胡
枳實炙 麥門冬去心 甘草炙。各貳兩
右壹拾捌味。㕮咀。以水壹㪷柒升。先煮竹葉小麥取壹㪷貳升。去滓。內諸藥煮取肆升。分溫伍服。日三夜二。忌如藥法。

治癰發背。諸客熱腫始作。竹葉湯方。

淡竹葉　小麥各叁升　生薑陸兩切　大棗拾肆枚擘　茯苓
麥門冬去心　枳實炙　芍藥　人參各貳兩　黃耆
前胡　乾地黃　升麻　射干　黃芩
芎藭　甘草各三兩炙
右壹拾柒味。㕮咀。以水一斗七升。先煑竹葉小麥取一斗二升。去滓。內諸藥煑取四升。分五服。若熱盛秘澀不通者。加大黃二兩。已下勿加也。

治患大熱。體盛發癰。或在於背。或在陰處。生地黃湯方。
生地黃捌兩　竹葉叁升　小麥貳升　栝樓肆兩　大黃伍兩
人參　當歸各壹兩　黃耆　黃芩　通草
升麻　芍藥　前胡　茯苓　甘草各貳兩炙
右壹拾伍味。㕮咀。以水二斗。煑竹葉小麥取一斗二升。去滓。內諸藥煑取四升。分四服。日三夜一。不愈。常服。

治發背黃耆湯方。

黃耆　黃芩　麥門冬去心　遠志去心各貳兩。

大棗貳拾枚擘　人參　芎藭　乾地黃　芍藥

當歸各壹兩　生薑伍兩切。　桑螵蛸拾肆枚炙　雞肶胵貳具

右壹拾參味。㕮咀。以水一斗。先煮雞肶胵。令熟可食去之。內諸藥。更煮取四升五合。分服九合。日三夜一。

治發背黃耆湯方

黃耆　麥門冬去心　芍藥　黃芩　人參

甘草炙各參兩　石膏碎　當歸各貳兩　半夏肆兩洗。　生薑伍兩切。

生地黃半斤　大棗參拾枚擘　淡竹葉切貳升

右壹拾參味。㕮咀。以水一斗。先煮竹葉取九升。去竹葉內諸藥。更煮取三升。分四服。如人行二十里又服。良久進粥。消又進。消息。

甘草炙。各壹兩

右壹拾叁味，㕮咀，以水一斗五升，先煮竹葉，令減五升，去竹葉，內諸藥，煮取三升五合，分四服，日三夜一。

治癰腫發背竹葉湯方。

竹葉切，伍升　小麥　生薑伍兩，切。　桂心壹兩半

大棗貳拾枚，擘　芍藥　乾地黃各叁兩　茯苓

升麻　當歸　甘草炙。各貳兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水一斗七升，煮小麥竹葉，取一斗一升，去竹葉，內諸藥，煮取三升五合，分四服，如人行七八里再服。

治男子發背肋結塊氣，或經一月苦寒熱，枳實湯方。

枳實炙　芍藥　乾地黃　前胡

黃芩　通草各叁兩　知母　芎藭

細辛　茯苓　黄耆　人參　甘草炙，各貳兩

右壹拾叁味，㕮咀，以水一斗一升，煮取三升五合，去滓，分四服。

治發背，虛熱大盛，腫熱侵進不住，内補湯方。

乾地黄肆兩　升麻　當歸　人參各壹兩

生薑伍兩　麥門冬去心　芍藥各叁兩　大棗貳拾枚，擘

遠志去心　茯苓　大黄　黄芩

黄耆各貳兩

右壹拾叁味，㕮咀，以水一斗三升，煮取五升，去滓，分為五服。

生地黄湯　治發背方。

生地黄捌兩　黄耆　黄芩　茯苓各叁兩

大棗貳拾枚，擘　芎藭壹兩　淡竹葉貳升　芍藥

人參　當歸　通草　甘草炙，各貳兩

右壹拾貳味。㕮咀。以水三斗。先煮竹葉取一斗五升。去滓。內諸藥。煮取四升。去滓。分五服。

治發背癰已服生地黃湯取利後服此方。

黃耆　芍藥　乾地黃　栝樓各三兩

小麥壹升　黃芩　柴胡　麥門冬去心

遠志去心　升麻各貳兩　當歸壹兩　淡竹葉切，肆升

大棗拾肆枚，擘

右壹拾叁味。㕮咀。以水一斗八升。先煮竹葉小麥取一斗。去滓。內諸藥。煮取三升。去滓。分三服。日三。

治癰節近肺俞。此多虛。故不宜用大黃。若欲得下。但其間數服此方。

黃芩　前胡　栝樓　芍藥

麥門冬去心　知母各叁兩　乾地黃肆兩　淡竹葉二升

小麥貳升　黃耆　升麻　甘草炙。各貳兩

右壹拾貳味。㕮咀。以水一斗八升。先煮竹葉小麥取一斗。去滓。內諸藥。煮取四升。去滓。分爲四服。日三夜一。

治背脊癰節。舉身壯熱。已行薄貼。此方數用有驗。連翹湯方。

連翹　漏蘆　射干　白斂

升麻　梔子擘　芍藥　羚羊角屑

黃芩各叁兩　生地黃捌兩　寒水石伍兩。碎　甘草貳兩。炙

右壹拾貳味。㕮咀。以水一斗。煮取四升。去滓。分四服。

治大虛客熱。發背上苦牽痛。微有腫。腫氣來去。黃耆湯方。

黃耆　乾薑　當歸　桂心各貳兩

大棗貳拾枚。擘　麥門冬去心　芍藥各叁兩　半夏肆兩。洗

生薑伍兩。切　人參　芎藭　甘草炙。各壹兩

右壹拾貳味。㕮咀。以水一斗二升。煮取四升。去滓。分五服。

日三夜二。

治癰發背及在諸處竹葉黃耆湯方。

竹葉切，肆升　黃耆　芍藥各叁兩　當歸壹兩

大黃壹兩半　升麻　黃芩　前胡

知母　麥門冬去心　甘草炙，各貳兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗七升，煑竹葉取九升，去滓，下諸藥，煑取二升八合，分三服，利兩三行，佳也。

治癰發背內補芍藥湯方。

芍藥　乾地黃　桂心各貳兩　當歸叁兩　生薑切，肆兩

黃耆伍兩　茯苓叁兩　人參　麥門冬去心　甘草炙，各壹兩

右壹拾味，㕮咀，以水一斗，煑取三升，分三服。

治發背腫即驗前胡建中湯方。

前胡叁兩　生薑切　茯苓　黃芩各伍兩

桂心壹两　人參壹两半　當歸　芍藥

半夏湯洗三十遍　甘草炙各貳两

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗，煑取四升，分四服。

治癰發背漏蘆湯方。

漏蘆　白斂　黄芩　芍藥　枳實炙

白薇　甘草炙各貳两　大黄別浸　麻黄去節　升麻各叁两

右壹拾味，㕮咀，以水一斗，先煑麻黄，去上沫，然後下諸藥，

煑取三升，分三服。

治男子背上發腫時覺牽痛內補黄耆湯方。

黄耆　當歸各貳两　乾地黄　麥門冬各三两

生薑伍两切　大棗拾肆枚擘　芍藥　芎藭

人參　甘草炙各壹两

右壹拾味，㕮咀，以水一斗，煑取二升五合，分服七合，日三。

治發背黄耆湯方。

黄耆　乾地黄　茯苓各肆兩　大棗拾伍枚，擘

芍藥叁兩　生薑貳兩，切　當歸貳兩半　人參

甘草炙，各壹兩半

右玖味，㕮咀，以水壹㪷貳升，煑取肆升，分肆服，日三夜一。

加黄芩貳兩佳。

治腫瘡發背芍藥甘草湯方。

芍藥　乾地黄　黄耆各叁兩　甘草炙，壹兩半

人參壹兩　茯苓　麥門冬去心　生薑各貳兩，切

右捌味，㕮咀，以水八升，煑取二升五合，分三服。

治毒腫發背黄耆湯方。

黄耆　白斂　玄參　黄芩

大黄　甘草炙，各貳兩　竹葉切，壹升

右柒味。㕮咀。以水九升。煮取三升。分三服。一日令盡。忌豬肉。

治癰腫始覺即令消。其腫五色。並爲發背痛欲死。腫上加灸不差。腹內虛悶。麥門冬湯方。

麥門冬去心貳兩　升麻　葛根各叁兩　丁香壹兩半

零陵香　藿香各壹兩

右陸味。㕮咀。以水柒升。煮取二升五合。分三服。

治發背初欲作腫及癰。便服此方。

大黃別浸　黃芩　甘草炙各叁兩　升麻貳兩

梔子壹百枚取仁

右伍味。㕮咀。以水九升。煮取三升五合。去滓。分三服。得快下數行利便止。不下更作。

治發背腫如杏核雞子。青木香湯方。

青木香　麻黃去節各貳兩　升麻叁兩

右叄味，㕮咀，以水六升，煑取二升，去滓，分叄服，一日令盡，暖卧取微汗，避風，以粉粉身。

治癰發背升麻湯方。

升麻叄兩

右壹味，㕮咀，以水三升，煑取一升，分三服。昔何道静母在建安，夜得發背，至曉半臂黑，上熱如火，嘘吸煩悶，時無三兩升麻，惟一兩，以水三升，煑得一升，如上法，一服覺如小寬，再服熱差，乃得眠，至暮服盡，轉佳，明日視背色還復，遂愈也。

千金翼方卷之二十三

瘡癰上

黃父相癰疽論第一

九江黃父相癰疽論黃帝問於岐伯曰余聞腸胃受穀上焦出氣以溫分肉而養骨節通腠理中焦出氣如霧上注谿谷而滲孫脉津液和調變化赤而為血血和則孫脉先滿乃注於絡脉絡脉皆盈乃注於經脉陰陽已張因息乃行行有綱紀周有道理與天合同不得休止切而調之從虛去實寫則不足疾則氣減留之先後從實去虛補則有餘血氣已調形神乃持余已知血氣之平與不平未知癰疽之所從生成敗之時死生之期或有遠近何以度之可得聞乎岐伯曰經脉流行不止與天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕地經失紀水道流溢草蘆不成五穀不植徑路不通民不往來巷

聚邑居，別離異處，血氣猶然，請言其故。夫血脈榮衛周流不休，上應星宿，下應經數。寒氣客於經絡之中則血泣，血泣則不通，不通則衛氣歸之，不得復反，故癰腫也。寒氣化為熱，熱勝則肉腐，肉腐則為膿，膿不瀉則爛筋，筋爛則傷骨，骨傷則髓消，不當骨空，骨空不得洩瀉，則筋骨枯虛，枯虛則筋骨肌肉不相營，一作親經脈敗漏，熏於五藏，藏傷故死矣。

診癰疽發起處第二　方一首

黃帝曰：願盡聞癰疽之形與忌日名。歧伯曰：略說癰疽極者有十八種。

癰發於嗌中，名曰猛疽，不急治則化為膿，膿不瀉塞咽，半日而死。其化為膿者，膿瀉已則含豕膏，無食三日已。一云無冷食。

發於頸，名曰夭疽。其疽大而赤黑，不急治則熱氣下入淵腋，前傷任脈，內熏肝肺，則十餘日而死。

陽氣大發。消腦流項。名曰腦爍疽。其色不樂。一作除 項痛如刺
以鍼。心煩者死不可治。
發於肩及臑。名曰疵疽。其狀赤黑。不急治。此令人汗出至足。
不害五藏。發四五日逆焫之。一作逆是。
發於腋下赤堅者。名曰朱疽。治之用砭石。欲細而長踈啓之。
塗以豕膏。六日已。勿裹。其疽堅而不潰者。爲馬刀挾嬰。急治
之。一作哀 一作裏。
發於胸。名曰井疽。其狀如大豆。三四日起。不早治。下入腹中。
不治七日死。
發於膺。名曰甘疽。其狀如穀實瓜樓。常苦寒熱。急治之。去其
寒熱。不治十歲死。死後膿自出。
發於脅。名曰敗訾。敗訾者女子之病也。久之其狀大癰膿。其
中乃有生肉。大如赤小豆。治之方。

剉陵翹草及根各一斗。以水壹斗陸升，煑取貳升。即彊飲厚衣坐釜上，令汗出足已。

發於股胻，名曰股脫疽。其狀不甚變色，癰膿內搏於骨。不急治，三十日死。

發於股陰，名曰赤弛。不急治，六十日死。在兩股內者，不治，六日死。

發於尻，名曰鋭疽。其狀赤堅大，急治之。不治，三十日死。

發於膝，名曰疵疽。其狀大癰，色不變，寒熱而堅，勿石之，石之即死。須其色異柔，乃石之，生也。

諸癰發於節而相應者，不可治也。

發於陽者，百日死。

發於陰者，三十日死。一云十日死。

發於脛，名曰兔齧。其狀如赤豆，至骨，不急治，殺人。

發於踝，名曰走緩。其狀色不變，數石其輸而止其寒熱，不死。

發於足上下，名曰四淫。其狀大癰，不急治，百日死。
發於足傍，名曰厲疽。其狀不大，初從小指發，急治之，去其黑者；不消輒益，不治，百日死。
發於足指，名曰脫疽。其狀赤黑則死，不赤黑不死。治之不衰，急斬去之，活也；不斬去者死。
黃帝曰：夫子言癰疽，何以別之？岐伯曰：榮氣稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行則衛氣歸之，歸之而不通，壅遏不得行，故曰熱。大熱不止，熱勝則肉腐，肉腐則爲膿，然不能陷肌膚於骨髓，骨髓不爲焦枯，五藏不爲傷，故命曰癰。何謂疽？答曰：熱氣純盛，下陷肌膚筋髓骨肉，內連五藏，血氣竭盡，當其癰下，筋骨良肉皆無餘，故命曰疽。疽者，其上皮夭瘀以堅，如牛領之皮；癰者，其上皮薄以澤，此其候也。帝曰：善。
帝曰：有疽死者柰何？岐伯曰：身有五部：伏菟一，腓二（一云踹），背

三。五藏之輸。四項。五五部有疽。死也。

帝曰。身形應九宮柰何。岐伯曰。請言身形應九野。

左足應立春。其日戊寅己丑。

左脅應春分。其日己卯。

左手應立夏。其日戊辰己巳。

膺喉頭首應夏至。其日丙午。

右手應立秋。其日戊申己未。

右脅應秋分。其日辛酉。

右足應立冬。其日戊戌己亥。

腰尻下竅應冬至。其日壬子。

六府及膈下二藏。應中州。大禁太一所在之日及諸戊己也。

凡候此九者。善候八正所在之處。所主左右上下身體有癰腫者。欲治之。無以其所直之日潰治之。是謂天忌日也。

凡五子日夜半　五丑日雞鳴　五寅日平旦
五卯日日出　五辰日食時　五巳日禺中
五午日日中　五未日日昳　五申日晡時
五酉日日入　五戌日黄昏　五亥日人定
右以此日時遇疾發癰者，不起也。

候癰疽色法第二

論曰：夫癰疽初發如微，人多不以爲急，此實奇患，惟宜速治之，治之不速，病成難救，以此致禍，能不痛哉！且述所懷，以悟後賢，謹按黄父癰疽論，論所著緩急之處，死生之期如左。

發皮肉淺腫高而赤，貼即消，不治亦愈。

發筋肉深腫下而堅，其色或青黄或白黑，或復微熱而赤，宜急治之，成消中半。發附骨者，或未覺肉色已殃，已殃者癰疽之甚也。

發背外皮薄爲癰。皮厚爲疽。如此者多見先兆。宜急治之。皮堅甚大者多致禍也。

夫癰壞後有惡肉者。當以猪蹄湯洗去穢。次傅食肉膏散。惡肉盡乃傅生肉膏散及摩四邊。令善肉速生。當絕房室。慎風冷。勿自勞動。須筋脉平復乃可任意耳。不爾新肉易傷。傷則重潰發則禍至。愼之愼之。

診知是癰疽法第四

癰疽之發。未辨是非。飢渴爲始。始發之時。或發白疽。或似小節。或復大痛。或復小痛。或發米粒大白膿子。皆是微候。宜善察之。欲知是非。重按其處。是即便隱痛。復按四邊。比方得失。審實之。是即灸第一便灸其上二三百壯。又灸四邊一二百壯。小者灸四邊。中者灸六處。大者灸八處。壯數不慮多也。亦應即薄貼。令得即消。內須服解毒冷藥。令毒氣出外。外須薄

貼熱藥。法當磨開其口。令洩熱氣故也。

診癰疽有膿法第五

凡癰按之大堅者未有膿。半堅半軟者半有膿。當上薄者都有膿。有膿便可破之。不爾侵食筋骨也。破之法。應在下逆上破之。令膿易出。用鈹鍼。膿深難見。肉厚而生者。用火鍼。若不別有膿者。可當其上數按之。內便隱痛。殃堅者未有膿。洩去熱氣。不爾長速則不良。

候人年得疽法第六

岐伯曰。赤疽發於額。不寫。十餘日死。可刺也。其膿赤多血死。未有膿可治。人年二十五　三十一　六十　九十五人神在額。不可見血。見者死。

杼疽發項。若兩耳下。不寫。十六日死。其六日可刺。其色黑見膿而癰者死。不可治。人年十九　二十三　三十五　四十

九　五十一　五十五　六十一　八十七　九十九。神在兩耳下。不可見血見者死。

蜂疽發背。起心俞若肩髃。二十日不瀉死。其八日可刺也。其色赤黑膿見者死不治。人年六歲　十八　二十四　三十五　五十六　六十七　七十二　九十八神在肩不可見血見者死。

刺疽發肺俞。若肝俞不瀉。二十日死。其八日可刺發而赤。其上肉如椒子者死。不可治。人年十九　二十五　三十三　四十九　五十七　六十八　七十三　八十一　九十七神在背。不可見血見者死。

俠榮疽發脅。起若兩肘頭。二十五日不瀉死。其九日可刺發赤白閒其膿多白而無赤可治。年十六　二十六　三十二　四十八　五十八　六十四　八十　九十六神在脅不可見血見者死。

勇疽發股。起太陰。若伏兔。二十五日不寫死。其十日可刺。發青膿赤黑者死。白者尚可治。年十一　十五　二十　三十一　四十二　四十六　五十九　六十三　七十五　九十一　神在尻尾。不可見血。見者死。

標叔疽發熱同同。耳聾。後六十日腫如水狀。如此可刺之。但出水後乃有血。血出即除也。年五十七　六十五　七十三　八十　九十七　神在背。不可見血。見者死。

旁疽發足趺若足下。三十日不寫死。其十二日可刺。發赤白膿而不大多。其上痒赤黑死。不可治。年十三　二十九　三十五　六十一　七十三　九十三　神在足。不可見血。見者死。

相五色疽死生法第七

禽疽發如軫者數十處。一云四日腫。食飲疢痛。其狀若變。十日可刺。其內發方根寒。齒如噤。俞若坐。如是十五日死。俞若生未詳。

釘疽發兩肩。此起有所逐惡血。結流內外。榮衛不通。發爲釘疽。三日身腫痛甚。七日噤如痓狀。十日可刺。不治。二十日死。

陰疽發髀。若陰股始發。要彊內不能自止。數飲不能多。五日堅痛。如此不治。三歲死。

脉疽發環項。一云頸。始痛身隨而熱。不欲動悄悄。或不能食。此有所大畏恐怖而不精。上氣欬。其發引耳。不可以腫。二十日可刺。不刺八十日死。

龍疽發背起胃俞。若腎俞。二十日不寫死。其九日可刺。其上赤下黑。若青黑者死。發血膿者不死。

首疽發背。發熱八十日。大熱汗頸。引身盡如欬。身熱同同如沸者。皮澤頰腫處淺。刺之。不刺入腹中。二十日死。

行疽發如腫。或復相往來。可要其所在刺之。即愈。

衝疽發。小腹痛而振寒熱。冒五日悄悄。六日而變。十日死。

敗疽發。兩指頭若五指頭。十八日不寫。死。其四日可刺。其發而黑癰不甚。赤過節。可治。

疥疽發腋下若臂兩掌中。振寒熱而咽乾者。飲多則嘔煩心悁悁或卒胗反有合者。此則可汗。不汗當死。

筋疽發脊俠脊兩邊大筋。其色蒼。八日可刺。其癰在肌腹中。九十日死。

陳乾疽發兩臂。三四日痛不可動。五十日方身熱而赤。六十日可刺。如刺無血。三四日死。一云病已

蚤疽發手足五指頭。起即色不變。十日之內可刺。過時不刺後為食癰。在腋。二歲死。

倉疽發身。癢後痛。此故傷寒氣入藏。篤發為倉疽。九日可刺。九十日死。

赤疽發身腫堅核。而身熱。不可以坐。不可以行。不可以屈伸。

成膿刺之。即愈。

赤疽白一甁發膊。若肘後癢。目痛傷精及身熱多汗五六日死。

赤疽發胷可治。

赤疽發髀樞。六月可治。不治出歲死。

赤疽發陰股。堅死。濡可治。

赤疽發掌中者可治。

赤疽發脛。死不可治。

黑疽發。腫在背大骨上。八日可刺。過時不刺為骨疽。膿出不可止。出碎骨。六十日死。

黑疽發腋淵。死。

黑疽發耳中。如米。此名文疽。死。

黑疽發肩。死。

黑疽發缺盆中。名曰伏癰。死。

黑疽發肘上下。不死可治。
黑疽發腓腸。死。
黑疽發膝臏堅。死。濡。可治。
黑疽發趺上堅。死。足下久癰。色赤。死。
手心主脉有腫癰在股脛。六日死。發膿血。六十日而死。
脅少陽脉有腫癰在頸。八日死。發膿血。十日死。
腰太陽脉有腫交脉來於陽明。癰在頸。十日而死。發膿血。七旬死。
尻太陽脉有腫癰在足心。少陽脉。八日死。發膿血。八十日死。
頭陽明脉有腫癰在尻。六日死。發膿血。六十日死。
股太陽脉有腫癰在足太陽。七十日死。發膿血。百日死。
肩太陽太陰脉有腫癰在脛。八日死。發膿血。四百日死。
足少陽脉有腫癰在脅。八日死。發膿血。六百日死。
手陽明脉有腫癰在腋淵。一歲死。發膿血。二歲死。

薄貼第八 方二十一首

松脂貼主癰疽腫方 鍊松脂採松脂法附

松脂貳斤。成鍊者　膒脂叄兩　細辛半兩　黃檗
白芷　芎藭　白斂　芍藥
莽草　白蠟　黃耆　黃芩
黃連　大黃　當歸　防風各壹兩

右壹拾陸味。切。先以火煖銅鐺令熱。以蠟拭鐺使通濕。剉松脂令破。內鐺中。次下膒脂。都消盡訖。乃內藥。以竹篦攪令調。仍於微火上煎。急攪令勿息。十沸下之。沸止更上。預作十箇濕土堆。一下置一堆上。遍十堆則成。及熱以新幕生布上。四面又安火炙。作絞子絞。澄去滓。挑取向火塗紙。依病處大小翦取貼之。周時易。此法稍難。好好用心作之。乃可成矣。

鍊松脂法。

取大麻人三升。研之令細。水三升淘之。生布絞去滓。松脂二升。以水三升半煑令消盡。及熱新布絞令脂出。內麻汁中。待小冷。取松脂牽挽令白。乃依法科取。

採松脂法。

取深山大松本有露根。脂自流出白粘者佳。火燒黑殭者不堪用。亦可五月六月大暑時破作痕。二五日待出取之。須多者。多破根取之。

升麻薄主癰疽方。

升麻　大黃　黃耆　芎藭　龍骨

白及各壹兩　黃芩陸兩　白斂　牡蠣熬　甘草各半兩

右一十味。擣篩為散。以蜜和之。如泥。塗布薄癰上。乾即易之。痛微用此令消方。

黃耆　青木香　梔子　乾地黃　升麻
龍骨　大黃　黃蘗　黃芩　麻黃
黃連　芎藭　生犀取末　白斂　羚羊角

右壹拾伍味，等分，擣篩爲散，以酯和之如泥，塗故布上，開口如小豆，以洩熱氣，乾則易之，差止。

白斂薄主癰疽方。

白斂　大黃　黃芩並等

右三味，擣篩爲散，以雞子白和如泥，塗布上，薄腫上，薄乾則易之。亦可以三指撮藥末，內三升水中，煑三沸，綿注汁拭腫上數十遍，以寒水石末和塗腫上，以紙覆之，乾則易之，輒以煑汁拭之，日夜二十易。

食惡肉散方。

旨朮　藜蘆各壹分半　蕳茹半兩　馬齒礬燒

硫黃　雄黃　麝香各叁分

右七味。擣篩為散。粉瘡上。亦可膏和傅之。著瘡孔中佳。

生肉膏。主癰疽金瘡方。

大黃　黃耆　芍藥　獨活

當歸　白芷各壹兩　薤白貳兩　生地黃叁兩。取汁

右八味。擣篩為散。切薤白。以地黃汁成煎豬膏三升煎之。二上三下。以綿布絞去滓。以傅瘡。多少隨人意。

升麻薄。主癰疽結核。種種色不異。時時牽痛。或經年腫勢不消方。

升麻　青木香　白斂　芒消　射干

當歸　黃芩　芍藥　防風

大黃　芎藭　乾葛各貳兩　甘草壹兩

右一十四味。擣。以酒和。令調。微火熬。令黃。以薄腫上。日再

易。乾者添酒更擣之。隨後薄腫上。

寒水石薄方。

寒水石　黃蘗　黃耆　黃連

大黃　石膏　梔子各貳兩　白斂肆兩

右捌味擣篩為末。粥和如泥。塗故布上薄腫上。乾則易之。

當歸貼諸腫方。

當歸一作當陸　黃芩　黃連　大黃

莽草　白芷　白斂　白及各貳兩

右八味擣篩為散。消膠汁稍稍和如泥。塗紙貼腫上。乾則易之。

有患癰破下膿訖。著兌藥塞瘡。痛煩悶困極。有人為去兌藥。以楸葉十重貼之。以布帛裹。令緩急得所。日再三易之。痛悶即止。腫消。此極甚大良。無比勝於眾貼。此主癰疽潰後及凍

瘡有刺不出者。用之甚良。冬無楸葉。當早收之。臨時以鹽湯沃之。令釋用之。亦佳。薄削楸白皮用。亦得。貼楸葉後不復煩悶。腫消減。膿血惡汁出。瘡陷下漸差。

治腦瘻諸節諸癰腫牢堅治之方。

削附子令如棊子厚。正著腫上。以少唾濕附子。艾灸附子令熱徹。附子欲乾。輒令唾濕之。常令附子熱徹。附子欲乾。輒更氣入腫中。無不愈者。此法絶妙不傳。

治萬種癰腫方。

蒺藜蔓淨洗。三寸截之。取得一斗。以水三升。煑取二升。去滓。內銅器中。煑取一升。內小器中。煎如稠糖。下取塗瘡腫上。大良。

治癰腫方。

伏龍肝以大醋和作泥。塗布上貼之。乾即易之。消矣。又和

蒜擣如泥塗之。

凡癰無問大小，亦覺即取膠壹片如掌，水清令軟，納納然，心開一孔如錢孔大，貼腫上。若已潰者，膿當被膠急撮，皆出盡。若未有膿者，當自消矣。

又方

燒鯉魚作灰，醋和傅之，一切腫用之皆愈，以差為限，至良。

蛇銜生肉膏，主癰疽金瘡敗壞方。

蛇銜　當歸各壹兩半　生地黃三兩　黃連　黃耆
黃芩　大黃　續斷　芍藥　芎藭
莽草　附子炮，去皮　細辛　蜀椒去目閉口　白芷
白及一作白鮮皮　白蘞　甘草炙，各壹兩

右壹拾捌味，切，以大醋漬兩宿，以臘月豬脂七升，煎三上三下，白芷色黃，下去滓，傅之。

又方

生地黄壹斤　薤白五兩　辛夷　芎藭

獨活　當歸　黄耆　白芷

續斷　芍藥　黄芩　大黄各壹兩

右壹拾貳味切以臘月猪脂四升煎白芷黄色下去滓傅之

野葛貼主癰疽痔瘻惡瘡婦人妬乳瘡方

野葛　芍藥　薤白　通草各半兩

當歸叁分　附子壹分

右六味切之醋浸半日先煎猪脂八合令煙出內亂髮半兩令消盡下令熱定乃內松脂貳兩蠟半兩更著火上令和乃內諸藥令沸三上三下去滓冷之浣故帛去垢塗貼腫上乾即易之春去附子其亂髮淨洗去垢不爾令瘡痛

又方

煎地黃汁如膠作餅貼之日四易三日差（千金云食惡肉）

紫葛貼癰腫方

紫葛（貳兩） 大黃（伍分） 白斂 玄參

黃連 黃芩 由跋 升麻

榆白皮（各二分） 青木香（半兩） 赤小豆（半合）

右壹拾壹味擣篩為散以生地黃汁和之如泥傅之乾即易之大酢和亦得

治癰疽瘡久不差方

松脂 薰陸香

右貳味等分擣入少許鹽為餅貼瘡上惡汁出盡即差

諸卒腫方

取芥子細末猪膽和如泥塗病上日三

蕪菁子封癰腫方

取蕪青子壹升。擣作細末。大醋和如泥。封之。乾則易之。

芥子亦大佳。

又方 槐子半升。慎火草一把。擣細。水和塗之。

又方 擣蔚臭汁。服一雞子。以滓封癰上。暖即易之。頭面腫更良。

葱白療癰疽瘻有數孔積年不差方。

葱白壹斤。細切擣如泥。淨洗瘡拭乾。封塗之。厚一分。日三夜一。取差止。

八味黃耆薄方。

黃耆　芎藭　大黃　黃連

莽草　黃芩　梔子　芍藥等分

右八味為散。以雞子白和如泥。塗布上。隨腫大小薄之。燥則易之。瘡上開孔。令得泄氣。

搨湯主丹癰疽始發焮熱浸長進方。兼主小兒丹長忌近陰。

升麻　黃連　大黃　芎藭

羚羊角　當歸　甘草各二　黃芩三兩

右八味，以水一斗，煮取五升，去滓，又還鐺中，內芒消叁兩，上火令一沸，則帛搨腫上，數過，腫熱便隨手消盡，王練甘休秘之。

搨湯方

大黃　黃芩　白斂各三兩　芒消壹兩半

右四味，以水六升，煮取二升，以故帛四重內汁中，以搨腫上，暖復易，晝夜為之。

又方　凡癰，以梁上塵灰葵莖等分，醋和傅之，乾則易之。

石癰堅如石不作膿者方

生商陸根貼軟布帛貼之，數易之，亦可擣傅，燥即易，癰當消濡。

處療癰疽第九　論壹首　方叁拾叁首

論曰。諸癰。狀多種不同。無問久近。皆五香連翹湯主之。先刺去熱。小豆薄之。其間數數鈹去血。若已失療。潰爛者。猶常服五香漏蘆等湯下之。當下大鈹入五分者則速愈。凡癰高而光者不大熱。其肉正平無尖而紫色者。不須治。但以竹葉黃耆湯申其氣耳。其肉正平為無膿也。癰卒痛。用八物黃耆薄。大癰七日。小癰五日。其有堅彊者。診寧生破發背及發乳。若熱手不可得近者。內先服王不留行散。外摩發背膏。若背生破無苦。在乳者。宜令極熟。熟之候。手按之隨手即起者。便熟。須鈹之。鈹法要得著膿。以意消息之。胸背不可過一寸。酌量不得膿。以食肉膏散著兌頭內癰口中。如人體熱氣歇。服木占斯散。五日後癰欲差者。服排膿內塞散。凡破癰之後。病人便綿惙欲死。內寒外熱。腫自有似癰而非者。當以手按腫上無所連。即是風毒耳。勿鈹。可服升麻湯。外摩膏。破癰口。當令

上留三分近下一分。鍼惟令極熱。極熱便不痛。破癰後敗壞不差者。作猪蹄湯洗之。日再。夏湯二日可用。冬六七日。湯半劑亦可用。胷中痛短氣者。當入闇中以手中指按左眼。視若見光者。胷中有結癰。若不見光者。瘭疽內發。鍼傷脉。血不出。住實不寫。當成癰也。凡脉來細而沈時直者。身有癰疽。脉來大漸小者。陰結苦肌肉痺癰節。尋寸口如此來大而漸小也。

漏蘆湯方。

漏蘆　白歛　黃芩　枳實炙　芍藥

升麻　麻黃　甘草炙各貳兩　大黃三兩

右九味。㕮咀。以水一斗。煮取三升。分三服。無藥處。單服大黃下之。一方白薇貳兩。

連翹五香湯方。

連翹　青木香　薰陸香　麝香　沈香

射干　獨活　桑寄生　通草　升麻各貳兩

丁香壹兩　大黃參兩，別浸

右壹拾壹味，㕮咀，以水九升，煮取減半，內竹瀝貳升，煮取參升，八分參服，未差，中間常服佳。

王不留行散，主癰疽及諸雜腫已潰，皆服之方。

王不留行子壹升　五色龍骨貳兩　野葛皮半分　栝樓六合

當歸貳兩　乾薑　桂心各壹兩

右柒味，擣篩為散，食訖溫酒服方寸匕，日三，以四肢習習為度，不知，漸稍加之。此浩仲堪方，隋濟闍梨所名為神散。癰腫即消，極安穩。千金云：治癰腫不能潰，困苦無聊賴。

黃耆竹葉湯，治胸背遊熱癰疽方。

黃耆參兩　生地黃八兩　甘草參兩，炙　芍藥參兩　黃芩參兩

人參貳兩　麥門冬三兩，去心　石膏貳兩半　芎藭貳兩　當歸貳兩

生薑五兩切。大棗三拾枚擘。半夏四兩洗。淡竹葉切壹升

右壹拾肆味。以水壹斗貳升。先煮竹葉取九升。去滓內諸藥。煮取叁升。分肆服。相去如人行二十里間食。日三夜之服。

黃耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渴方。

黃耆　升麻　栝樓　乾地黃

麥門冬去心各三兩　黃芩　芍藥各壹兩　梔子二十枚擘

右八味。㕮咀。以水壹斗。煮取叁升。分叁服。

溫中湯主癰疽取冷過多寒中下痢食完出方。

甘草炙　乾薑　附子炮各壹兩半　蜀椒二百四十枚汗

右肆味。㕮咀。以水陸升。煮取貳升。分叁服。

黃耆散主癰疽撮膿方。

黃耆五分膿多倍之　小豆一分熱口乾倍之　芎藭半兩肉不生倍之　芍藥二分痛不止倍之

栝樓二分渴小便利倍之　白斂三分有膿不合倍之

右六味擣篩爲散酒服方寸匕日三（廣濟有甘草三八分）

瞿麥散主諸癰潰及未潰瘡中疼痛膿血不絕不可忍之方

瞿麥　白芷　黃耆　當歸　細辛

芍藥　芎藭　薏苡仁　赤小豆（各壹兩）

右九味先以清酒漬豆出於銅器中熬之乾復漬熬五過止然後治末之合下篩溫酒服方寸匕日夜各五三日後痛者肌肉生一方以苦酒漬小豆多痛倍瞿麥瘡未開倍白芷膿多倍黃耆薏苡芍藥

黃耆湯主癰腫虛弱方

黃耆（四兩）　升麻（三兩）　桂心（今用貳八分）　黃芩（壹兩）　竹葉（切壹升）

茯苓　生薑（切）　甘草（各貳兩炙）

右八味㕮咀以水貳斗煮竹葉減五升去之澄取九升內諸藥煮取叄升去滓分叄服日三

諸惡腫失治有膿者方。

燒刺榆鍼作灰，水服之，經宿即頭出。服壹鍼作壹頭，多鍼多頭。無刺榆者，燒蛇蜕皮灰，水和封上，一日即孔出，仍以別服五香湯，以筋作縱任孔中，勿令合，使引膿血。若已成大瘡，去血盡，煮小兒餔塗之，上著乾薑末，以漸自消。

五利湯，主年四十已還，強壯，常大患熱，發癰疽無定處，大小便不通方。

大黃 升麻各三兩 黃芩貳兩 梔子廿五枚 芒消壹兩

右伍味，㕮咀，以水伍升，煮取叄升肆合，去滓，下芒消，分肆服，快利即止。

癰疽潰膿大多，裹虛方。

黃耆 麥門冬去心，各三兩 生薑四兩，切 五味子四兩

桂心 芎藭 茯苓 遠志去心

當歸　人參各二兩　大棗二十兩去核　甘草六兩炙

右壹拾貳味。㕮咀。以水壹斗。煮取肆升。分四服。

乾地黃丸主壯熱人長將服之終身不發癰疽令人肥悅耐勞苦方。

乾地黃五兩　天門冬五兩去心　大黃三兩　巴戟天　肉蓯蓉

栝樓　人參各壹兩　芍藥　桂心　當歸

黃芩　黃耆　遠志去心　石斛　甘草各二兩炙

右壹拾伍味。擣篩為末。錬蜜和丸如梧子。酒服拾丸。日二。加至貳拾丸。

乾地黃圓主虛熱消瘡癤方。

乾地黃四兩　大黃六兩　芍藥　茯苓各三兩

遠志去心　升麻　桂心　黃芩

麥門冬去心　人參　王不留行子　甘草各二兩炙

右壹拾貳味。擣篩爲末。鍊蜜和圓如梧子。酒服拾圓。日叁。加至貳拾圓。長服令人肥健。千金有枳實二兩

乾地黃圓主虛勞客熱。數發癰腫瘡節。經年不除者。悉主之方。

乾地黃四兩　天門冬五兩去心　人參壹兩　黃耆　黃連
大黃　黃芩各三兩　芍藥　細辛　茯苓
澤瀉　乾漆熬　桂心　甘草各二兩炙

右壹拾肆味。擣篩爲散。鍊蜜和圓如梧子。酒服拾圓。日三夜一。加至貳拾圓。長服延年益壽。終身不發癰節。凡大黃皆薄切。五升米下蒸之。暴乾。熱多者倍大黃。

排膿內塞散主大瘡熱已退。膿血不止。瘡中肉虛疼痛方。

防風　茯苓　白芷　遠志去心　芎藭
桔梗　人參　當歸　黃耆　甘草各一兩炙
厚朴炙　桂心各二兩　附子二枚炮　赤小豆三合熬

右壹拾肆味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日三夜壹服。

瞿麥散主排膿止痛利小便方。

瞿麥　麥門冬去心　黄耆　當歸　白斂各壹兩

芎藭　赤小豆半合　桂心半兩　芍藥二兩

右九味。擣篩爲散。先食。温酒服方寸匕。日參服。

薏苡仁散主癰腫令自潰長肌肉方。

薏苡仁　乾地黄　肉蓯蓉　白斂　當歸

桂心各壹兩

右陸味。擣篩爲散。先食。以温酒服方寸匕。日參夜貳服。

五香湯主惡氣毒腫方。

沈香　丁香　麝香入湯成　薰陸香　青木香各壹兩

右伍味。切。以水伍升。煑取貳升。分參服。不差更合服。以湯淬薄腫上。

治疽膏方。

當歸　芎藭　白芷　松脂　烏頭各二兩

巴豆三十枚去皮　豬脂三升

右七味。切。內膏中微火煎三沸。內松脂耗令相得。以綿布絞去滓。以膏著綿絮兌頭尖作兌。兌之隨病深淺兌之。膿自出食惡肉盡即生好肉。瘡淺者勿兌。著瘡中日三。惡肉盡止。

乾瘙瘡凡是瘡瘍皆用之方。

雄黃　雌黃　硫黃　白礬燒　胡粉

松脂各二兩　水銀三兩

右七味。細研如粉。以水銀不見爲度。內後膏中。以十隻筋攪之數千匝。冷。盛貯勿洩。

藜蘆　漏蘆　狼牙　羊蹄根　青葙

地榆　當歸　薔薇　藺茹各二　白斂

蛇床子〔各壹兩半〕

右壹拾壹味。擣篩為散。以醋浸一宿。以成煎豬膏四升。煎三上三下。膏成絞去滓。以極微火煎之。凡一切惡瘡癬疽瘻瘑疥。患悉傅之。勿令近目及陰。其石等研之如粉。膏欲凝。乃下攪。令勻。摩之。逐手差矣。

食惡肉散方。

硫黃　雄黃　雌黃　漆頭藺茹

麝香　礬石〔燒各半兩〕　馬齒礬石〔燒。二分〕

右柒味。細作散。傅之。兌食惡肉令盡。〔千金有丹砂半兩〕

滅瘢膏。主一百癰疽惡瘡。赤疽。皆先以布揩作瘡。以塗之。鼻中息肉。如大豆內鼻中。痢血酒服如棗核大。病痔以綿裹梅子大內下部中。中風塗摩取愈。婦人崩中產後中風皆主之方。

烏頭 礬石燒 女萎 狼毒 躑躅

附子 野葛 烏賊骨 皂莢炙 赤石脂

天雄 芍藥 芎藭 礜石燒 當歸

石膏 莽草 地榆 鬼臼 續斷

蜀椒 白朮 巴豆去皮 大黃 細辛

白芷 乾地黃

右貳拾柒味，各壹兩，擣篩，以成煎豬脂四升和藥，以此爲率。三沸三下，內三指撮鹽其中，下之。須服摩之。妊娠婦人勿服。其藥絹篩，豬膏臘月者，多合用之，神效。別取一升和鷹屎白三兩，調和，使熟，傅之，滅瘢大驗。

豬蹄湯，主癰疽及惡瘡有息肉方。

豬蹄一具，治如食法 白斂 白芷 狼牙 芍藥各三兩

黃連 黃芩 大黃 獨活各二兩

右玖味，切，以水三斗煮猪蹄，取一斗二升，去蹄，内藥，煮取五升，分洗瘡，日三，良。

治節腫方。

生椒　麴末　釜月下土（末之）

右叄味，末之，以大醋和傅上，乾則易之。

禁癰方。

呪曰：癰非癰，節非節，土塊失，癰即滅。三七遍，取一土塊摩腫上，傅與病人，男左女右。

割一切腫方。

凡人身上有腫，腫在左割左，在右割右，足出少血即消。在足小指下横文内畔稜上，此極良。

禁一切腫方。

凡一切腫亦覺陰，呪曰：上有太山，下有大海，内有大魚，主食癰

疽。四岳使者。於我所須。癰疽小鬼。隨手消除。急急如律令。七遍。

又方　取紫檀細研。大醋和之。塗。并治遊腫。

療身體手足卒腫方。

取驢脂鹽末傅之。

又方　取大醋和蚯蚓矢傅之。

又方　擣蒼耳傅之。冬用子。春用心。

又方　取大醋和土消末傅之。

千金翼方卷第二十三

千金翼方卷第二十四

瘡癰下

癰疽發背第一 方九首

凡發背及癰疽腫。已潰未潰方。

取香豉三升。少與水和。熟擣成彊泥。可腫作餅子。厚三分。已有孔。勿覆孔。可腫上布豉餅。以艾列其上灸之。使溫溫熱而已。勿令破肉也。其熱痛。急易之。癰疽當便減。決得安。或一日二日灸之。若先有瘡孔。孔中汁出即差。

癰腫發背并諸毒腫方。

楡白皮　栝樓兩各伍　婦人月布洗取汁
胡燕窠土　猬鼠土兩各拾

右五味。擣和作泥封之。一日漸消。五日全差。若壞。封四畔差。

諸癰腫無聊賴。發背及癰節已疼痛方。

蒸麋穀更遞尉之即愈。一云薔薇根更炙熨之。

癰疽發腹背陰隱處。通身有數十癰方。

取牛糞乾者燒末。以雞子白和塗。乾則易。差止。

又方　以牡蠣粉大醋和塗即愈。

占期散主消腫。癰疽消膿方。

木占斯　人參　乾薑一云乾地黃。　桂心

細辛　厚朴炙　敗醬　防風

桔梗　栝樓　甘草炙各壹兩

右一十一味。擣篩為散。酒服方寸匕。藥入咽覺藥流入瘡中。若癰疽灸之不能發壞者可服之。瘡未壞者去敗醬。已發膿者內敗醬。服藥日七夜二。以多為善。若病在下。當膿血出。此為腸癰也。諸病在裏。惟服此藥即覺其力。痛者即不痛。長服治諸瘡及疽痔。瘡已潰便早愈。醫人不知用此

藥。發背無有不治者。惟服此耳。若始覺背上有不好而渴者。即勤服之。若藥力行覺渴止便消散。若雖已壞。但日夜服之勿住也。服之腫自消散不覺去時。欲長服者當去敗醬。婦人乳癰宜速服之。一方無桂心。

癰疽潰漏男發背女發乳及五痔方。

蝟皮燒 蜂房燒各壹具 蜀椒汗 乾薑各壹兩

厚朴壹兩半 附子炮去皮 桂心 當歸

續斷 藁本 地榆皮各五分

右拾壹味。擣篩為散。酒服方寸匕。日三。加斑猫七枚益良。

治骨疽百方治不差方。

可於瘡上以次灸之。三日三夜無不愈。

又方

久瘡不愈。差而復發。骨從孔出者名為骨疽。取一死烏雌

雞。淨去肉取骨。熬令成灰。取三家牛拘木刮取屑。三家炊單各一兩。皆别熬成灰。合導瘡中。碎骨當出數十片。愈。

鼠瘻第二 論一首 方一十一首 灸法二首

論曰。一切癰疽。皆是瘡瘻根本所患。癰之後膿汁不止。得冷即是鼠瘻。是以漏方次之。大須急救之。

治鼠漏方。

馬齒草五升。 槲白皮一斤。水煮五升。取一升。澄清 麝香半臍。乾之。研末 杏人半升。曲煎令黑。擣如粉

右四味。以甆器貯之合和。以三四重帛密繫口。稱已成瘡者。以泔清煎減半。洗。作貼子塗藥貼著瘡上。日三易之。若未作瘡如瘰癧子者。以艾一升。熏黄如棗大。乾漆如棗大。三味末之。和艾作炷灸之。三七壯止。

治諸漏方。

取新生兒屎。一百日以來皆收置密器中五六日。取塗瘡孔中。

又方

取鯉魚腸切作五段，火上煖之，先洗瘡拭乾，以腸貼之，冷即易之，從旦至夜，乾止，覺痒，開看蟲出，即差。

又方

取雞子三顆，米下蒸半日，出取黄熬令黑，先拭瘡汁令乾，以藥內瘡孔中，不過三度。

又方

以臘月猪脂，以紙紝沾取內瘡孔中，日五度，夜三度。

風漏及鼠漏方。

赤小豆　白斂　牡蠣熬　黄耆

右四味，等分，擣篩爲散，酒服方寸匕，日三。

蟻漏方。

取陵鯉甲二七枚，燒爲末，猪膏和傅之。

又方取半夏一枚。屑之以鴨膏和傅之。

漏方

鍛鐵屑　狗頰連齒骨　虎矢　鹿角甲半取毛各貳兩千金云鹿皮合毛。

右四味。擣篩爲散。以猪膏和內瘡孔中。須臾易之。日五六。

治鼠漏方

死鼠壹枚中形者　亂髮壹雞子大

右二味。以臘月猪膏纔得沒之。微火煎之。鼠髮消盡膏成。

以塗瘡上。又以酒服半匕分許。鼠從瘡中出。

寒熱瘰癧方。

連翹　黃連　苦參　括樓　土瓜根

芍藥　恒山各壹兩　龍膽貳兩　狸頭骨壹枚炙

右九味。擣篩爲散。酒服五分匕。日三。

治身體瘰癧及常有細瘡。又口中有瘡。薔薇丸方。

薔薇根　黃蘗　黃耆　黃芩　芍藥

苦參　白歛　栝樓　防風　梔子

龍膽　鼠李根皮各壹兩　石龍芮貳兩

右壹拾叁味。擣篩為末。鍊蜜和丸如梧桐子。飲服十丸。日三。千金無黃蘗

頸漏。

擣生商陸根作餅子如大錢。厚三分。貼漏上。以艾灸之。餅乾熱則易之。可灸三四升艾便差。

一法

葶藶子貳合　豉壹升

右二味。合擣大爛熟。作餅子如上。以一餅子當孔上貼。以艾炷如小指大。灸上三壯一易。三餅九炷。日三。隔三日一灸。

一法

凡是一名瘰癧。有結核欲作癰節者。以獨顆蒜去兩頭。灸之如前法。日灸三度。差。

一法

七月七日日未出時。採麻花。五月五日取艾。等分合作炷。灸漏上百壯。

治瘻方。

馬齒草陰乾　臘月淳麻燭燼

右貳味等分。細篩。以臘月猪脂和之。先以煖泔清洗瘡。拭乾塗之。

又方

槲木皮一尺。闊六寸。去黑皮。細切。以水二斗。煮取五升。去滓。內白糖十挺。煎取一升。分三服。以銅器中貯之。若吐。吐著器中看之。

又方

五月五日午時。取馬齒草一石。以水一石煮取三斗。去滓。內白糖十挺。煎取九升。分三服。以銅器貯之。若吐。吐著器中看之。

人參散 主寒熱瘰癧在頸。脉如如杏李方。

人參 乾薑 白芷 甘草各壹兩

右四味。擣篩爲散。先食飲服方寸匕。日三。少小半匕。以意增加。

又方

狸骨伍分炙 烏頭柒分炮去皮 黃蘗壹兩

右三味。擣篩爲散。先食酒服一錢匕。日三。

又方

連翹 黃連 芍藥 苦參

土瓜根　龍膽　當歸各半兩

右七味，擣篩為散，先食以溫酒服錢五匕，日三，稍加至方寸匕。千金無當歸，有括樓根、山烏，八味。

又方　取桃枝上不落子，擣末，以大醋和傅之。

鼠乳方。

常思根拭去土，勿洗，以附本繫之，一日一夜便斷消。

瘭疽第三方八首

瘭疽秘方，世所不傳，神良無比。

升麻　乾地黃　枳實炙，各貳兩　大黃貳兩半　前胡三分

犀角壹兩半　麝香　射干　甘草炙，各半兩

右玖味，以水玖升，煑三升，分三服，以差為度，不限劑數。

猪蹄湯，主瘭疽諸疽，十指頭焮赤痛癢已潰方。

猪蹄壹具，治如食法　大黃　白芷　芎藭

黃芩　黃連　細辛　當歸

藁本　藜蘆炙。本無　莽草　甘草各壹兩

右壹拾貳味。以水三斗煑猪蹄。取一斗。煑藥取五升。洗瘡。

搨湯主瘭疽浸淫欲作未成。或如桃李核。或如雞子赤焮方。

黃芩　黃連　大黃　當歸

芒消　甘草各壹兩

右陸味。以水六升。煑取三升。去滓。還鐺中。內芒消一沸。貼布帛中。以搨腫上數百遍。

瘭疽浸淫多日漸大方。

胡粉熬壹分。　黃連　藺茹　甘草各貳兩

右肆味。擣篩爲散。以粉上。日三。

瘭疽著手足肩背。累累如米起色白。刮之汁出。愈而復發方。

黃耆壹兩半　款冬花　升麻各壹兩　赤小豆

附子（炮，去皮）　苦參（各壹分）

右陸味，擣篩為散，酒服半錢匕，稍增至壹錢匕，日三服。

又方

取虎矢白者，以馬矢和之，暴乾燒灰，以粉之。

又方

龍骨　胡粉（燒）　滑石（各半兩）　青木香（貳兩）

右肆味，擣篩為散，以米粉一升和之，稍稍粉之，日四五。

瘭疽方

竈室塵　竈突中墨　竈釜下土（各壹升）

右叁味，以水九升，煮三沸，取汁以洗瘡，日三四度。

惡核第四（論一首　方一十二首）

論曰：凡惡核似射工，初得無定處，多惻惻然痛，時有不痛者。不痛便不憂，不憂則救遲，救遲則殺人，是以宜早防之。此尤

忌牛肉雞豬魚驢馬等肉。初如粟或如麻子。在肉裏而堅似皰。長甚速。初得多惡寒。須臾即短氣。取茱萸五合作末。水一升和之。絞取汁頓服之。以滓傅之。須臾更服。此汁令毒氣散。不入腹。入腹則致禍。切慎之。

江南毒氣惡核射工暴腫生瘡。五香散方。

甲香　薰陸香　青木香　羚羊角　丁香

犀角　鼈甲炙　升麻　烏翣　黃芩

黃蘗　黃連　甘草炙各肆　吳茱萸參

右壹拾肆味。擣篩為末。中射工毒及諸毒。皆水服方寸匕。日三。以雞子白和塗腫上。乾則易之。兼以水和少許洗腫上。一方無香砂

野葛膏主射工惡核卒中惡毒方。

野葛貳兩　巴豆去皮　烏頭　蜀椒各伍　附子

丹砂　茵芋兩各壹　雄黃　大黃　躑躅兩各貳

右壹拾味。擣篩為散。以不中水猪膏十斤。煎三上三下。去滓。內丹砂雄黃末。攪至凝。以棗核大摩病上。勿近眼。凡合名膏。皆不用六畜婦人小兒見之。

麻子湯主遍身流腫方。

麻子熬伍升。　赤小豆叁升　防風兩　附子炮　當歸兩各壹

右伍味。先擣麻子令熟。以水三斗煑麻子。取一斗三升。去滓。內藥及豆。合煑取四升。去滓。食豆飲汁。

治惡毒腫。或著陰卵。或偏著一邊。疼急攣痛。牽小腹不可忍。一宿殺人方。

取茴香草擣取汁。飲一升。日三四服。滓薄腫上。此外國方。神驗。從永嘉以來用之。起死人。神效無比。

九風勞毒腫疼攣痛。或牽引小腹及腰胯痛方。

取桃仁壹升，去尖皮兩仁者，熬令黑煙出，熱研如脂，以好酒三升攪令相和，一服，覆取汗，不過兩三度作之，差。

若從腳腫向上，稍進入腹殺人方。

取赤小豆一斗，以水三斗煮爛，出豆，以汁漬膝以下，日一，數日則愈矣。若已入腹者，不須漬膝，但煮豆食之，斷一切鹽菜飲食米麪，惟秖食豆一物，渴飲豆汁，差乃止。

大麻子赤小豆湯，主毒腫無定處，或敕濇惡寒，或心腹刺痛煩悶者，此由毒氣深重也。

大麻子熬　赤小豆各伍升　生商陸貳升，薄切之

升麻肆兩　附子炮　射干各叁兩

右六味，以水四斗煮諸藥，取二斗五升，去滓，研麻子令破，以麻子汁煮豆令極熟，去滓，可得六七升，一服一升，一日一夜令盡，小便當利，即毒除腫減，食兼此豆益佳，如湯沃

差。凡用麻子皆不得用鬱悒者，可揀擇用之。

丁腫方。

狗屎珠。一名龍葵。取汁傅之，拔出根。冬用乾者，湯漬取汁用之。

又方

取蒼耳燒灰，和醋泔澱作泥封之，乾即塗，勿住，取拔根出乃止。

又方　取黑牛垢封之。

又方　刮竹箭上取茹作炷，灸上二七壯，即消矣。

又方　末附子，醋和傅上，燥即塗。

又方　取生薺苨根汁一合，去滓塗，不過三度。

丹胗第五　方二十八首

治丹毒腫升麻搨湯方。

升麻　漏蘆　芒消兩各貳　蒴藋根兩伍

黃芩兩各叁　梔子貳拾枚

右壹味，切，以水一斗，煮取七升，冷，分用漬搨，常令濕為佳。

丹毒方一名天火也，肉中忽有赤如朱塗，赤色大者如掌，劇者遍身，亦有痛癢微腫者方。

赤小豆貳升，絹下篩，雞子白和塗之，小乾即塗，遂手消也。

復合漏蘆湯以防其內，其方如左。

漏蘆　白斂　黄芩　白薇　枳實炙

升麻　芍藥　麻黄去節　甘草炙，各貳兩　大黄貳兩

右壹拾味，㕮咀，以水壹斗，煮取三升，分三服。

治五色丹，俗名油腫，若犯者多致死，不可輕之方。

縛母猪枕頭臥即差。

又方　牛屎塗，乾則易之。

又方　雞子白、蒲席灰塗之。

又方　擣麻子水和塗之。

又方　煎羊脂摩之。青羊尤佳。

又方　赤小豆五合，末，水和，取汁一合服。滓塗五心。

又方　以芸薹菜末、雞子和塗之。一云：芸薹菜汁服三合，滓塗丹上。

又方　榆根皮末，雞子和傅之。

又方　燒苦竹葉，篩灰，和臘月豬脂塗之。亦治油腫。

又方　擣芸薹菜，封即差止。

又方　擣慎火草封之，神良。

又方　鯽魚五枚，五寸以上者，去鱗，熟研朱砂一合，擣如泥，封病上，厚三分，乾易之。

瘤病方

取麞鹿二肉，治如厚脯，火炙令熱，搨掩瘤上，冷更炙搨，可四炙四易，膿便愈。不除，更炙新肉用之。

白瘤方

先極搔刮，以繩縛之，即愈。又取東向木空中水熱刮瘡上，洗之二三遍，即愈。

又方

硫黃　礬石燒

右二味等分，末，以醋和傅上。

麻遊腫方。

以生布一片搵油中，布入油出，以火然之，持照病上，呪曰：日出遊遊，不知羞，脂火燎你頭，七遍差。

白遊腫方。

熟擣生羊胛塗之。

青白赤遊手近微痛者方。

大黃　蒲黃　伏龍肝各貳

右三味，以水和如薄粥，塗之。

治赤遊方。

以鷹矢水和塗之二三差。

又方

胡鷰巢灰醋和傅之日二三。

又方

冷水射注之。

又方

大黃壹兩　紫檀壹兩　豉壹合

右三味擣細篩為末大醋和傅之。

又方

擣慎火草如泥塗之此最大效。

火遊腫方。

大黃慎火草和為末塗之。

又方

胡粉壹兩和醋一合煎塗之。

火遊腫流遍身赤色者入腹即死方。

以生豬肉傅上其肉蟲鳥不食臭惡故也。

甘濕第六 論一首　方二十八首

論曰。夫甘濕之為病也。或熱或寒如病虎狀。或時下痢。或痢

則斷。或常痢不止。無有時節。或時睡眠。有時思食。而氣力漸弱。日日羸瘦。腹背攣急。頭項無力。嗜卧食少。試法先掐琢其脊上兩邊。若逐指即起如粟者。即是甘病。若不起者。非是甘也。若起者可漸向上琢之。若起至頸骨兩邊者。即是蟲已入腦矣。病難愈矣。療十得二。終須多灸。若未入腦。醫之可差。先以繩拘項向心厭頭。令當齊骨下尖處。即捶著轉繩向背脊上當脊骨捶頭。横量病人口兩吻頭。作定於捉繩頭。脊骨上點兩處。灸必須細意點處齊平。即灸。初旦灸二壯。滿一七日至第二七日。灸二七壯。第三七日日暮灸七壯。第四七日目秪三壯。第五七日日二壯。看初灸二三日。若灸瘡發膿者易差。五六日乃發者難差。惟得食白飯首宿苦苣蔓菁菜香漿少許燒塩。差後百日。乃可得依常食。又須灌藥三遍。相去五日一灌。

葱白壹握　豉壹升　蜀椒叁合　塩貳合

右四味，以水一斗，煑取七升，去滓，煖灌之，取一升乃灌也。

療甘濕食口齒及下部方。

飛廉蒿蜀名

右壹味，燒作灰，擣篩，以兩錢匕著病處，甚痛忍之，若不痛，則非甘也。特忌油膩、蜜、魚。有人患甘，食口刺痛，穿著此得差，著下部中，蟲如馬尾大，相續出無數，十日後差，二十日平復。

又方

取五葉紫花草末，和杏仁、葶花灰相和，吹下部中，差。

甘濕方。

擣五葉紫花草熟，先病拭乾，內著病上，差為限，所中甘者，絞取汁五合，服之，日三夜一。

下部癢，食如蟲行方。

眞朱砂壹銖 礬石燒貳分。 芎藭壹兩

右三味。擣末。綿裹。內下部中。

又方 取蝦蟆末。兔矢末。用之如上法。

又方 以紙裹莨菪根。煻火燒熟。以蜜塗內下部中。一切蟲痔皆愈。

又方

黃連貳兩 蛇床子半兩 黃蘗 梔子各壹兩

右肆味。擣篩爲散。以臘月猪脂和。塗內下部中。日再。

又方

大黃 黃芩 黃耆 玄參各壹兩 丹參叁分

芍藥半兩 吳茱萸五分炒。

右柒味。擣篩爲散。酒服方寸匕。日三。

治甘濕。火下痢赤白。百療不差方。

兎頭炙　狐骨皆臘月採。炙　葶藶子熬　百草五月五日收　蛇頭炙

蝦蟆炙　蜣蜋皆五月五日採。炙　石黛　晩蚕蛾熬　青礬熬

黄礬熬　丁香　麝香　菥蕈灰　故緋灰

苦參　蘗皮　乾薑　角蒿灰　丹砂

芒消　鐵衣　印成塩　救月木　蝦蟲矢

桂心　床中桄木

右貳拾柒味，等分。細研如粉，以筒子吹下部，日三良。千金有倒桂草。

甘濕下蟲方。千金云下黚。

熏黄　朱砂　石黛　石塩　麝香

丁香　礬石熬　梔子　鐵衣　莨菪子熬

細辛熬　土瓜熬　乾薑熬　蜀椒汗　葶藶子熬

昌蒲熬　蝦蟆乾者。熬　故靴底炙　髑髏骨炙之。枯腐者佳，新者不任用。

右壹拾玖味，等分，擣篩為散，以筒子吹藥杏仁大下部中。

所有患甘瘡悉傳之。其丁香麝香皆別細研。內藥中合之。

一方有芥子。若病大重者。用灌法如左。

丁香　麝香　甘草各叁分　犀角伍分

右四味。細末如粉。別以塩三合。蜀椒三合。豉二升。以水三升煮取一升。去滓內諸藥合和。分再灌之。旦一酉一。

月蝕惡瘡息肉方。

硫黄一云雄黄。　䕡茹　斑猫去足翅熬。各壹兩

右叁味。擣篩為散。以粉瘡上。乾者以猪膏和塗。日三夜二。

治甘食人諸處。凡是赤白痢久不差秘之方。

五月五日蝦蟆壹枚半熬半生。作末　金銀土堝伍分

麝香壹分　人矢灰伍分　銀末小豆太

右伍味。細研如粉。傳病上即差。三七日慎食甜物。痢者吹下部中。

凡人口中生瘡。久不差。下至咽喉。胃中。有三年不差者。此亦是甘食病。宜塗角蒿灰於病上。有汁咽之。不過一宿差。

又方　薔薇根濃煮汁含咽三宿差。

又方　大麻子　胡麻熬各壹升半。並令焦赤

右貳味。以叁升瓦缾泥裹上厚一寸。待乾內麻子等令滿。以四五枚葦管插口中。密泥之。掘地作竈。立瓶竈口中。竈底著瓦器承之。密填竈孔與地平。聚炭餅四面。以擊壘之。日沒放火燒之。至明旦開取脂。適寒溫灌下部中一合。尋覺咽中有藥氣爲佳。亦不得過多。多則傷人。隔日一灌。重者再三灌止。旦一起灌至日夕。極覺體中之勞。勿怪也。非惟治甘濕。凡百異同瘡疥癬並洗塗之。無不差。一云口含一丸

甘食下部生瘡。及日月食方。

麝香　乾薑　蠹蟲矢　葵莖灰

礬石各叁分燒 五月五日蝦蟆壹枚炙。

右陸味，擣篩爲粉。以竹管吹下部入內三寸，日再。

又方

雚蘆壹兩 狼牙叁兩 橘皮 萹蓄 青葙各半兩

右伍味，準前法用之。

甘濕方。

取乾羊矢一升，以煖水三升漬之一宿，絞取矢汁和末石黛一顆，內汁中溫之，灌下部。令藥停腹一食久，病乃差。

又急甘食鼻口數日盡欲死方。

藍澱塗所食上，令遍，日十度，夜四，差止。

又方 細末沒石子吹下部，立差。

又方 燒文蛤灰，臘月猪脂和塗。 又方 灌白馬尿一升。

治痛瘡方。

細楸枝葉水煑稠可丸。以竹筒内下部中。甘痔漏皆差。煎楸葉汁數洗之良。

甘蟲月蝕濕䘌等方。

臘月兎頭燒貳枚　五月五日蝦蟆燒壹枚　青黛壹兩　地黄葉灰大雞子　虎頭炙八分　貝齒燒柒枚　小薊灰大雞子

右柒味。爲散。綿裹如棗核大。内下部中。亦筒吹半棗核大。成人者井華水旦服五分匕。隔日一服。

論曰。凡患濕䘌蟲。多是熱病後或久下不止。或有客熱結在腹中。或遇暑濕涼氣者。多生此病。病亦有燥䘌不甚泄痢。而下部瘡癢。不問燥濕。久則殺人。爲病診齒無色。舌上盡白。甚者脣口有瘡。四肢沉重。喜眠。如此者。此爲蟲蝕其肛。肛爛盡見五藏。即死矣。治之方。

黄連　生薑酪拾兩　艾葉捌兩　苦參肆兩

右肆味。㕮咀。以水一斗。煮取三升。爲三服。日三。久者亘三劑良。

凡濕䘌欲得冷而苦痢。單煮黃連及艾葉苦參之屬。皆可單用。

懊憹散。主濕䘌瘡爛。殺蟲除熱方。

雚蘆　青葙　女青　桃仁（去皮熬）

雷丸（各叁兩）　萹蓄（半兩）

右陸味。擣篩爲散。粥飲服方寸匕。日三。稍增至貳匕。酒服亦得。

濕䘌神方。

取生薑刮去上皮。斷理切之。擣極熟。取汁壹升五合。又以水壹升五合和合相得。旦空腹服之。仍刮生薑貳枚如指大。以楸葉桃葉數重裹之。塘火中燒之令極熱。內下部。須臾。若濕盛者。頻三日作之。無有不差。

陰蝕瘡方。

蒲黃壹升　水銀壹兩

右貳味。熟研令散。以粉瘡上。五月六月七月。食將忌肥濃。慎之者即免此。

又方

肥猪肉叁拾斤。并得陰肉雜用益良。以水貳石煮取熟。訖去肉。以湯汁內大盆中。以自洗。冷即易。不過四遍。

殺九蟲散。主寒疝心痛及蟲齧心痛方。

雚蘆　貫衆　乾漆貳兩，熬　狼牙壹兩

右肆味。擣篩爲散。以羊臛和服之壹合。日叁。貳日下蟲矣。

治熱心中懊憹方。

雚蘆貳兩半　乾漆熬　萹蓄各叁兩

右叁味。擣篩爲散。粥飲服方寸匕。日叁。

治蟲痛方。

熬乾漆末之。蜜和圓如梧子。飲服十圓。日三。

又方

燒槐木耳灰。水服棗大。差。不止。飲一盞熱湯。立有蟲出。

有人患心腹脹滿。不能食飲。至於死。有人教取羊子肝搵蒜虀服之。遂轉下五升如粉粥。寸寸皆是蟲。即差。此人口中生瘡。時人名曰乾甘。以此療之得差。百日內必不得食醬。食醬即發。常食蒜虀。平旦服至日西即下。其虀須和調作。不同尋常食虀也。

腸痔第七 方二十六首 論一首

療痔方。

臘月牛脾一具。炙熟食之。令盡。即差。

又方

牛脾一具。熟煮。空腹食之。盡。勿與鹽醬等。一具不差。更與

一具。從旦至未令盡。

療外痔方。

麻子肆升擣。生布袋盛。飯下蒸之。絞取脂銅盤盛。煖之以綿作貼子。坐使正當蟲孔。須臾易之。更坐蟲出。

又方

擣萹蓄絞取汁。溲麪作餺飥。空腹喫。日三頓。常食良。

療痔方。

桑耳切三升。水一斗五升。煮取三升。日服一升。日三。三日服一劑。

又方

桑耳作羹臛。調和令美。空腹下飯取飽。不過三頓差。

又方

蝟皮炙一具。乾地黃伍兩　連翹子　槐子各叁兩　當歸

乾薑　附子炮　續斷　礬石燒　黃耆各壹兩

右壹拾味，擣篩為末，鍊蜜丸如梧子，飲服十丸，日二，稍加至三十丸，兼主漏。

又方

取生槐白皮十兩，熟擣丸如彈丸，綿裹內下部中，長吏萹蓄菜及黃汁作羹粥食之，大佳。

治下部癢痛純緣腫起，內欲生肉突出方。

大豆參升，水柒升，急火煮，取肆升　槐白皮切，六升　甘草參兩，炙

右以大豆汁煮取二升，漬故帛薄之，冷則易之，日三五。

槐白皮膏，主下部癢痛痔瘡方。

槐白皮五兩　赤小豆貳合　楝實　桃人各五拾枚　當歸參兩

白芷　甘草各貳兩

右柒味，以成煎猪膏一斤，微火煎，白芷色黃去滓，摩瘡上。

兼導下部中。

療痔方。

取故鞶由一枚。燒作灰。以井華水空腹服一分。

又方　取地黃末。傅下部。日三夜一。良。

又方

乾薑　芫花　蜀椒各壹兩半汗　豬懸蹄拾枚燒

附子叁枚炮。芍藥　白薇　白斂　大黃

牡蠣熬　桂心各半兩　甘草壹兩炙。

右壹拾貳味。擣篩為散。酒服方寸匕。日二。

療痔下部出膿血。有蟲。傍生孔方。

取槐白皮一擔。以水煮令極熟。出置木盆內。坐其中。欲大

便狀。蟲悉出。冷復易之。不過二三度。

又方　煮槐根汁洗之。

又方　煑桃根汁洗之。

諸痔去血過多，氣息惙惙，不下食，或腹痛牽引下部，當歸湯。

當歸　乾薑　桂心　甘草炙，各叁兩　糖捌兩

牡丹　白芷　附子炮　芍藥　人參各貳兩

乾地黃肆兩

右壹拾壹味，㕮咀，以水壹斗，煑取叁升貳合，去滓，内糖令消，分爲肆服。

諸大去血，積日虛乏，内補湯方。

人參　續斷　白芷　芍藥　附子炮

當歸　甘草炙，各叁兩　桂心　茯苓　乾薑

芎藭　乾地黃　五味子　麥門冬去心，各叁兩

大棗貳拾枚，去核

右壹拾伍味，㕮咀，以水壹斗，煑取肆升，分肆服。

諸痔下血蒲黃湯方。

蒲黃壹升　當歸　白芷　白石脂各叁兩

黃連　芎藭　乾地黃　甘草各貳兩

右八味，㕮咀，以水壹斗，煮取叁升，分叁服。

諸痔去血大虛黃耆湯方。

黃耆　當歸　芎藭各叁兩　龍骨壹兩　芍藥

桂心各肆兩　糖壹斤　附子炮，去皮　甘草炙，各貳兩

右九味，㕮咀，以水一斗，煮取三升二合，去滓，入糖令消，分伍服。

槐子圓　主燥濕痔，痔有雄雌者主之方。

槐子　吳茱萸根皮　乾漆各肆兩，熬　蒺藜叁兩

秦艽　黃芩　牡蠣熬　雷丸　白芷

龍骨　黃耆　桂心　丁香　青木香

八角附子（炮，去皮，各貳兩）。

右壹拾伍味，擣篩為末，鍊蜜和丸如梧子，飲服二十丸，日三服。

小槐實圓，主五痔十年方。

槐子（叁斤）　白糖（貳斤）　礬石（燒）　硫黃（各壹斤）　龍骨　大黃　乾漆（熬，各拾兩）

右柒味，擣篩四味，其礬石及糖並細切，內銅器中，一石米下蒸之，以綿絞取汁，以和藥，令作丸，併手丸之，如梧子，陰乾，酒服二十丸，日二，稍增至三十丸。

槐酒，主五痔，十年不差者方。

槐東南枝（細剉，一石）　槐白皮（細剉，一石）　槐東南根（細剉，三石）　槐子（壹斗）

右肆味，以大釜中安十六斛水，煮取五斛，澄取清，更煎取

壹石六斗。炊兩斛黍米。上麴二斗釀之。攪令調封泥。七日酒熟。取清飲。適性。常令小小醉耳。合時更煮滓取汁。淘米洗器。不得用生水。作酒如此。藥忌生水故也。

主痔神方。

七月七日多採槐子熟擣取汁。重綿絞之。內銅器中。著中庭高門上暴乾之。二十日以上。煎成如鼠屎大。內穀道中。日三。亦主瘻及百種瘡。

又方

取三具鯉魚腸。以火炙令香。以綿裹之。內穀道中。一食頃。蟲當出。魚腸數數易之。盡三枚便差。

又方

炙魚腸令香坐上蟲即出。

又方

虎頭骨炙　犀角末

右貳味。各末之如雞子大。以不中水豬膏和塗之。

治痔方　取八月槐子擣取汁煎作丸塗之。

又方　取熊膽塗之。取差止。但發即塗。

又方

以紙裹小瓜以泥裹三四分。煻火埋燒之令大熟。經宿勿食使大飢。開取承熱任意飽食之。覆暖卧一炊久。其痔差。

五痔方。

五月五日收蒼耳莖葉擣爲末。水服方寸匕。日三。差。採時陰乾。

又方　燒羊角䚡末。酒服方寸匕。日三。

又方　常服蒲黄方寸匕。日三。良。

論曰。凡人大便有血即是痔病。勿得慢之。愼乾棗油膩豬魚。夫患痔在身。所服名藥皆不得力。徒弃功夫。一無所益。欲服

餌者。當斷之乃可服也。第一槐子人丸。大有效驗。方在前篇中。必須事之勿致疑也。

治脫肛方。

蒲黃貳兩

右壹味。以猪肪和傅肛門上内之。日二三愈。

又方

腸出不入。生栝樓取汁。猪脂等分。湯上溫塗内之。差。

又方　以鐵精粉上内之。每出即粉。取差止。

疥癬第八 論一首 灸法一首 方三十四首

論曰。瘑瘡疥癬之病。皆有諸蟲。若不速愈。三年不差。便爲惡疾。何者諸蟲族類極盛。藥不能當。所以須防之。不可輕也。凡瘰疥瘙。黃耆酒中加烏蛇脯一尺。烏頭附子茵芋石南莽草各等分。大秦艽散中加之。亦有大効。小小疥瘙十六味小秦

丸散亦相當。千金云：小秦丸散中加烏蛇貳兩。

香瀝主燥濕癬及瘑疥百瘡方。

沈香　松節各壹斤。一方更有柏節、松節各壹斤。

右貳味，破之如指大，以布袋盛之，令置麻油中半食久，出，取一口瓷坩穿底，令孔大如雞子，以松葉一小把藉孔上，以坩安著白瓷盌上，以黃土泥坩固濟，令厚五分，以藥內坩中，以生炭著藥上使然，其瀝當流入盌中，然盡乃開出坩取汁，以傅瘡上，日再，并治白禿，疽惡瘡皆差。當服小秦丸散即差。

礬石瀝主乾濕癢及惡瘡白禿方。

礬石　硫黃　芒消　大鹽各叁分　松脂陸合

白糖捌兩

右陸味，切諸藥令如指大，先取甑蔽仰銅器上，內甑中以

藥安瘢上。以松脂白糖布藥上。都訖。重以大瘢覆之。炊五升米。藥汁流入器中。其汁密覆之。臨用小温塗瘡上。日再。

治癬秘方。

擣羊蹄根分。以白蜜和之。刮瘡四邊令傷。先以蜜和者傅之。如炊一石米頃。拭去。更以三年大酢和塗之。以傅癬上。燥便差。若刮瘡處不傷。即不差。

治久疥癬方。

丹砂　雄黄　雌黄各壹兩　䕡茹叁兩　亂髮洗，壹兩。

松脂　白蠟各壹兩　巴豆拾肆枚，去皮　猪膏貳斤

右玖味。先煎髮令消盡。內松脂蠟等。三上三下。去滓。末䕡茹石藥等內中。更煎一沸止。傅之三數度差。

治久癬不差方。

細研水銀霜如粉。和臘月猪膏。先以泔清洗瘡。拭乾塗之。

一塗即差。後時重發。更塗即永差。始塗時大須薄。慎勿厚。

又方

水銀　礬石燒　蛇床子　黃連

右肆味，各壹兩，臘月豬膏七合，和攪不見水銀為熟，傳之。

治一切無問幼小諸瘡。上方加漆頭藺茹壹兩

治諸瘡癬瘵不差方。

水銀壹斤　豬膏臘月者伍斤

右貳味，以鐵器中壘竈馬通火七日七夜，勿住火，炊之停冷，取豬膏去水銀不妨別用，以膏塗一切諸瘡，無不應手即差。

又方

特牛尿壹斗　羊蹄根切伍升

右貳味，內羊蹄漬一宿，日暴之乾，則內尿中漬一宿，尿盡

止。擣作末。塗諸瘡癬上。和猪脂用更精。

又方

諸瘙疥。皆單用水銀猪膏。研令極細塗之。

又方　取生烏頭十枚。切煑取汁洗之。即差。

治癬方。

淨洗瘡。磨取醬瓣。尿和塗之。差止。

又方

水銀　蕪荑末

右貳味。酥和塗之。即差。

又方

正日中午時。灸病處影上。三姓灸之。咒曰。癬中蟲。毛茸茸。若欲療。待日中。

又方　取酥墨塗之。

凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以種種單方救之或嚼鹽塗之妙。

又方 取鯉魚鮓糝塗之。

又方 取薑黄塗之。

又方 取牛李子塗之。

治癬方。

取黄蒿穗作末粉傅之日三夜二。一切濕癬並差。

又方

取八月八日日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩手持戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各三壯若七壯十日愈。

又方 擣刺薊汁服之。

又方 服地黄汁佳。 又方 服驢尿良。

又方　燒蛇皮一具，酒服良。

又方　擣莨菪蜜和封之良。

又方　熱榻煎餅，不限多少，日一遍薄之良。

又方　酢煎丈塗之差。

又方　擣羊蹄根和乳塗之。

又方　大酢和雄黃粉，先以新布拭之，令癖傷，傅之妙。

治瘑疥百瘡經年不差方。

楝實壹升　地榆根伍兩　桃皮伍兩　苦參伍兩

右肆味，以水壹斗，煑取伍升，稍溫洗之，日一度。

治瘑疥濕瘡浸淫，日痛癢不可堪，搔之黃水汁出，差復發。

取羊蹄根，勿令婦女小兒貓犬見之，淨去土，細切，熟熬，以大酢和淨洗，傅瘡上一時間，以冷水洗之，日一傅。凡方中用羊蹄根，皆以日未出前採者佳。

又方

作羊蹄根散。癢時搔汁出，以粉上。又以生根揩之，神驗。

療渴利後發瘡，坐處瘡疥及痲癬方。

薔薇根叁兩　石龍芮叁兩　苦參貳兩　黃耆貳兩

黃連貳兩　芍藥叁兩　雀李根叁兩　黃蘗叁兩

黃芩叁兩　當歸壹兩　續斷壹兩　栝樓肆兩

大黃壹兩

右壹拾叁味，擣篩，鍊蜜和，以飲服之，丸如梧子大。一服十五丸，日三。加至三十丸，瘡差乃止。所是癰疽皆須服之。

一云薔薇飲服之。

又方

赤小豆一升，熬，內酢中。如此七遍。　人參貳兩　甘草貳兩，炙　瞿麥貳兩

白斂貳兩　當歸貳兩　黃芩貳兩　豬苓貳兩　防風壹兩

黄耆參兩　薏苡仁參兩　升麻肆兩

右壹拾貳味，擣爲散，飲服方寸匕，日三夜一。

治疥疽諸瘡方。

水銀　胡粉各壹兩半　黄連貳兩　黄蘗柒分　礬石燒參八分。

附子參八分　蛇床子半兩　苦參壹兩

右捌味，下篩，六種水銀胡粉別以猪脂研，令水銀滅不見。乃以猪膏合研，令調如泥，以傅瘡上，日三夜一。

代指第九　方六首

治代指逆腫方。

以毛雜黄土作泥，泥指上，令厚五分，内煻灰中令熱，可忍之，泥乾即易之，不過數反即差。

又方

單煑地榆作湯漬之，半日便愈。

治代指方。

麻沸湯內指其中。即愈。

又方　先刺去膿。炙鮓魚皮令溫。以纏指周匝。痛止愈。

治指疼欲脫方。

取豬脂和薑末稍令熱。內指甲中。食頃即差。

治指掣痛方。

取醬清和蜜任多少。溫塗之即愈。

濕熱瘡第十　方三十四首

治濕熱諸惡瘡方。

狼牙伍兩　芍藥伍兩　大黃叁兩　白芷伍兩　黃蘗伍兩　丹參伍兩

右陸味。切。以水四升。煑取一升半。以洗之。日三度。

治濕熱瘡多汁粉散方。

芎藭　大黃　白斂　芍藥　黃連

槐皮 龍骨各壹兩

右柒味，擣篩爲散，以粉瘡上，日三度。

又洗之方。

茵芋叁兩 石南叁兩 莽草叁兩 蛇床子貳兩

躑躅貳兩 礬石貳兩

右陸味，切，以水壹斗，煮取五升，洗瘡，日再。

治惡瘡三年不差方。

巴豆去皮 甘草

右貳味，等分，細下爲散，先别煮甘草湯洗瘡訖，以藥傅之，先從四面起向中心，日三夜一。

治惡瘡似火爛洗湯方。

取白馬矢暴乾，以水和煮十沸，絞取汁洗之，極佳。

治惡瘡十年不差，似癩者方。

蛇脫皮壹枚

右壹味，燒之，末下篩，以豬脂和傅之，良。

又方

苦瓠

右壹味，㕮咀，煑取汁洗瘡，日三度，洗煎以洗癬甚良，須先以泔清洗瘡也。

治諸惡瘡烏頭膏方。

烏頭　雄黃　雌黃　芎藭　升麻各半兩

杏仁貳柒枚　胡粉壹豆八分　巴豆仁柒枚，去皮　黃蘗半兩

亂髮如雞子大一枚　松脂如雞子大一枚　防已三八分

黃連半兩

右壹拾叁味，切，以豬膏三升，急煎，令亂髮消盡，去滓，停小冷，以真珠二錢匕投中，攪令相得，以傅之。凡用膏，皆令先

温酢泔清洗瘡。拭乾乃傅之。訖以赤石脂黄連散粉之。此治諸惡瘡皆差。

梔子湯 主表裏俱熱。三焦熱實。身體生瘡。或發即大小便不利方。

芒消貳兩 大黄肆兩 梔子仁二七枚 黄芩叁兩

知母貳兩 甘草貳兩炙

右陸味。㕮咀。以水五升。煑減半。下大黄。煑取一升八合。絞去滓。内芒消。分爲三服。

又方

礬石燒 蠟 松脂 亂髮

右肆味。各半兩。豬脂四兩。煎之令髮焦。内礬石。令消。内松脂。次内蠟。去滓。先刮洗瘡。以塗之。日再三。不痛。久瘡時愈。新瘡遅愈。瘑瘡頭禿皆即愈。生髮。此膏勝飛黄膏及諸名藥。

治諸瘡久不差并療六畜方。

棗膏叁斤

右壹味，以水叁斗，煑取壹斗伍升，數洗，取差爲度。

治身瘡及頭瘡不止方。

以菖蒲末傅之，日三夜一。

治濕熱瘡惡瘡洗湯方。

槐子貳升　蛇床子壹兩　黄連伍兩　當歸　芍藥　黄蘗各叁兩

右陸味，切，以水叁斗，煑取壹斗五升，去滓，以洗瘡，日三度。

治濕熱瘡方。

生地榆貳斤

右壹味，以水三斗，煑取一斗五升，以洗瘡，日三度。

烏膏主種種諸惡瘡，治不愈方。

水銀壹兩　黄連壹兩　經墨半兩

右叁味。末之。以不中水猪脂和傅之。不過三四度愈。神效。欲多任人。惟不治金瘡。其藥惟須熟研。

惡瘡黄水出流方。

燒故鞍韂氈灰。和臘月猪脂封塗。

又方

藜蘆　巴豆

右貳味。等分。燒灰。和臘月猪脂封塗。

又方

松脂灰　薰陸香各伍分　生地黄汁伍合

白羊脂貳分　石鹽半兩　亂髮灰半兩

右六味。以猪脂一升。煎取五合。內地黄汁煎成膏。去滓。貼之。日再。差止。

治惡瘡濕瘡方。

杏仁去皮 巴豆去皮各貳兩 藜蘆 黃連各一兩 水銀壹錢

右伍味，以青羊脂和研水銀令滅，先以鹽湯洗之，去上痂。傳瘡日二。

時氣病後得風生瘡疼癢，搔之黃汁出方。

皂莢炙 烏頭 礬石各叁兩 黃連壹升 牡蠣肆兩

藜蘆 桂心各壹兩八陸銖

右柒味，切，以水壹斗，煮取七升，去滓，先搔瘡令血出，溫洗瘡，緩浸良久佳。

卒患發熱瘡方。

取炭長二尺者二枚，燒令赤，置地中，以水二升灌之，取地上汁洗瘡，即差。

瘡中惡肉出方。

取烏梅二七顆燒作灰。傅瘡中。其瘡中惡肉乃盡矣。

治惡瘡方。

取白及煮汁洗瘡訖。傅膏。膏用桑東向枝作末。以臘月豬膏和傅之。亦主狗瘡。瘡初大痛。一宿即愈。

瘡初患似節後破無痂。疼痛難忍。名曰豬喙瘡方。

燒豬鼻作灰傅之差

反花瘡方。

煎柳葉爲煎。塗之差。

又方

燒馬齒草灰傅之。

又方

燒鹽末灰傅之。

又方

以蜘蛛幕裹之。

王不留行湯　主白禿及頭面久瘡。去蟲止痛方。

王不留行伍兩　桃東南枝伍兩　茱萸根皮伍兩

蚍床子叁升 牡荊叁升 苦竹葉叁斗切 蒺藜叁升

大麻仁壹升

右捌味，以水貳斗，煑取一斗，洗瘡，日再。并治疽及月蝕瘡爛。

治白禿方。

三月三日桃花開者，陰乾 柏子 赤桑根

右叁味，爲末，猪脂和，先以灰汁淨洗禿處，拭乾塗之。

又方

細柳枝壹握 水銀 皂莢炙

右叁味，以醋煎如餳，塗之。

松脂膏 主白禿及癰疽百瘡方。

木蘭皮壹兩 礬石 杜蘅 雄黃

附子 大黃 石南 秦艽

真朱　苦參　水銀各貳兩　松脂陸兩

右壹拾貳味，以酢漬一宿，猪膏一斤半煎之，候附子黄去滓，乃内礬石、雄黄、水銀，更著火煑三沸，還濕地待凝，以傅瘡，差。

又方

以牛肉作五味脯，炙令香，及熱搨瘡上，不過三四度即差。

治頭瘡腫方。

燒杏仁令黑，磨塗，復取東柴葛蔓及乾魚頭燒灰，和熏黄臘月猪脂塗之。

千金翼方卷第二十四

千金翼方卷第二十五

色脉

診氣色法第一

夫爲醫者雖善於脉候。而不知察於氣色者。終爲未盡要妙也。故曰上醫察色。次醫聽聲。下醫脉候。是知人有盛衰。其色先見於面部。所以善爲醫者。必須明於五色。乃可決生死。定狐疑。故立候氣之法。冠其篇首焉。

肝受病色青。　心受病色赤。　脾受病色黃。

肺受病色白。　腎受病色黑。皆先視於本色。

春。面色青。目色赤。新病可療。至夏愈。

夏。面色赤。目色黃。新病可療。至季夏愈。

季夏。面色黃。目色白。新病可療。至秋愈。

秋。面色白。目色黑。新病可療。至冬愈。

冬。面色黑。目色青。新病可療。至春愈。

論曰。此四時王相本色見。故療之必愈。夫五藏應五行。若有病。則因其時色見於面目。亦猶灼龜於裏。吉凶之兆形於表也。

扁鵲云。病人本色青。欲如青玉之澤。有光潤者佳。面色不欲如青藍之色。若面白目青。是謂亂常。以飲酒過多當風。邪風入肺絡於膽。膽氣妄泄。故令目青。雖云夭救不可復生矣。

病人本色赤。欲如雞冠之澤。有光潤者佳。面色不欲赤如赭。土若面赤目白。憂恚思慮心氣内索。面色反好。急求棺槨。不過十日死。

病人本色黃。欲如牛黃之澤。有光潤者佳。面色不欲黃如竈中黃土。若面青目黃者。五日死。

病人著床。心痛氣短。脾竭内傷。百日復愈。欲起傍徨。因坐於

地。其亡倚床。能治此者。是謂神良。
病人本色白。欲如璧玉之澤。有光潤者佳。面色不欲白如堊。
若面白目黑無復生理也。此謂酣飲過度。榮華已去。血脉
已盡。雖遇歧伯。無如之何。
病人本色黑。欲如重漆之澤。有光潤者佳。面色不欲黑如炭。
若面黑目白。八日死。腎氣内傷也。
病人色青如翠羽者生。青如草滋者死。
赤如雞冠者生。赤如衃血者死。
黃如蟹腹者生。黃如枳實者死。
白如豕膏者生。白如枯骨者死。
黑如烏羽者生。黑如炲煤者死。
凡相五色。面黃目青。面黃目赤。面黃目白。面黃目黑。皆不死。
病人目無精光及齒黑者。不治。

病人面失精光。如土色。不飲食者。四日死。

病人及健人面色忽如馬肝。望之如青。近之如黑。必卒死。

論曰。夫五色者。五藏之華也。故天晴明時。覩萬物辨白黑審長短。若五色不分。長短乖錯。此爲錯亂。故人亦然。

黃帝問伯高曰。察色知病何如。伯高曰。白色起於兩眉間薄澤者。病在皮膚。脣色青黃赤黑者。病在肉。榮氣需然者。病在血脉。目色青黃赤白黑者。病在筋。耳焦枯受塵垢者。病在骨。問曰。病狀如是。取之奈何。伯高曰。皮有部。肉有柱。氣血有輸。筋有結。骨有屬。經曰。皮部在於四肢。肉柱在於臂胻諸陽分肉之間及少陰分肉之間。氣血之輸在於諸經絡脉。氣血留居則盛而起。筋部無陰陽左右。唯疾之所在。骨之屬骨空之間。所以受津液而益腦髓。若取之者。必須候病間甚者也。間者。淺之少之。甚者。深之多之。隨變而調之。故曰上工。經言。知

一藏爲下工。知二藏爲中工。參而知之爲上工。上工十全九。中工十全六。下工十全三。此之謂也。

雷公問曰：人有不病而卒死者，何以知之？黃帝曰：大氣入於藏府者，不病而卒死矣。

雷公問曰：病少愈而卒死者，何以知之？黃帝曰：赤色出於兩顴上，大如拇指者，病雖少愈，必卒死。黑色出於顏貌，大如拇指者，必卒死。顏貌者，面之首也。顏當兩目下也。貌當兩目上眉下也。

扁鵲曰：察病氣色，有赤白青黑四氣，不問大小，在人年上者，病也。惟黃氣得愈。年上在鼻上兩目間，如下黑氣細如繩在四墓發及兩顴骨上者，死。或冬三月遠期至壬癸日，逢年衰者不可理。病者死。四墓當兩眉坐直上至髮際，左爲父墓，右爲母墓，從口吻下極頤名爲下墓。於此四墓上觀四時氣。

春見青氣節盡死。

夏見赤氣節盡死。
夏秋見白氣節盡死。
春見白氣至秋死。
夏見白氣暴死。黑氣至冬死。
秋見赤氣節盡死。冬至後甲子日死。
冬見赤氣暴死。見黃氣至長夏死。
論曰：凡病黃色入鼻從口入井竈，百日死。井在鼻孔上曲中是。竈在口吻兩傍上一寸是。若入者，丙丁日死。
凡人死色易驗，但看年上有黑色橫度者，此人不出百日死。
若天中從髮際兩墓皆發黑色，此人三年死。
天中當鼻直上至髮際是也。若顴骨上發黑色應之者，二百日死。
目下有黑色橫度年上者，不出三十日死。黑色入口應天中

者。不出一年死。

若天中發死色年上命門上並黃色者。未好半惡也。以天中爲主。五年内死。天中發黑色。法三年内死。所以然者有二處。得主故五年死。

凡天中發黑色兩顴上發赤色應之者。不出六十日兵死。若年上發赤色應之者。不出三十日死。若命門上發赤色應之者。不出百日市死。婦人產死。兵死同氣。從命門入耳年上死。赤色從眉衝下入目。五日死。或丙丁日死。

黑色在左右眉上。一日死。或壬癸日死。

若白色亦死。或庚辛日或二三日死

赤色入口三日死。遠期丙丁日死。

黑色從天中及年上入目。三日死。或壬癸日死。或一二三日死。

或百日半年死。

青色如鍼在目下。春死。或甲乙日死。

黃色入目匝四邊。戊己日死。

黑色準上行。或入目。期壬癸日死。遠期二十日死。若入耳鼻三日死。（準上者。當鼻上也。行謂在壽上年上下降。謂相次。）

黃色橫兩顴入鼻。一年死。

黑色如拇指在眉上。不出一年暴死。一云三年。

赤色如馬。黑色如烏。見面死。（在口傍左右也。右名馬。左名烏。）

黑色從眉繞目。死。

赤色在口兩傍。死。

黑色如深漆繞口。或白色。皆死。

黃帝問扁鵲曰。人久有病。何以別生死。願聞其要。對曰。按明堂察色。有十部之氣。知在何部。察四時五行王相。觀其勝負之變色。入門戶為凶。不入為吉。白色見衝眉上者。肺有病。入

闕庭者。夏死。黃色見鼻上者。脾有病。入口者。春夏死。青色見人中者。肝有病。入目者。秋死。黑色見顴上者。腎有病。入耳者。六月死。赤色見頤者。心有病。入口者。冬死。所謂門戶者。闕庭肺門戶。目肝門戶。耳腎門戶。口心脾門戶。若有色氣入者。皆死。黃帝曰。善。

問曰。病而輒死。甚可傷也。寧可拯乎。對曰。藏實則府虛。府實則藏虛。以明堂視面色。以針補寫調之。百病即愈。鼻孔呼吸。氣有出入。出爲陽。入爲陰。陽爲府。陰爲藏。陽爲衛。陰爲榮。故曰。人一日一夜一萬三千五百息。脉行五十周於其身。漏下二刻。榮衛之氣行度亦周身也。

夫面青者虛。虛者實之。補虛寫實。神歸其室。補實寫虛。神捨其墟。衆邪並進。大命不居。黃帝曰。善。

五實未見

六虛者。皮虛則熱。脉虛則驚。肉虛則重。骨虛則痛。腸虛則洩溏。髓虛則墯。

仲景曰。鼻頭色青者。腹中冷。若痛者死。鼻頭色微黑者。有水氣。色白者無血。色黃者胷上有寒。色赤者爲風。色青者爲痛。色鮮明者有留飲。

又仲景曰。病人語聲寂然喜驚呼者。骨節間病。言聲喑喑然不徹者。心膈間病。言聲啾啾細而長者。頭中病。一作痛。

診脉大意第二

問曰。手足三陰三陽十二經皆有動脉。而獨取寸口者。何也。

扁鵲曰。晝夜漏水下百刻。凡一刻一百三十五息。十刻一千三百五十息。百刻一萬三千五百息。脉行五十度。周於身。漏下一百刻。榮衛行陽二十五度。行陰二十五度。合五十度。爲一周。而復會於手太陰。手太陰者。寸口也。寸口者。五藏六府

氣血之所終始。故法取於寸口也。脉有尺寸者。從關至尺是尺內陰之所治。從關至魚際是寸內陽之所治。寸口位八分。關上位三分。尺中位八分。合三部一寸九分。寸口關上爲陽。陽脉常浮而速。尺中爲陰。陰脉常沉而遲。初持脉如三菽之重。與皮毛相得者。肺脉也。如六菽之重。與血脉相得者。心脉也。如九菽之重。與肌肉相得者。脾脉也。如十二菽之重。與筋平者。肝脉也。按之至骨。舉指來疾者。腎脉也。

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急。稱其形性則吉。與本性相乖則凶。何則人大而脉細。人細而脉大。人樂而脉實。人苦而脉虛。性急而脉緩。性緩而脉躁。人壯而脉細。人羸而脉大。此皆爲逆。逆則難治。反此爲順。順則爲易治。

凡婦人脉常欲濡弱於丈夫也。小兒四五歲者。脉自疾駃呼吸八至也。

凡春脉細弦而長。夏脉洪浮而長。來疾而去遲。秋脉微浮而散。冬脉沉滑而實。季夏脉洪而遲。

凡心肺二脉大率俱浮。何以別之。浮而大者心也。浮而短者肺也。凡肝腎二脉俱沉。何以別之。牢而長者肝也。按之濡舉指來實者腎也。遲緩而長者脾也。

夫人受氣於穀。穀入於胃。乃傳於五藏六腑。五藏六腑皆受氣於胃。其清者爲榮。濁者爲衛。榮行脉內。衛行脉外。陰陽相貫。如環之無端。故曰胃爲水穀腑。主稟四方。皆以胃氣爲本也。

凡人病脉不病。名曰內虛。脉病人不病。名曰行尸。死不治。

夫平和之脉。不緩不急。不濇不滑。不存不亡。不長不短。不低不昂。不縱不橫。此爲平也。無病。尺欲小。大關欲小。實老人脉欲微。陽羸於陰者。平也。

夫按之不足舉之有餘名曰浮。浮陽也。
按之去來促急名曰數。數陽也。
按之如琴瑟絃三關通病梗梗無有屈撓名曰弦。弦陽也。王函經爲陰
按之如動珠子名曰滑。滑陽也。
按之實強其脉有似沈伏名曰牢。牢陽也。
按之浮大在指下而滿名曰洪。洪陽也。
按之洪大牢強隱指名曰實。實陽也。
脉見於關上無頭尾大如豆厥厥搖名曰動。動陽也。
右件八條皆陽脉也。
按之有餘舉之不足名曰沈。沈陰也。
按之無舉之來兩傍實而中央空名曰芤。芤陰也。
按之遲小名曰細。細陰也。

按之短實而數，有似切繩狀，名曰緊。緊，陰也。

按之依依，名曰緩。緩，陰也。

按之大而遲，名曰虛。虛，陰也。

按之短小不至，動搖若有若無，或復浮薄而細急，輕手乃得，重手不得，名曰微。微，陰也。

按之乃得，舉之無有，濡而細，名曰弱。弱，陰也。

按之盡牢，舉之無有，不前不却，但出不入，如魚之接食動中，名曰遲。遲，陰也。

按之無有，舉之有餘，或如帛衣在水中，輕手與肌肉相得而軟，名曰濡。濡，陰也。

按之促數浮短，如刮竹皮，輕手乃得，重手不離其處，或多入而少出，名曰澀。澀，陰也。

按之來數，時一止，名曰促。促，陰也。

脉來動而中止，按之小數，中能還者，舉指則動，名曰結。結陰也，不死。

脉動而止，不能自還，因而復動，名曰代。代陰也，代者死。

右件一十四條，皆陰脉也。

脉有相薄者，寸口微而尺中弦，此為相薄也。或但寸口微而弦，亦為相薄也。

沈與伏相類。　濡與弱相類。　弦與緊相類。

浮與芤相類。　牢與實相類。　微與澀相類。

遲與緩相類。　滑與數相類。

凡脉出為陽，入為陰，來往之間為脾，大陰也。

凡脉浮滑長皆為陽，沈澀短皆為陰也。

脉有一陰一陽者，脉來沈而滑也。一陰二陽者，脉來沈滑而長也。一陰三陽者，脉來浮滑而長，時一沈也。一陽一陰者，

脉來浮而澀也。一陽二陰者。脉來長而沉澀也。一陽三陰者。脉來沉澀而短。時一浮也。

脉有伏匿者。謂陰陽更相乘伏也。若脉居陰部。反陽脉見爲陽乘陰也。雖陽脉時沉澀而短。若此爲陽中伏陰也。脉居陽部。反陰脉見。爲陰乘陽也。雖陰脉時浮滑而長。若此爲陰中伏陽也。故重陰者顛。重陽者狂。

脉有太過。有不及。有陰陽相乘。有覆有溢。有關有格。關之前者。陽之動也。脉當見九分而浮。過者謂之太過。減者謂之不及。遂上魚爲溢。爲外關內格。此陰乘之脉。關之後者陰之動也。脉當見一寸而沉。過者謂之太過。減者謂之不及。遂入尺爲覆。爲內關外格。此陽乘之脉。是眞藏之見也。得此諸脉。人不病自死。寸脉下不至關爲陽絶。尺脉上不至關爲陰絶。此皆死不治。欲決死生。當以月節期之。

脉有相乘。有縱有横。有逆有順。何以知之。水行乘火。金行乘木。名曰縱。火行乘水。木行乘金。名曰横。水行乘金。火行乘木。名曰逆。金行乘水。木行乘火。名曰順也。

夫欲知人病將愈。當診其三部之脉。大小遲疾浮沈正等。雖有寒熱不解。然陰陽已平。知當愈也。

夫病者發熱身體疼痛。此爲表有病。其脉當浮大。今脉反沈遲。故知當愈。病卒腹中急痛。此爲裏有病。其脉當沈細。今脉反浮大。故知當愈。然此二脉。其人不即愈者。必當死。以其病與脉相反也。

夫脉者。血之腑也。長則氣治。短則氣病。數則煩心。大則病進。上盛則氣高。下盛則氣脹。代則氣衰。細則氣少。短而急者。病在上。長而緩者。病在下。弦而沈者。病在内。浮而洪者。病在外。脉實者。病在内。脉虚者。病在外。滑而微浮。病在肺。下

堅上虛病在脾胃。長而弦者病在肝。脈小血少病在心。大而緊者病在腎。

凡脈腑爲陽主熱。臟爲陰主寒。陽微自汗。陰浮自下。陽數即口瘡。陰數即惡寒。陽数出血。陰澀下血。脈與肌肉相得久持之至者可下之。

失脈有三部。陰陽相乘。榮衛氣血。任人體躬。呼吸出入。上下於中。因息遊布。津液流通。隨時動作。倣象形容。春弦秋浮。冬沈夏洪。察色觀脈。大小不同。一時之間。變無經常。尺寸參差。或短或長。上下乖錯。或存或亡。病輒改易。進退低昂。心迷意惑。動失紀綱。願爲具陳。令得分明。師曰。子之所問。道之根源。脈有三部。尺寸及關。榮衛流行。不失衡銓。腎沈心洪。肺浮肝弦。此自經常。不失銖分。出入升降。漏刻周旋。水下百刻。一周循環。當復寸口。虛實見焉。變化相乘。陰陽相干。風則浮虛。寒

則牢堅。沉潛水畜。支飲急弦。動即爲痛。數即熱煩。設有不應。知有所緣。三部不同。病各異端。太過可怪。不及亦然。邪不空見。終必有奸。審察表裏。三焦別焉。知其所舍。消息診看。料度臟腑。獨見若神。爲子條記。傳與賢人。

凡療病。當察其形氣色澤。脉之盛衰。病之新故。乃可療之。形氣相得。色澤以浮。脉順四時。此爲易治。形氣相失。色夭不澤。脉實堅甚。脉逆四時。此爲難療。

夫形盛脉細。少氣不足以息者。危。形瘦脉大。胷中氣多者。死。形氣相得者。生。參伍不調者。病。

夫關前爲陽。關後爲陰。陽出陰入。以關爲界。陽數則吐。陰數則下。陽弦頭痛。陰弦腹痛。

診四時脉第三

春。肝木王。其脉弦細而長者。平脉也。反得微浮而短濇者。是

胏之乘肝。金之剋木。爲賊邪。大逆。十死不治。反得浮大而洪者。是心之乘肝。子之乘母。爲實邪。不治自愈。反得沈濡而滑者。是腎之乘肝。母之歸子。爲虛邪。雖病自愈。反得大而緩者。是脾之乘肝。土之畏木。爲微邪。雖病不死。

夏。心火王。其脈浮大而洪者。是平脈也。反得沈濡而滑者。是腎之乘心。水之剋火。爲賊邪。大逆。十死不治。反得大而緩者。是脾之乘心。子之乘母。爲實邪。不治自愈。反得弦細而長者。是肝之乘心。母之歸子。爲虛邪。雖病當愈。反得微浮而短澀者。是胏之乘心。金之畏火。爲微邪。雖病不死。

季夏六月。脾土王。脈大穠穠而緩者。爲平脈也。反得弦細而長者。是肝之乘脾。木之剋土。爲賊邪。大逆。十死不治。反得微浮而短澀。是胏之乘脾。子之乘母。爲實邪。不治自愈。反得浮大而洪者。是心之乘脾。母之歸子。爲虛邪。雖病自愈。

反得沉濡而滑者，是腎之乘脾，水之畏土，爲微邪，雖病不死。

凡脾脉王，則不見，衰時即見。

秋脉金王，其脉微浮而短澀者，是平脉也。反得浮大而洪者，是心之乘肺，火之剋金，爲賊邪，大逆，十死不治。反得沉濡而滑者，是腎之乘肺，子之乘母，爲實邪，不治自愈。反得大而緩者，是脾之乘肺，母之歸子，爲虛邪，雖病自愈。反得弦細而長者，是肝之乘肺，木之畏金，爲微邪，雖病不死。

冬，腎水王，其脉沉濡而滑者，是平脉也。反得大而緩者，是脾之乘腎，土之剋水，爲賊邪，大逆，十死不治。反得弦細而長者，是肝之乘腎，子之乘母，爲實邪，不治自愈。反得微浮而短澀者，是肺之乘腎，母之歸子，爲虛邪，雖病自愈。反得浮大而洪者，是心之乘腎，火之畏水，爲微邪，雖病不死。

診寸口脉第四

寸口緊者。中風風頭痛。亦爲傷寒頭痛。

寸口沈而橫者。脅下有積。腹中有橫積痛。

寸口浮大而實。宿食不消。浮滑亦然。

寸口沈而緊實。結在心下痛。千金云沈而緊。苦心下有寒。時時痛。有積邪。

寸口沈滑。胃中有水氣。面目腫有微熱。名爲風水。

寸口沈而弱實。熱疝瘕少腹痛。

寸口微而弱。氣血俱虛。男子吐血。婦人下血。嘔汁出。

寸口弱而弦。胃中脅下腰背並痛。

寸口雙弦。脅下拘急而痛。濇濇而寒。

寸口弦緊而細。痛在心下。

寸口洪而大。傷寒熱病。兼胃脅下滿痛。

寸口細沈滑者。有積聚在脅下。左右皆滿。背相引痛。

寸口細而數。數即發熱。細即反吐。
寸口緩而數者中風。
寸口沈而喘則寒熱。
寸口盛而緊者。傷於食也。
寸口急疝瘕少腹痛。
寸口浮大而疾者。名曰陽中之陽。病苦煩滿身熱頭痛腹中熱。
寸口沈細者。名曰陽中之陰。病苦悲傷不樂。惡聞人聲。少氣時汗出。陰氣不通。臂不能舉。
寸口脉壯大。尺中無有。此爲陽干陰。病苦腰背痛。陰中傷足脛寒。
寸口偏絶者。則臂偏不用。其人兩手俱絶者。不治。
寸口脉弱而遲。弱即衛氣微。遲即榮中寒。榮爲血。血寒即發

熱。衛爲氣。氣微即心中飢。飢而虛滿不能食。

寸口脉弱而緩。弱則陽氣不足。緩即胃氣有餘。噫而吞酸。食卒不下。氣塡於膈上。（一作下）

寸口脉微而弱。微即無氣。弱即血不足。血不足即不能呼。氣不足則不能吸。呼吸不足則胷滿短氣。

寸口脉微而澀。微即衛氣不行。澀即榮氣不逮。榮衛不能相將。三焦無所仰。身體痺不仁。榮氣不足即疼而煩滿。口即難言。衛氣虛即惡寒而數欠。

寸口脉微而澀。微即衛氣衰。澀即榮氣不足。衛衰其色黃。榮不足其色青。榮爲根。衛爲葉。榮衛俱微即根葉枯槁而寒慄。欬逆。唾腥。吐涎沫。

寸口脉微而緩。微即衛氣疎。疎即其膚空。緩即胃氣足。足即穀消而水化。穀入於胃。脉道乃行。水入於經。其血乃成。榮

盛則其膚必踈。三焦絶經名曰血崩。

寸口脉微而數微即爲風數即爲熱微爲風風即汗出數爲熱振而寒慄。

寸口脉微而遲尺脉沈即爲血滑即爲實血實内結入絡肖臆肺痿色薄不能喘息而心堅脫色口不能言肝舉筋厥。四逆不識人。

寸口脉微而濡濡即爲弱微即爲寒濡即惡寒弱即發熱濡即厥逆微濡相薄即爲煩其氣在心。

寸口脉微尺中緊其人虚損多汗知陰常在絶不見陽。

寸口諸微爲無陽諸濡爲無血諸弱爲發熱諸緊爲寒微濡爲血不足。

診關上脉第五

關上浮而數胃中熱。

關上浮大風在胃中。腹脹急。心下澹澹然。羸瘦不能食。千金云開上浮大風有胃中。張口有息。心下澹澹。食欲嘔。

關上細微而絕者。腹中癖。少氣不能食。

關上微而芤。唾血亦吐血。

關上弦緊而細。癥在胃管。

關上緊而滑者。蛔蟲動。

關上微浮。積熱在胃中。

關上滑而大小不均。是為病方欲來。不出一二日內復欲發動。其人欲多飲。飲即注痢。如痢止者生。不止者死。

關上弦大。有痛在臍左右上下。脉經云。關脉弦長者。積在臍左右上下。

診尺中脉第六

尺中緊數而弦。下痢病。

尺中浮數。小便不利。尿黃。

尺中微而滑。帶下病。

尺中微而芤。尿血。

尺中弦而細。癥在臍下。

尺中細而急。筋攣疼痺。不能行。

尺中細而滑。婦人欲産。

尺中虛小者。足脛痿寒。痺脚疼。

尺中虛者。漏血。小便不禁。

尺中沈細者。名曰陰中之陰。病苦兩脚疼酸。不能久立。陰氣衰。小便有餘瀝。陰下濕痒。

尺脉滑而浮大者。名曰陰中之陽。病苦少腹痛滿。不能尿。尿則陰中痛。大便亦熱。

尺中牢長。關上無有。此爲陰干陽。病苦兩脛重。少腹引腰痛。

尺寸俱數。有熱。俱遲。有寒。

尺寸俱濡，發熱汗出。

尺寸俱浮直下，此爲督脉，腰背強痛，不得俛仰，大人癲病，小兒風癎。

尺寸俱微，血氣不足，其人短氣。

尺寸俱牢，直上直下，此爲衝脉，胷中有寒疝。

診雜病脉第七

熱病大汗後，脉不安静者死。

熱病脉盛大而駃，不得汗，此熱發也。

寒熱瘈瘲，脉絶代者死。

熱病未得汗，脉盛大者生，細小者死。

熱病多汗，脉虚小者生，緊實者死。

熱病得汗，脉常喘而熱不退者死。

汗出而衄，其脉小滑者生，大躁者死。一云微細爲難治

傷寒脉浮而洪大者。易治。譫言妄語。身熱脉洪大者。生。沉細而微。手足四逆者。死。

欬而尿血。羸瘦脉大者。死。

欬且羸瘦。脉堅大者。死。

上氣注液。脉虛慢伏匿者。生。牢弦者。死。

寒疰上氣。脉虛濡者。生。牢急而疾者。死。

上氣喘息。脉滑手足溫者。生。澀而四肢寒者。死。

上氣面浮腫肩息。脉浮大者。死。

上氣喘息。脉滑者。生。大而駛者。死。

唾血脉沉弱者。生。一云緊強者死。滑者生。

吐血脉牢實者。死。

吐血鼻衄。脉沉細者。生。浮大而牢者。死。

中惡腹大。脉緊實細者。生。浮大者。死。

金瘡出血不斷。脉大而止者。七日死。

金瘡出血太多。脉虛細者生。大數者死。

金瘡所傷在陽處者去血四五升。脉弱微緩而遲者生。急疾者死。

人被笞榜。内有結血。脉實大者生。虛小者死。

從高墮下及金瘡内有瘀血腹脹。脉牢大者生。沈細者死。

心腹痛。脉沈細者生。浮大而長者死。

腹脹。脉浮者生。虛小者死。

下痢。脉微細者生。浮大者死。

下痢脉代絶者不死。

腸澼便膿血。脉沈細虛遲者生。疾大而有熱者死。

腸澼下白沫。脉沈者生。浮者死。

腸澼下赤白。脉細微而遲。身體温暖可治。

腸澼其脉滑者。生。浮者。死。懸絶者。死。

洩痢脉緩時小結者。生。浮大而數者。死。

洞洩或去膿血。食不化者。脉微小者。生。實急者。死。

洩痢脉細微而澀者。生。緊大而滑者。死。

洩痢寸關脉不見。尺中時一見。此腎氣見。爲難治。

下痢。脉絶手足寒。晬時脉還。手足温者。生。脉不還不温者。死。

霍亂脉大可治。微細難治。

霍亂吐下。脉微遲氣息劣。口不欲言者。不治。

病手足厥逆。脉當沈細而澀。反得堅大而滑者。死。

水病。脉洪大者。生。微細者。死。

消渴。脉數大者。生。細小浮短者。死。

卒中風。四肢不收。脣口僻。語言不正。脉浮遲者。生。癲病卒忤。
脉堅弦實大者。生。虛伏濡小者。死。

癲狂恍惚，脈實牢者生，沉細者死。

中風口噤不能言，四肢不收，其脈浮遲者生，實大數急者死。

病風痺不仁，痿厥，脈虛數者生，牢急者死。

目䀮䀮，脈大緩者死。

閉目不欲見人，脈得肝脈者生，反得肺脈者死。

耳聾，脈大者生，沉遲細者難治。

堅積洩痢，脈微細者生，浮者死。

頭痛，脈短澀者死，浮滑者生。

中毒藥，陽脈洪大而速者生，微細者死。脈細速作遲。

暴病，脈微細者生，大急洪直者死。

大人得小人脈者死。

脈但出不能入者死。

將死之脈，如羣鳥之聚，一馬之馭，系木交緊一作馳之狀，如懸

石之落。出筋之上。藏筋之下。堅關之裏。不在榮衛伺候交射。不可知也。

困病脉。如蝦之游。如魚之翔者。死。蝦游者。冉冉而起。尋復退沒。不知所在。久而復起。起輒遲而沒去甚速是也。魚翔者。似魚不行而但掉尾動身。其動疏而住久是也。

脉病人不病。脉如屋漏雀啄者。死。屋漏者。其脉既絶而止。時復一起。不相連屬也。雀啄者。脉來甚數而急疾。絶止久已復頓來。

脉來如彈石。去如解索者。死。彈石。脉辟辟急也。解索。脉動數而隨散亂無次緒也。

脉來涌涌不去者。死。

脉如轉豆者。死。

脉如偃刀者。死。

脉怒來忽去。暫止復來者。死。

脉中移者。死。

脉久絶者。死。

脉有表無裏者。死。

婦人尺脉按之不絶者。胎也。

産後寸口焱疾不調者。死。沈微附骨不絶者。生。新産後滑。熱病。脉細而四肢冷者。死。

三部脉沈浮正等不斷絶者。有娠也。

妊娠。脉滑疾重。手按之不散者。胎已三月也。但疾不滑者。五月也。妊娠七八月。脉實大牢強弦緊者。生。沈細者。死。欲産者。其脉細而滑也。

婦人欲産。其脉離經者。曰生也。

新産脉小緩滑者。生。實大弦急者。死。

已產。脉沈虛小者。生。實牢堅者。死。
婦人月經不通。脉絶小實者。生。浮虛者。死。
婦人脉寸關調如故。而尺脉絶不至者。月經不利。當患少腹
引腰絞痛。氣積聚上义胷脅也。
漏下赤白。脉急疾者。死。遲滑者。生。
婦人脉尺寸俱微弱。則絶子不產也。
小兒脉沈者。乳不消也。
小兒絃急者。客忤氣也。
凡按人脉五十至而不止者。五藏皆受氣足。吉也。四十動而
一止。一藏無氣。四歲死。三十動而一止者。二藏無氣。三歲
死。二十動而一止者。三藏無氣。二歲死。十動而一止者。
四藏無氣。歲中死。
凡脉一動一止。或三動一止。或十動一止。投數無常。此死脉

也。命雖未盡，正當小引日月耳。

凡脉一呼再至，一吸再至，呼吸定息，其脉五至，不大不小，爲平。若一呼三至，一吸三至，始爲得病也。

夫脉前大後小，則爲頭痛目眩；前小後大，則爲胷滿短氣。

問曰：何謂損至？荅曰：脉有損至，一呼再至曰平，三至曰離經，四至曰奪精，五至曰死，六至曰命絶，此謂至脉也。一呼一至曰離經，二呼一至曰奪精，三呼一至曰死，四呼一至曰命絶，此謂損脉也。至脉從下上也，損脉從上下也。損脉之爲病也，一損損於皮毛，皮聚而毛落；二損損於血脉，血脉虚少，不能榮於五藏；三損損於肌肉，肌肉消瘦，飲食不爲肌膚；四損損於筋，筋緩不能自扶持；五損損於骨，骨痿不能起於床。反此者，至於收病，從上下者，骨痿不能起於床者死；從下上者，皮聚而毛落者死。

損其肺者，益其氣；損其心者，調其榮衛；損其脾者，調其飲食，適其寒温；損其肝者，緩其中；損其腎者，益其精氣也。

凡脉一息再至爲平，無病也。一息三至名離經。離，失也；經，常也。其人榮衛已虧，將欲病也。一息四至爲奪精，其人已病也。一息五至爲絶命，有大有小，爲難治。一息六至爲將滅。一息七至爲命盡。一息八至爲無魂。一息九至爲無魄。一息十至爲今死。一息一至，其人雖行，當着床，其人血脉已病，諸氣皆不足也。二息一至爲危，三息一至爲困，四息一至爲行尸將死，五息一至爲定死。

千金翼方卷第二十五

針灸上

取孔穴法第一

論曰：安康公李襲興稱，武德中出鎮潞州，屬隨徵士甄權以新撰明堂示余。余既暗昧，未之奇也。時有深州刺史成君綽忽患頸腫如數升，喉中閉塞，水粒不下已三日矣。以狀告余，余屈權救之，針其右手次指之端，如食頃，氣息即通，明日飲噉如故。爾後縉紳之士多寫權圖，略遍華裔。正觀中入為少府，奉勅修明堂，與承務郎司馬德逸、太醫令謝季卿、太常丞甄立言等校定經圖。於後以所作呈示甄權，曰：人有七尺之軀，藏腑包其內，皮膚絡其外，非有聖智，孰能辨之者乎？吾十有八而志學於醫，今年過百歲，研綜經方，推究孔穴，所疑更多矣。竊聞尋古人伊尹湯液，依用炎農本草；扁鵲針灸，一準

黄帝雷公問難。慇懃對揚。周密玄聖。久遠愚人。無知道聽塗說。多有穿鑿。起自胷臆。至如王遺烏銜之法。單行淺近。雖得其効。偶然。即謂神妙。且事不師古。遠涉必泥。夫欲行針者。必準軒轅正經。用藥者。須依神農本草。自餘名醫別錄。益多誤耳。余退以甲乙校秦承祖圖。有旁庭藏會等一十九穴。按六百四十九穴。有目無名。其角孫景風一十七穴。三部針經具存焉。然其圖闕漏。仍有四十九穴上下倒錯。前後易處。不合本經。所謂失之毫氂。差之千里也。至如石門關元二穴。在帶脉下相去一寸之間。針關元主婦人無子。針石門則終身絕嗣。神庭一穴在於額上。刺之主發狂。灸之則愈癲疾。其道幽隱。豈可輕侮之哉。人誠知惜命。罕通經方。抄寫方書。專委下吏。承誤即錄。紕繆轉多。近智之徒。不見正本。逢為經鈔。以此而言。可為深誡。今所述針灸孔穴。一依甄公明堂圖為定。學

者可細詳之。且夫當今醫者。各承一業。未能綜練衆方。所以救疾多不全濟。何哉。或有偏功針刺。或有偏解灸方。或有惟行藥餌。或有專於禁呪。故以網羅諸疾。有愈於是。慨其如此。聊以養疾之暇。撰録灸經。以貽後嗣。其於條例具之。醫者意也。善於用意。即爲良醫。良醫之道。必先診脉處方。次即針灸。內外相扶。病必當愈。何則湯藥攻其內。針灸攻其外。不能如此。雖時愈疾。兹爲偶差。非醫差也。又以孔穴難諳。非圖莫可。雖復經本具述。自非碩學之士。造次未可卒知。所以先述取穴方法云爾。

○仰人面二十六穴第一

神庭在髮際直鼻。不刺。一云入髮際一分。

曲差夾神庭一寸半在髮際。

攢竹在眉頭陷中。

睛明在目內眥。

迎香在禾窌上鼻下孔傍。一云在禾窌上一寸。

素窌在鼻柱端。

水溝在鼻柱下人中。

兌端在脣上端。

齗交在脣內齒上齗縫。

本神在曲差傍一寸半。

陽白在眉上一寸直瞳子。

承泣在目下七分直瞳子不灸。

四白在目下一寸。

巨窌夾鼻傍八分直瞳子。

禾窌直鼻孔下夾水溝傍五分。

地倉夾口傍四分。一云在口角一韭葉近下動脉。

承漿在頤前下脣之下。
廉泉在頷下結喉上舌本。
頭維在額角髮本神傍一寸半。不灸。
上關在耳前上廉起骨開口取之。
下關在客主人下耳前動脉下空下廉。合口有穴。張口則閉。
頰車在耳下曲頰端陷中。
大迎在曲頷前一寸二分骨陷中動脉。
絲竹空在眉後陷中。不灸。
瞳子窌在目外。去眥五分。
顴窌在面頄骨下下廉陷中。
○頭上第一行九穴第二
上星在顱上直鼻中央入髮際一寸。陷容豆。
顖會在上星後一寸陷中。

前頂在顖會後一寸半骨陷中。

百會在前頂後一寸半頂中心。

後頂在百會後一寸半枕骨上。

强間在後頂後一寸半。腦戶前一寸半。

腦戶在枕骨上强間後一寸半。不灸。

風府入髮際一寸。大筋內宛宛中。不灸。一云在瘖門上一寸。

瘖門在項後髮際宛宛中。不灸。一云三寸。一云在腦戶下。又名瘂門。

○頭上第二行六穴第三

五處在頭上。去上星一寸半。

承光在五處後一寸。不灸。一云一寸半。

通天在承光後一寸半。

絡却在通天後一寸半。

玉枕在絡却後七分半。夾腦戶傍一寸三分起肉。枕骨上入

髮際三寸。
天柱夾項後髮際大筋外廉陷中。
○頭上第三行六穴第四
臨泣當目上眥直入髮際五分陷中。
目窗在臨泣後一寸。
正營在目窗後一寸。
承靈在正營後一寸。
腦空在承靈後一寸半。夾玉枕骨下陷中。
風池在顳顬後髮際陷中。
○伏人耳後六穴第五
顱息在耳後青脉間。
瘈脉在耳本雞足青脉。不灸。
完骨在耳後入髮際四分。

瘈脈在完骨上枕骨下。

翳風在耳後陷中。按之引耳中。

浮白在耳後入髮際一寸。此穴在翳風前。瘈脈後。寫時請爲用心看。

○伏人脊中第一行十一穴第六

大椎在第一椎上陷中。

陶道在大椎下節間。

身柱在第三椎下節間。

神道在第五椎下節間。

至陽在第七椎下節間。

筋縮在第九椎下節間。

脊中在第十一椎下節間不灸。

懸樞在第十三椎下節間。

命門在第十四椎下節間。

腰俞在第二十一椎下節間。

長強在脊骶端。

○伏人脊中第二行二十一穴第七

大杼在項第一椎下兩傍各一寸半陷中。

風門熱府在第二椎下兩傍各一寸半。

肺俞在第三椎下兩傍各一寸半。

心俞在第五椎下兩傍各一寸半。

膈俞在第七椎下兩傍各一寸半。

肝俞在第九椎下兩傍各一寸半。

膽俞在第十椎下兩傍各一寸半。

脾俞在第十一椎下兩傍各一寸半。

胃俞在第十二椎下兩傍各一寸半。

三焦俞在第十三椎下兩傍各一寸半。

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸半。
大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸半。
小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸半。
膀胱俞在第十九椎下兩傍各一寸半。
中膂俞在第二十椎下兩傍各一寸半。
白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸半。
上窌在第一空腰果下一寸夾脊陷中。
次窌在第二空夾脊陷中。
中窌在第三空夾脊陷中。
下窌在第四空夾脊陷中。
會陽在陰尾骨兩傍。

○伏人脊中第三行十三穴第八

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸。

魄户在第三椎下两傍各三寸。
神堂在第五椎下两傍各三寸。
譩譆在肩膊内廉。夾第六椎下两傍各三寸。
膈關在第七椎下两傍各三寸。
魂門在第九椎下两傍各三寸。
陽綱在第十椎下两傍各三寸。
意舍在第十一椎下两傍各三寸。
胃倉在第十二椎下两傍各三寸。
肓門在第十三椎下两傍各三寸。
志室在第十四椎下两傍各三寸。
胞肓在第十九椎下两傍各三寸。
秩邊在第二十一椎下两傍各三寸。
○側人耳頸二十穴第九

頷厭在曲周顳顬上廉。
懸顱在曲周顳顬上廉中。
懸釐在曲周顳顬下廉。
天衝在耳上如前三寸。
曲鬢在耳上髮際曲隅陷中。
角孫在耳郭中間上開口有穴。
率谷在耳上入髮際一寸半。
和窌在耳前兊髮下動脉。
耳門在耳前起肉當耳缺。
聽會在耳前陷中張口得之。
天容在耳下頰後。
聽宮在耳中珠子大如赤小豆。
天牖在頸筋缺盆天容後天柱前完骨下。髮際上。一云在風池上一寸。

缺盆在肩上横骨陷中。
天鼎在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半。
天窻在曲頰下扶突後動應手陷中。
扶突在曲頰下一寸。人迎後。
人迎在頸大筋脉。動應手。夾結喉傍以候五藏氣。不灸。
水突在頸大筋前直人迎下氣舍上。
氣舍在頸直人迎夾天突陷中。

○側脅十穴第十

章門一名長平。在大横外直臍季肋端。
京門在監骨腰中季肋本夾脊。
帶脉在季肋下一寸八分。
五樞在帶脉下三寸。一云在水道下一寸半。
維道在章門下五寸三分。

居窌在長平下八寸三分，監骨上。

泉腋在腋下三寸宛宛中，舉臂取之。

大包在泉腋下三寸。

輒筋在腋下三寸，復前行一寸，著脅。

天池在乳後一寸，腋下三寸，著脅直腋掘肋間。

○肖部中央直下第一行七穴第十一

天突在頸結喉下五寸中央宛宛中。

琁璣在天突下一寸陷中，仰頭取之。

華蓋在琁璣下一寸陷中，仰而取之。

紫宮在華蓋下一寸六分陷中，仰而取之。

玉堂在紫宮下一寸六分陷中。

亶中在玉堂下一寸六分，直兩乳間陷中。

中庭在亶中下一寸六分陷中。

○胸部第二行六穴第十二

俞府在巨骨下去璇璣傍各二寸陷中。仰卧取之。

彧中在俞府下一寸六分陷中。仰卧取之。

神藏在彧中下一寸六分陷中。仰卧取之。

靈墟在神藏下一寸六分陷中。仰而取之。

神封在靈墟下一寸六分。

步郎在神封下一寸六分陷中。仰而取之。

○胸部第三行六穴第十三

氣户在巨骨下夾俞府兩傍各二寸陷中。

庫房在氣户下一寸六分陷中。

屋翳在庫房下一寸六分陷中。

膺窻在屋翳下一寸六分。

乳中不灸刺。

乳根在乳下一寸六分陷中。

◯胷部第四行六穴第十四

雲門在巨骨下氣户兩傍各二寸陷中。動脉應手。舉臂取之。

中府在雲門下一寸。乳上三肋閒動脉應手陷中。

周榮在中府下一寸六分陷中。

胷卿在周榮下一寸六分陷中。

天谿在胷卿下一寸六分陷中。

食竇在天谿下一寸六分陷中。舉臂取之。

◯腹中央第一行十四穴第十五

鳩尾在臆前蔽骨下五分。不灸刺。

巨闕在鳩尾下一寸。

上管在巨闕下一寸去蔽骨三寸。

中管在上管下一寸。

建里在中管下一寸。
下管在建里下一寸。
水分在下管下臍上一寸。
臍中不刺。
陰交在臍下一寸。
氣海在臍下一寸半。
石門在臍下二寸。女子不灸。
關元在臍下三寸。
中極在臍下四寸。
曲骨在横骨上中極下一寸毛際陷中。
○腹第二行十一穴第十六
幽門在巨闕傍半寸陷中。
通谷在幽門下一寸陷中。

陰都在通谷下一寸。
石闗在陰都下一寸。
商曲在石闗下一寸。
肓俞在商曲下一寸。直臍傍五分。
中注在肓俞下五分。
四滿在中注下一寸。
氣穴在四滿下一寸。
大赫在氣穴下一寸。
横骨在大赫下一寸。
〇腹第三行十二穴第十七
不容在幽門傍一寸五分。去任脉二寸。直四肋端相去四寸。
承滿在不容下一寸。
梁門在承滿下一寸。

關明在梁門下太一上一寸。千金云梁門下五分。

太一在關明下一寸。千金甲乙經皆云梁門下一寸。

滑肉門在太一下一寸。

天樞去肓俞一寸半。夾臍各二寸陷中。

外陵在天樞下大巨上。千金云在天樞下半寸。

大巨在長谿下二寸。千金云在臍下一寸。兩傍各二寸。

水道在大巨下三寸。

歸來在水道下二寸。

氣衝在歸來下鼠鼷上一寸。

○腹第四行七穴第十八

期門在第二肋端。不容傍各一寸半。上直兩乳。

日月在期門下五分。

腹哀在日月下一寸半。

大橫在腹哀下三寸。直臍傍。

腸結在大橫下一寸三分。一云腹結。

府舍在腸結下三寸。

衝門上去大橫五寸。在府舍下橫骨兩端約中動脉。一云衝門。

○手太陰肺經十穴第十九

少商在手大指端內側。去爪甲角如韭葉。

魚際在手大指本節後內側散脉內。

太泉在掌後陷中。

經渠在寸口陷中。不灸。

列缺去腕上一寸半。

孔最在腕上七寸。

尺澤在肘中約上動脉。

俠白在天府下。去肘五寸動脉。

天府在腋下三寸。臂臑內廉動脉。不灸。

臑會在臂前廉。去肩頭三寸。

○手陽明大腸經二十穴第二十

商陽在手大指次指內側。去爪甲角如韭葉。

二間在手大指次指本節前內側陷中。

三間在手大指次指本節後內側陷中。

合谷在大指歧骨間。

陽谿在腕中上側兩筋間陷中。一云在合谷上二寸。

偏歷在腕後三寸。

温留在腕後。小士五寸大士六寸。

下廉在輔骨下。去上廉一寸。

上廉在三里下一寸。

三里在曲池下二寸。按之肉起。兌肉之端。

曲池在肘外輔。屈肘曲骨之中。一云在肘上橫文中。

肘窌在肘大骨外廉陷中。

五里在肘上行馬裏大脉中。不刺。甲乙經云在肘上二寸。

臂臑在肘上七寸䐃肉端。

肩窌在肩端臑上。斜舉臂取之。

秉風在夾天窌外肩上髃後。舉臂有空。

肩井在肩上陷解中。缺盆上大骨前。

天窌在缺盆中。上毖骨之際陷中。

巨骨在肩端上行。兩叉骨間陷中。

肩髃在肩端兩骨間。

○手少陰心經八穴第二十一

少衝在手小指內廉之端。去爪甲角如韭葉。

少府在手小指本節後陷中。直勞宮。

神門在掌後兊骨之端陷中。
陰郄在掌後脉中。去腕半寸。
通理在腕後一寸。
靈道在掌後一寸半。
少海在肘内廉節後陷中。
極泉在腋下筋間動脉入胷。

○手太陽小腸經九穴第二十二

少澤在手小指之端。去爪甲一分陷中。
前谷在手小指外側本節前陷中。
後谿在手小指外側本節後陷中。
腕骨在手外側腕前起骨下陷中。
陽谷在手外側腕中兊骨之下陷中。
養老在手踝骨上。一空在後一寸陷中。

支正在腕後五寸。
小海在肘內大骨外。去肘端五分陷中。
肩貞在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷中。
○手厥陰心主經八穴第二十三
中衝在手中指之端。去爪甲如韭葉陷中。
勞宮在掌中央動脈。
內關在掌後去腕二寸。
大陵在掌後兩筋間陷中。
間使在掌後三寸。兩筋間陷中。
郄門去腕五寸。
曲澤在肘後內廉下陷中。屈肘得之。
天泉在曲腋下。去臂二寸。舉腋取之。
○手少陽三焦經十七穴第二十四

關衝在手小指次指之端。去爪甲角如韭葉。

腋門在手小指次指間陷中。

中渚在手小指次指後本節後間陷中。

陽池在手表腕上陷中。

外關在腕後二寸陷中。

支溝在腕後三寸兩骨間陷中。一云在陽池上一寸。

會宗在腕後三寸空中。

三陽絡在臂上大交脉。支溝上一寸。不刺。

四瀆在肘前五寸外廉陷中。

天井在肘外大骨後一寸兩筋間陷中。屈肘得之。

清冷泉在肘上三寸。伸肘舉臂取之。

消濼在肩下臂外開腋斜肘分下行。

天宗在秉風後大骨下陷中。

臑俞夾肩窌後大骨下甲上廉陷中。
肩外俞在肩甲上廉。去脊三寸陷中。
肩中俞在肩甲内廉。去脊二寸陷中。
曲垣在肩中央曲甲陷中。按之應手痛。
○足太陰脾經十二穴第二十五
隱白在足大指端内側。去爪甲角如韭葉。
大都在足大指本節後陷中。
太白在足内側核骨下陷中。
公孫在足大指本節後一寸。
商丘在足内踝下微前陷中。
三陰交在足内踝上三寸骨下陷中。
漏谷在足内踝上六寸骨下陷中。
地機在膝下五寸。

陰陵泉在膝下內側輔骨下陷中。伸足得之。
血海在膝臏上內廉白肉際二寸。
箕門在魚腹上越筋間動應手陰市內。一云在陰股內起脉間。
氣衝在陰股內動脉。此穴已見上腹第三行中。

○足陽明胃經十五穴第二十六

厲兌在足大指次指之端。去爪甲角如韭葉。
內庭在足大指次指外間陷中。
陷谷在足大指次指外間本節後。去內庭二寸。
衝陽在足趺上五寸骨間去陷谷三寸。
解谿在衝陽後一寸半腕上陷中。
豐隆在外踝上八寸。下廉䯒外廉陷中。
上廉在三里下三寸。一名上巨虛。
下廉在上廉下三寸。一名下巨虛。

條口在下廉上一寸。
三里在膝下三寸䯒外廉。
犢鼻在膝髕下骭上夾解大筋中。
陰市在膝上三寸伏兔下若拜而取之。
伏兔在膝上六寸起肉。
髀關在膝上伏兔後交分中。
梁丘在膝上二寸兩筋間。
○足厥陰肝經十一穴第二十七
大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中。
行間在足大指間動應手陷中。
太衝在足大指本節後二寸或一寸半陷中。
中封在足內踝前一寸仰足取之伸足乃得。
蠡溝在足內踝上五寸。

中郄在足內踝上七寸胻骨中。與少陰相直。
膝関在犢鼻下三寸陷中。甲乙經云二寸。
曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中。屈膝而得之。
陰包在膝上四寸。股內廉兩筋之間。
五里在陰廉下二寸。甲乙鍼經一云在陰廉下去氣衝三寸。陰股中動脈。
陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈。

○足少陽膽經十五穴第二十八

竅陰在足小指次指之端。去爪甲角如韭葉。
俠谿在足小指次指岐間本節前陷中。
地五會在小指次指本節後陷中。不灸。
丘墟在足外踝如前陷中去臨泣三寸。一云伸脚取之。
臨泣在小指次指本節後間。去俠谿一寸半。
付陽在外踝上三寸。太陽前少陽後筋骨間。懸鍾一名絕骨。

在外踝上三寸動者中。

光明在足外踝上五寸。　外丘在足外踝下七寸。

陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端。如前三分許。去丘墟七寸。

陽交在足外踝上七寸。斜屬三陽分肉間。

陽陵泉在膝下一寸外廉陷中。

陽關在陽陵泉上五寸犢鼻外陷中。

環跳在髀樞中。側卧伸下足屈上取上足。一云髀樞中外硯骨陷中。

中瀆在髀外膝上五寸分肉間陷中。

○足少陰腎經十一穴第二十九

涌泉在足心陷中。屈足捲指宛宛中。

然谷在足內踝前起大骨下陷中。

太谿在足內踝後跟骨上動脉陷中。

太鍾在足踝後。　水泉去大谿下一寸。在內踝下。

照海在足內踝下。
復溜在足內踝上二寸陷中。
交信在足內踝上二寸。少陰前太陰後廉筋骨間。
築賓在內踝上端分中。
陰谷在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上。按之應手屈膝得之。
會陰在大便前小便後兩陰間。
○足太陽膀胱經十七穴第三十
至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉。
通谷在足小指外側本節前陷中。
束骨在足小指外側本節後陷中。
京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中。
申脉在足外踝下陷中。容爪甲。

金門在足外踝下。名曰關梁。

僕參在足跟骨下陷中。

崑崙在足外踝後跟骨上陷中。（一云在外踝從地直上三寸兩筋骨中。）

承山在兌腨腸下分肉間陷中。

飛揚在外踝上七寸。

承筋在腨中央陷中。不刺。（千金云在脛後從脚跟上七寸腨中。）

合陽在膝約中央下二寸。

委中在膕中約文動脈。

委陽在足太陽後出于膕中外廉兩筋間承扶下。

浮郄在委陽上一寸。展足得之。

殷門在肉郄下六寸。

扶承一名肉郄。在尻臀下股陰下文中。

○三陰三陽流注法

肺手太陰　少商經渠　魚際尺澤　太泉募中府　列缺俞三椎

大腸手陽明　商陽曲池　二間募天樞　三間俞十六椎　合谷　陽谿

心主手厥陰　中衝間使　勞宮曲澤　大陵募巨闕　內關俞五椎

心手少陰　少衝通里　少府靈道　神門少海

小腸手太陽　少澤陽谿　前谷小海　後谿募關元　腕骨俞十八椎

脾足太陰　隱白陰陵泉　大都募章門　大白俞十一椎　公孫　商丘

胃足陽明　厲兊三里　內庭募中管　陷谷俞十二椎　衝陽　解谿

肝足厥陰　大敦曲泉　行間募期門　太衝俞第九椎　中封　中郄

膽足少陽　竅陰陽陵泉　俠谿募日月　臨泣俞第十椎　丘墟　陽輔

腎足少陰　涌泉陰谷　然谷募京門　太谿俞十四椎　水泉　復溜

膀胱足太陽　至陰委中　通谷募中極　束骨俞十九椎　京骨　崑崙

三焦手少陽　關衝天井　腋門募石門　中渚俞十三椎　陽池　支溝

右五藏六腑。三陰三陽十二經脉。藏腑出井流滎注俞過

原。行經入合。募前後法。假令肺手太陰爲藏出於少商爲井。流於魚際爲滎。注於大泉爲俞。過於列缺爲原。行於經渠爲經。入於尺澤爲合。募在中府。俞在第三椎。他皆倣此。

陽井爲金。　陰井爲水。　陽滎爲水。　陰滎爲火。

陽俞爲木。　陰俞爲火。　陽原爲火。　陰原爲金。

陽經爲火。　陰經爲金。　陽合爲土。　陰合爲水。

婦人第二　法四十五首

絶子。灸然谷五十壯。穴在内踝前直下一寸。

胞門閉塞絶子。灸關元三十壯報之。

姙胎不成若墮胎腹痛漏胞見赤。灸胞門五十壯。關元左邊二寸是也。右邊名子戶。

又灸氣門穴。在關元傍三寸。各五十壯。千金一云百壯。

子藏閉塞不受精。灸胞門五十壯。

絶嗣不生。漏下赤白。灸泉門十壯三報之。穴在橫骨當陰上際。石門穴在氣海下一寸。針入一分。留三呼。得氣即寫。主婦人氣痛堅硬。産後惡露不止。遂成結塊。崩中斷絶。日灸二七至一百止。

關元在石門下一寸。主斷緒産道冷。針入八分。留三呼。寫五吸。灸亦佳。但不及針。日灸一百止。

崩中帶下。因産惡露不止。中極穴在關元下一寸。婦人斷緒最要穴。四度針即有子。若未有。更針入八分。留十呼。得氣即寫。灸亦佳。但不及針。日灸三七至三百止。

白崩中。灸少腹橫文當臍孔直下一百壯。

又灸内踝上三寸。左右各一百壯。

帶下。灸間使三十壯。又淋小便赤。尿道痛臍下結塊如覆盃。或因食得。或因産得。惡露不下。遂爲疝瘕。或因月事不調。

血結成塊。皆針之。如上。

婦人遺尿。不知時出。灸橫骨。當陰門七壯。

姙不成。數墮落。灸玉泉五十壯。三報之。中極是

灸夾丹田兩邊相去各一寸。名四滿。主月水不利。賁血上下并無子。灸三十壯。丹田在臍下二寸。

婦人胞落頹。灸臍中三百壯。

水泄痢。灸氣海百壯。三報之。

胞落頹。灸身交五十壯。三報之。是臍下橫文中。

又灸背脊當臍五十壯。

又灸玉泉五十壯。三報之。

又灸龍門二十壯。三報之。是陰中上外際。

胞下垂注陰下脫。灸夾玉泉三寸。隨年壯。三報之。

陰冷腫痛。灸歸來三十壯。三報之。夾玉泉兩傍五寸。

婦人無乳法

初針兩手小指外側近爪甲深一分。兩手腋門深三分。兩手天井深六分。若欲試之。先針一指即知之。神驗不傳。

婦人逆產足出。針足太陰入三分。足入乃出針。穴在內踝後白肉際陷骨宛宛中。

橫產手出。針太衝入三分。急補百息。去足大指奇一寸。

胞衣不出。針足太陽入四寸。在外踝下後一寸宛宛中。又針足陽蹻入三分。在足外踝下白肉際。

產後脉絕不還。針合谷入三分。急補之。又主胎上搶心。

心（一作陰）中懊憹痛。針涌泉入三分。

心中懊憹痛。針勞宮入五分。補之。

產後出汗不止。針太衝急補之。

產難。月水不禁。橫生胎動。皆針三陰交。

胞衣不出。或腹中積聚皆針胞門入一寸。先補後寫。去關元左二寸。

又針章門入一寸四分。

子死腹中及難產。皆針胞門。

胎動及崩中下痢。責氣上逆。針丹田入一寸四分。在臍下二寸。

凡難產。針兩肩井一寸。寫之。須臾即生也。

漏胞下血不禁。灸關元兩傍相去三寸。百壯。

婦人陰中痛引心下。少腹絞痛。灸膝外邊上去一寸宛宛中。

婦人下血泄痢赤白。漏血。灸足太陰五十壯。在內踝上三寸百壯。主腹中五寒。

婦人漏下赤白。月水不利。灸交儀穴。在內踝上五寸。

婦人下血漏赤白。灸營池四穴三十壯。在內踝前後兩邊池上脈。一名陰陽。

婦人漏下赤白。四肢痠削。灸漏陰三十壯。穴在内踝下五分微動脉上。

婦人下赤白漏洩注。灸陰陽穴隨年壯。三報之。在足拇指下屈裏表頭白肉際。

小兒驚癎第三法二十一首

曲澤。主心下澹澹喜驚。

陰交。氣海。大巨。主驚不得卧。

陰蹻。主卧驚視如見星。

大鍾。郄門。主驚恐畏人神氣不足。

然谷。陽陵泉。主心中怵惕恐人將捕之。

解谿。主瘈瘲而驚。

少衝。主太息煩滿。少氣悲驚。

行間。主心痛數驚。心悲不樂。

陽谷。主風眩驚手捲。

厲兌。主多臥好驚。

腋門。主喜驚妄言面赤。

神門。主數噫恐悸少氣。

間使。主喜驚瘖不能言。

三間。合谷。主喜驚。

陽谿。主驚瘈。

通里。主心下悸。

大陵。主心中澹澹驚恐。

手少陰陰郄。主氣驚心痛。

天井。主驚瘈。

後谿。主淚出而驚。

腕骨。主煩滿驚。

鼻病第四 法七首

鼻中壅塞。針手太陽入三分。在小指外側後一寸白肉際宛宛中。

顖二穴。主鼻塞不聞香氣。日灸二七至七百壯。初灸時痛。五十壯已去不痛。七百壯還痛即止。至四百壯漸覺鼻輕。

治鼻中息肉。灸上星二百壯。入髮際一寸。

又夾上星相去三寸各百壯。

衄時癢。便灸足大指節橫理三毛中十壯。劇者百壯。衄不止灸之。并主陰卵腫。

鼻衄不止。灸涌泉二穴百壯。

灸鼻兩孔與柱七壯。主鼻涕出不止。

舌病第五 法二十五首

重舌。灸行間。隨年。穴在足大指岐中。二穴。

小兒重舌。灸左足踝上七壯。

又灸兩足外踝上三壯。

緊脣。灸虎口。男左女右七壯。　又灸承漿三壯。

牙齒疼。灸兩手中指背第一節前有陷處七壯。下火立愈。

齒疼。灸外踝上高骨前交脉上七壯。

風牙疼。逐左右。以繩量手中指頭至掌後第一橫文。折為四分。以度橫文後。當臂兩筋間。當度頭灸三壯。隨左右灸之。兩相患。灸兩臂。至驗。

耳聾鳴。客主人一名上關。在聽會上一寸動脉宛宛中。針入一分。主耳聾鳴如蟬。

又聤耳膿出。亦宜灸。日三壯至二百壯。側卧張口取之。

又聽會在上關下一寸動脉宛宛中。一名耳門。針入三分。主耳聾耳中如蟬鳴。通耳灸日五壯至七七上。十日後還依

前灸之。慎生冷醋滑。酒麪羊肉蒜魚熱食。

又合谷在虎口後縱文頭。立指取之宛宛中主耳聾颼颼然如蟬鳴。宜針入四分留三呼五吸。忌灸。慎洗手足。凡針手足。皆三日勿洗也。

耳風聾雷鳴。灸陽維五十壯。在耳後引耳令前絃絃筋上是。

耳聾不得眠。針手小指外端近甲外角肉際。入一分半。補之。

又針關衝。入一分半補之。

又針腋門。在手小指次指奇間。入三分。補之。

牙車失欠蹉跌。灸第五椎日二七壯。滿三百壯不差。灸氣衝二百壯。胸前喉下甲骨中是。

又灸足內踝上三寸宛宛中三百壯。三報之。

聽會主牙車急及脫臼相離二寸。在上關下一寸。一名耳門。側臥張口乃得之。針入三分留三呼。得氣即寫。不補宜灸。

日五壯至七壯止。十日後還依前灸。愼生冷醋滑。

又法。下關在耳門下一寸宛宛中動脉際是也。主牙車脫關。不得嚼食。側卧開口取之。針入四分。與上同法。灸數亦同忌熱食酒麪。

頰車在耳下二韭葉宛宛中。主牙車不開口噤不言及牙疼不得食牙頰腫。側卧張口取之。針入四分。得氣即寫。不補宜灸。日七壯至七七壯即止。

喉痺。針兩手小指爪文中出血三大豆許即愈。左刺左。右刺右。

又手無名指甲後一韭葉名關衝。主喉痺不得下食飲。心熱噏噏。常以繆刺之。患左刺右。患右刺左也。都患刺兩畔。

咽喉酸辛。灸少衝七壯。雀矢大注。

神門合谷。主喉痺心煩。

脚氣第六 法二二首論一首

初灸風市。　次伏兔。　次犢鼻。　次膝目。

次三里。　次上廉。　次下廉。　次絶骨。

凡八穴風市穴令病人起正身平立垂兩手直下舒十指掩著兩髀便點手中指頭髀大筋上灸百壯逐輕重灸之輕者不可減百壯重者一穴五六百壯伏兔穴令病人累夫端坐以病人手夫橫掩膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外角平處以手按之得節解是一法云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得窟解是灸五十壯可至百壯膝目穴在膝頭下兩傍陷者宛宛中是灸百壯三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一法云在膝頭骨節下三寸人有長短大小當以病人手夫度取灸百壯上廉穴在三里下一夫亦附

脛骨外是灸百壯。下廉穴在上廉下一夫。亦附脛骨外是灸百壯。絶骨穴在足外踝上一夫。亦云四寸是灸百壯。凡此諸灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中令盡壯數爲佳。凡病一脚灸一脚。病兩脚便灸兩脚也。凡脚弱病多著兩脚。一方云覺脚異便灸三里及絶骨各一處兩脚異者合四穴灸之。多少逐病輕重。大要雖輕不可減百壯。不差速令以次灸之。多則佳。

脚疼三陰交三百壯。神良。一云灸絶骨最要。論曰。有人得之不以爲事。不覺忽然入腹。腹腫心熱。其氣大上。遂至絶命。當知微覺有異即須大灸之。乃得應手即差。亦依舊支法存灸之梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿大衝陽陵泉絶骨崑崙陰陵泉三陰交足太陽復溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴。舊法多灸百會風府五藏六府俞募。頃來灸者悉覺引氣

向上。慎不得灸。以上大忌之。

又灸足十指奇端去奇一分。兩足凡八穴。名曰八衝。極下氣。足十指端名曰氣端。日灸三壯。其八衝可日灸七壯。氣下即止。丈夫須小作之。

諸風第七 法六十九首 論一首

肺中風者。其人偃卧而胷滿短氣。冒悶汗出者。肺風之證也。視眼以下鼻上兩邊。下行至口色白者。尚可治。速灸肺俞百壯。小兒減之。若色黄者。此為肺已傷。化為血矣。不可復治。其人當妄言掇空指地。或自拈衣尋縫。如此數日死。若為急風所中。便迷妄恍惚。狂言妄語。或少氣惙惙。或不能言。若不速治。宿昔而死。亦覺便灸肺俞膈俞肝俞數十壯。急服續命湯可救也。若涎唾不止者。既灸。當與湯也。

肝中風者。但踞坐不得低頭。遶兩眼連額微有青者。肝風之

證也。若脣色青面黃尚可治。急灸肝俞百壯。急服續命湯。若色大青黑者。此為肝已傷。不可復治。數日而死。

心中風者。其人但得偃臥不得傾側。悶亂冒絕汗出。心風之證也。若脣正赤尚可治。灸心俞百壯。急服續命湯。若或青或白或黃或黑。此為心已壞為水。不可復治。旬日死。一云五六日死

脾中風者。其人但踞坐而腹滿。視身通黃口吐鹹汁尚可治。灸脾俞百壯。急服續命湯。若目下青手足青。不可復治。

腎中風者。其人踞坐腰痛。視脅左右。未有黃色如餅粢大尚可治。灸腎俞百壯。急服續命湯。若齒黃赤鬢髮直面土色不可復治。

大腸中風者。臥而腸鳴不止。灸大腸俞百壯。服續命湯。

論曰。凡風病內外沉浮者。內是五藏。外是皮膚。沉是骨髓。浮是血脉。若在腠理。湯藥所及。若在五藏。酒醪所至。若在血脉。

針灸所中。深在骨髓。扁鵲自云不能如何。

風痱者。卒不能言。口噤。手不隨而強直。灸法。度病者手小指內歧間至指端爲度。以置臍上直望心下丹注度上端畢。又作兩度續在注上合其下開上。取其本度橫置其開上令三合其狀如倒作厶字形也。男度右手。女度左手。嫌不分明。故以丹注三處起火各百壯。夫眼瞤動口偏喎舌不轉者。灸口吻邊橫文赤白際逐左右。隨年壯三報之。不差更報。

肝風占候口不能言。灸鼻下人中。次大椎。次肝俞各五十壯。

心風灸心俞各五十壯。

脾風灸脾俞各五十壯。

脾風占候言聲不出或手上下。灸手十指頭。次灸人中。大椎。兩耳門前脉去耳門上下行一寸。次兩大指節上下六穴各七壯。

卒中風口喎，以葦筒長五寸，以一頭刺耳孔中，四畔以麪密塞，勿令洩氣，一頭内大豆一顆，并艾燒之令然，灸七壯，差。患右灸左，患左灸右。千金不傳。○又灸手交脉三壯，左灸右，右灸左，其炷如鼠矢，横安之，兩頭放火燒之。

凡卒中風，口噤不得開，灸頰車二穴，穴在耳下八分小近前，灸五壯即得語。又隨年壯，口僻左右灸之。

治尸厥法

凡尸厥如死，脉動如故，針百會入二分，補之，灸熨兩脅，又針足中指頭去甲如韭葉，又針足大指甲下肉側去甲三分。

灸失瘖不語法

先灸天窻五十壯，訖，息火，乃移灸百會五十壯，畢，還灸天窻五十壯。若初發，先灸百會，則風氣不得洩，内攻五藏，當閉伏更失瘖也。所以先灸天窻，次灸百會乃佳。一灸五十壯，息火

洩氣復灸之。視病輕重。重者處各三百壯。輕者以意。一云次灸肩井。得一百壯。即灸一里三壯。若五壯以下氣也。瀉尾可灸百壯。灸至五十壯。暫息火也。

又法 凡一切中風服藥益劇者。但是風穴皆灸之三壯。神良。欲除根本必須火艾。專恃湯藥則不可差。

灸角弓反張法

脣青眼戴。角弓反張。始覺發動。即灸神庭七壯。穴在當鼻直上髮際。

次灸曲差二穴各七壯。穴在神庭兩傍各一寸半。

次灸上關二穴各七壯。在耳前上廉起骨陷中。一名客主人。

次灸下關二穴各七壯。在耳前動脈下空下廉陷中。

次灸頰車二穴各七壯。穴在耳下曲頰端陷中。

次灸廉泉一穴七壯。在當頤直下骨後陷中。

次灸顖會一穴七壯。在神庭上一寸。

次灸百會一穴七壯。在當頂上正中央。
次灸本神二穴各七壯。在耳直上入髮際二分。
次灸天柱二穴各七壯。在項後大筋外入髮際陷中。
次灸陶道一穴七壯。在大椎節下間。
次灸風門二穴各七壯。在第二椎下兩傍各一寸半。
次灸心俞二穴各七壯。在第五椎下兩傍各一寸半。
次灸肝俞二穴各七壯。在第九椎下兩傍各一寸半。
次灸腎俞二穴各七壯。在第十四椎下兩傍各一寸半。
次灸膀胱俞二穴各七壯。在第十九椎下兩傍各一寸半。
次灸曲池二穴各七壯。穴在肘外曲頭陷中屈肘取之。
次灸肩髃二穴各七壯。在兩肩頭上中兩骨間陷中。
次灸支溝二穴各七壯。在手腕後二寸兩骨間陷中。
次灸合谷二穴各七壯。在手大指虎口兩骨間陷中。

次灸間使二穴各七壯。在掌後三寸兩筋間。
次灸陽陵泉二穴各七壯。在膝下骨前陷中。
次灸陽輔二穴各七壯。在外踝上絕骨陷中。
次灸崑崙二穴各七壯。在外踝後跟骨上陷中。
右以前主久風卒風緩急諸風發動不自覺知。或心腹脹滿。或半身不遂。或口噤不言涎唾自出。目閉耳聾。或舉身冷直。或煩悶恍惚。喜怒無常。凡有風皆灸之神驗。鼻交頞中一穴。針入六分。得氣即寫。留三呼。寫五吸。不補。亦宜灸。然不如針。此主癲風角弓反張。羊鳴。大風青風面風如蟲行。卒風多睡健忘。心中憒憒。口噤闇倒不識人。黃疸急黃八種大風。此之一穴皆主之。莫不神驗。慎酒麪生冷醋滑豬魚蒜蕎麥漿水。

雜灸法

凡風灸上星二百壯。又前頂二百壯。百會二百壯。腦戶三百

壯。風府三百壯。

凡大風灸百會七百壯。

凡百諸風灸大椎平處兩相二寸三分。以病人指寸量之。各一百壯。

治風耳後八分半有穴灸一切風若狂者亦差。耳門前灸百壯。

治卒病惡風欲死不言及肉痺不知人灸第五椎名曰藏俞。各一百五十壯。

扁鵲曰。凡心風灸心俞各五十壯。第五節對心是也。

肝俞。主肝風腹脹食不消化吐血酸削四肢羸露不欲食鼻衄。目眗䀮䀮。眉頭脅下痛少腹急灸百壯。

大腸俞。主風腹中雷鳴大腸灌沸腸澼洩痢食不消化少腹絞痛腰脊疼強大小便難不能飲食灸百壯。三報之。

治卒中惡悶熱毒欲死灸足大指横文隨年壯若筋急不能

行。若內筋急。灸內踝上三十壯。外筋急。灸外踝上三十壯。
愈。若戴睛上插者。灸兩目後眥二七壯。
若不語。灸第三椎五百壯。
若不識人。灸季肋頭七壯。
若眼反口噤。腹中切痛。灸陰囊下第一橫理十四壯。
腋門二穴。主風。灸五十壯。亦可九壯。
治風身重心煩。足脛疼。灸絕骨百壯。在外踝上三寸。一云四寸。又云一夫。
凡卒中風口噤不開。灸機關二穴。在耳下八分近前。灸五壯即愈。一云隨年壯。僻者。逐左右灸之。
治頭風搖動。灸腦後玉枕中間七壯。

治猥退風偏風半身不隨法

肩髃主偏風半身不隨。熱風頭風。刺風。手不上頭。捉物不得。挽弓不開。臂冷酸疼無力。針入八分。留三呼。瀉五吸。在髆骨

頭陷中平手取之。偏風不隨。可至二百壯。過多則臂強。慎酒肉五辛。熱食漿水。

又針曲池。入七分。得氣即寫。然後補之。大宜灸日十壯至一百壯止。十日更報下少至二百壯。

又針列鈌。入三分。留三呼。寫五吸。亦可灸之日。七壯至一百。總至三百壯。

陽池上。一夫兩筋間陷中。主刺風熱風耳聾鳴。手不仁。冷風手戰。偏風。半身不隨。陽池支溝。下一夫覆腕當文宛宛中。亦主或因損後把捉不得。針入三分。留三呼。寫五吸。忌灸。

商丘。在內踝前陷中。主偏風痺。脚不得履地。刺風頭風熱風陰痺。針入三分。留三呼。寫五吸。疾出之。忌灸。

偏風半身不隨。脚重熱風。疼不得履地。針入四分。留三呼。得氣即寫。疾出針。於痕上灸之。良。七壯。

灸猥退風半身不隨法

先灸天窻。次大門。腦後尖骨上一寸。次承漿。次風池。次曲池。次手髓孔。腕後尖骨頭宛宛中。次手陽明大指奇後。次脚五冊屈兩脚膝腕文。次脚髓孔足外踝後一寸。次足陽明足拇指奇三寸。各灸百壯。若有手足患不隨。灸百會。次本神。次肩髃。次心俞。次手少陽。次足外踝下容爪外並依左右五百壯。面上游風如蟲行習習然起則頭旋眼暗頭中溝壟起。灸天窻。次兩肩上一寸當瞳人。次曲眉在兩眉間。次手陽明。次足陽明。各灸二百壯。

時行法第八 法四首

初得一日二日。但灸心下三處。第一去心下一寸。名巨闕。第二去心下二寸。名上管。第三去心下三寸。名胃管。各灸五十壯。然或人形小大不同。恐寸數有異。可以繩度之。隨其長短

寸數最佳。取繩從心骨鳩尾頭少度至臍孔中屈之取半。當繩頭名胃管。又中屈更爲二分。從胃管向上度是上管。上度取一分是巨闕。大人可五十壯。小兒可一七二七壯。隨其年灸。以意量之。

若病者三四日以上。宜先灸囟上二十壯。以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半。便從髮際度入髮中灸繩頭名天窻。又灸兩顳顬。又灸風池。又灸肝俞百壯。餘處各二十壯。

又灸太衝三十壯。神驗無比。

腕內踝灸兩手腕研子骨尖上三壯。男左女右。

黃疸第九　法一十一首

脣裏正當承漿邊逼齒斷針三鋥。治馬黃黃疸。

顳顬在眉眼尾中間上下有來去絡脉是。針灸之治疸氣溫病。

夾人中火針。治馬黃疸通身並黃。語音已不轉者。

灸錢孔百壯。度乳至臍中。屈肋頭骨是灸百壯治黃疸。

夾承漿兩邊各一寸。治馬黃急疫。

灸太衝七壯。又一云針灸隨便。

又灸風府熱府肺俞心俞肝俞脾俞腎俞男陰縫拔陰反向上灸治馬黃黃疸。若女人玉門頭是穴。針灸無在。

脚跟在白肉後際。針灸隨便。治馬黃黃疸。

臂石子頭還取病人手自捉臂。從腕中大淵文向上一夫接白肉際灸七壯。治馬黃黃疸。

黃疸灸第七椎七壯。黃汁出。

瘧病第十 法一十三首

瘧灸上星及大椎。至發時令滿百壯。艾炷如黍米粒。俗人不解。務大炷也。

又覺小異。灸百會七壯。若更發。更七壯。極難差。不過三灸。

又灸風池二穴三壯。　又灸腎俞百壯

又灸三間在虎口第二指節下一寸三年瘧欲發即下火。

治一切瘧無問處所仰卧以繩量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右。

治瘧刺足少陰出血愈。

治諸瘧而脉不見者刺十指間見血血去必已先視身赤如小豆者皆取之。

瘧日西發者臨泣主之。

瘧實則腰背痛虛則鼻衄飛揚主之。

瘧多汗腰痛不能俛仰目如脱項如拔崑崙主之。

灸一切瘧尺澤主之。

凡瘧有不可差者從未發前灸大椎至發時滿百壯無不差。

千金翼方卷第二十六

針灸中

肝病第一 五十一法

治眼目法

攢竹主目視不明䀮䀮目中熱痛及瞤。針入一分。留三呼。寫三吸。徐徐出之。忌灸。宜出血塗鹽。

膚瞖白膜覆瞳人。目闇及眯。雀目冷淚。目視不明。努肉出。皆針睛明。入一分半。留三呼。寫五吸。冷者先補後寫。復補之。雀目者可久留十吸。然後速出。

視眼喎不正。口喎。目瞤。面動葉葉然。眼赤痛。目䀮䀮。冷熱淚。目瞼赤。皆針承泣。在目下七分匡骨中。當瞳子直下陷中。入二分半。得氣即寫。忌灸。

目闇不明。鍼中渚。入二分。留三呼。寫五吸。灸七壯。炷如雀矢

大。在手小指次指本節後閒。眯目偏風眼喎通睛耳聾。鍼客主人。一名上關。入一分。久留之。得氣即寫。亦宜灸日三七壯至二百壯。炷如細竹筋大。側臥張口取之。眼暗灸大椎下第十節正當脊中二百壯。唯多佳。可以明目神良。灸滿千壯。不假湯藥。

肝勞。邪氣眼赤。灸當容一百壯。兩邊各爾。在眼後耳前三陰三陽之會處。以手按之有上下橫脉。是與耳門相對也。

肝俞主目不明。灸二百壯。小兒寸數斟酌。灸可一二七壯。

治目急痛不可遠視。灸當瞳子上入髮際一寸。隨年壯。

治風翳。灸手中指本節頭骨上五壯。炷如小麥大。隨病左右灸之。

治風痒赤痛。灸人中鼻柱二壯。仰臥灸之。

治目卒生翳。灸大指節橫文三壯。逐左右灸之。

治眼暗。若一眼暗。灸腕後節前陷中。兩眼暗。兩手俱灸。隨年壯。

治温病後食五辛。即不見物。遂成雀目。灸第九椎名肝俞二百壯。永差。

治脚轉筋法

治脚轉筋。鍼内崑崙穴在内踝後陷中。入六分氣至寫之。又灸承山。隨年壯。神驗。

第二十一椎主腰背不便。筋轉痹。灸隨年壯。

治筋攣轉筋。十指筋攣急不得屈伸。灸足外踝骨上七壯。

治失精筋攣。陰縮入腹相引痛。灸中封五十壯。又下滿灸五十壯。兩脚一百壯。此二穴亦主喉腫厥逆。五藏所苦鼓脹悉主之。老人加之。五十以下及小兒並隨年壯。

治轉筋脛骨痛不可忍。灸屈膝下廉横筋上三壯。

腹脹轉筋。灸臍上一寸二七壯。

治癥瘕法

少腹堅大如盤，胷腹中脹滿，飲食不消，婦人癥聚瘦瘠，灸三焦俞百壯。三報之。

灸內踝後宛宛中，隨年壯。 灸氣海百壯。

久冷及婦人癥瘕，腸鳴泄痢，繞臍絞痛，灸天樞百壯。三報之。勿鍼。臍兩傍各二寸。

積聚堅滿痛，灸脾募百壯。章門是也。

治瘕癖，患左灸左，患右灸右，第一屈肋頭近第二肋下即是。灸處第二肋頭近第三肋下向肉翅前亦是。灸處初日灸三次，日五，後七，周而復始，至十止。唯忌大蒜，餘不忌。

又灸關元五十壯。 又灸臍上四指五十壯。

膏肓俞兩穴主無病不療方。

先令病人正坐曲脊。伸兩手以臂著膝前。令正直。手大指與膝頭齊。以物支肘。勿令臂得動也。從甲骨上角摸索至甲骨下頭。其間當有四肋三間。灸中間依甲骨之裏。去甲骨容側指許。摩胎去表肋間空處。按之自覺牽引肩中。灸兩甲內各一處至六百壯。多至千壯。數百壯當氣下。聾聾然如流水。當有所下。若停淡宿疾亦必下也。此灸無所不治。主諸羸弱瘦損虛勞。夢中失精。上氣欬逆。及狂惑妄誤。皆有大驗。若病人已困。不能正坐。當令側臥。挽上臂。令前索孔穴灸之。求穴大較。以右手從左肩上住指頭表所不及者是也。左手亦然。及以前法灸。若不能久正坐。伸兩臂者。亦可伏衣襆上。伸兩臂。令人挽兩甲骨使相遠。不爾甲骨覆穴不可得也。所伏衣襆當令大小有常。不爾則前却失其穴也。此穴灸訖後。令人陽氣盛。當消息自養。令得平復。其穴近第五椎相準望求索。

治頭重臂肘重法

頭重風勞，灸腦戶五壯，鍼入三分補之。

頭重不能勝，灸腦戶下一寸半。

身體重，四肢不能自持，灸脾俞隨年壯，鍼入五分補之。

身重，嗜眠不自覺，灸天府五十壯，鍼入三分補之。

身重，灸水分百壯，鍼入一寸補之。

體重，四肢不舉，灸天樞五十壯，忌鍼。

身重腫，坐不欲起，風勞脚疼，灸三里五十壯，鍼入五分補之。

又灸足太陽五十壯，鍼入三分補之。

臂重不舉，灸肩井隨年壯，可至一百壯，鍼入五分補之。

又灸足澤三十壯，鍼入三分補之。

第一椎名大杼，無所不主，俠左右一寸半或一寸二分，主頭項痛不得顧，胷中煩急，灸隨年壯。

諸煩熱時氣温病。灸大椎百壯。鍼入三分。寫之。横三間寸灸之。

心煩上氣。灸肺俞。鍼入五分。

心煩短氣。灸小腸俞。

又灸巨闕期門各一百壯。鍼入五分。

又灸心俞百壯。鍼入五分。

頭身熱。灸胃管百壯。勿鍼。

煩悶憂思。灸大倉百壯。

煩熱頭痛。鍼虎口入三分。

煩躁恍惚。灸間使三十壯。鍼入三分。

骨熱煩。胷滿氣悶。鍼三里入五分。

身體煩熱。鍼中府。　又灸絶骨五十壯。

膽病第二　一十二法

左手關上陽絕者。無膽脉也。苦口中無味一云苦眯目。恐畏如見鬼。多驚少力。刺足厥陰治。陰在足大指間。或刺三毛中。

左手關上陽實者。膽實也。苦腹中不安。身軀習習。刺足少陽治。陽在足第二指本節後一寸。

俠膽俞傍行相去五寸。名濁浴。主胸中膽病。隨年壯。

膽虛。灸足內踝上一夫。名三陰交。二十壯。

治吐血法

虛勞吐血。灸胃管三百壯。亦主嘔逆吐血少食多飽及多睡百病。

凡口鼻出血者。名曰腦衄。灸上星五十壯。

吐血唾血。灸胸堂百壯。忌鍼。

吐血腹痛雷鳴。灸天樞百壯。

吐血唾血。上氣欬逆。灸肺俞隨年壯。

吐血酸削，灸肝俞百壯。

吐血嘔逆，灸手心主五十壯，大陵是。

吐血，灸頸項上二七壯。

心病第三 一十八法

心俞各灸二七壯，主心病，老小減之，不能食，胷中滿，膈上逆，氣悶熱，皆灸之。

卒心疝暴痛汗出，刺大敦，左取右，右取左，男左女右，刺之出血立已。

俠巨闕兩邊，相去各半寸，名曰上門，主胷中痛引腰背，心下嘔逆，面無滋潤，各灸隨年壯。

凡顏色焦枯，勞氣失精，肩背痛，手不得上頭，灸肩髃百壯，穴在肩外頭近後，以手按之有解宛宛中。

當心下一寸，名巨闕，主心悶痛，上氣引少腹冷，灸二七壯。

脉不出。鍼不容兩穴。在幽門兩傍各一寸五分。
健忘忽忽。鍼間使入五分。掌後三寸。
心裏懊憹。徹背痛煩逆。灸心俞百壯。
心痛如錐刀刺氣結。灸膈俞七壯。
心痛冷氣上。鳩尾上一寸半。名龍頷。灸百壯。不鍼。
心痛惡氣上脅痛急。灸通谷五十壯。在乳下二寸。
心痛暴惡氣叉心。灸巨闕百壯。
心痛胸脅滿。灸期門隨年壯。
心痛堅煩氣結。灸太倉百壯。
心痛暴絞急欲絕。灸神府百壯。附鳩尾正當心有忌。
胸痺心痛。灸亶中百壯。忌鍼兩乳間。
心痛灸臂腕橫文三七壯。
心痛灸兩虎口白肉際七壯。

小腸病第四 八十一法 訣二首

左手關前寸口陽絕者。無小腸脉也。苦臍痹。少腹中有疝瘕。主月即冷上搶心。刺手心主治陰。在掌後橫文中入一分。

左手關前寸口陽實者。小腸實也。苦心下急熱痹。小腸內熱。小便赤黃。刺手太陽治陽。在手第二指本節後一寸動脉。

俠中管兩邊相去半寸。名曰陰都。灸隨年壯。主小腸熱病。

俠臍兩邊相去一寸。名魂舍。灸一百壯。主小腸泄利膿血。小兒減之。

又灸小腸俞七壯。

灸風眩法

以繩橫度口至兩邊。既得度口之寸數。便以繩一頭更度鼻。盡其兩邊兩孔間。得鼻度之寸數。中屈之取半。合於口之全度中屈之。先覔頭上廻髮。當廻髮中灸之。以度度四邊左右前後。當繩端而灸。前以面為正。並依年壯多少。一年凡三灸。

皆須癢差。又更灸之。壯數如前。若速灸。火氣引上。其數處廻髮者。則灸其近當鼻也。若廻髮近額者。亦宜灸。若指面爲癥。則闕其面處。然病重者。亦不得計此也。

治卒癲法

灸陰莖上宛宛中三壯。得小便通即差。當尿孔上是穴。

又灸陰莖頭三壯。

又灸乳頭三壯。

又灸足大指上聚毛中七壯。

又灸督脉三十壯。在直鼻人中上。入髮際。二報之。

又灸天窓百會各漸灸三百壯。炷惟小作。

一法

灸耳上髮際各五壯。

治卒中邪魅恍惚振噤法

鼻下人中及兩手足大指爪甲。令艾炷半在爪上。半在肉上。

灸不止十四壯，灸如雀矢大作之。

狂鬼語，鍼其足大拇指爪甲下入少許即止。

治大人癲小兒驚癇法

灸背第二椎及下窮骨兩處，以繩度中折，繩端一處是脊骨上也，凡三處畢，復斷此繩作三折，令各等而參合如厶字，以一角注中央，灸下二角俠脊兩邊，便灸之，凡五處也，以丹注所灸五處各百壯，削竹爲度勝繩也。

狂風罵詈撾斫人名爲熱陽風，灸口兩吻邊燕口處赤白際各一壯。

又灸陰囊縫三十壯，令人立，以筆正注當下，已卧却核卵令上，乃灸之，勿令近前中卵核，恐害於陽氣也。

卒發狂言鬼語法

以甑帶急合縛兩手大指，便灸左右脅，當對屈肘頭兩處火，

俱下各七壯。須臾鬼語自道姓名乞去。徐徐語問。乃解其手。

狂癇不識人癲病眩亂。灸百會九壯。

狂走瘈瘲。灸玉枕上三寸。一法頂後一寸百壯。

狂邪鬼語。灸天窻九壯。

又灸口吻十五壯。

狂癲哭泣。灸手逆注三十壯。在手腕後六寸。

狂走驚癇。灸河口五十壯。在手腕後陷中動脉。此與陽明同也。

狂癲風癲吐舌。灸胃管百壯。不鍼。

又灸大幽一百壯。

又灸季肋端三十壯。千金云治狂走癲癇。

狂言恍惚。灸天樞百壯。

又灸間使三十壯。千金云治狂言妄語。

狂走喜怒悲泣。灸巨覺隨年壯。在背上胛內側反手所不及者。骨罅穴上六分。搖之痛是也。一云巨闕俞。

狂邪驚癇。灸承命三十壯。在內踝後上行三寸動脈上。

又灸巨陽五十壯。千金云治狂癲風驚厥逆心煩。

又灸足太陽五十壯。千金云治狂癲鬼語。

又灸足少陽隨年壯。千金云治狂癲癇狂易。

又灸足陽明三十壯。千金云治狂走驚恍惚。

狂走癲厥如死人。灸足大敦九壯。千金云灸足大指三毛中。

狂走罵詈。灸八會隨年壯。在陽明下五分。

狂癲驚走風恍惚瞋喜罵笑歌哭鬼語吐舌。悉灸上星腦戶風池手太陽陽明太陰足太陽陽明陽蹻少陽太陰陰蹻足跟。悉隨年壯。

驚怖心忪少力，灸大横五十壯。

邪鬼妄語，灸懸命一十四壯，在口脣裏中央絃，絃者是，一名鬼禄。一法以鋼刀決斷絃絃乃佳。

狂邪鬼語，灸伏兎百壯。

又灸慈門五十壯。千金云：治悲泣邪語，鬼忙歌哭。

悲泣鬼語，灸天府五十壯。

狂邪發無常，披頭大喚，欲殺人，不避水火者，灸間使，男左女右，隨年壯。

狂走刺人，或欲自死，罵詈不息，稱鬼神語，灸口吻頭赤白際一壯。

又灸兩肘內屈中五壯。

又灸背胛中間三壯，報之。

驚狂走，灸內踝上三寸近後動脈上七壯。

邪病四肢重痛諸雜候，尺澤主之。一名鬼堂。

邪病語不止及諸雜候，人中主之。一名鬼市。千金云：一名鬼客廳。凡人中惡，先掐鼻下是也。

邪病臥瞑瞑不自知，風府主之。一名鬼穴。

邪病大喚罵詈走，十指端去爪一分主之。一名鬼城。

邪病鬼癲，會上主之。一名鬼門，并主四肢重。

邪病大喚罵走，三里主之。一名鬼邪。

勞宮。一名鬼路。

陽澤。一名鬼臣。

耳前髮際宛宛中，名鬼床。

尺中動脈，名鬼受。

足太陽，名鬼路。

癲狂二三十年者，灸天窻，次肩井，次風門，次肝俞，次腎俞，次

手心主次曲池次足五里次涌泉各五百壯日七壯

鍼邪鬼病圖訣法

凡百邪之病源起多途其有種種形相示表癲邪之端而見其病或有默然而不聲或復多言而謾語或歌或哭或笑或吟或眠坐溝渠噉食糞穢或裸露形體或晝夜遊走或嗔罵無度或是飛蠱精靈手亂目急如斯種類癲狂之人今鍼灸與方藥並主治之

扁鵲曰百邪所病者鍼有十三穴凡鍼之體先從鬼宮起次鍼鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併鍼止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言説論其由來往驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起鍼女從右起鍼若數處不言便遍鍼也依訣而行鍼灸等處並備主之

第一初下鍼從人中名鬼宮在鼻下人中左邊下鍼出右邊

第二次下鍼手大指爪甲下三分。名鬼信。入肉三分。
第三次下鍼足大指爪甲下入肉二分。名鬼壘。五指皆鍼。
第四次下鍼在掌後橫文入半解。名鬼心。
第五次下鍼在外踝下白肉際。火鍼七鋥。鋥三下名鬼路。
第六次下鍼入髮際一寸。大椎以上火鍼七鋥。鋥三下名鬼枕。
第七次下鍼去耳垂下五分。火鍼七鋥。鋥三下名鬼床。
第八次下鍼承漿從左刺出右。名鬼市。
第九次下鍼從手橫文三寸兩筋間鍼度之。名鬼路。此名間使。
第十次下鍼入髮際直鼻上一寸。火鍼七鋥。鋥三下名鬼堂。
第十一次下鍼陰下縫灸三壯。女人玉門頭三壯。名鬼藏。
第十二次下鍼尺澤橫文中內外兩文頭接白肉際七鋥。鋥

三下名鬼臣。此名曲池。

第十三次下鍼去舌頭一寸。當舌中下縫。刺貫出舌上。仍以一板橫口吻。安鍼頭。令舌不得動。名鬼封。

右以前若是手足皆相對鍼兩穴。若是孤穴。即單針之。

治風邪法 灸間使隨年壯。

又灸承漿七壯。三報之。

又灸心俞七壯。

又灸三里七壯。

治鬼魅 灸入髮際一寸百壯。

灸間使手心各五十壯。

野狐魅 合手大指急縛大指。灸合間二七壯。當狐鳴而愈。

脾病第五　三十二法

脾俞。主四肢寒熱。腰疼不得俛仰。身黃腹滿。食嘔。舌根直。并灸椎上三穴各七壯。

治老小大便失禁法

灸兩脚大指去甲一寸三壯。 又灸大指奇間各三壯。

大小便不通灸臍下一寸三壯。 又灸橫文百壯。

治大便難法

灸第七椎兩傍各一寸七壯。

灸俠玉泉相去二寸半。名腸遺。隨年壯。一云二寸。 又灸承筋二穴三壯。 又灸大都隨年壯。 又灸大敦四壯。

腹中熱閉時大小便難腰痛連胸。灸團岡百壯。在小腸俞下二寸橫三間寸。灸之。

大便閉塞氣結。心堅滿。灸石門百壯。

大小便不利。欲作腹痛。灸榮衛四穴各百壯。在背脊四面各一寸。

大小便不利。灸八窌百壯。在腰目下三寸。俠脊相去四寸。兩

邊各四穴。
小兒大小便不通。灸口兩吻各一壯。
小便不利。大便數洩注。灸屈骨端五十壯。
又灸天樞百壯。在俠臍相去各二寸。魂魄之舍。不可下鍼。一云相去二寸。

治痢法

大便下血。灸第二十椎。隨年壯。恐是中膂內俞。
赤白下痢。灸窮骨頭百壯。多多益佳。
食不消化。洩痢不作肌膚。灸脾俞隨年壯。洩注五痢。便膿血。重下腹痛。灸小腸俞百壯。洩痢久下。失氣勞冷。灸下腰百壯。三報之。在八魁正中脊骨上。灸多益佳。三宗骨是。忌鍼。
少腹絞痛。洩痢不止。灸丹田百壯。三報之。在臍下二寸。鍼入五分。

下痢。不嗜食。食不消。炙長谷五十壯三報之。在俠臍相去五寸。一名循際。

下痢赤白。炙足太陰五十壯三報之。

久冷五痔便血。炙脊中百壯。

五痔便血失屎。炙廻氣百壯。在脊窮骨上。赤白下。炙窮骨。惟多為佳。

久痢。百治不差。炙足陽明下一寸高骨之上中。去大指奇間三寸。炙隨年壯。

又炙關元三百壯。十日炙。并治冷痢腹痛。

又先屈竹量正當兩胯脊上點記。下量一寸點兩傍各一寸。復下量一寸當脊上合三處。一炙三十壯。炙百壯以上。一切痢皆差。亦主疳濕。脊上當胯點處不炙。

又炙臍中稍稍至二三百壯。

胃病第六 三十四法

治胃補胃。灸胃俞百壯。主胃中寒。不能食。食多身羸瘦。腸鳴腹滿胃脹。

灸三焦俞。主五藏六腑積聚。心腹滿。腰背痛。飲食不消。吐逆。寒熱往來。小便不利。羸瘦少氣。隨年壯。

又灸心下二寸。名胃管。百壯至千壯佳。

小腸俞。主三焦寒熱。灸隨年壯。

治胃中熱病。膝下三寸。名三里。灸三十壯。

反胃食即吐出。上氣。灸兩乳下各一寸。以差為限。

又灸臍上一寸二十壯。

又灸內踝下三指稍斜向前有穴三壯。外臺秘要云一指

灸胷脅脹滿法。

臚脹脅腹滿。灸膈俞百壯。三報之。

脹滿水腫。灸脾俞隨年壯。三報之。

脹滿雷鳴。灸大腸俞百壯。三報之。

脹滿氣聚寒冷。灸胃管。在心鳩尾下三寸。百壯。三報之。

脹滿繞臍結痛堅。不能食。灸中守百壯。在臍上一寸。一名水分。

脹滿瘕聚滯下疼。灸氣海百壯。在臍下一寸。忌鍼。

脹滿氣如水腫狀。少腹堅如石。灸膀胱募百壯。在中極臍下四寸。

脹滿腎冷。瘕聚洩痢。灸天樞百壯。

胷滿心腹積聚痞疼痛。灸肝俞百壯。

灸乾嘔法

乾嘔不止。所食即吐不停。灸間使三十壯。若四厥脉沈絕不至者。灸之便通。此法起死人。

又灸心主尺澤。亦佳。

又灸乳下一寸三十壯。

凡噦。令人惋恨。灸承漿。炷如麥大七壯。

又灸臍下四指七壯。

治卒噦。灸亶中。中府。胃管各數十壯。灸尺澤。巨闕各七壯。

灸吐法

吐逆不得食。灸心俞百壯。

吐逆不得下食。今日食明日吐。灸膈俞百壯。

卒吐逆。灸乳下一寸七壯。

吐變不下食。灸胷堂百壯。

又灸巨闕五十壯。

又灸胃管百壯。三報之。

又灸脾募百壯。一名章門。在大横外直臍季肋端。三報之。

嘔吐宿汁。吞酸。灸神光。一名膽募。百壯。三報之。甲乙經云。日月膽募也。在期門下五分。

嘔吐欬逆霍亂吐血。灸手心主五十壯。

噫噦膈中氣閉塞。灸腋下聚毛下附脅宛宛中五十壯。神良。

噫噦嘔逆。灸石關百壯。

肺病第七 四十五法

肺脹氣搶脅下熱痛。灸俠胃管兩邊相去一寸。名陰都。隨年壯。

又刺手太陰出血。主肺熱氣上欬嗽寸口是也。

肺脹脅滿嘔吐上氣等。灸大椎并兩乳上第三肋間各二壯。

凡肺風氣痿絕。四肢脹滿喘逆胷滿。灸肺俞各兩壯。肺俞對乳引繩度之。

肺俞主喉痺氣逆欬嗽。口中涎唾。灸七壯。亦隨年壯。可至百壯。

嘔吐上氣。灸尺澤。在肘中。不三則七。

腹中雷鳴相逐，食不化，逆氣，灸上管下一寸，名太倉，七壯。

治奔豚上氣灸法

章門一名長平，二穴在大横外直臍季肋端，主奔豚腹腫，灸百壯。

又灸氣海百壯，在臍下一寸半。

又灸關元五十壯，亦可百壯，在臍下三寸。

中極一名玉泉，在臍下四寸，主奔豚搶心不得息，灸五十壯。

心中煩熱，奔豚，胃氣脹滿不能食，鍼上管入八分，得氣即寫。若心痛不能食，爲冷氣，宜先補後寫，神驗，灸之亦佳，日二七至一百止，不差倍之，大忌房室。

奔豚冷氣，心間伏梁狀如覆杯，冷結諸氣，鍼中管入八分，留七呼，在上管下一寸，寫五吸，疾出鍼，須灸日二七壯至四百止，愼忌房室。

又中府二穴。主奔豘上下。腹中與腰相引痛。灸一百壯。

又期門二穴。直乳下二肋端傍一寸五分。主奔豘。灸百壯。

又四滿俠丹田兩傍相去三寸。灸百壯。一云三十壯。主奔豘氣上下搶心腹痛。

凡上氣冷發。腹中雷鳴轉叫。嘔逆不食。灸太衝不限壯數。從痛至不痛止。炷如雀矢大。

第四椎名巨闕俞。主胷膈中氣。灸隨年壯。

太倉一穴。一名胃募。心下四寸。主心腹諸病。堅滿煩痛憂思結氣。寒冷霍亂。心痛吐下。食飲不消。腸鳴泄痢。灸百壯。

肓募二穴。在乳頭斜度至臍中。屈去半。從乳下行盡度頭是。主結氣囊裹鍼藥所不及。灸隨年壯。

臍下結痛。流入陰中。發作無時。此冷氣。灸關元百壯。

又灸天井百壯。

氣短不語灸大椎隨年壯。又灸肺俞百壯。

又灸肝俞百壯。又灸尺澤百壯。

又灸小指第四指間交脉上七壯。

又灸手十指頭各十壯。

少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯。又灸臍孔中二七壯。

乏氣灸第五椎下隨年壯。

下氣灸肺俞百壯。

又灸太衝五十壯此穴并主肺痿。

灸飛尸法

以繩量病人兩乳間中屈又從乳頭向外量使肋罅於繩頭。灸隨年壯。主一切注。千金云三壯或七壯男左女右。

胃管主五毒注不能食飲百病灸至千壯。

忤注灸手肘尖隨年壯。佚一文。

又第七椎。灸隨年壯。

又灸心下一寸。三百壯。

食注。灸手小指頭。隨年壯。男左女右。

水注。口中涌水出。經云肺來乘腎。食後吐水。灸肺俞及三陰交。隨年壯。寫肺補腎。

灸一切注。無新久者。先仰卧。灸兩乳兩邊斜下三寸。名注市。隨年壯。

第二肋間名期門。灸隨年壯。凡中尸者。飛尸遁尸風尸尸注也。今皆取一方治之。其狀皆腹脹痛急。不得氣息。上衝心背。兩脅或踝踊起。或攣引腰脊。灸乳後三寸。男左女右。可二七壯。不止者。多其壯數即愈。

又兩手大指頭。各灸七壯。

乳下一寸。逐病所在灸之。病差止。

一切惡注。氣急不得息。欲絶者。及積年不差者。男左手虎口

文於左乳頭並四指當小指節下間灸之婦人以右手也

大腸病第八 論一首 二十二法

大腸俞主腸中臚脹食不消化灸四十壯

俠巨闕相去五寸名承滿主腸中雷鳴相逐痢下兩邊一處各灸五十壯

治欬嗽法

肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足大谿膽欬刺陽陵泉厥陰欬刺手大陰

嗽灸兩乳下黑白肉際各一百壯即差

又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯

又以繩橫度口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報之三日畢兩邊者口合度也

又灸大椎下數下行第五節下第六節上穴中間一處隨年

壯。并主上氣。

呀嗽灸兩屈肘裏大横文下頭隨年壯。

上氣欬逆。短氣氣滿。食不下。灸肺募五十壯。

上氣欬逆。短氣。風勞百病。灸肩井二百壯。

上氣短氣欬逆。胷背徹痛。灸風門熱府百壯。

上氣欬逆短氣。胷滿多唾。唾血冷痰。灸肺俞隨年壯。千金云五十壯。

上氣氣悶欬逆。咽塞聲壞。喉中猜猜。灸天瞿五十壯。一名天突。

上氣胷滿短氣。灸雲門五十壯。

上氣欬逆。胷痺徹背痛。灸胷堂百壯。忌刺。

上氣欬逆。灸亶中五十壯。

上氣欬逆。胷滿短氣。牽背徹痛。灸巨闕期門各五十壯。

灸欬。手屈臂中有横文。外骨捻頭得痛處二七壯。

又内踝上三寸。絶骨宛宛中。灸五十壯。主欬逆虛勞。寒損憂

恚。筋骨攣痛。又主心中欬逆。泄注腹痛。喉痺。項頸滿。腸痔逆氣。痔血陰急。鼻衄骨瘡。大小便澀。鼻中乾燥。煩滿。狂易走氣。凡二十二種病。皆當灸之也。

論曰。凡上氣有服吐藥得瘥。亦有鍼灸得除者。宜深體悟之。

治淡飲法

諸結積。留飲。澼囊。胷滿。飲食不消。灸通谷五十壯。

又灸胃管三百壯。三報之。

心下堅積聚冷熱。腹脹。灸上管百壯。三報之。

腎病第九　二十四法

對臍當脊兩邊相去各一寸五分。名腎俞。主腎間風虛。各灸百壯。

治小便失精法

灸第七椎兩傍三十壯。

又灸第十椎兩傍三十壯。

又灸陽陵泉陰陵泉各隨年壯。

灸第十九椎兩傍各三十壯。

夢泄精。灸中封五十壯。

男女夢與人交洩精。三陰交灸五壯。喜夢泄。神良。

丈夫夢失精。小便濁難。灸腎俞百壯。

男子陰中疼痛。尿血精出。灸列缺五十壯。失精。五藏虛竭。灸屈骨端五十壯。陰上横骨中央宛曲如却月中央是也。一名横骨。

男子失精。陰上縮。莖中痛。灸大赫三十壯。在俠屈骨端三寸。

男子腰脊冷疼。小便白濁。灸脾募百壯。

男子失精。膝脛疼冷。灸曲泉百壯。

男子失精。陰縮。灸中封五十壯。

第二十二椎。主腰背不便，筋攣痹縮，虛熱閉塞。灸隨年壯。兩傍各一寸五分。

小腸俞。主小便不利，少腹脹滿虛乏。灸隨年壯。

骨髓冷疼。灸上廉七十壯。三里下三寸。

治腰疼法

腰卒痛。去窮脊上一寸。灸七壯。

腎俞。主五藏虛勞，少腹弦急脹熱。灸五十壯。老小損之。若虛冷可至百壯。橫三間寸灸之。腰痛不得動者。令病人正立。以竹杖拄地度至臍。取杖度背脊。灸杖頭處。隨年壯。良。灸訖藏竹杖。勿令人得之。丈夫痔下血、脫肛、不食、長洩痢。婦人崩中、去血、帶下、淋露、去赤白雜汁。皆灸之。此俠兩傍各一寸。橫三間寸灸之。腰痛。灸足跟上斜文中白肉際十壯。

又灸巨陽十壯。巨陽在外踝下。

又灸腰目窌在尻上約左右是。
又灸八窌及外踝上骨約中。

膀胱病第十三　十二法

灸轉胞法

玉泉主腰痛小便不利若胞轉灸七壯。
第十七椎灸五十壯。
又灸臍下一寸。
又灸臍下四寸各隨年壯。
第四椎名厥陰俞主胷中膈氣積聚好吐隨年壯灸之。
俠巠骨相去五寸名水道主三焦膀胱腎中熱氣隨年壯巠骨在臍下五寸巠骨端水道俠兩傍各二寸半。
俠臍傍相去兩邊各二寸半名大橫主四肢不可舉動多汗洞痢灸之隨年壯。

第十五椎名下極俞。主腹中疾腰痛。膀胱寒澼飲注下。隨年壯灸之。

小腸俞主膀胱三焦津液下。大小腸寒熱。赤白泄洞痢。腰脊痛。又主小便不利。婦人帶下。灸之各五十壯。

小腸俞主三焦寒熱。一如灸腎法。

治霍亂法

凡霍亂灸之。或雖未即差。終無死憂。不可逆灸。或但先腹痛。或先下後吐。當隨病狀灸之。內鹽臍中灸二七壯。并主脹滿。

治霍亂轉筋。令病人正合面臥。伸兩手著身。以繩橫兩肘尖頭。依繩下俠脊骨兩傍相去一寸半。灸一百壯。無不差者。肘後云此華佗法。

若先心痛先吐。灸巨闕二七壯。不差更二七壯。

若先腹痛灸太倉二七壯。不差更二七壯。
若先下痢灸穀門。在臍傍二寸。男左女右。一名大腸募灸二
七壯。不止更灸二七壯。
吐痢不禁。三陰三陽但數者。灸心蔽骨下三寸。
又灸臍下三寸。各六七十壯。
霍亂上下吐瀉灸臍下十四壯。
又灸關元三七壯。
手足逆冷。灸三陰交各七壯。不差更七壯。
轉筋灸涌泉三七壯。不止灸足踵聚筋上白肉際七壯。立愈。
又灸慈宮二七壯。
走哺轉筋。灸踵踝白肉際左右各二十一壯。
又灸少腹下横骨中央隨年壯。
轉筋四厥。灸兩乳根黑白際各一壯。

轉筋在兩臂及胷中。灸手掌白肉際七壯。

又灸亶中中府巨闕胃管尺澤。

又灸承筋五十壯。

又灸承山一百壯。

下若不止。灸大都在足大拇指本節內側白肉際各七壯。

若轉筋入腹欲死。四人持其手足灸臍上一寸十四壯四五壯自不動。勿持之。

又中管建里二穴皆主霍亂腸鳴。腹痛脹滿。弦急上氣。鍼入八分。留七呼。寫五吸。疾出鍼。可灸百壯日二七壯。

千金翼方卷第二十七

千金翼方卷第二十八

鍼灸下

消渴第一 論一首 法十二法

消渴咽喉乾，灸胃下俞三穴各百壯，在背第八椎下橫三間寸灸之。

消渴口乾不可忍，小腸俞百壯，橫三間寸灸之。

消渴欬逆，灸手厥陰隨年壯。

消渴口乾，灸胸堂五十壯。

又灸足太陽五十壯。

消渴口乾煩悶，灸足厥陰百壯。

又灸陽池五十壯。

建氏灸消渴法。

初灸兩手足小指頭及項椎，隨年壯。

又灸膀胱俞橫三間寸，灸之各三十壯，五日一報之。

又灸背脾俞下四寸，俠脊梁一寸半二穴，隨年壯。

論曰：灸上諸穴訖，當羮白狗肉作羮汁，飲食不用薑醬豉，可用葱薤隨意。當羮肉，脊汁作淡羮，可食肉。當稍漸進，忌食豬肉，法須二百日乃善。

又灸腎俞二穴，并腰目，在腎俞下三寸，俠脊兩傍各一寸半，以指按陷中。

又關元俠兩傍各二寸一處。

又陰市二穴，在膝上當伏菟上三寸，臨膝取之。

曲泉、陰谷、陰陵泉、復溜，凡此諸穴斷小便利大佳，不損陽氣，亦云止遺尿也。太谿、中封、然谷、太白、大都、趺陽、行間、大敦、隱白、涌泉，凡此諸穴各一百壯。腹背兩脚凡三十七穴，其腎俞、腰目、關元、水道可灸三十壯，五日一報之，各得一百五十壯，佳。涌泉可灸十壯，大

敦隱白行間可灸三壯。餘者悉七壯。皆五日一報之。滿三灸可止

也。若灸諸陰不差。可灸諸陽。諸陽在脚表。宜審用之。無有不驗。造次則并灸腑俞募。按流注孔穴。壯數如灸陰家法。

灸小便數而少且難。用力輙失精。此方萬驗也。令其人舒兩手合掌。并兩大指令齊。急逼之令兩爪甲相近。以一炷灸兩爪甲本肉際。際方後自然有角。令炷當兩角中。小侵入爪上。此兩指共當一炷也。亦灸脚大指與手同法。各三炷。經三日又灸之。此法甚驗。

淋病第二 二十三法

著鹽臍中。灸三壯。

五淋不得小便。灸懸泉二七壯。在内踝前一寸斜行小脉上。是中封之別名。

五淋。灸大敦三十壯。

氣淋。灸關元五十壯。

又俠玉泉相去一寸半。灸三十壯。

勞淋。足太陰百壯。在內踝上三寸。三報之。

石淋。臍下三十六種疾。不得小便。灸關元三十壯。百一云百壯。

血淋。灸丹田。隨年壯。

血淋。灸腹溜五十壯。

卒淋。灸外踝尖七壯。

失禁尿不自覺知。鍼陰陵泉入五分。灸隨年壯。

莖中痛。灸行間二十壯。

屈骨端。主腹中滿。小便數。灸二七壯。小兒以意量之。

不得尿。灸大衝五十壯

失尿不禁法。

灸大敦七壯。　又灸行間七壯。

小兒遺尿。灸臍下一寸半。隨年壯。　又大敦一壯。

尿床灸法

垂兩手髀上盡指頭上陷處灸七壯。又臍下橫文七壯。又灸陰陵泉隨年壯。又足陽明隨年壯鍼入三分。

遺尿鍼遺道入二寸補之在俠玉泉五寸灸隨年壯。

尿血第三 七法

第七椎兩邊各五寸主尿血。

又灸大敦各隨年壯。

虛勞尿血白濁灸脾俞百壯。

又灸三焦俞百壯。

又灸腎俞百壯。

又灸章門百壯。

尿黃灸石門五十壯。

水病第四 一十五法

灸足第二指上一寸。隨年壯。
又兩手大指縫頭各灸七壯。
虛勞浮腫。灸太衝百壯。
灸腎俞百壯。主百病水腫。
灸胃倉隨年壯。
水腫。灸陷谷隨年壯。
水腫氣上下。灸陰交百壯。
水腫脹。灸曲骨百壯。
大腹。灸陰市隨年壯。
人中滿。脣腫及水腫。大水。灸臍中石門各百壯。
風水。灸上廉隨年壯。
水腫不得臥。灸陰陵泉百壯。
石水。灸然谷氣衝四滿章門。

水分。主水腫脹滿不能食堅硬。灸日七壯。至四百即止。忌鹹。鹹水出盡即死。水病灸至差止。在下管下一寸。

鼓脹灸中封二百壯。

癰疽第五 七法 論一首

卒疽著五指。急不得屈伸。灸踝尖上數壯。亦可至一百壯。

凡卒患腰腫。胕骨腫。癰疽節腫。風遊毒熱腫。此等諸疾。但初覺有異。即急灸之。立愈。遇之腫成。不須灸。從手掌後第一橫文後兩筋間。當度頭灸五壯。立愈。患左灸右。患右灸左。當心胸中者灸兩手俱下火。

丁腫在左。灸左臂曲肘文前。取病人三指外於臂上處中灸之。兩筋間。從不痛至痛。腫在右從右灸。不過三四日差。

又灸掌後橫文後五指。男左女右七壯。即驗。已用得效。

論曰。丁腫灸法稍多。然此一法亦甚效驗。出於意表也。

癮㾼灸曲池二穴。隨年壯。神良。

頭痛癮㾼。灸天窗七壯。

白癜白駁浸淫癧瘍著頭及胷前。灸兩乳間。隨年壯。立差。

痔漏第六　十八法

鍼漏法。

少海。在臂曲側肘內橫文頭屈手向頭取之。主腋下瘰癧漏臂疼。屈伸不得。風痹瘻漏。鍼入三分。留七呼。寫五呼。

鍼癧瘰。先拄鍼皮上三十八息。推鍼入內之。追核大小。勿出核。三上三下。乃拔出鍼。

灸漏法。

頸漏。灸天池百壯。穴在乳後一寸。腋下著脅。直腋屈肋間。

又灸兩耳後髮際直脉七壯。

又灸背後兩邊腋下後文頭。隨年壯。

又灸心鳩尾下宛宛中七十壯。

又內胯內有患癧處宛宛中百壯。

又灸章門臨泣支溝陽輔各百壯。

又以艾炷繞四畔周帀灸七壯即止。

又灸肩井隨年壯。一云二百壯。

諸惡漏中冷息肉出灸足內踝上各三壯二年者六壯。

鍼痔法。

長強在窮脊骨下宛宛中主下漏五痔甘䘌食下部鍼入三寸伏地取之以大痛爲度灸亦良不及鍼灸日三十壯至七日止特忌房室。

鍼足太陰穴在內踝上一夫一名三陰交亦主大便不利鍼入三分。

飛揚商丘復溜勞宮會陰承筋扶承委陽委中並主之。

灸腸癰法。

屈兩肘正尖頭骨。各灸百壯。則下膿血者愈。

灸乳癰妬乳法。

灸兩手魚際各二七壯。斷癰脉也。

又以繩橫度口。以度從乳上行。灸度頭二七壯。

指忽掣痛不可忍。灸指端七壯。

脫肛第七　四十法

灸尾翠骨七壯。立愈。主脫肛神良。

又灸臍中隨年壯。

灸瘻法。

灸風池俠項兩邊兩穴耳上髮際百壯。又大惟百壯。大椎兩邊相去各一寸半。小垂下各三十壯。又頸衝在兩伸手直向前。令臂著頭對鼻所住處。一名臂臑。灸隨年壯。凡五處共九穴。又垂兩手兩

腋上文頭各灸三百壯。鍼亦良。

灸癭。肩髃左右相宛宛中。男左十八壯。右十七壯。女右十八壯。左十七壯。再三。以差止。

癭。上氣短氣。灸肺俞一百壯。

癭。上氣胸滿。灸雲門五十壯。

癭惡氣。灸胸堂百壯。

又灸天府五十壯。

又灸大椎橫三間寸灸之。

又灸衝陽隨年壯。在肘外屈橫文外頭。(據此是曲池穴衝陽在足趺上五寸)

癭。灸天瞿三百壯。橫三間寸灸之。

癭氣面腫。灸通天五十壯。

癭。灸中封隨年壯。

灸癲卵法。

以蒲横度口如横折之一倍增之以布著少腹横理令度中央上當臍勿令偏僻灸度頭及中央合三處隨年壯好自養勿勞動作役大言大怒大笑

又牽陰頭正上行灸頭所極牽向左右髀直下行皆倣此隨年壯

又灸足厥陰在右灸左在左灸右各三壯厥陰在足大指本節間

男癩有腸癩卵癩氣癩水癩四種腸癩卵癩難差氣癩水癩鍼灸易差卵偏大入腹灸三陰交隨年壯在内踝上八寸

又肩井肩臂接處灸隨年壯

又灸關元百壯

又灸手小指端七壯在左灸右在右灸左

癩卵偏大灸玉泉百壯報之

又灸泉陰百壯三報之在横骨邊三寸

凡癩病陰卒腫者令並足合兩拇指爪甲相並以一艾炷灸兩爪

端方角上七壯。

陰腫欲潰困灸足大拇指本節横文中五壯。

又灸足太陽五十壯報之。

又灸足太陰五十壯在內踝上一夫。

又灸大敦在足大指三毛中隨年壯。

又灸足大指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗若雙癩灸兩處

又横骨兩邊二七壯俠莖灸之。

又足大指下理中十壯隨腫邊灸之神驗。

小兒癩先時將兒至碓頭呪之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一灸訖便牽兒令雀頭向下著囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已用有驗艾炷如蝟簪頭大。

凡男癩當騎碓軸以莖中置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯即愈。

匈腫如瓜。入腹欲死。灸足大指下横文中。隨年壯。

灸汗法。

多汗寒熱。灸玉枕五十壯。鍼入三分。

多汗瘧病。灸譩譆五十壯。

盜汗。寒熱惡寒。灸肺俞隨年壯。鍼入五分。

又灸陰都各一百壯。鍼入八分補之。穴在俠胃管相去三寸。

多汗。四肢不舉。少力。灸横文五十壯。在俠臍相去七寸。

又灸長平五十壯。在俠臍相去五寸。不鍼。

卒死第八　十三法

鍼間使百息。　又灸人中。

灸魘不覺法。

灸兩足大指聚毛中二十一壯。

治卒忤法。

灸人中三十壯。又灸肩井百壯。

又灸間使七壯。又灸巨闕百壯。

又灸十指爪甲下各三壯。

治鬼擊法。

夫鬼擊之爲病，卒著人如刀刺狀，胷脅及心腹絞切急痛，不可按抑，或即吐血，或即鼻中出血，或下血，一名鬼排，灸人中一壯，立愈，若不止，更加灸臍上一寸七壯，又灸臍下一寸三壯。七一云壯

中惡，灸胃管五十壯。

治蛇毒，灸毒上三七壯，無艾，以火頭稱瘡孔大小爇之。

治熱暍，灸兩乳頭七壯。

治狂犬咬人，令人吮去惡血盡，灸百壯，已後日日灸，一百日乃止。差，血不出，慎酒猪肉，一生慎之。

雜法第九

用鍼法。

凡用鍼者。虛則實之。滿則泄之。宛陳則除之。邪勝則虛之。大要徐而疾則實。疾而徐則虛。言實與虛。若有若無。察其後先。若存若亡。爲虛爲實。若得若失。虛實之要。九鍼最妙。補寫之時。以鍼爲之。重則爲補。輕則爲寫。雖有分寸。得氣即止。明堂偃側。鍼訖皆無不灸。

凡病皆由血氣擁滯。不得宣通。鍼以開導之。灸以溫煖之。灸已好須將護。生冷醋滑等。若不謹慎之。反增疾矣。

黃帝曰。五藏五行五時。病何以故。歧伯曰。假令春月和暢。條芳水淥。心盪意盈。神亂於內。而形病於外。卒有西方飄風凛然毛聳。因腠理開。不復得散。便居孫脉。孫脉滿流。入絡脉。絡脉入大經。大經注府。府歸藏。四時同然。故風病多歸於心也。手心主灸刺血出多。令人心驚。三里刺入四分。令人氣上。涌泉刺深殺人。陰交灸多絶孕。

凡諸孔穴名不徒設。皆有深意。故穴名近於木者屬肝。穴名近於神者屬心。穴名近於金玉者屬肺。穴名近於水者屬腎。是以神之所藏。亦各有所屬。穴名府者。神之所集。穴名門戶者。神之所出入。穴名舍宅者。神之所安。穴名臺者。神所遊觀。穴名所主。皆有所況以推百方。庶事皆然。穴名五藏。穴關脾。

凡孔穴者。是經絡所行往來處。引氣遠入抽病也。故經云。灸三壯者。即爲足數也。

禁忌法

凡灸頭與四肢。皆不欲少。須熟。宜令灸。計壯蒲三百。足以愈病。頭手足肉薄。若併灸。則血氣絕於下。宜時歇火氣。少時令血氣遂通。使火氣流行。積數大足。自然邪除。疾差也。乃止火耳。本經多云。剌入三分。灸三壯。茲乃舉其大綱。未盡聖心。且手足皮薄。炷小數少。腹背肉厚。炷大壯多。斯皆以意商量也。背欲熟。即爲佳也。凡灸生

熟候人盛衰老少肥盛灸之。

凡微數之脉及新得汗後並忌灸。

凡孔穴皆逐人形大小取手中指第一節為寸男左女右一云三寸者盡一中指也人年三十以上若灸頭不灸三里穴令人氣上眼闇所以三里穴下氣也。

一切病皆灸三里三壯每日常灸下氣氣止停也。

凡灸法先發於上後發於下先發於陽後發於陰凡鍼刺大法在午時後不欲午時前。

治冷痺脛膝疼腰脚攣急足冷氣上不能久立有時厭厭嗜臥手脚沉重日覺羸瘦此名復連病令人極無情地常愁不樂健忘嗔喜有如此候即宜灸之當灸懸鍾穴在足外踝上三指當骨上各灸隨年壯一灸即愈不得再灸也取法以草從手指中文橫三指令至兩畔齊將度外踝從下骨頭與度齊向上當骨點之兩脚令

三姓人灸之。候天晴日。午後在門外四達道上灸之。神良。若年月久更發。依法更灸。若意便欲多者。七日外更灸七壯。

巨闕可百壯。　上管可二百壯。　中管可千壯。　下至五百壯。

下管可百壯。　中守可一百壯。　陰交可三百壯。　中極可五百壯。

大椎可三百壯。　風門可二百壯。　魂門可五壯。　陽綱可五壯。

意舍可百壯。　肓門胞門可各一百壯。　懸樞可五壯。

命門可七壯。　白環俞可三壯。又云壯。　心俞　肝俞　肺俞

脾俞　腎俞　小腸俞　膽俞　大腸俞　胃俞　膀胱俞

三焦俞　膈俞

右五藏六府俞。皆得滿一百壯。

肺募中府。　心募巨闕。　肝募期門。　膽募日月。

脾募章門　腎募京門　小腸募關元　三焦募石門。

大腸募天樞。　膀胱募中極。　胃募中管。

右五藏六府募。亦得滿百壯。

鳩尾三十壯。三報之。　巨闕五十壯。　上管　胃管　建里　下管　水分

臍中各五十壯。三報之。　陰交　氣海　石門　關元五十壯。

中極五十壯。

右從鳩尾下第一行皆得百壯。以此爲大率。自外諸穴。或中病

乃止。或取隨年壯。以意商量也。

頭維　腦戶　風府　絲竹空　下關　耳中　瘈脉　人迎

瘖門　承泣　經渠　脊中　氣衝　鳩尾　地五會　陰市

陽關　乳中　泉腋　伏菟　承光　天府　白環俞　石門女人忌灸

右二十四處禁不可灸。大忌。

上關　左角　乳中　鳩尾　五里　承筋　復溜　顱息

缺盆　臍中　神庭　雲門　伏菟　三陽絡　然谷

右十五穴禁不可刺。大凶。

王枕　維角　睛明　舌根　結喉　胡脉　天窻　神符

巨覽（一作覺）　血海　足太陰　丘墟

右十二穴。無病不可灸刺。

鍼灸宜忌第十

論曰。凡欲灸鍼。必先診脉。知醫須看病者行年。本命禍害絕命生氣所在。又須看破除開日。人神取天醫。若事急卒暴不得已者。則不拘此也。既得吉辰當知忌穴。乃以繩量依圖朱點并疏患穴及壯數。然後用心乃療之。則無不愈矣。其分寸法。取病人男左女右手中指第一節爲寸。宜忌等列之如左。

治病服藥鍼灸法訣。

凡鍼灸服藥。皆須審知病人生年月日。推其行年遊宮。生氣絕命訖。乃處斷之。

舊法男避除。女避破。又男忌戊。女忌己。

假令木命人行年又在木。則不宜鍼及服青色藥。
火命人行年又在火。則不宜發汗及服赤色藥。
土命人行年又在土。則不宜吐及服黃色藥。
金命人行年又在金。則不宜灸及服白色藥。
水命人行年又在水。則不宜下及服黑色藥。
凡醫者不知此法。下手即困。若遇病人年命厄會深者。下手即死矣。
凡入月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日治病。令人長病。
戊午甲午此二日大忌。鍼刺出血服藥及灸。不出月凶。
甲辰庚寅乙卯丙辰辛巳。此日灸刺大凶。
壬辰此。一日大忌鍼灸。
甲辰巳巳丙午丁巳。此日男子特忌鍼灸。

甲寅乙卯乙酉乙巳。此日女人特忌鍼灸。
丙子壬子甲子丙辰丁巳辛卯癸卯乙亥。以上日切忌鍼灸。
立春春分脾。　立夏夏至肺。　立秋秋分肝。　立冬冬至心。
四季十二日後腎。　右以前日並不得治療，凶。
凡五藏王時不得治及鍼灸其經絡，凶。
凡春左脅。　秋右脅。　夏臍。　冬腰。　以上人神皆不宜鍼灸。
凡五辰五酉五未等日及八節先一日後一日，皆不得鍼灸。
建日申時頭。　除日酉時膝。　滿日戌時腹。　平日亥時腰背。
定日子時心。　執日丑時手。　破日寅時口。　危日卯時鼻。
成日辰時脣。　收日巳時足。　開日午時耳。　閉日未時目。
右件其時並不得犯其處，殺人。
一日足大指。　二日外踝。　三日股內及腳腨。　四日腰及髀。
五日口齒舌根咽懸癰及足指。　六日手小指少陽及臍下。　七

日内踝。八日足腕。一云脚。九日尻尾手陽明。十日腰眼及足拇指。十一日鼻柱及眉。十二日面髮際。十三日牙齒。十四日胃管咽喉足陽明。十五日遍身。十六日胷乳。十七日氣衝及脅。十八日股内及脳腸。十九日足趺足下及項。二十日膝以下。一云內踝及腨。二十一日手舌足小指。二十二日伏兔外踝。一云胷膺中。二十三日肝俞足趺兩腋。二十四日足陽明兩脅及小腸。二十五日足陽明心腹。一云膝足。二十六日手足胷。二十七日膝内踝。一云膝肩膺腨下及兩足并陰囊中。二十八日内踝玉莖。一云陰中。及耳頰。二十九日膝頭顳顬兩手足。三十日關元下至足。一云足趺上及頰膝頭。又云遍身。

右人神並須依之吉。

肝神丁卯。心神庚辰。肺神癸酉。腎神庚子。脾神戊己。

此五神之日。特須避之餘日不假避諱也余以此論爲得之近

矣。必須依而行之。餘者猥碎。徒費辞難。領固非君子之言。諸忌之法以施俗士。通人達道。豈拘此哉。

月忌	血忌	月厭	四激	月殺	月刑	六害	天醫
正	丑	戌	戌	丑	巳	巳	卯
二	未	酉	戌	戌	子	辰	寅
三	寅	申	戌	未	辰	卯	丑
四	申	未	丑	辰	申	寅	子
五	卯	午	丑	丑	午	丑	亥
六	酉	巳	丑	戌	丑	子	戌
七	辰	辰	辰	未	寅	亥	酉
八	戌	卯	辰	辰	酉	戌	申
九	巳	寅	辰	丑	未	酉	未
十	亥	丑	未	戌	亥	申	午
十一	午	子	未	未	卯	未	巳
十二	子	亥	未	辰	戌	午	辰
	忌鍼灸	忌鍼灸	忌鍼灸	忌鍼灸千金法不同	忌鍼灸	忌鍼灸	宜尋醫取藥呼師

右呼師宜天醫上來療病吉。若刑害上來及鍼灸大凶。

又行年天醫法。

人年至子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

天醫卯戌子未酉亥辰寅巳午丑申。

推歲天醫法。

常以傳送加大歲太一下爲天醫。

推月天醫法。

陽月以大吉。陰月以小吉。加月建功曹下爲鬼道。傳送下爲天醫。

避病法。

以小吉加月建登明下爲天醫。

療病法。

以月將加時天醫加病人年上療之。差。

日天醫法。

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。　天醫卯亥丑未巳。

行年人神所在法。

年一歲。十三。二十五。三十七。四十九。六十一。

七十三。八十五。神在心辰。
年二歲。十四。二十六。三十八。五十。六十二。
七十四。八十六。神在喉卯。
年三歲。十五。二十七。三十九。五十一。六十三。
七十五。八十七。神在頭寅。
年四歲。十六。二十八。四十。五十二。六十四。
七十六。八十八。神在肩丑。
年五歲。十七。二十九。四十一。五十三。六十五。
七十七。八十九。神在背子。
年六歲。十八。三十。四十二。五十四。六十六。
七十八。九十。神在腰亥。
年七歲。十九。三十一。四十三。五十五。六十七。
七十九。九十一。神在腹戌。

年八歲。二十。三十二。四十四。五十六。六十八。
八十。九十二。神在頭酉。
年九歲。二十一。三十三。四十五。五十七。六十九。
八十一。九十三。神在足申。
年十歲。二十二。三十四。四十六。五十八。七十。
八十二。九十四。神在膝未。
年十一歲。二十三。三十五。四十七。五十九。七十一。
八十三。九十五。神在陰午。
年十二歲。二十四。三十六。四十八。六十。七十二。
八十四。九十六。神在股巳。

十日人神所在。

甲日在頭。乙日在項。丙日在肩臂。丁日在胸脅。戊日在腹。
己日在背。庚日在膝。辛日在脾。壬日在腎。癸日在足。

十二日人神所在。

子日在目。　丑日在耳。　寅日在胷。一云面及口。

卯日在鼻。一云在脾。　辰日在腰。　巳日在手。一云在頭口。

午日在心腹。　未日在足。一云兩足心。　申日在頭。一云在肩額，又云在腰。

酉日在背。一云在脛。　戌日在頸。一云在咽喉。　亥日在項。一云在臂頸，又云兩膝。

十二時人神所在。

子時在踝。　丑時在頭。　寅時在耳。一云在目。

卯時在面。一云在耳。　辰時在項。一云在口。　巳時在乳。一云在肩。

午時在胷脅。　未時在腹。　申時在心。

酉時在膝。一云在背脾。　戌時在腰。一云在陰左右。　亥時在股。

右件人神所在，血不可鍼灸損傷，慎之慎之。

千金翼方卷第二十八

千金翼方卷第二十九

禁經上

論曰夫清濁未分無間昏曉玄黃肇判乃見溫涼四時攸分降生寒暑三光照爛日昃虧盈人禀五常腠理通塞故老子曰吾所以有人患者為吾有身及吾無身吾有何患由此觀之形質既著則痾瘵興焉靜言思之惟無形者可得遠於憂患矣夫天地聖人尚不能無患況如風燭者乎古有調針切脉之君嘗藥鍊石之帝憂勞庶類不遑寧處者亦以衆矣自時厥後窮神極智之士抽心盡思之賢相與贊成其業者不可勝紀是以醫方千卷未盡其性故有湯藥焉有鍼灸焉有禁呪焉有符印焉有導引焉斯之五法皆救急之術也何者病起無端醫療萬品閭閻之內猶有夭枉之哀朝野之中尚致膏肓之疾誠可悲夫方今醫者學不稽古識悟非深各承家技便為洞達自負其長競稱彼短由斯對執卒不得挹

其源流也。余早慕方技。長崇醫道。偶逢一法。豈信千金。遂使名方異術。莫能隱秘。且此書也。人間皆有。而其文零疊。不成卷軸。縱令有者。不過三章兩章。既不專精。探其至賾。終為難備。斯之一法。體是神秘。詳其辭采。不近人情。故不可得推而曉也。但按法施行。功效出於意表。不有所緝。將恐零落。今編為兩卷。凡二十二篇。名曰禁經。其於條例。後科詳悉。博雅君子。無或隱焉。

持禁齋戒法第一

神仙經曰。凡欲學禁。先持知五戒十善八忌四歸。皆能備治此者。萬神扶助。禁法乃行。

五戒者。

一曰不殺。　二曰不盜。　三曰不淫。　四曰不妄語。

五曰不飲酒嫉妬。

十善者。

一濟扶苦難。二行道見死人及鳥獸死者皆埋之。
三敬重鬼神。四不行殺害起慈愍心。五不憐富憎貧。
六心行平等。七不重貴輕賤。八不食酒肉五辛。
九不淫聲色。十調和心性不乍嗔乍喜。

八忌者。

一忌見死屍。二忌見斬血。三忌見產乳。四忌見六畜產。
五忌見喪孝哭泣。六忌抱小兒。七忌共女人同牀。
八忌與雜人論法。

四歸者。

一不得著穢汚不淨潔衣服即神通不行。
二不得惡口呪詛罵詈。三不得共人語詐道稱聖。
四不得飲酒食肉殺害無道。
又云不得穢處誦禁文。又云不得與不信人行禁。

又不得向人說禁法。又不得穢汚手執禁文。

又不得與雜人諠戲。又不得輕說神明。

又不得嗔打六畜及人。不得乘車馬。

有犯此滿三事。則禁道不行。能不犯者。其禁大驗。

經曰。若覆城邑汚穢者。當用此方。

竹葉拾兩　桃白皮肆兩　柳白皮肆兩

右三味。以水壹石貳斗。煑之一沸。去滓。浴身。百穢消除。又辟溫瘴瘧癘。此法天仙下游既返之日。未嘗不用此方解穢也。至於符水咒漱及外舍之近術。皆不及此方。若能常用此湯澡浴者益佳。惟不可洗目也。

紫微王夫人勑水洗目得清淨法。

呪曰。濁不穢形。死不妨生。摩掌薰目。三遍。令我長生。青龍在吾左。白虎在吾右。朱雀在吾前。玄武在吾後。神禁勑水。除塵垢。急急如

律令。一法解穢禁水曰。東流之水滑如苔。中有主君與三台。某甲汚穢蕩除。急急如律令。

受禁法第二

神仙經曰。陽道強堅而易歇。陰道微軟而久長。聖人閉口。萬物可藏。迴轉清白。改易陰陽。應言不言。神明相傳。應語不語。神明相與。故萬法閉口。藏身之禁法流行。五藏神明。衆人游戲。而我獨住。衆人浩浩。而我獨靜。衆人言說。而我獨嘿。此行禁之道畢矣。

仙經曰。凡受禁之法。當先齋戒百日。精心不行淫慾。惟得清淨沐浴。著鮮淨衣。口常不出惡言罵詈。精思靜念。勿生異想。一如前章。仍更七日之中閉口。不共人語。乃可受之。

正月一日。 三月三日。 五月五日。 七月七日。 九月九日。

三年之中。三遍於此月日受之。并一心持齋戒不犯。則行禁其驗如神。

正月一日受法。

正月一日平旦寅時。清淨澡漱。在無人清淨之處。著鮮淨衣。不得令人輒見。燒衆名香。正面向東。禹步三匝。勿迴轉。長跪讀啓度文曰。上啓三師神童王女天醫盧醫一切諸師太上老君諸仙神王日月五星二十八宿北斗三台諸神仙官屬諸大神王咸知弟子某甲受持符禁之法。願濟拔衆生苦難。除毒消邪。辟却奸惡。萬事如勑急急如太上老君律令。

都受禁文曰。

想東方木禁在吾肝中。　想南方火禁在吾心中。

想西方金禁在吾肺中。　想北方水禁在吾腎中。

想中央土禁在吾脾中。

想左青龍右白虎前朱雀後玄武。天師禁駕。無事不苦。東王公西王母。道吾禁有隨當止。急急如太上老君律令。訖。還誦所得禁文

各三遍。禮一十二拜。仍更七日。勿共人作一言及惡罵詈等語。七日勿洗手。

三月三日受法。

三月三日平旦寅時。至東流水上。正面向東立。端心正意。讀前啓度文如正月法。并啓江河四瀆一切水官四海大龍王。願知弟子某甲受持禁法。願大神王立契。訖誦所得禁文各六遍。禮九拜。

五月五日受法。

五月五日日正中午時。在靜處燒香。正面向南立。讀啓度文。訖誦所得禁文各三遍。禮十二拜。

七月七日受法。

七月七日雞鳴丑時。在靜處燒香。正面向西立。讀啓度文。訖誦所得禁文各三遍。禮七拜。

九月九日受法。

九月九日人定亥時。在靜處正面向北立。盆盛水。口銜刀。讀啓度文投香火長跪。誦所得禁文各三遍。禮九拜。此五日處法。用一如正月法。惟所向方及拜數不同耳。

太白仙人受法。

四月一日齋戒至八日。立道場四面懸幡。盡燒香。然燈。啓醮五方五帝五方禁師五方吞精啖毒夜叉神王。願知弟子某甲受持禁法。既訖。誦所得禁文各三遍。七日齋戒。

同力受禁法。

候初雷時。舉目看雷。右手把刀。以左手摩之。呪曰。助我行禁。振聲如雷吼。萬毒伏閉氣。待雷聲盡。訖七日齋戒。不出言。一本云。候初雷時。眼所見物。隨便把取。唱言聲如雷。萬邪皆怖畏。待雷聲盡。乃棄之。一云。口銜刀。手捉大斧。摩之。言。口如毒。手如毒。聲如雷吼。云云。

神仙王受禁法。

候鷩初來時。仰頭看之。以手按地云。口如毒。以鷩去不見乃止。此等潔淨齋戒。一如正月不別乃至七日不洗手。

天帝太一受禁法。

初受禁時。在寂靜無人之處。敷坐。設案燒香。正面向北。閉口並足正立。左手持刀。依式思存。青龍在左。白虎在右。朱雀在前。玄武在後。北斗七星覆頭上。柄指前。次思東治大禁師願持兵萬石趙侯驃騎大將軍蘇平南公八部將軍七十二禁師陳師趙師直符小吏直日童子護直今日。不得以左為右。以前為後。若有倒錯。即依使者法律科罪之。急急如律令。如此陰念三遍。然後禹步三匝至香火前。叩齒三遍。呪曰。東方青龍銜水來。南方赤龍銜水來。西方白龍銜水來。北方黑龍銜水來。中央黃龍銜水來。悉投杯中。三台三台。此水非常水。洗除天穢地穢。三十六穢。某甲身穢淨除之。急急如律令。三遍呪訖。以水洗目。并噀四方上下。餘水自飲之。洗腹

内令淨想。又讀前啓度文。然後長跪誦所得禁文。各三遍訖。禮四方各再拜。即成神驗。刀子水盆不得用曾經酒肉五辛者。

又一法。

正月一日。東方明星出時洗浴。在清淨無人之處。白茅爲藉。置坐設案燒香。以井花水洗面目。正面東向。並足立。先舉左手呼青龍。次舉右手呼白虎。前行呼朱雀。後行呼玄武。訖。依前左手持刀。次第思神師。日符禁同法。更無別法也。若欲受符印者。以帛若袋子盛挂著左手指向之。而擎水盆閉氣。禹步依法次第呪請。有效也。

七星受呪法。

正月一日。　三月三日。　五月五日。　七月七日。　九月九日。

先以香湯洗浴。取東流水。未經用瓦器盛之。以誦所得禁文呪一遍。受人自洗浴。於曠野無人之處。以淨草爲坐。以瓦器盛水七盞。作七星形。北向。云謹啓七聖真君。弟子某乙願持禁法。禁斷邪惡

鬼毒之氣。救理人民。伏願降真氣。流布臣身。令臣所行符禁應聲除差。應手除愈。次第欲前件水各少許。餘洗手。不得手捻不淨之物。即有大驗。一云七佛呪法下又有一觀自存呪法。今並不取。

黃帝越禁受法。

黃帝曰。凡受符禁者。皆清淨齋潔百日。不得近死亡產乳房室。三年之中三度。 正月一日。 三月三日。 五月五日。 七月七日。 九月九日。 以夜衆星之下。置神座設案。燒香。盆盛水臨刀。北面叩齒捻三師目。次第思神訖。禹步三匝。長跪讀咨度文。又誦所得禁文各三遍。神驗。水盆不得用曾盛酒肉五辛者。臨欲越時。朱書帛素上。左手持之捻目陰誦呪之。欲行禁時。閉氣朱書帛素上。右手持之捻目陰誦呪之。

雜受禁法第三

正月一日日未出寅時。 三月三日寅時。

五月五日午時。七月七日丑時。九月九日寅時。一云丑時。
正月受一年用。三月受一春用。五月受一夏用。
七月受一秋用。九月受一冬用。
右年年常依此日受之法。不得飲酒食肉五辛芸薹乳酪酥蜜。
心如藥王藥上願救護一切衆生。不作艱難。不求財物。但作此
心下口即差。萬不失一。受法用前月日。先以清淨井花水沐浴。
上下衣服一切鮮淨清齋七日。至其日。先以井花水澡浴漱口。
燒香禮五方五帝各五拜訖。正面向東燒香。端立淨器盛井花
水置傍。誦所得禁文各二七遍訖。口含水仰噀五方。承取洗手
面訖。向東方吸青氣想入口中七吸。次向南方吸赤氣。次向西
方吸白氣。次向北方吸黑氣。次吸中央黃氣。皆作七吸入腹想
訖。更禮五方各五拜訖。後作兩月持齋戒作得禁想。不得作一
切諸惡行受訖。即成禁法。器物不得用曾經盛酒肉五辛者。

受禁腫法

古塚北桑樹陰內有艾者五月五日平旦日未出時從塚北向南步取五十四步至艾作禹步北斗七星訖還閉氣將取艾葉拭手使汁入手中七日勿洗手持齋過七日以外即成禁五十四步之中標記使分明一步七尺登取艾時面向西方呪願我此手一切癰腫一切諸毒乃至一切病手著即差作法訖還勿反顧受時以五月四日作齋標記步數亦四日使記先從艾東置魁因北向爲尾向北五十四步作標記五日旦從北向南步之作法了齋至十一日上桑樹在塚北從地三尺於塚上生者佳亦於四日在塚東宿五日旦即作法禹步法閉氣握固若治病時作想此手作熱鐵又想前人病如雪手著病即散又治病時常在病人生氣上若病人頭面上有浮腫不得頻治使盡即傷人必當留少許明日更治此法大業六年琅邪郡莒縣令梁閤送擅持山善寂道場靈法師

所行。神驗不傳。

受禁瘧法。

候瘧初來時。以紙一張。濃點筆於紙上。望瘧與點瘧沒乃止。後若瘧病人來。向回我患瘧。即語我與你治。你但去。陰押取一點。塞壁孔中。即愈。

又法 正月元日呼牛馬時。火下將筆。閉氣多書紙上作鬼字。氣盡乃止。瘧病欲發時。押取一鬼字與吞之。即差。

受禁腫都禁法。

正月元日東方動時。以淨席一領。於寂靜無人之地。以井花水沐浴漱口三遍。手持香炷。禮五方五帝君。呪願曰。弟子某甲今日受天神呪願。救一切衆生苦。四方各禮三拜。訖。想取東方青氣入口蒲七咽。南方赤氣。西方白氣。北方黑氣。中央黃氣。等各七咽。訖。向南東方閉氣誦呪。各七遍。七日持齋戒呪曰。天之所圓。地之所方。受天神符。可以長生。二十八宿。其色亭亭。五色变化。與符合并急

急如律令。次呪曰。無根肉本生無留停。大腫如山小腫如粟。登高山臨海水。旦起生。向暮死。急急如律令。

須紫檀杷刀子。以刀杷按腫上。其腫疼痛用前禁文。若不疼痛用此禁禁之。然此二禁皆是正禁腫文。凡是惡腫皆用此二文。其大腫日別四五度禁。五日差。小者當日差。

大總禁法。

呪曰。朝日不良。爲物所傷。上告天公。下告地皇。地皇天人教我禁瘡。仙人持水。王女持漿。一唾止毒。二唾止瘡。三唾已後平復如常。天雷焉鳴。瘡亦不驚。天雷地動。瘡亦不恐。皮相連。肉相當。不疼不痛。不腫不膿。急急如律令。用法以刀子一枚。先吸一口水。捻臨著口中和水噀病上。若小兒驚恐。當噀地上二三過。馱唾病上。以口附近病上誦禁。每一遍三唾。每七遍一遍鹽水漱口。三七遍成一禁也。若不差。多加遍數。取差爲限。若百遍不差者。此病大重不可

救也。慎勿與治。

禁時氣病法。

頭痛以刀隱痛處。唾禁如前緣。但有患疼痛處。皆用刀背隱而禁之。若金瘡從高墮下。六畜狼虎毒蛇所傷。手足卒攣躄。凡百一切痛苦不如意處。並用此法禁呪之。悉得除愈。不可具載。男女並得受持。

論曰。此之雜法。由禁師不能具美大法。所以須受輕法。易者約者。若受大法。此亦不須。

禁法大例第四

論曰。用禁大例。誦禁文必不得出聲。令自耳聞聲。若聞之。呪即禁法不行。之無益。慎之慎之。受禁之時。不得令人畜等一切見之。見之即不成。受法時刀及水盆皆不得曾經酒肉五辛用者。

神仙經曰。對治禁萬病擊同類。

逢水難。土王擊之。逢土難。木王擊之。
逢刀難。陽精擊之。逢鬼難。桃湯擊之。
逢虎難。五常氣擊之。萬病擊同類對治。皆持刀持桃持火持鑪持水持繩持藥持符持戟持弓持箭持弩持食持坐持粉持意持神持想持氣持畫持石持土持鹽持幡持脂持肉持血持麪持金持玉持印。故其法皆禁擊之。所須用禁之法。有請有告有祭。有害（善神即飲食祭之誑之　惡鬼即煞之却之）有殺有畏有愛有喜有惡有死有走有任有滅。是故對治用時各各條列。

仙經曰。用禁有六法。一牙齒禁。意存氣至牙齒。二營目禁。開一日閉一目。三意想禁。存意以去想諸疾以除。四捻目禁。謂手上有一十五日。五氣道禁。謂吹呼呵噓嘻呬。六存神禁。存諸神在以食醮祭之。感天靈氣至。又鳴天鼓。叩齒是也。

凡爲人請療疾。出門三步呪曰。

天殺黃黃地殺正方。千鬼萬神誰復敢藏。飛步一及。百鬼滅亡。急急如律令。

若至主人家。先當解穢。即作五龍水法。手持水椀呪曰。

東方青龍含水來。　南方赤龍含水來。

西方白龍含水來。　北方黑龍含水來。

中央黃龍含水來。

五方五龍吐水没殺邪鬼。急急如律令。訖叩齒三百遍。

呪曰。神水解天穢地穢生穢死穢人穢鬼穢身穢病人之穢。速除去之。立令清淨。急急如律令。三噓三叱。以刀右攪三迴。以右足跟蹴地三下。含水四方噴之。及噴病人上。盡令清潔。然後按法思神行禁。又存氣至牙齒。令住閉一日。存意已去。即捻目。然後用存七星在其頂上。存青龍白虎朱雀玄武來護身。存大神在其前後。五星存之腹內。吐氣存如雲氣。擊彼處。令如徐行。行步法乾坤。如此行

按節。次邪不入五藏。神明自通。仍皆須審之。萬不失一。又法欲向病人家。當須存想作白虎吐火燒病人家屋舍。皆令湯盡。又作龍舐病人身肉。令盡還。作充滿悅懌。然後用氣急治之。欲擊物一一皆如是。此令行禁神明萬物。皆神效驗。須精審之。若唾熱病。以冷氣吹之二七。然後禁之。若唾冷病。以熱氣呵之二七。然後禁之三唾之。後行禁。禁後三唾乃放之。

仙經曰。受符禁同法。先當脩身潔己。安魂定魄。口勿妄言。齋戒百日。可致神仙。避逆惡氣。除滅災祥。可以長生。

掌訣法第五

天師曰。若欲修之。先持齋戒。一如正月法。斷口味。絕房室。先取龍骨烏頭附子皁角各一兩。以水三斗。煑取二斗。遍身澡浴。有餘者明日更洗手面。訖。以盆盛水燒香。禹步三匝。口銜刀北面長跪讀前啓度文訖。誦所得禁文各三遍。一依正月戒忌。即成神驗。

天師曰。得吾法者。上士昇仙。下士遷官。庶人得之益壽延年。父子兄弟不得相傳。傳必賢人。非賢勿傳。殃及子孫。

又受禁法。

呪曰。女口含文一日誦七遍。七日止。

凡禁病大例。禁一切病。先須口嚼楊枝。去口中穢氣訖。又嚼鹽乃呪唾之。若犯一切口味者。即燒牛糞灰淋取汁飲漱服之。此除腹中諸穢。并作解穢符水法。還得清淨。此是掌訣解穢法也。

凡游行人間。有所犯穢者。皆亦如之。

凡欲行禁者。皆須先捻鬼目。若男禁捻左手目。若女禁即捻右手目。一云男子行禁捻左手目。女人行禁捻右手目。並逐四時王相。正向向月建。正心定意。閉氣三捻目左營目。順天道。即成禁法。用之神效。左營目者。開左目。閉右目。右營目者。開右目。閉左目。

凡禁訖。須解禁法。

假令禁虎。須存作師子。捻虎目。若欲解之。還存作虎。
一二台。男嗇捻右手虎目。女嗇捻左手虎目。若欲禁狗。存作虎。捻狗目。若欲解之。還存作狗。以此為例。觸類長之。皆須倣此。
大指第一節是生人蛇虎頭。若有惡人侵犯己身。罵詈不止。若緩即捻之。急即閉氣押之。左營目。惡人即怒止也。若不止。則押喉向官府門亦如之。一百步外預作之。乃入官。官見不瞋。欲禁虎蛇亦依此法。即虎蛇避人。入草。畏見人也。
大指第二節是生人蛇虎喉。若惡人罵詈不止。與人爭者。閉氣捻之。急即押之。左營目。令彼吃訥。不能言也。
第二指第一節是蛇虎目。治蛇虎瘡。閉氣捻之。己身及他人同。若見蛇虎便捻之。急即嗔怒而押之。
第二指第二節是鬼目。欲見鬼去鬼擊鬼。皆捻之。急則閉氣押之。左營目。九氣則鬼神立至矣。呼即去。吸即來。治病捻之。

第一指第三節是生人目。欲藏身避己與人鬬爭及在深山曠野皆須捻之。以伏衆人之言。急則閉氣押之左營目。人不見己也。

第三指頭甲下是蜂蠆及白鳥飛蟲之目。若人被蜂蠆螫捻之七左營目。五氣則觧之。若不差押蠆目及人大一道并捻掌心即差。

第二指第一節是地獄治鬼目。若欲禁諸神不令來去閉目向王。閉氣五十息捻之。急即左營目押之。

第二指第二節下是天獄目。欲禁鬼攝鬼劫鬼殺鬼皆向王閉氣捻之。急則押之左營目。若爲鬼魅所著或惡夢魘鬼押之。

第二指第三節是鼠目。一名天地獄治鬼目。若住鬼定鬼往神皆向王閉氣五十息。捻之左營目。

第四指次甲下是蚊子蚤虱蝨之目。欲除之閉氣捻之。

第四指第二節是都監目。一名神都目。都監者監領一切諸神。都管一切諸鬼。欲召鬼神閉其意。向王閉氣五十息捻之左營目。

鬼神立至矣。

第四指第三節是禁鬼目。一名蛇胎。欲行考鬼令鬼住鬼問鬼捻之閉氣。若入山澤畏逢蛇蟒。當押蛇胎令不來見人及已逢亦押之。蛇口禁不得開。

第五指頭是天心。欲求天神。向王閉氣押之。神自來奉賓大佳。

第五指第一節是游師目。

第五指第二節是天師目。

第三節是三師目。此三目是初學符禁法時。向王閉氣捻之九十息左營目。啓請即有神驗。

掌中一理是鬼道。欲誅符破壙斷鬼魍魎惡氣伐神樹。皆向月建閉氣五十息。押之左營目神驗。

凡欲呪敕符皆須捻斷鬼道。使鬼常敬之。掌中一理一名鬼舍。亦名地軸。亦名左都監鬼道目。欲誅符破廟除社公社地。或召諸

鬼神。須有請問。及治病并欲解鬼，皆押左都監鬼道目。鬼神並至。若田野中浪宿押地軸。令鬼賊及神皆不敢近人。若入神屋止宿，恐怕不安。押鬼舍即不魘夢。

掌中一理斜文名食地。食地上一文名天文。下一文名人道。若入山澤畏逢虎狼。向王閉氣押手虎口中，即不來。若已逢亦押之。令虎狼閉口不開。

第四指第一節名左金堂。若遠行求財押之萬倍。

第三指第一節名玉堂。欲求官覓職押之必遂意。

第二指第一節亦名玉堂。欲求官押之。

論曰：此掌訣宜用閉氣左營目捻之，無呪文也。禁病則皆須禹步誦禁文捻而用之。急則瞋而押之，緩則捻之。禁男用左手，禁女用右手。禁手之用，勿失左右也。

凡禹步法，移步左右，脚前後不同。

凡欲作法。必先取三光氣。又禹步。然後作法驗矣。三光者。日月星。禹步者。或三步七步九步。不定。若欲受三光氣者。極晴明日向日兩脚並立。先所願事隨意多少。呪之。然後取禹步三步也。所欲步時。先舉頭看日光剩開口吸取日光明。即閉口塞氣至三步始得放氣也。三步者。從立處兩過移兩脚始成一步。三步即是六過移脚也。向日光禹步時。左脚先移。右脚後移。若向月星二光禹步時並右脚先移左脚在後也。但步數不同耳。若向星禹步時。須滿九步也。九步者。向日中三步。更足六步耳。三三步合九步也。星者。即是北斗七星也。星中最須懇懃。所以須九步也。於日月中或用三步。或所用七步也。呪願及閉氣方法並如日中作也。受三光氣時。日必須明亮好晴日也。日是陽。月與星是陰。又左是陽。右是陰。是故受日氣時左脚先移。受月星氣時右脚先移也。又向星禹步作九步時。既長久。若一氣不得度。是以三步作一閉氣。則九步即

三過閉氣也。呪願亦須三過願之。又須識北斗下三台星。男識免獄厄。女識免産厄。問曰。雖云兩過移兩脚成一步。猶未可好。其狀云何。釋曰。先兩脚正並立。先舉左脚進前往。次舉右脚就左脚處正齊並立。此猶未一步。次第二又先舉左脚進往。次舉右脚就左脚住。方始成一步也。如此六過雙移兩脚成三步。此是步法也。

禁鬼客忤氣第六

呪曰。吾上太山府謁拜皇老君。交吾却鬼。語我神方。上呼玉女。收攝不祥。登天左契。佩戴印章。頭戴華蓋。足躡魁剛。左呼六甲。右呼六丁。前皇神。後越章。神師誅罰。不避豪強。先斬小鬼。後殺游光。何神敢住。何鬼敢當。一鬼不出。斬付魁剛。急急如律令。一云吾上太山。道逢東王父。教吾殺鬼。語我有神禁。上帝王子。捕收飛祥。登天左契。佩戴印章。頭戴華蓋。足躡天罡。先殺小鬼。後殺游光。何神敢住。何神敢當。縛汝正身。煑汝鑊湯。三日一治。五日一量。門丞收縛。竈君上章。吾含天地之氣。讀呪殺鬼之方。唾天自裂。唾地自缺。唾山自崩。唾水自竭。唾癰自潰。唾火自滅。唾邪自走。唾鬼自殺。急急如律令。

又吾為天師祭酒。為天地所使。身佩乾靈之兵百千萬億。在吾前後。羅列左右。何神敢住。何鬼敢當。正神當住。邪鬼速去。急急如律令。

又六甲六乙。邪鬼自出。六丙六丁。邪鬼入冥。六戊六己。邪鬼自止。六庚六辛。邪鬼自分。六壬六癸。邪鬼自死。急急如律令。

又神師所唾。嚴如雪霜。唾殺百鬼。不避豪強。當從十指自出。前出封侯。後出斬頭。急急如律令。七遍呪之。先呪水噴病人。然後呪之欲殺鬼。然後下刀。不差。更呪看之。手十指頭毛出。若呪病人時。當以單被籠病人頭。更遣兩人捉被單兩頭。以遮前病人。洗手莫拭。合手胡跪。然後呪之。

禁溫疫時行第七

禁時氣溫疫病法。一日十禁。自防難。為人施无限也。

天封吾以德。地封吾以道。吾奉天威。取地武。吾遇石石爛。按癥癥散。左達右貫。貫骨達體。追病所在。何邪敢進。進者斬死。北斗七星

飲汝血。叱叱滅手下。急急如律令。

禁時氣法。亦禁水沐浴身體令淨。法溫疫惡鬼。

九真行道。邪氣敢當。元氣洞達。百邪消亡。伏羲女媧。五瘟地主流入四肢。主作千病。萬病上氣。虛寒皆以風邪鬼所為。急按急按滅絕手下。急急如律令。

出病家門禁法。從病家門出去門三步。嚙齒禁閉氣。左轉而去。然後呪之曰。

一畫成湖。再畫成海。斬汝黃奴老古頭。不得追吾天師。縣酒之後。急急如律令。使以左手畫背後地因去勿反顧。

禁疫鬼文。

吾上知天文。下知地理。天地夫人教吾禁名。能禁疫鬼。汝從東來名曰狗。入人身中。倚於心口。神師呪汝。汝自走。汝從南來名曰羊。入人身中。倚於肝腸。神師呪汝。汝自亡。汝從西來名曰雞。入人身中。倚於皮。神師呪汝。汝自衰。汝從北來名曰蛇。入人身中。倚於百

脉。神師呪汝汝自厄。科斗七枚在吾目前。口是天門不得枉開。若唾東方甲乙木。木折。若唾南方丙丁火。火滅。若唾西方庚辛金。金缺。若唾北方壬癸水。水竭。若唾中央戊己土。土裂。六甲六乙疫鬼自出。六丙六丁知鬼姓名。六戊六己疫鬼自死。六庚六辛知鬼東西。六壬六癸疫鬼自死。六亥六戌百鬼速出。急急如律令。

禁時氣溫疫法。

東方青溫吾肝中之氣。南方赤溫吾心中之氣。西方白溫吾肺中之氣。北方黑溫吾腎中之氣。中央黃溫吾脾中之氣。五方五溫惡在吾身中。不得動作。即歸在實。急急如律令。

度惡世禁法。

東方青帝甲乙君。南方赤帝丙丁君。西方白帝庚辛君。北方黑帝壬癸君。中央黃帝戊己君。千乘萬騎護衛吾身。前有萬石桃湯。後有萬隊將軍。主斬黃奴之鬼。欲行我者吾祭酒。父長甲母奇仲。語

我吾萬厄之中不近我。急急如律令。一日卅念，度惡世也。

禁時氣却疫法。一日十念，万惡不近人也。

吾是天師祭酒。當為天師驅使。頭戴日月北斗五星。吾有乾靈之兵十萬人。從吾左右前後。吾有太上老君天地父母在吾身中。左手持節。右手持幢。何鬼不役。何神不走。何邪不去。何鬼敢住。急急如律令。

禁時氣溫疫法。

吾頭戴朱雀。足履玄武。左挾青龍。右挾白虎。前有萬石鑊湯。後有虎賁猛士。天騶甲卒。在吾前後。黄奴之鬼。去我萬里。急急如律令。

又禁溫疫法。存青龍。白虎朱雀玄武逐後禁之。

咄汝黄奴老古知吾不。吾吾初學道出於東方千城萬仞上紫宮靈鋼百鍊之劍。利如鋒芒。斬殺凶咎。梟截不祥。叱汝黄奴老古。先出有禮。後出斬你。叱叱急急如律令。

唾時行頭痛法。

南越太公還故鄉。壬申之唾自有方。神師所唾上白太一皇天使者督察不祥。威若山海。唾若雪霜。當吾者死。值吾者亡。魅精魍魎。自受其殃。急急如律令。

粉水逐鬼法。

習習詳詳使生水光。直符使者。住立水傍。真正補虛。邪氣消亡。吾左手捉鬼。右手持鉞斧。斬鬼死。急急如律令。

禁唾惡鬼法。（禁注亦得。）

吾從狼毒山中來。飢食真珠。渴飲武都。戎鹽一把。冷水一盂。口含五毒。常與唾居。但老君之唾。唾殺飛鳥。唾河則竭。唾木則折。唾左徹右。唾表徹裏。銅牙鐵齒。嚙鬼兩耳。速去千里。不得留止。急急如律令。

禁病粉粉大法。（禁注亦得。）

粉在紙中。為神粉。舉手以摩體。百鬼走出。精魅魍魎。應聲散走出。天皇老教我唾粉。腹中跳跟。五藏安穩。録保三氣。道保精神。急急如律令。

禁治溫鬼法。

天門亭長外都使。欲得九卿縛鬼士。非子法。住左手持刀。右手持斧。所黃奴溫病之鬼。何不走去。前出封侯。後出所頭。急急如律令。

禁瘧病第八

呪瘧鬼法。

登高山。望海水。水中有一龍。三頭九尾。不食諸物。惟食瘧鬼。朝食三千。暮食八百。食之不足。差使來索。符藥入五藏。瘧鬼須屛跡。不伏去者。縛送與河伯。急急如律令。一云。登高山。望海水。天公下捕瘧鬼。咄汝不疾去。吾家有貴客。子名破頭。如東山。軀如東澤。不食五穀。但食百鬼。朝食三千。暮食八百。一食未足。摧促來索。急急如律令。

禁瘧病去法。連年不差。治之即愈。

若治之須在淨處平地以手小指畫地作鬼字口中陰道病人生時年月日姓名以塼覆之勿令知之至三七日不開永差如三七日內開其病還復發若治必須知發時逆前預治勿使患人知之大良若丈夫左手畫之女人右手畫之陰爲之勿使人知靜作大驗

禁瘧病法

唾瘧鬼翁字園（一作周）母字欲大兒羸長吴小兒如石大女甂甋炊小女曾子因王道將軍取瘧鬼不得留停速出速去不得停住急急如律令

禁瘧鬼法

南山一神字銅柱岀門入戶口有語捉得瘧鬼大鑊煑

南山一神字長丘早起至門遶家遊捉得瘧鬼斬却頭

南山一神字辟邪銅作髑髏鐵領車斧鑿作齒金剛作牙生吞瘧鬼三萬車北斗七星知汝姓字不得住家急急如律令

禁瘧鬼法。

登高山望海水。使蝗螂捕瘧鬼。朝時來暮時死。暮時來朝時死。捕之不得與同罪。急急如律令。

禁瘧鬼法。

將狗上山下使入海中有一蟲。不食五穀只食瘧鬼。朝食三千暮食八百。一食不足。下符更索。速出速去。可得無殃。急急如律令。

禁瘧病法。

日正中時正南立。取西北桃枝結項。兩手脚夾達三匝。中心立刀曰。頭上戴九天。兩手把九弓。兩脚履九江。腹安四神。皆出自然。吾生食天。育養四神。上得精禁。能轉人身。蜈蚣蟒蛇。止殺汝身。并鬼子孫。急急如律令。

禁瘧鬼法。

先取一平塼。令病人在無人處。不得見人。大從月建向月破。以塼

磨地令平。以手按塼四角使不動。還以手發塼立。在前可塼下書北斗。傍置三台。外盡孤虛。直取句孤虛。其北斗中畫作小鬼患人姓名年幾。置下在斗柄中。呪曰。

小鬼字某甲。年若干。你從台入斗。瘧鬼斷後。若患人時。頭上先下。若非患人時。頭下先下。若無逆順。平下塼訖。若患人日一發。以手二七下打塼。若隔日發。三七下打塼。三日一發以上。四七下打塼訖。取塼傍土擁塼。即復左手取一把土散塼上而去。慎勿反顧。大驗。

又以故筆畫六尺方中。畫作北斗。形皆以北斗。相應其魁衡。必令開門。以身左行向斗魁。閉氣並足俱前而立。呪曰。

小鬼吾今出天門。入地戶。不得從我去住。遂出建上之門。急去不得反顧。即差。三七日不發。與人治患還得此患。必用此治。欲令患人還發。二七日內發之法。

還取患人發以足蹴塼。呪曰。

小鬼㒳從斗入台。瘧疾還迴即發。

㪍禁瘧鬼法。

書桃枝一尺。欲發即用。噀病人面。誦呪文二七遍。數著頭底。天姓張。地姓皇。星月字長。日字紫。光南山有地。地中有蟲。赤頭黄尾。不食五穀。只食瘧鬼。朝食三千。暮食八百。少一不足。下符請索。語你速去。即得無殃。汝若不去。縳送魁剛。急急如律令。

禁瘡腫第九

呪曰。先奄腫上。閉右目左目。營之三匝。然後唾之。三乘車。四獄吏載癰神。棄都市。登高山。臨海水。呂河伯。捕癰鬼。大腫如斗。小腫如粟。吾唾一腫。百腫屏跡。唾汝二七。毒自出。急急如律令。

禁唾癰法。

禁唾一遍一度刀割。一二三四五六七。背陰向陽。吾朝晨行。女媧相逢。教

我唾癰。從甲至乙。癰疽速出。從乙至丁。癰疽不生。從丁至癸。癰疽皆死。青癰赤癰白癰黑癰黃癰血疽肉疽兄弟八人。吾皆知汝姓名。徒忍割汝。汝須急去。急急如律令。

禁癰腫法。正面向東。以手把刀。按其邊令匝。以墨點頭。重重圍訖。然後急唾之。即愈。

日出東方。乍赤乍黃。牽牛織女。教我唾方。若是癰。應鉀空。若是痤。應鉀碎。若是癤。應鉀滅。若是腫。應鉀離。不疼不痛。速去速去。急急如律令。

又法 取東壁土三九。向井東置一九。三呪曰。赫赫洞洞。日出東方。上有崑崙之山。下有清泠之泉。某甲患某處上有發癰。土入井中。天公當爛。石癰當散。七星北斗。光織女。教我方。唾汝急急出。不得留藏。急急如律令。又噓三七遍。置土井中。三九三禁三噓之也。

禁五毒法。禁蛇亦得。

吸東方青毒。南方赤毒。西方白毒。北方黑毒。中央黃毒。天毒地毒水毒火毒霧毒塵毒死生毒。百毒之精。知汝姓名。天毒上昇。地毒

下藏百毒止息五毒滅亡惡毒湏出毒腦破毒腹出毒腸止不止不已拘汝牙折汝齒吸吸叱叱急急如律令

禁腫法（三七遍）

骨肉皮膚血氣空虛遠入江海急去無留大腫如山小腫如粟唾一腫千腫滅急急如律令（一本滅作死）

禁腫法（七重右迴氣朱書皆以右手封之指七過周於五指右手持禁如法）

呪封山山沒封石石爛封湖湖決封火火滅上白東王公西王母教我神方白刃封汝大腫如山小腫如米封一腫萬腫死急急如律令先以手按之久令痛次以金刀按之四邊令散以氣七呵令熱然後急氣七吹令冷陰陽氣定然後却唾之

禁天下大腫法（別室中以木甕相背令以繩繫定上安一斛一禁一打斛令沒以三七遍）

東方青帝攝青精之毒氣南方赤帝攝赤精之毒氣西方白帝攝白精之毒氣北方黑帝攝黑精之毒氣中央黃帝攝黃精之毒氣

五方毒氣幷及五精內吾腹中。天下最尊者。莫大於五帝。天下最神者。莫及於五精。天下大惡者。莫過於五毒。吾含五帝五精五毒與禁共居。其聲如雷。禁如風霜。經口即死。逢禁即亡。吾禁東方木。木折。禁南方火。火滅。禁西方金。金缺。禁北方水。水竭。吾上禁飛鳥落下。禁井泉枯竭。吾禁一腫百腫滅。吾禁盤石開。深淵契。天架摧。地柱折。曉停光。夜星滅。冬變雨。夏積雪。冷腫熱腫速消滅。急急如律令。

禁水腫方。

呪曰。天陽在上。人陽在中。陰陽在地。水從下流。唾腫消化。急急如律令。

太白仙人禁腫法 先向王方三噓三吹。以刀約之。以手握之。訖。然後三噀之。禁曰。日出東方。雷起西南。蝦蟇白兔。食月中心。嘗月帶日。無所不通。大腫如山。小腫如珠。吾唾一腫。百腫自除。急急如律令。

又法 一二三四五六七。百腫皆疾出。急急如律令。

又法 日出東方。如懸鼓。似白虎。吾能唾腫散。唾毒爛。急急如律令。

又法 東方青帝禁駕青毒。南方赤帝禁駕赤毒。西方白帝禁駕白毒。北方黑帝禁駕黑毒。中央黃帝禁駕黃毒。吾有苦口唾十瘥九。急急如律令。

禁一切腫法

呪曰吾口如天雷。唾山崩。唾木折。唾金鈌。唾水竭。唾火滅。唾鬼殺。唾腫滅。池中大魚化為鼈。雷起西南不聞其音。大腫如山。小腫如氣浮遊。如米吾唾一腫。百腫皆死。急急如律令。

又法 呪曰生在太閒。那得來人間。石鹽一撮。清水一斗。故來治腫。南山石羊其角如芒。左角觝腫。右角決腫。東海大鳥飛來食腫。左翼掠腫。右翼裂腫。不疼不痛。不壞不膿。急急如律令。

禁癰腫法。

先叩齒三七遍。急嘿左營目即唾。呪曰雷起地中。一聽其音。月生東盛蟾蜍。白兎食月中。心榮衛不通。結成癰。大腫如山。小腫如粟。

唾呪一腫百腫散死。急急如律令。

又法 日出東方，赫赫煌煌，威威容容，天門亭長來捕癰腫，山多石，海多龍，天門亭長來捕，摩得便斬殺，莫聞羅。一唾當心，再唾都愈，急急如律令。

禁丁瘡法。一云，初得之時，逆以禁即除。愈，當二七遍唾之訖。

呪曰：日出東方，乍赤乍黃，天上織女，教我唾方。丁公丁母，元出南方。丁公死，丁母亡，北斗真氣能治丁瘡，吾口如天門，不可枉張。唾山崩，唾石裂，唾金缺，唾火滅，唾水竭，急急如律令。

禁丁瘡法。

用水一椀，置是樹南，令搏樹，以刀子一枚安椀上，刀向樹，三指漫撮臨著刀刃上，胡跪呪曰：上啓伏奴將軍、伏奴將軍能治丁瘡，今是某年月日，姓字某甲年若干，患某處生丁瘡，或是浮漚丁，或是麻子丁，或是雄丁，或是雌丁，或是羊角丁，或是蛇眼丁，或是爛丁，

或是三十六丁。或是驅失瘡。或是水洗瘡。或是刀鐮瘡。三頭著體於人。不量清淨七寸棗樹下之水洗之。伏藏急急如律令。

禁丁瘡法。（先閉氣三遍。叩齒三十六通。閉氣禁之。三七遍即差。）

東海大神三女郎。療丁有神方。以藥塗此瘡。必使丁公死。丁母亡。丁男丁女自受殃。星滅即愈。大吉良。過時不去。拔送北方。急急如律令。（一云東海大神三女郎。三刀細米簸去糠。三稱行無灸丁瘡。云云。）

禁喉痺第十

吸喉痺。父喉痺。母喉痺。婦喉痺。孫天生汝時。緣上百草露。誰使汝著人喉裏。拘汝牙。折汝齒。破汝頭。破汝脊。神不得動。不得留停。北斗知汝名。吸吸急急如律令。

又法

吸日出陽陽。吸為喉痺腫毒所傷。莫癰莫痛。吸吸愈。急急如律令。

禁牙齒法。

用桃板長一尺二寸。正面南向閉氣。書曰某州某縣鄉里女某甲年若干患口中左右若干齒痛。三讀訖埋三路頭。以石子蓋之。勿反顧南山有一蟲。名赤松子。不食五穀。但食口中齒。埋汝三路頭塞汝用石子。埋汝著樹東千年。萬歲不得起。急急如律令。

又禁牙齒法

用一枚杖長三握。復取兩指團艾三炷。灸杖頭上柱牙上。呪曰。登高山望海水。中有一蟲。黃頭赤尾。不食五穀。專食牙齒。吾欲治之握兩指神灸三壯。蟲死矣。急急如律令。

禁哽法

南山大虎。北山狐狸。江中大獺。海中鸕鷀。某甲得哽共來吞除。急急如律令。

又禁哽法

四海蕩蕩滑如苔上。五虎四獺。三鸕鷀共來食哽。速消除。橫者即

入順者即出。急急如律令。

禁目痛法以呵之二七遍。然後禁之。

日出東方。赤如紫陽。兒子目痛。父母心傷。吾口一唾。明見四方。百藥千治。不如吾湯。若唾唾汝。汝眼毒消亡。急急如律令。

禁目痛法

神師所唾自有方。日出東方。右陰左陽。瞳子生肉。瞻視無光。吾能誅罰。不避鑊湯。唾目二遍。還復故常。大吉神師。西岳靈方。急急如律令。

呪禁產運第十一

取蒜七瓣。正月一日正面向東。令婦人念之一遍。夫亦誦一遍。次第丈夫吞蒜一瓣。吞麻子七枚便止。丈夫正面向東行。誦滿七遍。不得見穢惡。受持之法。不用見尸喪。見即無驗。吾躡天剛遊九州。聞汝產難。故來求。斬殺不祥。衆喜投。母子長生。相見面。不得久停

留。急急如律令。

唾運鬼法。或丈夫從婦人口中受取。婦人從男夫口中受取。

天無梁地無柱。五騎三龍使九虎押運鬼汝身長少許。或在人心肝。或在人心肺。或在人心膂。吾受東海王禁。故來追捉汝。急急如律令。

禁運鬼法。

先禹步三匝。左手持刀。右手持水努目急氣。然後禁之噴之曰唾。東方青運鬼字青姖年七十。南方赤運鬼字赤姖年六十。西方白運鬼字白姖年五十。北方黑運鬼字黑姖年四十。中央黃運鬼字黃姖年二十。唾天皇地皇六律九章。是公運子之鬼未嫁之女頭亂如筐。腹脹如苕。剋害忠良唾汝急出。不得留藏。汝若不去吾遣張丞伯捉汝縛送鑊湯。急急如律令。一云運子之鬼未嫁之女頭亂如筐。腹脹如苕。但行人間。不見運女。唾之還本主。速出速出。更不見汝。張丞伯王問驅殺運鬼數萬千。速斷因緣東唾无辜。惡見運鬼來相呼南唾无極惡見

運鬼來相逼唾二寸刀二寸刃。先治支却治運。唾太山東門一把葦舉高十丈治運鬼初來如犴蜂不著。餘處當眉聚一杯水唾運去。須臾不去當自死。急急如律令。

禁產難方。

先禁水一杯與服之乃禁曰。天有陰陽。地有五行。星辰列布日月精明。四時變化不失其常骨肉已成四體已強毛髮已就。今是生時生遲何望。河伯在門司命在庭日月已滿何不早生。若男若女。司命須汝促出無遲。并持胞衣急急如律令。

千金翼方卷第二十九

禁經下

禁金瘡第十二

禁金瘡法 呪曰。吾被百箭。療無一瘡。一人挽弓。萬人驚張。一箭破於千陣。此禁亦是難當。急急如律令。

又法 正月一日日未出時。取四壁下土。和酒井華水。向東三拜云。言受神禁。願大神如是。四方各禮訖。口含酒水。四方悉噀。至日中還復如此。七日之中。鮮潔齋戒。不得惡言出口。禁金瘡即定。法先閉氣噓三遍。呵氣七遍。唾之曰。日出東方。惠惠皇皇。上告天公。下告地皇。地皇夫人。教我禁瘡。吾行步不良。與刀相逢。斷皮續皮。斷肉續肉。斷筋續筋。斷骨續骨。皮皮相著。肉肉相當。筋筋相連。骨骨相承。今會百藥。不如神師。一唾

止痛。毋唾愈瘡。北斗七星教我禁瘡。南斗六星。使瘡不疼不痛。不風不膿。北斗三台轉星證來。急急如律令。

唾瘡法。

日出東方。育育陽陽。上白天公。下白地王。地王有女。教我唾瘡。皮皮相養。肉肉相當。令瘡不疼不痛。不風不膿。連筋續骨。肌生肉實。急急如律令。用王氣唾瘡。良便有驗。神吉。

禁血不止法。遍三七

日出東方。乍赤乍黃。南斗主瘡。北斗主血。一唾斷血。再唾愈瘡。青衣怒士。却血千里。急急如律令。

禁瘡斷血法。

某甲不良。某甲不慎。爲刀箭木石所傷。上告天公。下告地皇。地皇夫人。教我禁瘡。一唾止血。再唾合瘡。兩皮相連。兩骨相當。新瘡莫痛。故瘡莫膿。急急如律令。

禁金太瘡法

吾是天師之子。爲師之所使。執天有綱。執地有紀。一百二十禁呪。吾以受之。吾禁此瘡。金血須止。吾與天地同體。令瘡合。急急如律令。

唾百種瘡法

神師所唾。口爲雷門。唾爲霹靂。雷公主陰。霹靂主陽。殘賊結氣。唾下消亡。急急如律令。

禁唾惡瘡毒法

先閉氣三通。神師受告大道最良。呪曰。

百藥之長。不如吾之膏唾。吾仰天唾殺飛鳥。唾南山之木。木爲之折。唾北山之石。石爲之裂。唾北方之水。水爲之竭。唾百蟲之毒。毒自消滅。唾百瘡之毒。生肌斷血。連筋續骨。肌生肉實。扁鵲盧醫。教我禁方。三唾何瘡不愈。何毒不去。天音神師今在汝處。急急如律令。

禁水洗瘡法

先左營目三周。閉目視瘡中。閉氣一息。欲止。然後禁之。無弱無強。爲其所傷。清血無流。濁血無往。一青一黃。一柔一剛。皮皮相值。脉脉相當。南方止血。北方止瘡。東流海水。寒熱如湯。朝令淹露。暮令復故。醫王扁鵲。藥術有神。還喪車起死人。不膿不痛。知道爲真。知水爲神。急急如律令。

禁漆著人法

漆翟丹盈。漆翼丹盈。丹爲兄。漆爲弟。汝不漆杯。以壬盃乃漆人肌膚。刀來割汝。斧來伐汝。汝不疾去。鹹鹽苦醋唾殺汝。急急如律令。

禁漆著人法

三七遍

一云。燒故漆器。當著漆急唾之。赤非非。漆賢丈夫著車。移丙丁。使者收攝之。不得著人體。不得著人皮。急急如律令。一云安後移漆賢丈夫若車乘以壬盃。何由得著人皮膚。保辛保辜。收攝漆賢丈夫。急急如律令。

禁火爛瘡法

浮陽浮陽。火燒東壁。東壁窮爛。上付河伯。還付壬癸。火精毒滅。入地千里。急急如律令。

禁蠱毒第十三

呪蠱毒文

毒父龍盤推。毒母龍盤脂。毒孫無度。毒子龍盤牙。若是蛆蛛蜣蜋。還汝本鄉。蝦蟆蛇蜥。還汝槽櫪。今日甲乙。蠱毒須出。今日甲寅。蠱毒不神。今日丙丁。蠱毒不行。今日丙午。還著本主。雖然不死。腰脊僂拒。急急如律令。

禁蠱毒法

取一赤雄雞淳色者。左手持雞。右手持刀。來至病人戶前。去屋溜三步。便三聲門尉戶丞。其甲病蠱。當令速出。急急如律令。以雞頭柱病人口中。三遍畢。以苦酒二合。刺雞冠上血。內苦酒中。便與病人服之。愈。

呪魘蠱及解法

天無梁地無柱魘蠱我者還著本主一更魘蠱不能行一午魘蠱不能語太山昂昂逐殺魅先魅翁死魅母亡魘蠱大小驅將入鑊湯急急如律令

又呪曰食鬼將軍摩牙利齒不食餘味止食魅鬼魅鬼九千九萬戶少一不足下符來取魅鬼速還本主不歸本主反縛送與急急如律令

又有將軍字屈丘牙形帶劒持戟鋒出門入戶遠地遊捉得魅鬼便斫頭又有一神字窮奇頭如破筐髮強相口如羅披惡神祇不食五穀食魅皮朝食一千暮食九百一口不足使來便索急急如律令

禁五蠱時氣悉用此

九真斗光道氣并行大寒小熱當從內出最巨夷憂除烈水火之

光宅中凶殃。大神丈人。入其身形。恍惚無常。大道正教。真道常行。邪氣急滅。手下。急急如律令。

又法呪曰

東方青帝魘人鬼。南方赤帝魘人鬼。西方白帝魘人鬼。北方黑帝魘人鬼。中央黃帝魘人鬼。魘公字阿強。魘母字阿防。有人魘我者。還令著本鄉。誦魘二七鬼走出。誦魘二九魘鬼還向本主走。若當不走。吾語北斗。急急如律令。

禁遁注第十四

禁注法

吾從天南來至北。食鹽三斛。飲水萬千。經江量海。手捉丘山。口含百毒。心懷蚰蜒。唾天須轉。唾地陷穿。唾石碎裂。唾火滅煙。唾鬼即死。唾水竭淵。東方之注自名醫。入人體中注心根。神師呪注注滅門。南方之注自名青。入人體中注百脉。神師呪注注即易。西方之

注自名搖。入人體中注脊腰。神師呪注注即消。北方之注自名雎。入人體中注心脾。神師呪注注即移。中央之注自名雉。入人體中注十指。神師呪注注即死。四方之注盡已亡。惟我五藏永安。強急急如律令。

禁注出血法 三七遍急噀之。

東方之注自名羊。入人體中主腹腸。神師呪注注即亡。南方之注自名狗。入人體中主心口。神師呪注注即走。西方之注自名雞。入人體中主心臟。神師呪注注即迷。北方之注自名魚。入人體中主六府。神師呪注注即無。中央之注自名雉。入人體中主心裹。神師呪注注自死。

謹告病人身中諸注殃。若在心腹及胷腸。或在四肢并中央。謹告四方諸關節。急送血殃三焦關元下部膀胱。若有若無。不出者亡。速去百年毒。神符欲居汝處。急急如律令。

又法

注父張。注母楊。注兄靖。注弟強。注姊姫。注妹姜。知汝姓字。得汝宮商。何不遠去。住何所望。前出封侯。後出斫頭。前出與賞。後出與杖。汝今不去。住何所望。急急如律令。

又禁注法

東方青帝食青色之注。南方赤氣食赤色之注。西方白帝食白色之注。北方黑帝食黑色之注。中央黃帝食黃色之注。五帝之神食十二注。北斗七星食一百二十注。或食土八公注。或食土母注。或食土子注。或食土婦注。或食土孫注。或食土孫婦注。或食生人注。或食死人注。或食飛尸遁注。大注消。小注滅。急急如律令。

又禁注法二七遍

東方青注。南方赤注。西方白注。北方黑注。中央黃注。

五方五注何不速去。雷公霹靂欲居汝處。吾唾山山崩。唾石石裂。唾火火滅。唾水水竭。吾唾五毒逐口消滅。急急如律令。

呪注文

吾是太山之子。今爲太山所使。口如天門。不可柱張。唾如毒藥。氣如秋霜。當吾者死。值吾者亡。五注之鬼速出速去。不得留藏。急急如律令。此呪當晨朝日初出時遣病人淨洗手面向東方至心禮太山。訖。更以水洗手至心合掌正西立。師當在東正當病人面向南立。以此呪之七遍便愈。若不愈者。明晨更如是呪之。不過三朝無不愈者。

禁唾飛尸入腹急切痛法。

請天上飛龍窮奇白虎眼如明星。腹如建鼓。齊功叩齒。主食惡鬼。入食飛尸。出食殃魅。人生於天。吞氣受道。身形之中。非汝所處。形中五部各有所主。肝爲青龍。肺爲白虎。心爲朱雀。

腎爲玄武。脾爲中府。主御四方。上有眞人赤城童子。下有咸池青腰玉女。各守部界。不得留住。名道人教來治汝頭。則法天身法北斗。手爲魁剛。口爲金斧。主授六甲直神輔汝何鬼不出何尸不走。急急如律令。

按摩卒中注忤魍魎法。

配陰脉十三陽脉十五。二十八脉隨手上下。一脉一通知汝有苦。男祥女祥。客死不葬。骸骨消散。流離道傍。驚恐馳走責人酒漿。南山有一人名窮奇。不食五穀。但食鬼皮。朝食鬼父。暮食鬼母。食正欲壯。復索鬼子。急急如律令。

禁邪病第十五

凡鬼邪著人。或啼或哭。或嗔或笑。或歌或詠。稱先亡姓字。令人癲狂。有此狀者。名曰鬼邪。唯須伏鬼遣之。乃差。治之法。正發時使兩人捻左手鬼門鬼市。兩人捻右手如左手法。鬼門

者。掌中心是。鬼市者。腕後厭處是。伸五指努手力則厭處是。腕後者。大指根兩筋中間是。一捻之後。不得暫動。動鬼出去。不得伏鬼。又不得大急。若大急則捻人力盡。力盡即手動。手動即鬼出。亦不得大緩。若大緩復不能制鬼。惟須以意消息令緩急得所。復使兩人投櫏子刺兩肩井中。緩急如鬼門鬼市法。以鬼伏為限。若不伏。稍稍急刺。若鬼伏即稍輕刺之。若病人是丈夫肥壯者。則急刺之。量人之強弱消息以意。若櫏尖利。以布物裹之。勿令人傷。亦須誦呪。必臣伏如狀貌。中有似伏狀。不復相罵。下情求首叩頭求去。遣一人捉呪師自問鬼之姓名。住何州縣鄉里。年幾貫屬。伴侶幾人。又問來意有所須。為何事來。一依病人口筆寫之。若其臣伏叩頭求去。不敢更住者。且停刺肩井等。依其所須備覓發遣之。須食與食。須金銀車馬。即采畫人馬像。金銀綵帛。隨其形貌悉盡作之。

絹帛以白紙作。金以梔子染之。若是遠來之鬼。須給過所者。亦即給之。即日早發遣。或待後發遣。亦得。送鬼之時。須桃符一枚。長七寸。闊三指。綜縱一條。長七寸。以朱書板上。著年號月朔日子。鬼之鄉里姓名年幾。從人頭數。告五道大神。河伯將軍。上件鬼某甲等。在我家中作如此罪過。捉獲正身。所索之物並已具給。發遣速出去。不得久停。不得久住。急急如律令。

炬火禁邪法（去百鬼。斷萬邪。）

粅粉火治邪。亦可以按摩病人。若欲斷邪鬼。以粅粉火。以一炬火著戶外。令病人住門外。又師捉一炬火。作禹步燒粉。令病人越火入戶。還牀。以向者一炬送大門外道上。去門百步棄之。勿反顧。師取一盆水。著病人戶限內。以大刀橫上。亦可然燈置病人屋內。令晝夜不滅。至病差。師捉火炬燎病人身上。隨多少治病。呪曰。

粉良天火赫赫。天火奕奕。千邪萬惡。見火者避。急急如律令。

呪水噴病人法

先取淨水一器。呪三吸氣閉目。存鬼神怒五氣擊之。呪曰。持清持濁。持正持水。所爲物無不消化。怒石石裂。怒木木折。邪不干正。危不入身。大道流行。攝録邪精。神祇所怒。玉石皆化。何病不愈。何災不斷。速出速出。急急如律令。

呪水治百病法。

先取淨水。以器盛之。十呪曰。太一之水祖且良。舉水向口續神光。大腸通膀胱。蕩滌五藏入胞囊。脾腎太倉。耳目皆明。百病除差。邪精消亡。急急如律令。噢之遍身。然後用之。

禁惡獸虎狼第十六

夫草野山林。行見惡蟲。但閉右目。以左目營之三匝。鬼神見

之伏而頭脅著地也。

禁虎入山法。

吾登行五嶽。前置辟邪六駮。後從麒麟師子。揚聲哮吼。野獸猛虎聞吾來聲。伏地不語。若不避吾。檄蟲殺汝。急急如律令。

敕禁虎法。

天一太一。李耳伯陽。教我行符。厭伏虎狼。垂頭塞耳。伏匿道傍。藏身縮氣。疾走千里。舅氏之子。不得中傷。急急如律令。

禁蛇毒第十七

三月三日夜。向北燒香。閉氣誦滿三七遍。呪曰。

日出東方。赫赫煌煌。報你蛇蟲。遠逃深藏。你若不藏。鸛鵲步剛。食你蛇頭。吞汝入腸。大蛇死。小蛇亡。急急如律令。

禁蛇法

押蛇頭呪曰。寅加卯。寅加卯。三遍即愈。若欲發蛇毒。押蛇尾

到誦之。卯加寅，卯加寅，蛇毒即發劇。一注螫右相押左手自餘皆同。

又法

庚寅卯，庚寅卯，三遍即愈。若欲令發，云卯寅庚，卯寅庚，即發。

又法　辰生巳，辰生巳，蛇毒即止。三遍即愈。欲令發者，云巳生辰，巳生辰，即發。

禁蛇法

一名蛇，二名蟾，三名蝮，居近野澤南山腹。蛇公青，蛇母黑。蛇公字麒麟，蛇母字接肋。犀牛角，麝香牙，鸛鵲野猪牙啄蛇腹，腹熟；啄蛇頭，頭爛。蜈蚣頭，鴆鳥羽，飛走鳴喚，何不急攝汝毒，還汝本鄉江南畔。急急如律令。

禁蛇斂毒法

暉暉堂堂，日沒亭光，姿擢之節，唾蛇萬方。蛇公字蚰蜒，蛇母字彌勒。汝從江南來，江北言汝何失準則，汝當速斂毒，若不

收毒。吾有鴆鳥舌。野猪牙蜈蚣頭何咜沙。吾集要藥破汝。速出速出。歛毒還家。急急如律令。

一法

器朱書此符。左手把之。閉氣唾禁。捻目向王為之。吾一唾開天門。再唾諸黃泉。天下有惡毒。皆來歸吾前。吾今捉你。一唾得千千。急急如律令。

山鵲蛇　山蚱　山青蛇　澤青蛇　馬蛇　蛟黑似斷蜴

右六種螫人不死。令人殘病。呪曰。

吾有一切之禁。山海傾崩。九種惡毒。元出南厢。令渡江北。專欲相傷。吾受百神之禁。惡毒元出南邊。今來江北。截路傷人。吾一禁在後。你速攝毒。受命千年。急急如律令。

白朔蛇　蒿脊蛇　赤蛇　黃蛇　水蛇　青蛇

右六種嚙人不傷。直禁即差。

子蛇　尺八蛇　土蝎蛇　沙蝨　毒到蛇　白蜴蛇

罔蛇　蟒蛇

右八種蛇。人著者須禁治。呪曰。

道邊一木。百尺無枝。鳳凰嘴如絲。速去速去。吾不知。急急如律令。

禁蠍蜂第十八

禁蝲法（捻蛇目閉氣向王爲之。）

蠕蝲神祇。八節九枝。兄字大節。弟字蠍兒。公字腐屋草。母字爛高枝。但自攝斂。汝毒不出去。何爲。急急如律令。

呪蠍法

蹀蹀移移。八節九枝。公字腐草。母字蒿枝。緣他籬落。螫他婦兒。何不收毒。欲住何爲。山雞戴勝。食汝四肢。頭破尾折。伏地莫移。急急如律令。（一云山雞頭戴勝角拉爾腰斷。不得動尾。云云。）

又曰蠍蟲毒止。速收你尾河伯將軍。鐵鉗銅指。押你腰斷。不得動尾。急急如律令。

禁毒蠍螫人法。

先二日齋戒。正朝一日日未出時。淨澡浴洗手。北堂東頭下誦之三七遍。呪曰。

天有八節。地有九枝。一兆草木。二兆蒿枝。上他牀上。傷他婦兒。速去速去。戴勝來追。不痛不疼。不腫不膿。急急如律令。

禁蜂毒。捻蜂目左營目。閉氣向王爲之。

東方青毒還東方。　南方赤毒還南方。　西方白毒還西方。

北方黑毒還北方。　中央黃毒還中央。

黃蜂䬃䬃。黑蜂奕奕。王有小女。嫁與河伯。吾有銅掌鐵指。押汝便死。汝是小蟲。何不速去。毒陰吾曰大鳥數翅。三千八萬里。不得張口。汝應是死。急急如律令。

禁蜂毒法 捻蜂目左營目。向王閉氣爲之。

兄弟三人走出野。大兄名蝮。南山上下。中兄名蛇。走田野。小弟名蜂。看屋梁。堅如瓦。熱如火。二七唾。毒當墮。急急如律令。

禁惡蚝螫人毒法

蛆似蜂。著山裒。蚝似蝎。著山腹。老蚝蚑。緣木枝。兄弟五人吾都知。攝汝五毒莫令移。汝不攝毒滅汝族。急急如律令。

禁惡蚝文 一云狐尿刺傷人腫。當急閉氣治。唾之即愈。一七不愈。二七遍。

日出東方。乍赤乍黃。瓜熟離蔓。椹熟離桑。東家嚙人狗。西家好婦娘。呪此小蟲。雄狐毒死。雌狐毒亡。急急如律令。

禁狗鼠第十九

呪曰。日出東方何堂堂。狗不名。狗名大黃。皇帝遣汝時。令嚙猴與鼠。不令汝嚙人。傷若嚙人。傷白虎吞入汝腸。急急如律令。一云不令汝齒人。傷斷汝齒。腐汝牙。自不去。虎敢汝。云云。

禁狗毒法

犬牙狗齒。天父李子。教我唾汝。毒出乃止。皇帝之神。食汝腦髓。白虎之精。食汝之形。唾汝二七。狗毒便出。急急如律令。以氣噓呵之捻狗目左營目向王爲之。

禁狗令不咬人法。捻狗目向王閉氣七息七禁之。令不咬人。

吾口如天門。不可枉張。舌如拔劍。唾如秋霜。北斗照耀。列宿天蒼。單集聲氣。正其發陽。牽牛持形。織女侍傍。此之小狗。呪之滅亡。天狗地狗。何反不走。欲傷我者。牙折口啞。急急如律令。一法下文不同今不取。

又法

取西廂屋簷下土。擣末。絹羅之。和大苦酒漬作團。如雞子。於瘡上摩之。呪曰。

東方木爲折。　南方火爲滅。　西方金爲缺。　北方水爲竭。中央土爲絶。　吾太上府逢西王母。教我禁毒。語我神方。東

句枝西。句枝庶。民狂狗。咬我天公兒。急出急出。汝若不出。莫使我怒。吾能唾山崩。唾石裂。唾火滅。唾海竭。速出速出。急急如律令。如此三呪。擘泥中。見隨狗毛色有驗。

又取竈中黃土。與水和作泥丸如雞子大。摩瘡上。隨犬毛色。毒隨而出。擘破泥丸。明視之。瘡痛則又以一盆水寫屋上。以器盛取。以洗瘡。餘水破落地。則和爲泥封瘡上。擘中必見犬毛色。瘡不疾痛也。

禁狗文

呪曰。汝是小犬。惡獸之餘。爲物有幸。得與人居。汝命如泥土。精空虛。吾以西方白虎咬汝頭。汝毒急收。急急如律令。

凡向人家。先以脚踏門右。呪曰。主人某甲家門丞戶尉。籬落諸神。主人有狗。黃白不分。師來莫驚。師去莫瞋。急急如律令。

禁狗不吠人法。

黃狗子。養你遣防賊捕鼠。你何以齧他東家童男。西家童女。吾請黃帝竈君震宮社土付與南山黃斑。北山黑虎。左脚踏汝頭。右脚踏汝肚。向暮必來咬殺食汝。狼在汝前。虎在汝後。三家井底黃土塞汝口。吾禁你四脚蹤不得走。右擲不得。左擲擲草。吾來上牀。汝亦莫驚。吾出十里。汝亦莫起。急急如律令。

禁鼠令出法

桃枝一枚。草索一條。呪曰。

天皇地皇。卯酉相當。天皇教我壓鼠。羣侶聚集一處。地皇教我壓鼠羣侶聚集一處。速出速出。莫畏猫犬。莫畏呪咀。汝是猫之雖。又非猛獸之侶。東無明。南無明。西無明。北無明。教我壓鼠失魂精。群陽相將南。一作西目失明。呼喚盡集在於中庭。急急如律令。作此法時。於室中淨掃地。冗前遍掃之。桃枝以

茅草索結杖中腹。以三箇宂立呼之矣。

初越集鼠法。

初越時以香湯浴身。灑室中及庭前地訖。用三盆三家漿粉。以刀子横着盆上。以灰匝之。以筆一管。去盆三尺著地。所有宂前皆安灰。廣一尺上作子字。一云宂上紫字。乃呪曰。北斗十三台。招揺所録。天李目形。必歸所屬。寄食附人。穿宂我屋。胡爲楊時。飲食欲熟。急勑鼠王。召集眷屬。大鼠小鼠。并須來食。側立單行。洗盪心垢。伏罪勿走。汝父小奚。汝母幽方。汝兄阿特。汝弟阿當。汝妹僕姜。室家相將。歸化坐傍。固告勑汝。莫以舊爲常。急急如律令。

又去鼠法

鼠必栗兜。牛必栗兜。蛾蛾必栗兜。犯犯必栗兜。母名必栗兜。三喚神來赴。

欲辟之法。悉在華上。勿得東西。

解放鼠法。

日東向曠二里。西向曠二里。辟方八里。此廣闊耐停止。雞零星牽至廳。雞零祿牽至獄。汝等此中行。勿得與人相牽觸。當斷汝手足。急急如律令。

禁鼠耗并食蠶法。

呪曰。天生萬蟲鼠最不良。食人五穀。啖人蠶桑。腹白背黑。毛短尾長。跳高二尺。自稱土公之王。今差黃頭奴子三百箇。貓兒五千頭。舍上穴中之鼠。此之妖精。呪之立死。隨禁破滅。伏地不起。急急如律令。

越百怪法

乾坤定位。陰陽化成。門丞戶尉。侍從交并。二十八宿。黑白赤青。千殃萬怪。急收汝形。吾知汝姓。吾知汝名。急須屏跡。不得

久停。違即斬殺。萬不得生。急急如律令。

又呪曰。日出東方。赤如紫陽。百怪妄起。損害忠良。吾口呪之。辟除凶殃。怪聞我呪。速去他方。禍去福來。萬惡潛藏。急急如律令。

護身禁法第二十

呪曰。諾諾罡罡。左帶三星。右帶三牢。天翻地覆。九道皆塞。使汝失心。從此迷惑。以東為西。以南為北。人追我者。終不可得。明星北斗。却閉千里。六甲反張。不避禍殃。乘車追我。折其轅軸。乘馬追我。揜其兩目。步行追我。腫其兩足。揚兵追我。刀反自伏。明星北斗。却敵萬里。追我者亡。覓我者死。牽牛織女。化為江海。急急如律令。

又法

太一神人曰。凡欲遠行避難。若為惡人迫逐。危厄之中。出門

禹步三呪乃去。可以消災，追我者迷惑，五道旋轉，到還惡人欲來侵己者，逆而却之。呪曰：

東方青毒，南方赤毒，西方白毒，北方黑毒，中央黃毒，五毒之氣，令有某甲無道，欲來侵吾，被太一神符，歷行四海，乘風駕雲，使有限會，某甲懷惡逆之心，殘賊忠良，不肯休止，五毒之氣，并力收攝，付與地官，莫令某甲復懷惡心賊害之意，應時了命，言切千二百等，急急如律令。

若逢怨家惡人法

先却三步，捻生人喉，又以左足大指躡地，呪曰：

北斗神君，來滅惡人，斬截冤家某甲頭，送上天門，急急如太上老君魁剛律令。

又法

惡人欲來侵害者，先閉氣三噓，竊呪勿令人聞。呪曰：

頭戴朱雀。足履玄武。左佩青龍。右佩白虎。吾來到處。百惡悉走。吾有天丁力士。椎殺惡鬼。遠逬千里。急急如律令。

自防身禁呪法

咄。某甲左青龍蓋章甲寅。右白虎監兵甲申。頭上朱雀陵光甲午。足下玄武執明甲子。脚爲貴子中央甲辰甲戌。急急如律令。

右此一法。凡是學人。常以旦夕闇誦令熟。莫使聲出。若有縣官口舌。軍陣危險厄難之處。四方興功起土殃禍之氣。或入他邦。未習水土。及時行疫癘。但以晨夜數數存念誦之。勿忘。若弔喪問病。臨尸凶禍之家。入門一步誦一遍。出門三步誦二遍。皆先叩齒三通。并捻鬼目。

又法

凡行山澤。晨夜恐怖之處。使人鬼惡總不相忤。呪曰。

人皆濁。我獨清。人皆去。我獨得。人皆極。我獨丁。人皆枯。我獨榮。人皆破。我獨成。天長地久。我與并。依文昌。遊八星。登太玄。星紫庭。飲甘露。食陽精。佩日月。體安寧。乘三鳳。駕羽英。堅藏擇。九天仙公以趌刑。急急如律令。

被人所禁解之法

先捻生人喉。呪曰。

煒煒煌煌。天有九柱。地有九梁。北斗七星。爲我除殃。青龍在前。白虎在後。青龍飲汝血。白虎咬汝喉。頭破腦裂。汝死不擇日。急急如律令。

被人禁劫解之法

噴之行頭及天公。亦是吾師。坐頭及天公。亦是吾師。眠卧及天公。亦是吾師。却看天師欲作禁。吾解千禁萬惡。若有禁吾反自著。急急如律令。

禁令家和法

南無伽帝伽帝膩。伽帝收濁遊。南無阿乾陀羅呵。彌陀羅灌陀沙婆呵。

右此法能令家內有不孝子。不順婦女。皆孝順。用法取一把土。呪三七遍。置家大門下。又呪一把置中門下。又呪一把置堂門下。又呪一把撒在井中。又呪一把置竈額上。如是七日。內外自然和順。但使行禁人精心呪之。

又凡人行處不安穩。疑有恐怖之事。即以氣噀之。便以拒禁呪之曰。急令辟惡鬼除制不祥。衆邪消盡魍魎逃亡。神符宣流。以知天惡。當我者死。值我者亡。急急如律令。

又法

唾三十六鬼。大鬼打頭破作七分。如阿梨樹枝沙呵。

凡行經神廟及斷虎狼呪。

吾爲天地祭酒。當爲天地頭戴日月。身佩北斗。急急如律令。

禁惡人鬼火法

呪曰。吾是元皇之孫。太上之子。口含聖眞神氣。付與東西百鬼。隨吾驅使。吾東向一唾。九木折。南向一唾。八火滅。西向一唾金剛缺。北向一唾流水絶。道氣流布。隨吾所説。急急如律令。

禁賊盜第二十一

夫欲出行。先畫地爲壇。房中六尺。庭中六尺。野外六十步。置十二辰位。身居甲地。自呼名某乙。今欲出往某處。征討時神。保佑於我。吉昌三言。乾大呼青龍下。呪曰。六甲九章。天圓地方。四時五行。青赤白黃。太一爲師。日月爲光。禹前開道。蚩尤辟兵。青龍俠舉。白虎承衡。熒惑先引。辟除不祥。北斗誅罰。除凶去殃。五神導我。周遊八方。當我者死。向我者亡。欲惡我者先受其殃。吾受北斗之孫。今日出行。乘青龍出天

門入地戶。遊陰中。覆華蓋。去寇賊。予楯刀。戟戟弩。見我摧伏。莫敢當禦。急急如律令。

禁賊法

唾此惡賊。欲來狂圖。某甲者。或從東方青帝來。或從南方赤帝來。或從西方白帝來。或從北方黑帝來。或從中央黃帝來。欲來傷害人者。令其作事莫成。拔刀自刺。拔箭自射。吾於四道開通。盜賊伏匿。五兵摧折。蜂蛇莫動。大尾辟側。百步莫令相傷。吾禁五方。惡賊伏吾手下。不得浪行。急急如律令。

呪童子令説鬼姓字第二十二

太上老君禁神。三呼三吸。以取其真。

東方青帝木中精。南方赤帝朱雀形。

西方白帝白虎神。北方黑帝乘舡行。

中央黃帝黃龍聲。

吾有其禁知天神。蓋不自發身歸誠。曰南施禁火精。曰北施禁五帝動。經吾三禁。莫敢不來。神道神名。鬼道鬼字。蠱道蠱名。魅道魅字。偷道偷名。賊道賊字。高山騰蛇。下山騰蛇。高山之崎。下山之峻。或在天上。或在人間。河伯將軍。五道脩羅。十二神將。登明君。天魁君。傳送君。小吉君。勝光君。太一君。天罡君。大衝君。功曹君。大吉君。速送速送。汝名不得久停。急急如律令。

嵒（天佛）九九山（使靈符）𡈼三（法籙）玉 𡈼鬼（一本如此。）

右前件取清水半升。以刀子攪之。誦此呪三七遍。與小兒飲之。朱書前件籙於小兒髆。（膊 作）下少時召鬼並來。小兒自見。一一問之。即道所作病。所作鬼抄取姓名。發遣。如治癲法。與過所遣之。如上說也。

度符啓請神言曰。

先上香呪筆曰。以筆指口鳴六鼓。

謹請東方青帝老君來下纒吾筆。

謹請南方赤帝老君來下纒吾筆。

謹請西方白帝老君來下纒吾筆。

謹請北方黑帝老君來下纒吾筆。

謹請中央黃帝老君來下纒吾筆。指天天傾。指地地窜。指鬼鬼死。指人人生。急急一如太上老君律令。

請五方水度符言曰。

謹請東方青龍真氣入吾水中。

謹請南方赤龍真氣入吾水中。

謹請西方白龍真氣入吾水中。

謹請北方黑龍真氣入吾水中。

謹請中央黃龍真氣入吾水中。

謹請五方五龍真氣入吾水中。吾水非常之水。煑桃作湯。吾刀非常之刀。七星俠傍。吾口非常之口。內含魁罡。水在江中。名曰江水。水在井中。名曰井水。水在井中。名曰井水。水在吾椀中。名曰清淨神水。水在吾口中。名曰太上老君解穢之水。吾水噀山山崩。噀地地裂。噀人人生。噀鬼鬼滅。急急如律令。灑水言噓。係天師陽平等二十四化真氣臣某弟子自稱道號某嶽真人。某先生。以今月今日今時。奉為某家弟子度某符。隨符言之。

神符度呪曰。日出東方。光曜表裏。行符勅水。出於老子。老子行符。從五岳所使東九夷從符行。南八蠻從符起。西六戎捉鬼軍。北五狄破鬼營。中三秦從符所攝。急急收錄。一鬼不去。斬付北嶽。天有三皇。地有五嶽。某所行符。自有法則。非當吾真。當符者死。值符者亡。一鬼不去。斬付魁剛。急急如律令。

又曰。符主東方木折。南方火滅。西方金缺。北方水竭。中央土裂。符主天清地裂。人生鬼滅。急急如律令。噀水三口。度神符主符啓請。

謹請虛無直符直事。三十六人從吾符行。

謹請太清直符直事。今歲直符直事。今月今日今時直符直事。各三十六人從吾符行。保某家弟子三災度脫。急急如律令。噀水三口。又曰。天圓地方。六律六章。神符燒香。災厄消亡。符到奉行。急急如律令。

禁經上下兩卷。二十二篇。其間辭語鄙野。蓋出俗傳。思邈切於救人。寔是錄其文不加刪潤。今具有云。庶成一家之書。

千金翼方卷第三十

文政十二年重
彫元大德刊本

後記

《千金翼方》三十卷，唐·孫思邈撰。翼，輔翼的意思。孫氏既撰《千金方》猶慮或有缺遺，更撰《翼方》以輔之。後人云：『《千金方》一書，獨傷寒未之盡，似未盡通仲景之言，故不敢深論。後三十年作《千金翼方》，論傷寒居半，蓋始得之』。則二書當以合觀爲是。全書三十卷，內容包括藥錄纂要、本草、婦人、傷寒、小兒、養性、辟穀、退居、補益、中風、雜病、癘病、風𤸷、瘡癰、色脈、鍼灸、禁經等，凡一百八十九門，合方、論、法二千九百餘首。其中本草共載藥八百餘種。在用藥處方上，又分列藥用爲六十五類。本書取材廣博，大多輯自唐以前古醫書。林億等稱其書：『至纖至悉，無不該備。』宋人有云：『今通天下言醫者，皆以二書爲司命也』。雖云

過譽，然其見重於醫界，可以知之。

今影印底本爲清光緒四年（一八七八）長州黄學熙據日本江戶醫學影宋本重刻本，原影刻本無句讀，今參考人民衛生出版社一九八二年影印本和華夏出版社一九九三年點校排印本標加，對書中較爲明顯的錯、訛、衍、脱，並予訂正，附於書後校勘表中。

吉文輝

校正千金翼方後序

夫疾病之至急者有三。一曰傷寒。二曰中風。三曰瘡癰。是三種者。療之不早。或治不對病。皆死不旋踵。孫氏撰千金方。其中風瘡癰可謂精至。而傷寒一門。皆以湯散膏丸類聚成篇。疑未得其詳矣。又著千金翼三十卷。辨論方法。見於千金者十五六。惟傷寒謂大醫湯藥雖行百無一效。乃專取仲景之論。以太陽方證比類相附。三陰三陽宜忌霍亂發汗吐下後陰易勞復病爲十六篇。分上下兩卷。亦一時之新意。此於千金爲輔翼之深者也。從而著之論曰。傷寒熱病。自古有之。名賢濬哲。多所防禦。至於仲景。特有神功。尋思旨趣。莫測其致。有以見孫氏尊而神之之心也。是二書者。表裏相明。至纖至悉。無不該備。世又傳千金髓者。觀其文意。殊非孫氏所作。乃好事者爲之耳。王道集外臺祕要方。多載所出。亦未之見。似

出於唐之末伐。博雅者勿謂其一家書也。至於合藥生熟之宜。炮炙之制。分兩升斗之齊。並載于金凡例中。此不著云爾。

大德丁未良月
梅溪書院刻梓

校勘表

三二六	九(後)	9	獨活酒治產后中風方
五五四	十三	(肌)食一餅	飢食一餅
五八二	九	白(羊)骨	白羊骨
六一五	十三	(理)舍北陰中	埋舍北陰中
六一六	三	(二)十日齲齒除者	三十日齲齒除者
六六七	十	(苓)苓	茯苓
六七一	一	大豆(齊)	大豆卷
六七七	五右	半夏壹(十)	半夏壹升
七一〇	五	非1者不差病	非大者不差病

八二六	九	渴(升)水漿方	渴勝水漿方
八三八	七	黃牛新[2]者	黃牛新生犢者
八七五	四	小兒亦[2]	小兒亦可服
一〇一〇	三	宿(物)食	宿勿食
一一二二	十三	寒如病(虎)狀	寒如病瘧狀
一一三四	七	水一斗五(斗)煮取	水一斗五升煮取
		三(斗)日服一(斗)	三升。日服一升
一一四二	七	(湯)上溫塗	腸上溫塗
一二〇一	十三	攢(行)	攢竹
一二二一	十三	一(空)在後一寸	一云在後一寸

中國醫學大成續集

責任編輯　周瑞芳
　　　　　虞厚安
　　　　　高一聰
封面設計　戚永昌

ISBN 7-5323-5215-3

9 787532 352159 >

定價：100 圓

[General Information]
书名=千金翼方
作者=（唐）孙思邈撰
页数=1412
SS号=10858400
DX号=
出版日期=2000.12
出版社=上海上海科学技术出版社